


M 90-1°

2-h Jies.





полный и вс Е общій

المراج ال

домашній льчебникъ,

Сочиненный как для предохраненія здравія надежньйшими средствами, так и для пользованія бользней всякаго рода, сь показаніемь причинь, признаковь, а наипаче разпознавательных ь,
гньзда, оборотовь, усилія и исхода оныхь; лькарствь как в повсюду предь глазами нашими
находящихся, так и продаваемых ь вы Аптеках в; наименованія оных в как в Россійскими,
так и латинскими словами; доброты, времени,
употребленія, количества пріема, образа пріема, и других в нужных в обстоятельствь, вы
пользу всякаго человька, вы какомы бы оны ни
быль состояній, чинь, родь жизни, и вы каких ь
бы ни находился бользнях в.

Твореніе Г. Бухана, славибишаго въ нынъшнемъ въкъ Англинскаго Врача.

TOMB IV,

MOCKBA.

Въ Университенской Типографіи. Иждивентемъ В. Окорокова.

I 79 I.

35

O A O B P E H I E.

По приказанію Императорскаго Московскаго Университета господь Кураторовь я читаль сію книгу, подь заглавіемь: Полный и Всеобщій Домашній Авчебникь, Томь IV, и не нашель вы ней ничего противнаго наставленію, данному мнь о разсматриваніи печатаемыхь вы Университетской Типографіи книгь; почему оная и напечатана быть можеть. — Коллежскій Совытикь, Краснорычія Профессорь, Ценсорь печатаемыхь вы Университетской Типографіи книгь и Кавалерь,

АНТОНЪ БАРСОВЪ.


Valetudo sustentatur notitia sui corporis; & observatione, quæ res aut prodesse soleant, aut obesse; & continentia in victu omni acque cultu corporis tuendi causa; & prætermittendis voluptatibus, & cet. Cicer. de Offic.

Optimum vero medicamentum est opportune cibus datus.

Omnes homines artem Medicam nosse oportet: & ex his maxime eos, qui eruditionis ac eloquentiæ cognitionem habent. Nam sapientiæ cognitionem Medicinæ sororem ac contubernalem esse puto. Sapientia enim animam ab affectibus liberat: augescit autem intelligentia præsente sanitate, cujus providentiam habere honestum est eos, qui recte sentiunt. At ubi corporis habitus ægrotat, neque mens ipsa alacritatem habet ad virtutis meditationem. Morbus enim præsens, animam vehementer obscurat, intelligentiam ad adsectionem per consensum ducens.

Hippocrates, lib. de Nat. bom.





полный и всеобщій домашній Л В ЧЕБНИКЪ.

продолжение ВТОРОЙ ЧАСТИ.

TAABA 49.

О Венерихеской бользни.

Весьма справедливо, что некоторые иевежды, вые причины шиваясь во предписывание лекарство ко врачеванию побудисть бользыи, могуть быть причиною многихь был вый говорить о вественных приключений; но таковая опасность довольнерической но уже отвращена будеть темь великимы и надеж семь сочне нымы преимуществомы, которое получить больной, когда благовременно будеть имыть познание о своемы состоянии, и о самомы пищеупотреблении, какого вы сей бользыи требление и не врачуеть его бользыи, то по крайней Томо IV.

мврв оную учинить сноснейшею и для его телослежежія не столько опасною (і).

Hevzo6ешва проискодний отъ необходимости, въ кановой часто бы ваеть чежовъкъ, чтобы €ирывашь. сію боль. 3Hb.

Нешастве особенно съ сею бользиво сопряженное есть то, что всякь за нъкоторой стыдь почитаеть объявить, что оною страждеть. Таковое мнъніе необходимым в содълывает в притворство, и побуждаеть больного или скрывать свою бользнь, или искать помощи у тъхъ, кои ему объщають выльчить. его скоро и тайно; но которые въ самой вещи отдаляють признаки на время, и симъ способомъ оной яда глубже въ кроск вгоняють. Такимъ- пто образомъ легкая бользнь, которую удобнобы можно было изльчить, не рыдко бываеть превращаема въ бользнь упорную, а иногда и совстмъ неизлечимую,

ANN Mero не можно во чинь ее тошаенныствами?

Другое нещастве равным в образом в съ венеритеского сопряженное бользніго есть то, что она бываеть множества различных видовь, такь что се: мя льнар. можно бы лучше называть собраніем в бользней, нежели одною бользнію. Дві различныя бользни не требують такого разнообразнаго способа леченія, какь Венеритеская бользиз въ ся различных в пергодахь: откуда видеть можно, сколь безумно-и опасно, для врачеванія оной, полагаться на какое нибудь лікарство. creen barbers. тайное.

> Однакож всякой день видимъ мы таковыя лакарства предписываемых и во всей точности равно VIIOтреб-

⁽ г) Мы не имбемб нужды оправдывать того, что Г. Буканб забев говоримъ. Правишельство, пенущееся непрестанно обо всемъ, могужемъ споспъществовать иъ облегчению и сохранению гражданъ, обрашило отеческой взорь на оную толпу нещастныхъ, которые, кота ж жертвы большею частию самаго постыднейшаго распутства, не менте достойны нашего сожальнія, поколику суть люди. По благорасположению онаго оширышы публичные курсы, въ истерых в преподается исторія, познаніе и пользованіе Венерических волбаней и оснаваны общенародные домы, гат бъдные безденежно пользующель

тользоващься, безъ малейшаго вниманія къ состоянію бользин, къ телосложенію больнаго, къ напряженности припадковъ, къ лешамъ страждущаго и тысячи другихъ обстоятельствъ, которыя суть самой величайщей важности (2).

A. 3.

Xo-

(2) Сін разсужденія долженствують быть принаравливаемы не тонмо нь льяарствамь тайнымь, но еще и кь разнымь способамь употре-бленія созственно дьйствующаго вы венерической вольни льяарства, то есть меркурія: нбо хотя бы различности вы разсужденін тьло-сложенія, возраста, признаковы и проч. и совершенно были извыстны врачамь; котя о важности оныжь сомніваться не можно, но ,, все , еще накодинся, справедливо говорить Г. Горль; вы пользованіи венеу, ступи в принаравно в за в принаравно в принаравній венеу, нужно было изноренить. Вы самомы ділі всяны придерживаєтся своу, его способа ліченія, да и самые почтеннійшіє прантики не різнюу, собственнымы способомы довольствуются; слідовательно натарый
у, имієть свой способы ліченія, и оной всямы прочимы предпочитаєть;
у, и что часто всего еще опасніє, наждый своєму способу слідуєть,
у, не жота ни мало отступать от онаго.

, Но всего болбе служить нь умвержденю столь зловреднаго зала Врачебной Науки мивнія що , что наблюденія чинимыя о Венеромических волбаняхь, которыя и сами по себь могли бы определять истинную действительность наждаго способа леченія, по нхв., существенной тайне требують и того, чтобы ихь почти ниногда, предь другими не обнаруживать, и что шарлатаны или площаде, ные врачи во всякое время на зло употребляли дозволлемую имь скромеромы, ность, выдумывая сами такія бользии, кон нажутся соотвётся, ствующими ихь леченость, и оныя употребляя за действительный; что самое и навленло на сей сбразь врачеванія самый существенный и правильный таное медоверіе, которое весьма нужень но вовсе истребить.

CABAOBAMEABHO EQUHOE CREACMED, TMOGH BY OHOMY HONYHIMES YENTER, COCMONAO BY HAGNOGERIEND, Признанных и утвержден. Ных за истинныя, и въ семъ токмо намъреній, которое можеть женьтано быть въ одних больницах в, самъ Г. Горих водумаль сострать изданныя имъ весьма нужныя наблюданія, подъ заглавість: Observations fixes to publices par ordre du gouvernement, sur les différentes methodes d'administrer le mercure dans les maladies vénériennes; 2. vol. in 82, à l'Paris, chez Monery, Libraire, rue de la comédie Françoise.

Певинные подвержены Chigarom's cel forkпричина чтобы прежарашь объ ней въ семъ воминенти.

Хотя Венерическая бользив и бываеть вообще елъдствиемь распутства и своевольства, однакожь вь настоящее время невинные равно подвержены оной. как в и виновные: малолешныя деши, кормилицы, поэни: новая вивальныя бабки, замужнія жены, коих в мужья в в распутствъ провождали жизнь, не ръдко оными страждуть, а иногда и умирають для того единственно. что не было приложено старанія объ отвращенім таковой опасности благовременно.

> И такъ самыя сіи злоключенія, коимъ подвержены бывають подобные люди, послужать намь извинентемь, естьли токмо оныя для насъ нужны, при намъреваемомъ описанти признаков и самаго врачевантя сей по нещастію весьма общей бользии.

Paenozomewie cen тлавы.

Естьли бы мы сталивычислять всв различные признаки Венерихеской бользии; естьли бы начали описывать стю бользнь во всьх вежвидах в, то конечно бы распространились мы болье, нежели сколько мазначено для сей части намего сочинентя: почему всв наблюденія наши и ограничимъ обстоятельствами самоважнейшими, не упоминая о техь, кои маловажны, или которыя ръдко встрвчаются.

Мы

Всякъ, прочитавъ сје сочиненје столь мужное и необходимое для упражияющагося во Врачебномъ искусствъ, улостоверится объ оной истиннъ, что способы врачевания венерической польяны должны равличествовать не различносни обстоятельствь, и чио ивть ни одного изъ оныхъ шакого, кошорой бы можно было назващь всеебщимъ и к Знаючительным Б.

и такь вь разсуждение сего мы должны отступить оть плана Г. Букана; предложивь о способажь испытанных в., покажемь совонупно и самыя обстоятельства требующи того, чтобы одинъ предпочтень быль другому, или требующіл стечетія многихь способовъ для благоуспешнаго враневанія. Къ сему намеренію сочиненіе Г. Торка руководенномъ намь послужинь.

Мы не станемъ такожъ предлагать о исторія еей бользыя, равно какъ и о различных в способах в (3) употребляемых в къ врачеванию оной, съ того времени как в она перенесена была в В Европу, и о мнотих в подобныхъ предметахъ, могущихъ безъ сомнънія бо. жве занимать читателя, нежели подать ему какое нибудь полезное сведение.

(ВЪ шести слъдующихъ параграфахъ предложено для чего булеть о главных в признаках Венерической бользни, предлагаежко непредполагающих в существованія яда венерите- в особлискаго въ цъломъ составъ крови, а слъдовательно и вости о нетребующих в столь полнаго врачеванія, как вене- главных в ритеская бользив вкоренившаяся, о которой говорено Венеричебудеть въ 55 7 и 3 сей главы.

Въ самой вещи не касаясь до того, что боль причиною шая часть сихв припадково можеть приключиться и сему то, птому, кито венеритеской заразв еще не подвержень, что прикакъ то мы постараемся учинить объ ономъ замъча- могутъ нте, всякь чувствуеть, что даже когда кто и под-существоверженъ сей заразв, могушь оные бышь столь легки вашь и тои столь нежнаго свойства, что естьли приступишь ядь венек в нимъ въ самомъ началъ и станень ихъ лъчить ричесной надлежащимъ образомъ, то можно надъяться изъ впу- не прошемъ перенних в частей истребить всю заразу онаго яда.

ОднакожЪ надобно признашься, что таковые случаи бывають редки; а темь еще и реже, что сопря. женный по справедливости съ сею бользнію стыдь побуждаеть часто кь открытію того, что оною страждень. не прежде какъ тогда, когда она болъе или менъе уси-

ской болт-

еще въ Kposb.

⁽в) им должны отетупить от плана Г. Букана, относительно къ различнымь способамь врачеванія Венерической волбани, нань що и вы предыдущемъ примъчания о семъ было нами упоминуто, для причинь вр скомр предложеннымъ,

жител. Впрочемы не всегда легко можно опредвлить, что зараза не прошла вы крось, развы когда признака будеты самый легчайшій, да и то при первомы началь оных заразы. Во всякомы другомы случай самое величайшее произошло бы неудобство оты сокрытіл бользни, которая, потому что не была врачуема во всемы ел пространствы, часто готовиты быдственных слыдствіл. И такы безы сомныта гораздо менье будеты опасности, когда предположить всь сій припадки веперитескіе, станешь пользовать оные за таковые, однакожы и то сы ограничиваніями, каковыхы требують свойство и состояніе бользни. Самымы опытомы многократно извыдано, что многіе, не употребляя сей предосторожности, часто о томы раслядваются.

B 1.

О Венеритеской гоно рреи, называемой просто ... ерыкомд.

Caokemaa sek 60x53Венерическая гоноррея или просто называемый ...ерыхд, есть невольное истечение гнойнаго вещества изъ дътородныхъ частей того или другаго пола (4).

Во сколько в ремени она оказы-

Первые признаки сей бользни оказывающся обыкновенно чрезъ восемь или девящь дней послъ шого, когда кшо оною заразишся. Однакожъ сте примъщно бываетъ иногда и во второй или третти день, а

⁽⁴⁾ Г. Букань неснольно ощибается, говоря, что машерія въ гоноррев есть гвойная. Всё искусные Врачи полагають, что она есть не иное что, какь влажность желбов находищихся вы изгибъ мочеточного стеола; да и вы самомы дыль естьми бы гной или вещество гнойное производили истечение вы гоноррев, то судя по изобилю, вы нановомы они вышенають вы поретное время, надлежало бы последовать нарочитому истощению самой сущности вы тыхы частяхы, кои оную вы себь выбщають. Однаножь случается иногла, что сія матерія шмысты теченіе инсколько мысяцовы безь всяной боли, помому что происходить она оть ослабленія членовь, какы то видыть можно вы з сей главы.

вногля не прежде какъ въ концъ четвертой или даже и пятой нельли.

HAEHBI

П ризнаки Венерической гоно рреи.

Пока истечение совершенно не откроется, признача больной чувствуеть накоторое щекотание, сопро предшевождаемое легкою болью въ дътородныхъ частяхъ: истеченюе по томъ свътлая и слизкая влажность начинаеть течь изъ мочеточнаго ствола; она мараетъ бълье и причиняеть небольшое щекотаніе; а особливо во время испущентя мочи. А сте щекоппанте, мало помалу увеличиваясь, производить наконець совершенную боль, сопровождаемую жаромЪ, а особливо около конца мотеиспускательного ствола, гдв скоро начинается такожь показыващься некоторое красное пящно и самое восжаленге.

Естьли стя бользнь начнеть усиливаться, то сопровожболь, жаръ моги и истечение увеличиваются, и но- маювые припадки день от дня открываются. Мужчины ше оное истечение. чувствують возстание илоти невольное и съ нъкоторою болью, бывающее гораздо чаще и долве, нежели какь выздоровомь состояни; припадока болье обезпоконвающий больнаго, когда он в окуппавшись лежить въ восшели.

Боль, которая сперва чувствуема была токмо около конечностей мотеиспускательнаго ствола, объ емлеть тогда все пространство онаго ствола, и бываешь гораздо сильные вы то время, какы больной помочится. Истечение сие болье и болье отстунаеть от в цвъта съмени, каковой оно прежде имъло начинасть желивив и принимасть наконець всв свой-CHIBA CHOR.

Wonshake язнерической гонортен дошежшей до camaro высочай-ERATO CH стапени.

Когла бользны достигнеть до сего степени, то всь признаки становятся напряженные; жаръ моги льлается столь великь, что больной почти не можеть мочиться, хотя безпрестанно позыв в кв тому имветь: наконець и могу испускаеть не иначе какь съ величайшею трудостію, а часто даже по одной каплъ. Невольное возстанје плоти приключается гораздо чаше и съ большею болью. Сверхъ того больной чувствуетъ вообще боль, жаръ и некоторую тяжесть около залняго прохода. Истекающая матерія бываеть острая и въ великомъ изобиліи; цвъть ея темноватый, зеленый, а иногла наполобіе к росавага.

ПорядокЪ. въ какомъ всв правиламъ

Пристойное пользование мало помалу уменьшаеть силу сихъ припадкова; жаръ мочи непримъшно ущоляется, бользненныя и невольныя возстанія плоти, падки про-жаръ, боль въ заднемъ проходъ становится сноснъс; падають, истечение перестаеть постепенно, и самая материя втань поль бываеть бълве и гуще, пока наконець не пропадеть зуется по совершенно.

женуеств2 Вользич . MOHHO разпознатив тоноррен.

Разсудительное вниканіе въ свойство сихъ приврачебнаго знаков тегко способствовать будеть къ отличению оть кото. Венеритеской гонорреи отъ всякой другой бользни. рыхъ не Однакожъ все есть такія бользни, съ которыми можно ее сывшать: какв-то вереды вв потках ими вв пузырь, были у женщинъ и проч.; но въ вередахъ потеко ихи пузыря гной выходить токно съ мотею. да и то когда запирка въ пузырв будеть открыта: а въ гоноррей напрошивъ истечение непрерывно продолжается: почему и труднее гораздо различить ее оть былей, о которых в мы станемь говорить выглавы 50, § 2, члек. IX сего Тома. Тогда надлежить стао бълкав, рашься болье всего разпознавать оную по ея дъйствілыв, какв-то по боли ею причинлемой, по заразв ею сообщаемой, и проч.

Чемъ от**жичаеттеж** она отъ ВередовЪ въ почнажь и пузырт!

(Kpomt

(Кромъ вере дого въ поскахо или въ пузы ре и белей слу- небольте часто, говорить Г. Горно, маленькие енойные пры полобие фицечки въ сережкахо, въ большихъ губахъ и другихъ частяхъ стулы въ тайнаго у да, кои бывають иногда совсъмъ неприметны, и вътородизъкоторыхъ происходить обыкновенно течь, коей не льзя ныхъ частяхъ стяхъ у никакъ смъщивать съ истечениемъ гонорреи. Вскрытиемъ женщинъ таковыхъ фистуло или фистульныхо полостей можно скоро заживить вереды, и пресъчь самое истечение.

Но сій гиойные прыщечки встрвнаются только у женщинь распутныхь. Причиною оныхь бываеть всетда Венерисеская зараза: почему прежде операціи, какой они требують, и нужно выльчить самую гоноррею. Однакожь наблюденіе Г. Горна есть весьма важно, потому что при неупотребленіи сего способа врачеванія истечніе оть нижь происходящее подало бы поводь думать, что гоноррея, оные сопровождающая, еще не выльчена, а чрезь то побудило бы продолжать безплодно лекарства и употреблять вязательныя, кои были бы совсьмь безполезны.)

члень и.

Діэта, какую надлежить предпивывать в Венерихеской воноррги.

Какъ скоро кто примътить, что сія бользнь пища, ему приключилась, то и долженъ наблюдать немедлен ноторой но и очень строго прохладительную діэту; такому житъ убъчеловьку надобно убъгать всего горячаго, какъ-то вина, гать. крвпких папитков, соусовъ съ подливками, пищи пряной, соленой, сладко приправленной, копченой, сушеной и проч., такъ какъ всъхъ душистых и острых растъній, на прим. луку, тесноку, мускатнаго оръха, гортицы, корицы, мускатнаго цевта, инбирю и проч.

Б 2

Kanvio OHWKOE vn-mpe6-Esma?

Питаться же должно раствитями усладительны. ми, молокома, отварами, легкими похлебками, жилкою кашицею и проч.

Пишье придичное.

Пишь должно ясную воду, молоко пополамь съ водою, деконты изъ корня большаго проскурняка и солодкаго кория; настой из в ланянаго св. пени, или процеженую сыворотку. Такого пишья больному нужно упопреблять в довольном в количествь.

Всякое сильное тело движение, какого бы рода ни было, а особливо верзховая Езда и любовныя забавы, должны быть оставлены: нужно ему беречь себя от в стужи, и какъ скоро воспаление усилитея, то 40хжно лежашь в посшели.

YAEHT HIL

Пвкарства, ком на добно предписывать вб Венерисеской гонорреи.

Сей болвз-MHO AT-ANILP HOспъшно.

Сколько

времени

Релко случается, чтобы кожно было вылечить ни не мо- скоро и вивсив совершенно Венеритескую гоноррею: и такъ не должно больному ласкать себя скороноспешным в излечением в; да и никакой Медик в не пожеть ему объщать того.

Венеритеская гоно ррея продолжается часто да, три мъсяца, а иногда иять и шесть, коти и было упошребляемо надлежащее пользование, и больной охоженя и бы, шно слушался Медика во всехъ предписанїяхъ.

она продолжается. ВаетпЪ **МОЛЬЗОВАНА** по правижамъ ис-Myccmaa.

Пользование Венерической гонорреи самой легкой.

Однакожъ надобно признаться въ томъ, что можно остановить Венерическую гоноррею самую легкую въ короткое время, промывая дътородныя части въ теплой соль и молокь, и впуская въ мотечепускательвои стволь почасту въ день немного сладкаго мин-Aans.

(mp 111082-HEN YCAR dksh mg

Частная

вання.

暴战基。

жальнаго масла, или настол из в лынянаго свмени, нелогрытых в не болые как в нарное молоко, или вегетомине ральной воды Гулардовой; и естьли сти средетва не достаточны к в излычентю болыми, то всекла силу оныя уменьшають.

Что касается до слательных шприцованій, съ наково то оныя должно употреблять съ величайшею пред рожноосторожностію, и единственно тогда, когда бользнь стіо набудеть весьма легкая и совершенно недавная; ибо добно упокакъ скоро она усилится или застарьеть, такъ что треблять
ляд имъль уже время взойти во вев мокроты, то ныя шприсін средства могуть болье только продолжить из- дована?
леченіе бользни и оную учинить опасныйтею.

Нынъ всякъ вообще старается останавливать одному жегкія голорреи посредством в сязательных иприцо жанку мо- моній. Не льзя сомнъваться, чтобы средство сіе не жно ихъ было хорошее, а особливо когда можно оное упо-прединем треблять безопасно; но сіе дълать могуть люди вать. знающіе и вы пользованіи сей бользии искусившіеся.

Влательных шприцованух, о которых в тенерь составъ товорено, демаются следующим в образом в:

Возьми свинцуваго сахару, - . тритцать грановъ; ширицоваРозовой воды - - шесть или семь унцій.

Сившай вивешь.

По Хашын Б:

Recipe sacchari saturni, - - - grana trigintas;

Aque rosarum, uncias sex vel septem;

Misce:

Когда обстоятельства нозволяють его употреб- спосось, Анть, то подо ревь не много, наполнить имь не требанию большой шприць, конторой и вложить вы мотейстуска- его, ногда тельной стаоло, каждым день шприцовать надобно разы поналопять или шесть, и продолжать до тахь порь, поко истечение не перестанеть.

жества чиньть, но хистительных лькарства прохладительных стительныхь львсегда приличные вы гонорреи. Однакожы не должны нарствы оныя быть крынки, а и того менье взяты изы класса прохладительныхь.
Всякое лькарство могущее сильно потрясти составы тылесный усугубить только опасность, и самой бользни придасть глубочайште корени.

Доставить два или три раза на низв, каждые два HEAR . MOпорую " или три дни, въ первые папнапнапь супокъ, сполько онжкож же каждые четыре или и пятой день во второе пятпредположить при натцати суточное время, доводьно вообще кЪ уменьупотребшенію воспаленія, умъренію истехенія, перемъненію женін чиивъта и самаго существа матерїи, которая будеть стительбытье и гуще, по мыры того, как венеритеской яль HMM'b. станеть разбиваться.

Естьян больной можеть принимать Глацбе рову Ranis nooсоль съ манною, то надлежить сму дать шесть драхив жизли-BRESSHIEL . сей соли и половину унціи манны, или ежели твло-ANCIBHсложение требуеть, можно употребить и до унции пельныя оной соли съ толикимъ количествомъ манны. Оба сін OHMKKOK предписывещества должно распустить въ одномъ фунтъ ки-Bamb. Глауберова ПЯПКУ, или сыворотки, или самой жидкой кашицы. соль и ман- и больному дать принять все поутру. на. Пріемъ.

На той Естьми же настой из В Алексан дрийскаго листу и въ Алекиз В тамаринта покажется для него не столько проегнарійска, тивным в, то оной надлежит в приготовить следуютамаринтамаринтамарин-

беровой

собЪ, канЪ

Возьми Ялексан дрійскаго листу - дві дражны.

Тамаринта - одну унцію.

На-

Налей на сей составь фунть кипятку и поставь приготовона целую ночь: поутру процеди и прибавь Глаубе ровой мить оновесоли половину унцін. Сего настол должно давать по чайной чашке чрезь каждую половину часа, пока не станеть действовать.

Сей рецепть на Латинскомъ языкъ пишется слъдующимъ образомъ:

Recipe foliorum sennæ, - - - drachmas duas;

Tamarindi, - - - unciam unam;

Adde salis Glauberi, - - - unciam semis.

Но когда больной желаеть лучше отистить себл электуаргемв, или составомь наподобге натоки рій чиств жидкимь, то приличные всего слыдующій:

Возьми слабительнаго электуарія четыре унцін; проклаж-Виннаго камия, — — дві унцін; Голгеной ялаппы, — — дві драхмы; Голгенаго резеню, — Одну драхму; Сиропу изб білыхо розб довольное количество.

Ежели кому угодно получить из в аптеки ствети, то может в написать Латинскими словамы следующий билетець:

Recipe electuarii lenitivi, --- uncias quatuor;

Cremoris tartari, - - - uncias duas;

Jalappæ pulveri satæ, - - - duas drachmas;

Pulveris rhei, - - - drachmam unam;

Syropi rosarum albarum, - - - quantum necesse est.

Сившай все это, и сдълай жиденькой электуа-

Сего состава должно давать по двё или по три пріємъ.

когна больной захочеть себя отистить. Можно такожь увеличить или уменьшить приемы сихв лекаротов смотря по обстоящельствамъ.

Мы предписали распустить Глауберову соль вы довольном в количествъ жидкости для того, чтобы сія операція не столько была трудная.

Пользование Венеритеской гонорреи тяжкой.

Первое состояние, или состояние воспалительное.

KPOSORY-

Какъ скоро признаки воспаления бывающь сильные. то надлежить всегда начинать кровопусканіемь. Таковое дъйствие, равно какъ и въ другихъ частныхъ воспаленіяхб, должно повторяемо быть смотря по кръпости и телосложению больнаго; или по тому, какъ сего требують усиливающиеся признаки (5).

Мотегонительныя лъкаренва полезны шакожь въ То дезность семъ періодъ бользни; почему и должно давать слъ-MOVETOHUшельных дующее лакарсшво: авиарентав.

B03%-

(5) Должно примътить у что Г. Бумань провопускание предписываетъ в такомъ единственно случат, когда признажи соспаленія бывають сильные; ибо въ легкихъ воспаленіямъ, нановыя случаются обыкновенто въ Венерической гоноррев, кошерая не пака еще въ мошенку, просопусканіе, лишая больнаго и ткоторой части сплв, могло бы привести его въ разслабление, а чрезъ то и способствовало бы къ продолжению истечения, которое и такъ уже остановить трудно-

Миз кажешея в что сего не въдаетъ большая часть ттхв, кои и чишають себя за первышихь испусниновь вы пользования Венеричевкой колбэни. При мантишемъ признакт отворяють провы: и ихъ навыкь. въ разсуждени сего споль осабиленный, чио и не принимажотся никогда ва такъ называемое ими пользование, не начавъ прежже съ провопусканія, даже и въ такихъ случаять, когда бользив существуеть понмо въ одномъ ихъ воображения, или безсовъщия, какъ - то мы сте изъясния въ главъ зг, примъч. т Тома ИМ. Однако Венерическая положь не имбеть нинакого преимущества предв всеми прочими: провопускание вы оной бываеть нужно и даже полезно только тогда, когда сна вопревождается признаками того требуюжими, о чемъ подробно мы описали въ конца примачания в, глав. 2 Тома II; а употреблять оное, накъ многіе дълають, всякому безъ разбору, очень дено отпрываещь чим дерзость мам совершенное немв-AK CCIII BO.

селитры - - - Одну унцію; Селитра т Ярабской камігди, - - дві унцін. Арабсная Возьми селитры - -

По Лашынт:

Recipe falis nitri, - - - unciam unam; Gummi Arabici, - - - uncias duas.

Смъщай все вмъстъ и раздъли на чещыре равные пріема.

Больной принимать должень по одному изв сихв пріемъ, прісму при или четыре раза на день въ стаканъ своего нишья. Ежели сте лекарство будеть понуждать его мочиться столь часто, что приведеть въ безсилте, то надобно или принимать ему не такъ часто, или вывещо селитры даващь ему щоликое же количе выда ма · PHESIA. СПІВО бълой магнезии.

ровЪ. Покв.

Когда боль и воспаление имъющъ свое мъсто око- обстолдо шейки пузыря, то надобно часто ставить мясти тельства тельчые клистиры, которые кромъ той выгоды, что требуюпобуждають на низв, служать еще и внутрениею при начетипаркого частямь воспаленнымв.

за оныхъ. Мягтительныя припарки весьма полезными почи принарки таются, как в скоро удобно можно прикладывать их в изв мяникъ больнымъ частямъ. Таковыя припарки дълаются изъ нагосъмо, толченаго льнянаго съмени, или изъ мякиша писпит-локомъ, и наго кавба св молокомв, смешаннаго св свежимв тухон корольимь или дереским в или хорошим в деревянным в маслом в. ВяннымЪ

(Лекарство, которое завсегда мыт удавалось въ масломъ. таких в случаях в в коих в упомянутыя теперь при- ша жавепарки не такъ скоро унимали боль, есть припарка изъ наго и ве-Мяки ша хабонаго ѝ вегето мине ральной воды Гула р довой, гето - ми-неральной которую перемьнять должно чрезъ каждые два или воды гутри часа: менње нежели въ полсушки доставляють мардовой, они нарочитое облегнение, а не радко въ одинъ день Jone IV

воспаление и боль разбиваются. Сил припарка дълается обыкновеннымъ образомъ, и такъ какъ мы о семъ говорить будемъ во есеобщей таблиць, смотри въ Томъ V слово припарка.)

Теплыя припарки. Ежели не можно употреблять таковых припарока, то надлежить прикладывать полотно обмоченное вы теплую воду, или пузыри наполненные молоком сы водою. Мнь случалось часто видыть самую жесточайщую боль, во сремя соспалентя, гонорреи, утоляему тыть или другимы изы сихы внышнихы мыхарство.

Преимущества подвязки. Поделзка для поддержанія мошны есть самое удобньйшее средство къ утоленію воспаленія съмяно-носных сотудово. Надобно оную дълать такъ, чтобы поддерживала ядря, и больной долженъ ее носить съ самаго начала бользни, и нъсколько недъль по выздоровленіи.

Предложенное нами теперь пользование выльчиваеть иногда гоноррего такъ скоро, что больной остается въ безъизвъстности, быльли еще оною одержимъ или нътъ. Однакожъ ръдко надъяться должно на столь благоприятной оборотъ; ибо гораздо чаще случается, что таковое пользование только на время отдаллеть признаки воспаления, такъ что и берутъ прибъжище безъ опасения къ собственно дъйствующему лъкарству. то есть къ меркурию, который кажется необходито нужнымъ во всъхъ упорныхъ припадкахъ Венерической бользии къ совершенному оныя излъчению.

Второе состояние Венерической гонорреи, или время употребления меркурия.

Когда кровопусканія, систительныя, припарки и всякія другія средства, нами здёсь предложенныя, уймуть

уймуть боль, привелуть вы обыкновенное состояние пульов, утолять жарь моги и уменьшать частыя невольныя возстания плоти: то больному должно начать употреблять меркурій вы такомы видь, который для него не столько отвратительные покажется. (Но надлежить тогда поступать по \$\mathfrak{S} 7 u 8 сей главы, гдь мы предложили о главных способахо, какь употреблять меркурій, и которой изы оныхы избрать смотря по обстоятельствамы.)

Естьли больной лучше рёшится на обыкносенныя обынномеркуріальныя пилюли, то довольно будеть ему вънамеркуріальныя пилюли, то довольно будеть ему вънамеркуріальныя принимать по двё ввечеру и но одной поутру: альныя
которой пріемь должно уменьшать, какъ скоро меркупилюли.
рій очень сильно станеть действовать во рту; а ежели
во рту никакого действія от онаго не чувствуется,
то пріемь увеличивается постепенно допяти или шести на день.

Естьми же больной предпочитаеть каломеласо, колометто должень принимать каждой вечерь, лежа вы посте-мась вы ли, по два или по три грана, изы чего надлежить натышествать катышеко сы розовымы вареньемы или розосымы консерсомо, и сей пртемы надлежить увеличивать мало помалу до осыми или десяти грановы, какы то мы о семы будемы говоритьниже вы у сей главы: Смотри способо како употреблять меркурги неразпускаемый, или пилюли меркургальныя.

Самое обыкновенивниее и нынв болве употре сумема. бительное приусотовление меркургальное есть сумема (mercurius fublimatus corrofivus); ее давать должно такъ, какъ мы совытовать сте будемъ въ Венеритеской болизии вкорениещейся: смотри въ § 7 сей главы, способъ, какъ употреблять сумему. Сте лекарства, предписанное всъми потребными предосторожностьми находилъ В 2 я всегла за самое надежньйшее и сильно двиствующее въ полобнахъ бользняхъ.

Больной можеть принимать по изъ сихъ лькарство, которое онв избереть, или кажлой лень. какъ мы теперь говорили, или токмо чрезъ лень. смотря по тому, какъ желу доко его переносить въ состояніи будеть.

Ие должно \$036 V 78 -

Пріему не должно никогда бышь столько сильдань сли ному, чтобы возбудилось слипотетение, развъ токмо мотеченія, весьма легкое; ибо сію бользнь можно выльчить льйствительные, и съ такою же достовырностью безъ слинотегенія, нежели возбуждая онов. Когда мер. курій выходить сь изобиліемь чрезь желізы рта, то бользни не пользуеть съ толикимъ усивхомъ, какъ тогда, когда долгое время остается вы тель, и изъ онаго мало помалу выступаеть (6).

Ko-

⁽⁶⁾ Мивніе Г. Бумана относительно до слинотеченій сходствуеть съ мивніємь всткь искусныхь мединовь. Долговременный опышь ясно доназываеть, говорить Г. Лістодь, что птіализть или слиноточеніс, которое прежде многіе почитали за нужное, не только бозполезно, но еще и опасно. Вошь накь Г. Горнь извисиленся о слинотечения въ другом'в сочинении, изданном'в вв 1775 году, подв заглавіем в: Ехробы sion ra sonnée des différences méthodes d'administrer le mercure dans les maladies v.nes iчинея, рад. 26 6 Juivantes, то есть сеновательное изъяснение различных в способовь, нань употреблять меркурій вы Венерический бользжахъ, стран. 62 и савдующіл.

[,] Миотіе думали во время первыкв опытовв пользованія Вене. в рической колбани, да и самые знаменишые въ Медицинъ мужи лерь за жались сего мибнія, что слинотеченіе было необжодимо нужно нъ в изатчению Венерической волбани; и на семб - то выметания всекв ь основываль свою надежду и расподагаль употребление меркурій. таковое заблуждение швыв было опаснве, что оное по видимому в полдерживалось провишемь и самымь страшнымь самь сыметаниемь ь. Почему и нужно было къ истребленю онаго, дабы внима тельные т и умозанлючающие наблюдащели, ив часто повторнемымв опышамв.

Когда меркурій слабить, или причиняєть ко- что налоба лотье больному ночью, то должень онь принимать но дълать, настой изб Ялександрійскаго листу, или какое нибудь курій сла. Аругое гистительное, и въ довольномъ количествъ бать най пить отварб изб ясных крупб для предупрежденія крова причивать ком захва по петово, довольно обыкновенных в тымь, кои захва потье за потье за принимають не надлежащимь образомь прі уготовленный меркурій.

(Ибо самая величайшая опасносные сопряженная что происство Вене ритеского бользніго есть та, что не можно от сего положиться на цёльность меркурія и онаго пріуго-лена оно каго расхода, какой бываеть на сіе существо, и от вели ногда оно малаго свёденія и вниманія тёхь, кои его употреждено уготовлення оправдать уготовлення нерадёніе Адтехарей? Вь разсужденіи сего оно такь но бывае важно, что не рёдко видимь мы многія бёдственныя приключенія происходящія от употребленія меркурія

B 3

kir

³⁾ донавывавшимъ недостатокъ и опасность санномечения, присовонув пили самое убъянтельнъйтее донавательство для обращения на прамую стевю людей недовърчивыхъ.

ь, Въ самомъ деле, накъ меркурій почищается советвеннодей. з стоующимъ лькарстоомъ для венерического яду, то и необходимо у было нужно дать лапарству сему пройти во вст. части тала во онымъ заразивиняся: ибо им малъйшая часпица сего ядо не могла избъэ, ти уть оть действія онаго, не произведши вновь вь скоромь времени, чрезв э, сообщение, которое необходимо и неминуемо происходило от кругообраэ щенін (circulatio) повых в безпораднов в хуже еще первых в. И шик дов у, знались, что слинотечение, применая всв меркуриальныя части, э, но жельземь рта и самаго нека, прочія части шьля оныхв лишалов ,, что чистительныя, утольющія и останованощія слинотеченіе, э, им вли подобное сему неудобство: что самое, будучи соединено съ новыми э, пранадкам, накимъ подвергались опять многіе больные, симъ споэ собомъ пользованные, наконець принудило оной вовсе оставить; п у сжели еще находятся ибноторые тему последователи, то сте при-, писывань должно упряметву невъжеству и самой привычив, неэ достапкамь поистиний непреоборимымь, когда оныя сопражены BMBcmB.

и от пріуготовленій онаго, а притомъ и самыя пользованія совершенно неудачныя, по тому ли что меркурій не быль прежде оживлень киноварью, кото. рое двиствие есть самое существенное и необходимо нужное; или по тому, что оной употреблень быль не въ надлежащемъ количествъ въдълаемыхъ изънего пріуготовленіяхь; или наконець по тому, что оной не совершенно разведенъ въ салъ, изъ котораго дълается мазь, или въ камваи, извлетентяко и проч. изъ коих в пріуго повляются пилюли, катышки и проч. Вв прошломъ 1784 году принуждены были Медики при себь вельшь пріугошовлять лекарства, которыя принималъ одинъ Офицеръ, коего прежде пользовали двоекрашно и безъ всякой пользы, и кошорый посла въ продолжении обыкновеннаго времени совершенно былЪ выльченъ чрезъ оное третте пользованте.)

КакЪ скоро кишки удобораздражаемы, и меркурій начинаеть производить колотье или слабить, то еїн опасныя действія предупреждаются прибавкою кЪ пилюлямой или къ катышку предписаннымъ на 19 стран. нав япон- сего Тома, трипцапи или сорока грановъ діаскордія пли Японскаго состава. Повторив в си пилюли или катышки, должно давать систительное питье для изгнанія меркуріл и предупрежденія слинотегенія.

Дічекордій €ной соcmaBE. Чистительное пишье.

ПріємЪ.

Способъ удержать меркурій отъ сильнаго дъй-Средения къ воспре ствія во рту, или возбужденія слинотеченія, заклюпяшствочается въ томъ, чтобы составлять его ев тистиму, чтобы тельными. Въ семъ то намврении и выдумали меркиральныя пилюли слабительныя. Обыкновенный пріем'ь меркурій диль сли- полагается въ притцать шесть грановъ, или номеченія, трехв пилюль, ввечеру и поутру, которой повтомеркурі- ряется чрезъ каждые два дни; но всего одагоразумальныя пи- нъе начать двумя или такожь одною такою пилюлею, вительных. и доходить до трехъ не иначе, какъ постепенно.

(Cb

(СЪ величаниею осторожностию наблюдать дол-внимание; жно, чтобы сих в слабительных в пилюль давать не боль- каного ше, какъ сколько потребно къ удержанию привала мер- требуетъ употрекуріл кЪ слинототнымо жельзамо; ибо, какъ що мы бленівсихъ изЪ предыдущаго вримъчанія видъли; тистительныя, пилюль. продолжаемыя слишкомъ долгое время, могутъ имъть то же самое неудобство, какъ и слинотетение, а именно ко кишкамо приптягивать всь тасти меркуріальныя и оных в лишить прочія части тела. И так в надобно, как в скоро признаки слинотетентя от далены булуть, прибъгнуть паки къ меркурію, несоставленному съ сиетительными, которой надлежить давать въ меньшемъ пріемъ, или въ иномъ совсъмъ видъ, какЪ то мы говорить будемЪ вЪ § 7, гав предложимв о разныхв способахв, какв предписывать мер-Kupiii.)

Чтожъ касается до тъхъ людей, кои не мо- меркурій гутъ принимать ни катышково, ниже пилюль: то въ видь онымъ надлежить давать меркурій въ видь жидкости. Для сего дъйствія распускается онъ въ водяной жидкости посредствомь Арабской камьди. Сте прічуготовление имъетъ то преимущество, что препятствуеть теркурію подыматься въ роть; отъ чего онь по многимь отношеніямь можеть почесться превосходиваннямь лікарстволю.

Воть способь, какь делать стю диссолюцію или Распущень распущенте:

Возьми меркуріл киноварью оживленняго, одну драхму; камелью, или просто перкурій вы біе слизени, двё драхмы. съ на-

Надлежить тереть меркурій сь окого распущен-медыю. коло камедыю вів мраморной исоти до тёхів порів, пока шарики меркурія совершенно не разобыются. Тогда мало помалу, помішивая всегда.

При-

Прибавь бальзамитескаго сиропу, половину унцін; Простой коритневой воды, восемь унцій.

По Лапынь:

Recipe mercurii ex cinnabari revisicati drachmam unam;
Mucilaginis gummi Arabici, drachmas duas;
Adde syrupi balsamici, - - - unciam semis;
Aqua cinamomi simplicis, uncias octo.

Tpiemb.

Сего состава должно давать по одной столовой ложкв каждое утро и вечеръ.

Нѣкоторые почитають сте мерку ртальное пртусотосленте за самое лучшее, какое только можно предписывать въ гонорреи (7).

По

(7) Сіе мерпуріальное пріуготовленіе привстно здись подо именемь Буммическаго или во намбли распущеннаго мерпурія: из бритені, емо онаго одолжены мы Г. Пленку, харургу и лиушеру, которой публиковаль сбо немо во сочиненія подо заглавіємь: Меньодия нога во facilis argentum vivum agris venerea labe infectis exbibendi, екс. Vindobona, 1766. Но вмисто воды коричневой простой, Г. Пленко предписываеть воду изь чистотька (fumaria vulgaris) во такомо же количество. Однакожь, говорить Г. Герні, сметри примін. в, стран. 20 сего Тома, не взипал на пышных сбіщанія Льтора, сіе пріугстовленіе не достигло еще до того, чтобы, уничтожило всё прочік: поелику сбіщанія еіи не токмо не были завсегда утверждаемы, но напротиво того не рёдно опровергались самыми достовірными и безпристрастнійшими ваблюжені ми.

Г. Горив находить сему причину въ той трудности, наную имбеть меркурій, чтобы остаться соединеннымь съ камбдью, нань сноро туда прибавлено будеть сиропу и воды изъ чистотьла. Надобно прочитить въ его сочичинения на стран. 253 и сабдующихъ повторенные имъ опыты, иом руноводствують его нъ предпочтеню въ томь видь, въ котеромь прічуготовляль оной первый Г. Костель, Аптенарь Парижскій, и котерый называеть онь меркуріемь съ камбдью спущеницимь въ сухомь видь, да и подлинно, въ такомъ видь можно его давать въ большей части Венерическихъ колбаней, а всобливо въ бользикъ легчайшихъ; и его надлежить почтать за дъйствительное средство къ отраженію нада, когда оный сопровеждаеть или причиняеть кровохарианіе чахотку, или другія почти шакого же рода бользии, дозволяющіх токмо легкіл лъквоства

Камъдный меркурій въ видъ сухомъ. По щастію для твхв, кои не иогуть прини- меркурій мать меркуріл внутренно, или у коих в кишки слиш- вв натиком в ньжны кв перенесенію двйствій онаго, сіе су- употрещество пользуеть равнымь образомь, и даже вв нь блаемый. которых в случаях в лучше, когда прикладывается снаружи. Надобно признаться в томь, что меркурій, принимаемый внутрь чрезв нькоторое время, разслабляеть и нарочито причиняеть вредь кишкамь. Сль- довательно и должно, когда долгое время нужно его употреблять, должно говорю я, предпочитать способь натираній всякому другому способу.

Мазь или помада мерку ріальная, или сврая мазь, есть альная сам ре общее пріугошовленіе для внышняго употребленія. мазь. Сія мазь авлается изь меркурія, растертаго вмысть св саломо, взявы по равной доли оныхы; которой мази употребляется по одной драхмы на каждое натираніе вы сенеритеской гонорреи. Самое удобныйшее для сего дыствія время почитается вечерь; а часть кы тому способныйшая есть внутренность лядый. Больной должены лежать подль огня, пока производится такое натираніе, и кы натертой части надлежить прикладывать фланель, которую больной не должень снимать во все время, пока оныя натиранія происходить буздуть.

Меркурїальная мазь содержить иногда больше меркурїя, какь то двъ трети; а иногда кладется вь нее меньше, какь на примърь одна треть: по четму и можно увеличивать или уменьшать мъру, смотря по обстоятельствамь, какь то мы сте покажемь въ 7 сей главы: смотри способо, како употреблять меркурій посредствомо натираній.

Ежели, при употребленіи натираній дътородныя канвых части придуть вы воспаленіе; ежеля жары вновы по образовы Томо IV.

етупать при упо-

кажется; во ршу появятся вереды з десны савлаются мягки, и въ груди чуветвуема будеть боль: то натреоления добно дать приемъ или два Глауберовой соли, или какого нибуль лоугаго прохлалительнаго тистительнаго. какЪ то сте предписано было выше стран. 14 сего Тома, и на нъсколько дней оппложить натиранія.

> Однакож в как в скоро слинотегение и другие признаки минующся, ежели бользны не совершенно выльчена будеть, то надлежить вновь начать натиранія; но надобно меньше унотреблять мази, и не такъ часто тереться (8).

> > Ka-

ВЪ самомъ дълв бывають такіе больные, у конкъ кожа стокь слаба, столь изжна и столь редна, и нося споджиния сами по себъ такъ отверсты, что она поглещаетъ, такъ сказать съ жадностію всь тья, къ ней подносимыя или прикладываємыя: другіе же, напрошив? того есть такіе, коих в сплетеніе кожи, чрезвычайно частой в иръпной, не пріемлеть и не вшагиваеть въ себя почти начеге. Въ первомъ случат меркурій проходя очень удобно и въ излишно великомъ количествъ относительномъ, производитъ слишкомъ сильное, снорое и примъщнымъ образомъ опасное дъйстве, ежели жо продолжишся; въ другомъ же случат, больные мало или и нинаного не ощущающь абиствія оть меркурія; едва ли мальйшія частецы она-

^(3) Еін натиранія чрезб долгое время почитались за единый и самый надежныйший спос 65 нъ излычению Венерическия вольней; и досель еще не лишились они сего преимущества у техъ, которые полагають, что слинотечение необходимо нужно, потому что симъ способомъ возбуждается оно съ большею силою и снорве, канъ то мы говорили о семъ выше въ примъч, 6 сей главы. Однаножъ вредъ причиненный оными и при помощи самых благоразумныйших в и опытнъйшихъ Врачей; пріуготовленія, наковыхъ они требунть; весь снарядь къ сему нужный: медленность, старощение, нечистота, ноихъ избъжать не можно; гнусныя и скаредныя изверженія, производищія надъ всеми нашими чувствами самыя непріятивний впечатявнія, мало помалу отвратили прантиновъ отъ сего впрочемъ невърнато и совство неудобос образнато споссба абченія. Ибо, говоришь Г. Горнь, жамъже на стран. 77 и слъдующихъ какъ тоже самое количество меркуріальной мази производинів вів разныхів больныхів действія вногда согетшенно прошивныя, то и не можно по сему никакого предположить расчисленія.

Какимъ бы образомъ ни быль предписанъ мерку- Сколько рій, но должно продолжать онаго употребленіе до времени таллет поръ, пока еще подозръваешь въ себъ остатки наллет жить про- яда венеритескаго (и не переставать еще недъли двъ должить послъ того времени, когда всъ признаки минуются.) употре

Во время употребленія меркурія, или время, кото кузія. рос можно назвать вторым в періодомо бользый, дія. між не должно быть столько строгой, как в в первом добно предперіод в, или во время воспаленія; однакож в должен в писывать больной убъгать всякаго рода излишеств в.

Пища должна быть простая, легкая и удобова- бленія римая въ желудкъ, и очень мало дозволять можно меркурія.

2 64

Сиольно
времени
наллежинть продолжеть
унетре
бленіе мернувіл.
Дізна, каную надобно предписывать
во время
унетре
бленія
меркурія.
Пеще и

THE THE

го скизъ кожу ихъ прониции в и такъ естьли бы часто повторенными опытами опредълено было, накое ноличество мерхурія нужне иъ излѣчелію Венерической волбяни погредствомъ сего споссба, то можно бы заключить изъ того, что оное не было бы никогда вѣрное; понолину сіе количество зависѣло бы всегда отъ дѣйствія отягиванія еъ севя, ноего не можно опредълить основательно, и ноего выкладна, такъ сказать, есть совсѣмъ невозможная.

Не тольном в сій одчи неуд бства производит в способь натираній; ибо натираній влекуть не рёдно за собою безчисленное множество золь, стольно же почти бёдственных в какв и самая первобытная вольнь: обыкновенная боль головная, лом в в составажь,
трясеніе одчого или многих в членов в, потерячіе зубов в, а иногда також в самая Аслинская чакотия или сухотка бывают в нещастными
слёдствіями неосторожнаго употребленія меркурія в в сем в способ в предписываемаго. Сверьк в того за вреден в сей способ в в чакотив, крогомарканіи,
водяной вольни, в в скорбут в пли цинготной больни и проч. и
опасень в беременности, потому что женщина можеть сть
выкануть рабенка

Следовательно къ сему способу должны прибътать развё только те, которые совершенно не могуть внутрь принимать мераурія,
по нёжности или слабости желудка или вишекь, какъ то примечаеть Г. Бухань. Впрочемь не должно никогда способа сего употреблять, не предуготовивь чрезъ долгое время больнаго, посредствомь
мягчительныхь ванны и усладительныхы ловарствь, дабы сосуды учинить гибкими и сколько возможно уменьшить пренятствія. Впрочемь
должно наблюдать во время употребленія натираній наставлечія предписываемыя Авторомь, ві § 7 сей главы, и спосовь ваяв употревлять мержурій посредствомь натираній.

енна, да и то мъшать съ довольнымъ количествоиъ воды. Чтожь касается до крепкихо напитково, то оных в совершенно лишишься должно, какого бы свойства они ни были. Часто видаль я, что признаки воспаленія оказывались вновь в видъ опаснъйшемь, и истетение усиливалось, да и самая наконецъ бользнь становилась весьма трудною и продолжительною къ излъченію отводного только излишняго употребленія вина.

Гретіе и послівянее состояніе венерической гонорреи,

Поизнаки ческой гоморрем.

КакЪ скоро предложенное нами теперь пользовамэобража-ющіе третіє состоя- Автородных в частях в оказавшіеся признаки; когда исніе венери- тетенге довольно уменьшится, когда болве не будешь ни боли, ни онухоли вь пахахо или вь ядрахо, и когда уже не чего оных в опасаться; когда больной не станеть больше чувствовать невольнаго напряжения плоти, когда истекающая машерія следаешся беловата, густа, безъ всякаго запаха и клейкая; когла приивчены будуть сти знаки, или большая часть оныхв. тогда гоно ррея доведена будеть до третьяго и послъдняго ея состоянія, и можно приступать постепенно кЪ употреблению вязательных влегких в, или лв. карстоб склеивающихб: однакожь все надлежить еще оныя употреблять съ осторожности.

no semy знашь, что венеричесной дав нешребденЪ:

Когда вене ритеской ядо уничтожень, то истете. можнопри иге обыкновенно перестаеть само по себь; а какъ скоро случается противное, то справедливо опасаться должно, что оный ядо не совсым еще истреблень; что самое топчасъ примътить можно: ибо какъ скоро остановится истечне, а бользнь не выльчена. то ядра начнуть пухнуть, вы горы покажутся всреды, и пахевики или бубоны и другія многія вкорениемейся Венеритеской бользни признаки окажущея.

ВЪ такихъ случаяхъ надлежитъ опять произветкий деже сти истечне посредствомъ систительныхъ, и употре- жно по- блять большее количество меркуріл, но дабы посту- ногда при- пить съ осторожностію и не остановить внезапно знанивновь истечнія, то надлежить къ чистительнымъ приба- онажутеля випь легкія олзательных слёдующимъ образомъ:

Возьми слабительнаго электуарія или конфекта Вязательдвів унцій; ные каты-Виннаго камия - Ревеню об порошкі в каждато по полунцій. Вальсаму копачве, - полторы унцій.

По Лашынт:

Recipe electuarii lenitivi, --- uncias duas;

Cremoris tartari,
Pulveris rhei,

Balfami copaivæ, unciam unam cum dimidio.
Смѣшай, и сдълай электуарги съ сыропома изъ
блі дныха розд.

Сето состава должно принимать величиною съ примъ мушкатной оръх поутру и ввечеру.

Ежели сіи лъкарешва не сопровождаются ника- влашельким в неудобством в, то можно приступить кв влас ныя сильным
тельным сильнъйшим в, как в - то Вениценскому терщія.
пентину, бальсаму Перуанскому, Гилеадову и проч. ТерпенЕжели сіи бальсамы причиняют в позыв на рвоту или тивь, баль
тошноту, то больной может в причимать, вмъсто рузнекой,
их в, дважды в в день, по пятнатцати или по дватца- Гилеадов в
тим капель купороснаво эликсира в в рюмк краснаго
заинсир
вина, или в в чайной чашк в настоя из в хинхины.

съ виномъ

Естьми же при всем в употреблении сих в с редстей ном жихипродолжается истечение, не будучи сопровождаемо ни чио надобжал вашим в признаком вене ритескаго яда, по. над-но двяать, г з

mrewettie. продолжается знаковЪ

6 ез в привенериче_ енихЪ.

Вазательной составъ для сприцованій.

лежинъ прибъгнуть къ вязательныма сприцованияма, кои пріуго поваяю пся савдующим в образом в:

> Возьми Ярабской камвди - двъ драхмы; Розовой воды - - пящь упий:

Свинцоваго сахару - двенапцать грановъ.

По Лашынь:

Recipe gummi Arabici, - - - drachmas duas: Aque ro/arum, - - - uncias quinque: Sacchari faturni, - - - duodecim grana.

Распусти камедь въ розовой содь, и прибавь туда свинцоваго сахару.

Надлежить впускать по двв или по- три за разъ въ мотетотной стволб посредствомъ маленькаго шприца. Сей составо долженъ быть тепловать; а делается или крепче или слабее смотря по обстоятельствамЪ.

Aiema, которую надобие предписы-Bamb Bo МЕВАГО COстоянія гоноррен.

Надлежить еще наблюдать и самое пищец пот ребление при семъ окончании пользования. Больной долженъ соединять съ онымъ умъренное твлодвижение на открытом в создухв, но не разгорячая себя, ниже приводя эремя прев в в безсиліе. Яища его должна быть сухая и крепительная, как в то бисквить, сорогинское пшено, просо, студень изб оленьяго рога, и другая укрвпляющая желудок З. Для пишья должен в он в употреблять волы Вристольскія, Пирмонтскія, Яхенскія, или Пассійскія, вино Бордосское или Порто, прибавляя въ нихъ по немногу воды. Сверьх в того надобно ему убъгать всякаго излишества, такъ какъ и всего удоборазскабляющаго или обезсиливающаго твлосложение.

> Когда всв сім средства безплодны, а истетеніе не перестаеть, хотя яль совершенно истреблень: то сія бользнь будеть токмо простая гоноррея, о пользованіи котторой мы теперь предлагать намърены.

6 2

О гонорреи простой, или о истетении невенерическомб.

членъ І.

Причина сего рода гонорреи, когда она бывает в слъд-

Венеритеская гоноррея, многокрашно получаемая ослаблеили худо пользуемая, оканчивается часто изтегентемв, ніе, на пропсходящимъ или отъ ослабленія, или отъ ка-раны. ких в нибудь скрышых в ранд, в в некоторых в часпяхь, кои занимала вене ригеская гоно ррея. Но какь бы то ни было, однакож весьма нужно, для излачения сего истетенія, точно знать, от в которой изв сихв двухъ причинъ оное происходить. Когда оно весьма по чему упорно, и очень мало или и ничего не двиствуют в можно надъ нимъ лекарства вязательня, то можно подозръ- что оно вашь, что оно происходить оть ранв. Естьли же присхо. напрошивъ того сте истетенте не долго продолжает- дитъ отъ ся, ежели бываеть оно только тогда, когда больной ринь: возбуждается любострастными помыслами, или усиль бления. нымЪ жиленгемЪ кЪ испражнентю, то основательно заключать можно, что оно болве всего происходить оть ослабленія.

Пригина гонорреи простой, от венерического яда независящей.

(Изъ предъидущаго видно, что сія гоно ррел, или сіе тегеніе свмени можеть совсьть не зависьть отъ сообщенія съ женскимь поломь. Вы самомы дыль, очень часто оно не бываеть сопровождаемо никакою болью; истекающая матерія бываеть былая и почти настоящее свмя. Иногда происходить оно оть избыточества соковы излише- у людей холостыхь, живущихь вы изобиліи, а особли-ство соновь во, когда они занимаются чтеніемы и помыслами любостыра-

ной жидкоеши.

Моврежде- спирастиными; птогла оно не опасно. Но ежели оно зависить міе свили- ощо поврежденія в в свилиной жидкости, что не ръдко случается между худосотными и имконны ии, то бываеть гораздо опасные, потому что чрезь продолжение онаго можеть ввергнуть вы истощение и сухотку. Не менве опасно и тогда, когда оно бывает в савлетейся в нохных в оское рненій, руковлудія и проч.)

Оскверне MIR.

членъ п.

Въ случав ослабления должно себъ за цель

Пользование гонорреи простой, или истеченяя невенеритескаго, происходящаго отб ослабленія.

ABK 2Dетва тв самыя. накія предписаны въ третвемъ вінкот эоэ венеричеpew. Вязаниель.

имъть укръпление и придание ослабъвшимъ сосудамо некоторой степени напряженности. ВЪ следствие чего, сверьх в совышованных в в претьем в пергоды венеритеской гонорреи лакатство, надобно прибатнуть къ вязательным сильнышим и дыйствительнышим в. каковыя сушь, хина, квасцы, купоросв, тернильной екой гонор- 9 рвхд, коренья завязной травы (radix tormentilla) и ужовника или сердетной травы, (bistorta), гранатоваго цевту и проч.

Можно составлять хину съ другими вязательны-Пишье вы жи слядующим в образом в:

жины еЪ черниявнымъ ортшкомЪ.

жыя силь-

unkuia.

- - тесть драхив; толгеной хины Возьми Голгеных в орвшкоев тернильных в дв драхмы; Вари вътрехъ полуфунтовых в мфркахъ воды до твхъ поръ, пока останется не болье одного фунта, потомъ процади.

Прибавь тинктуры изб простой хины три унцін. По Латынв:

Recipe corticis peruviqui pulverisati. . drachmas sex; Nucis gallæ pulverisatæ, drachmas duas; Coquatur omne in XXIV unc. aquæ simplicis usque dum fiant XVI unciæ. Adde tinctura corticis beruviani simplicis uncias tres.

Ce-

Сего декокта принимать должно по малой чай- пріємь, мой чашкв три раза в день, прибавляя в в каждую чашку по пятнатцати или дватцати капель купороснаго эликсиру.

Между швыв, какв больной станетв принимать в тольной сти лекарства, надлежить облегчать изличенте его ныя шприцованиями внательными, такими, каковыя мы со нія. вытовали вв послиднеть состоянти венеритеской гонорреи, стран. Зо сего Тома. Можно кв тому прибавить нисколько гранв квасцовв, или билаго купоросу, смотря по обстоятельствамь.

Наконецъ послъднее средство, какое употре жолодиа блять должно, есть колодная ванна, которая почиванна; важетается, можеть быть, за самое сильнъйшее изъвсъх въ сей босредствъ употребляемых в къукръпленію и совершенному възниоблегченію. Не надобно никогда опускать того, чтобы предписывать оное въ семъ родь истетенія, происходящаго от ослабленія, ежели только нъкоторыя обстоятельства, зависящія от талосложенія больнато, не будуть тому пренятствовать.

Самая сильный шая причина приводимая прошиву возраженая колодной ванны есть та, что оная вредить вы случав противы полнок ровіл или худаго состоянія внут ренности. 1 Но употреблевый первомы случав можно прибытнуть кы к ровопуска дней ванны. піто и тистительныма, кои, ежели и не пользують отвыны совершенно полнок ровія, то по крайней мырь довольно оное уменьшають. Чтожь касается до худаго состоянія внут ренности, то сіе пренятство непреоборимое, потому что, тяжесть воды и внезапное сжатів внь. шних сосудова, прогоняя кровь сы великою силою кы внутреннимы частямы, могуть причинить перерывы вы сосудаха или прилива мокроть на органы. Но какы скоро пыть ни малышей сего рода опасности, то должно употреблять холодную ванну.

JOME IV.

A

Способъ . треблять XOAOAHVIO' ванну.

Следовашельно больной будеть погружаться въ канъ упо- холодную воду весь; и даже голову каждое упро натощакь, вь течени трехь или четырехь нельль безпрерывно; но не долго времени должно вы ней сильшь. По выходь отпуда весьма нужно вельть себя вытереть.

> Діэта придичная въ семъ случав есть таже самая, какую мы совытовали вы послынемы перголя вене ритеской гон преи, на стран. 26 сего Тома. Пища лолжна быть свойства сухаго и вязательного; а пить больному надобно воды Яхенскія, Пирмочтскія или Бристольския, къ коимъ надлежить прибавлять не много вина краснаго или Бордоскаго. Названія минеральных вод в французских в, кои можно к в сим в прибавищь, описаны во втором в Томв, глав. 21, примвч. 9, стран. 427.

> Пользование гонорреи простой, или истечения невенеритеского происходящого отб вередовб, или раковб.

Какъ скоро истетенте никакимъ образомъ не уни. Меркурій: женоктъ мается от в сихв лакарство, то основательно заклюизъ жины, чапть можно, чтво оно происходитъ отъ какого нили, сассаф- будь вереда или ранокд. ВЪ такомъ случав надлежитъ раса и проче прибъгнуть къ меркурію, или къ другимъ лека рствамо могущимъ прошиводвиствовать кислотв владычествующей и повреждающей мокроты: таковыя сушь, декокты или отвары изв хины, сарсепарили. сиссафраса и проч.

г. фордись сказываеть, что онь видель исте-Наширанія тенія упорныя, существовавшія по два, по три или меркурі-SABHBIS. по четыре года, которыя, по тиетном' испытаніи почти всёхь другихь лёкарствь, были совер-

шенно выльчены меркургальнымо напирангемо.

Но Локторъ Капмано, соглащаясь объ успёхё оныхъ, пильян присовокупляеть, что меркурій гораздо лучше поль изъ калозуеть вы семь случав, когда составлень сы тер-сладной пентинома и съ другими клейкаго свойства лекарства- ричин съ ми: по чему и совътуеть онь пилюли дъланныя изъ терпентикаломеласа и Веницейскаео терпентина, а сверых в номъ; детого желаеть, чтобы употребление оных в сопрово- гваяну. ждалось декоктом в изв гваяка и сарсепарили.

рили.

Пилюли изъ сладкой ртути и терпентина при Способъ готовляются слъдующимъ образомЪ;

сін шилю-

Возьми Веницейского терпентина, вареного до готованть довольнаго степени твердости, половину унціи,

Сладкой ртути, или каломеласа половину драхмы. Смъшай; саълай шестнатцать пилюль, съ довольнымЪ количествомЪ сиропа.

Надлежинъ принимань по пяти или шести по-приемъ, утру и ввечеру.

Ежели во время употреблентя сих в пилюль во рту появятся ранки, или грудь станеть больть, то надобно ихъ оставить до тъхъ поръ, какъ припадки сіи минующся.

Послъднее средство, которое можемъ мы совъ Нарывныя товать прошиву ранок в могеиспускательного ствола, супь нарывныя севски. Какъ оныя бывають множества видовъ, и почти вездъ можно достать ихъ совсъмъ готовыя, що и не станем ваниманься описантем в примьса входящаго въ составъ оныхъ, ниже способа, какЪ ихЪ приготовлять (9).

Мы

⁽⁹⁾ Виды свъчекъ не менъе многочисленны во Франціи, какъ и въ Англіи. Каждый Абкарь имбеть свой способь составлянь оныя, которой по мивнію своему находить лучше другихь. Но наив не можно сомиввашься объ успёхё шёхь, кои изобрёль славный Лёкарь Г. Дарань, и коихъ рецептъ не давно отъ него публикованъ, то мы надъемся услужить нашимъ читателямъ помъщениемъ во ессовщей тавлиць, Тома пяшаго, при словъ себчия г. Дарана, способа, накъ пригошовлять сей видь абхарствь.

СпособЪ канъ ихъ упошреб-Zamb.

Мы дадимъ только примъщить, что преже вкладыванія севски въ мотеиспускательной стволю налобно помазать ее масломя изб сладкаго миндаля, лабы не могла она слишком в скоропостижно произвести своего дъйствія. Въстволь оставляется она на семь пли на восемь часовъ, больше или меньше, смотря, какъ больмой перенести можетъ.

Я долженъ присовокупить, что сти севски выль-СверькЪ more near чивають часто не токмо вереды упорные, но еще зующь они опухоли и диков мясо около ран в в стволь, словом в. жоль, на- все препятствующее мотеиспусканию. Роспы ди-

наго мнего Пользование гонорреи простой, или истетения невенериссского зависящого отб других присинд, кромв ослабления и вередовв.

Когда све мянная жидкость повредит C.F.

(Когда сте истеченте происходить оть испорченной жилкости свмянной, како то бываеть у нъкоторых в худок ровных в и иинготных в: то чув. ствуеть всякь, что надобно употреблять такія лькарства, каковых в требуеть бользны оное причиняющая. Воть для чего раноцилительныя, противицинготныя и крвпительныя часто выльчивали истечентя. коих в не могли остановить сязательныя самыя сильнъйшта и наилучшимъ образомъ употребленныя.

Когда оно отт осниерненій.

Что касается до истеченія происходящаго отв произошно осквернений, от в излишно частаго испущентя съмени и проч: по мы опсылаем в главъ 57, 63, член. IV cero Toma.)

6 3.

О опухоли и воспалении ларб, простонародно называемыхв...ерыкомв падшимв (опустившимся) вв могину, когда си припадки зависять отбяда венеритескаго, и когда отб онаго не зависятв.

членъ І.

Присины сих припадков в, зависящих в от в яда вене-

Опухоль въ ядрахв, по просту называемая въ такомъ случав ... ерыкомб опустившимся об мошку, можеть имыть причиною венеритеской ядо совсымь новый, то есть недавно захваченный, или тотъ же самый я 18 прошедшій уже въ крось; но сей последній случай весьма ръдокъ. Что принадлежить до перваго, то он в довольно часто бываеть: ибо таковая опухоль въ ядрахб- очень часто приключается въ первомъ и во втором в состояни вене ритеской гоно рреи, особливож в когда истечение было остановлено слишком скоро, отъ простуды, или по тому, что больной пиль крепкие напишки. или принималь тистительныя слишкомъ кръпкія, или скоропостижно и сильно двиствующія лвкарства и проч. или имълъ сильное телодвижение, или наконецъ по тому, что очень рано началь принимашь лёкарства вязательныя.

Притины таковых припадков, не от венеритескаго яда происходящих.

(Однакожъ лара могутъ распухнуть и имъть воспаление, хотя убольнаго и не будеть венеритескаго лаа: удары, убоины, и великое напряжение силъ могутъ производить си самыя дъйствия. Но когда они отъ сихъ причинъ происходять, то бывають сопровождаемы реотого, судоргами и другими припадками; а по сему самому и весьма легко разпознать ихъ можно.

ЧЛЕНЪ II.

Пользование опухоли и воспаления во ядрахо, происхо-

Въ опухоли ядро воспалительной нужно быва кровопуеть кровопускание, и оное надобно повторять, снание. Д 3 Hanga.

смотря как в скоро того признаки требують (а). Пища должна быть легкая и пите мокротожидительисе. Больному надлежить воздерживаться отв крыко приправленных в мясь, отв випа, отв пряных кореньест, слоком, отв всего имъющаго свойство разгорятительное.

Теплыя примочки и припаринТеплыя примотки для сего особенно полезны, так в как в и припарки, из в мякиша былаго хлыба и молока, размятченныя свыжимы коровыйм или корошимы деревянным масломы. (Припарки из хлыбынаго мякиша св вегето - минеральною водою Тулардовою, выше сего на стран, 17 и 18 сего Тома предписываемыя, равнымы образомы вы семы случав полезны.) Больной должены их в прикладывать безпрестанно вы то время, как в лежить вы постели; а когда будеть стоять, то ядра найобно держать вы тепль, и утвердить перебязкого, так в чтобы оная могла предупредить подергиванте, оть тяжести их в происходящее.

Перевязка.

(Весьма нужно наблюдать, что постеля забесь величайшую приносить пользу; что следовашельно не надобно позволять больному вставать до техь порь, пока опухоль и воспаление большею частию не будуть разбиты и не стануть уже причинять боли.)

Очень нужно больному лежать въ постели.

Ежели не можно успѣть въ разбитіи опухоли трезь діэту прохладительную, нами шеперь предложенную, которую должно перемѣнять по обстоятельствамь: то надобно тогда больному пользоваться меркуріємь, дабы излѣченіе онаго было совершенно надежное.

Bo

⁽а) Нъсколько уже времени употребляю я для сего піленцы, кои велю припускать къ соспаленнымъ парамъ, которая практика всегда была сопровождаема успъками благополучными.

ВЪ следствие чего надлежитъ делать надъ нимъ меркурімеркуріальныя натиранія, как в то мы совытовали вым навъ гонорреи венеритеской, но по ядрамо тогда только. когла не булеть боли; ибо въ противномъ случав ивлашь сте должно по лядвеямь. Сверых в того больному надобно пять или шесть недъль лежать въ посшели, и ежели нужно чрезъвсе оное время имъщь пересязку для поддержания ядера, и пишь въ довольжомъ количествъ кръпкой декокто изъ сарсепарили, какъ то сте предписано будетъ послъ въ § 7 сей главы; смотри способо како употреблять меркурій посредством в меркургальных в натирангй.

Пользование опухоли в парах по истреблени венеригескаго яда, когда предполагается в воных в порта от в желвака или от в рака.

Когда предписанныя теперь средства не доста-Приварки точны будуть, и когда подозръвать можно порчу изъ боли. оть желеака или оть рака, производящую (не взирая на истребление венеритеского яда) твердость въ дрв: то надлежить тогда принаривать каждой день двигородныя часии декоктомо из в болиголова, (cicuta major), прибавлять кЪ припаркамо листу сего расшентя, а притомъ и сокъ онаго давать еще принимать внутрь.

Можно давать сок в болизолова в в пилюляхв, и сок в изъ составлять оной такъ, какъ мы совътовали для рака болиголова. Том. III, глава 47, § 2.

Сія практика особенно похваляется Докторомъ Сторком в в случав желеака или рака; а Г. фордаев увъряеть, что онь симь способомь выльчиль ядра съ желеаком в продолжившимся два или три года, даже и такте, кои были въ ранахв, и въ которых в начинала уже бышь чувствована боль нестерпимая, такъ какъ бы ихъ безпрестанно иглами покалывало.

ЧЛЕНЪ Ш.

Пользование опухоли и воспаления в в ядрах в, независя-

- (Когла бользнь сія зависить оть причинь пре-Кровопусканіе, аложенных в на стран. 37 сего Тома, то кром кровоприпарки. перевязка, пусканій, мягительных припароко, перевязки и попокой въ коя въ постели, кои всё равномерно здесь полезны, постели, надобно еще употреблять проливательных мяссиныя промы- тельныя и болеутолительныя; должно також в прибъмягчишельвательныя. гать кв припаркамв нарывнымв или назравательнымв, нарывныя когда от в сихв первых в лекарство опухоль не проили наэръвашельныя
ходишЪ. НаконецЪ нужно взящься и за пртугошовлеприпарки, нія из болиголова, выше сего совътованныя, ежели на детородных в частях в окажется некоторое свойсшво желвака или рака.

Каная бы ни была причина воспаленія в В ядрахв, етвія мо- но случаєть, иногда, что не взирая на всевозмотуть жныя и самыя лучшія вспомоществованія, происходять воспаленія от в него парывы или вереды на подобіє фистулы, анъварахь: точов огонь, водяная в шулятах опухоль, и проч. Сій случай, всегда затруднительные, требують великаго искусства и знанія: по чему, как вскоро они начнуть открываться, и должно призвать искуснаго Медика, и на его совыты положиться.

Надобно предупреждать антоново огонь, когда оной приключится, который легко истребляеть шулятную мощенку; но сколь удивительным образом вновь она выростаеть. Ежедневно видимы мы, что голыя ларышки, безы всякаго остатка обологеко, совертенно опять покрываются вы довольно короткое время. Еще надлежить предупреждать и самую опужоль

онучоль её шулятных ядрышках в, которая почти всегда пачинается находящеюся около оных воболоткого, и которая носль всего выльчивается, так в что остается даже часто распухлою долгое время и по выздоровлении, но только без всякой боли.)

\$ 4.

О еснеритеской опухоли, просто называемой бубонами или паховиками, и о мнимых 3 бубонах 3.

ЧЛЕНЪ І.

О венерических бубонахв.

Венеритеские бубоны суть твердая опухоль гнв- Сюйстов заящаяся въ пахахв, и причиняемая венеритеским вубоновы адомв, пребывающимъ въ сихъ частяхъ. Ихъ находится два вида: одня приключающиеся отъ лда недавно вкравшагося; а другие отъ венеритеской бользни вкоренившейся.

Пользование венерических бубонов.

Врачевание бубоново зараждающихся или недавних в то есть оказывающихся вскор после нечистаго сово-купления, можно сперва испытать разбивкого опухоли; а въ случат когда въ ономъ успеть не льзя, то приступить къ насноснию.

Для произведенія разбивки бубона надобно, что кань пребы больной слёдоваль той же самой діэтв, какую изводить темить советовали вы первомы состояніи венеритеской оныхь: воноррей: смотри выше стран. 11 сего Тома. Над-Кровопулежить ему пустить кровь, и давать систительныя снаніе, чнявкарства прохладительныя, какы-то декокто изы ныя явнартамаринта и Александрійскаго листу, изы Глау- ства про-Голю IV. серовой соли и проч. предписанных на 14 спгран. се-

Какъ скоро чрезъ сте пользованте опухоль и другте васпалительные признаки пропадуть, тогда можно во всякой безопасности начать употреблете те меркурій. нте меркурія, которой должно продолжать до тыхъ поръ, пока венеритеской ядб не будеть истреблень совершенно, какъ то выше о семъ говорено было: смотри пользованте втораго состоянтя венеритеской гонорреи, на стран. 18 и слъдующей въ семъ Томъ (b).

Средства, какъ споесбетвоъ ва ть нагноенію.

Но ежели бубон съ самаго начала сопровождается болью, биене иб пулка и великимъ жаромъ: то недобно тошчасъ стараться о способствовании нагноснего.

Aipma.

Мачимасчишеавныя.

ВЪ шакомъ случав дозволяется больному упошреблять обыкновенную его пищу, а между швмъ отъ времени до времени пить по рюмкв хорошаго вина. На больную часть вельть прикладывать млегительныя припарки, составляемыя изъ мякища хльбнаго съ молокомъ, прибавивъ къ тому севжаго коровълго или дергеяннаго масла; изъ мякища хльбнаго съ вегето - мине рального Гулардового водого, какъ то сте быдо совътовано на стран. 17 и 18 сего Тома. Ежели больной телосложентя мокротнаго, такъ что нагнаиванте весьма медленно производится: то къ припаркамъ надлежитъ, прибавлять лилейныхъ луковицъ вареныхъ, или домпиковъ луковицъ обыкновенныхъ сырыхъ, и смъшанныхъ съ довольнымъ количествомъ желтой базилики.

Kow

⁽b) Для разбитія бубона равно накъ и при воспаленій шулятныхъ ядрышенъ весьма полезно припускать нъ больной части нъсколько пілвицъ; смотри выше примъч, а въ сей глачъ.

Когда опухоль назръешь, что можно признать время, нед по коническому виду, которой она приметь, по нъжно гла всиристи кожи, и по волиенто матерти весьма ощути жоль трижигательным или ланцетомь, и по томь льчить прижигательным праздъляющим сязкость.

(Когда чрезъ сіи средства произведено будетъ спольно нагноеніе, то весьма полезно содержать оное долгое времени время, а именно, тритцать или сорокъ дней: сіе должно содержать самое надежный шее средство къ ускоренію нагноеніе! излыченія Венеритеской бользии, употребляя однакожь и меркурій, какъ-то сіе послы предпишется: смотри \$ 7 сей главы.)

ЧЛЕНЪ П.

Э мнимых бубонах в.

прекословно происходить оть яда венеритескаго; но весьма нужно быть предувьдомлену, говорить Г. Яйе-тодо, при случав венеритеских бубоново, что сильная причине боль мотеиспускательнаго ствола вы гонорреи, или сего вняе сильной мотерьзо, могуть произвести вы подбрюшимих жельзах опухоль, которая непременно пропадеть, какы скоро боль перестанеть: извыстно, что боль вы плечы и во рту ежедневно производить подобное дыйствие надыжельзами шей и поды мышками. Сколько разы таковое скоропроходящее засорение подбрюшных жельзо пользовано было вывсто венеритескаго паховика, и коего всегда скорое излычение невыжды почитали за рыдкое дыйствие лыкарство своихы?

Нъкоторые принимали еще инотда килу или гры- чъмъ разжу во разжилательной мышкъ ноги за бубоно, и даже бубонь Е 2 от каки имъли такую дерзость, что оную вскрывали къ таки грожи великому вреду больных в. Съ перваго взгляду чавъ разжиматель от сто кажется на него похожею; но кила или опухоль, промь шкъ но- исходящая от выходу кишки, бывает в всегда прати? вильнъе шаровидная, и ся основание гораздо уже;
впрочем в от осязания подается, потому что
многие могут вее опять вправить; обстоятельство неоставляющее ни малъйшаго сомнъния о свойствъ оныя.)

Однакожъ случается иногда, что бубоново не Emo Hoxможно ни разбить, ни привести кЪ нагноению, и опи жно дъ-MATRIB . KOостаются твердыми и никакой боли не причиняють: тда бубонЪ не можно въ такомъ случав, надлежить посредствомь прижигапривеста тельного разбить, затвераблыя жельзы, но ежели опухоль. сія приметь свойство желеака, то надобно тогда ста**ми** кЪ раз-. битію, ниже нъ на рашься разводишь оную посредсшвомъ Солиго 1087. употребляемаго внутренно и наружно, так в как в мы жиренію? совътовали сте въ предыдущемъ у, стран. Зу сего, Тома

\$ 5:

О шанкерах вили нарывах венеритеских существенных или самовытных и симптоматитевких в, или от в других в бользней происходящих в, и о шанкерах в невенеритеских в.

шанкеры сущь вереды или ранки наружные, мезольманкеровь ные, точаще, кои могуть быть и съ гонорреего вснеритеского и безъ нее; обыкновенно приключаются они на головки уда или около оной, и оказываются сладующимъ образомъ.

члень 1.

О шанкерак венеритеских в существенных в.

П ризнаки.

Сперва появляется небольшой прыщитек красеный, который въ екоромъ времени начинаеть показывать, а по томъ испускаеть матерію бъловатую съ желтиною. Сей прыщико, будучи сопровождаемъ жаромъ, производить обыкновенно зудъ, прежде нежели выйдеть на ружу, а по томъ перерождается въ упориную рану, коед внутренность покрывается клеикою слизью, а края постепенно начинають твердъть издълаются наподобіе мозолей.

Иногда первые знаки сих в прыщиково походять на простую ссадку кожи, которая однакожь скоропреображается въ ядовитые раны или шанкеры когда причиною оных в бываеть ядо вене риссекти.

Манкерві составляеть иногдат самы собою бо шинеры лёзнь, или существенную и пертобщиную по чаще всего от друпраключается от друга бельять, и бываеть слёд гихь боствіемь Венеристой бользни вкоренившейся. Шанкеры лёзней пропервобытные: открываются: скоро послё нечистаго исходать,
покрыты одною поччайтею кожицею, какы по на оныхь.
большихь губахві и на сосхё титекв у женщинь, на

Когда: шанкеры: бывають на губахь рта, то можно сообщить. Венеритескую бользиз одними поцьлуятин. Я видаль на губахь венеритеские ранки весьма жестокіе, которые, какь то по всыв причинамь закочить было можно, происходили оть поцьлуевь съ человьконь сей бользнію одержимымь.

E 3:

Kopa-

Кормилицы должны весьма остерегаться отъ кормленія грудью дітей зараженных вольник себя сосать тымь, кои въ Венеритеской бользии. Сія предосторожность особенно важна для кормилиць живущих во близости больших городовь.

Пользование Венеритеских гланкеров существенных .

Какъ скоро шанкерв окажется топчасъ послъ

сообщентя нечистаго, то пользование онаго во всёх в отношентях в есть то же самое, какое совытоватищеуно. Ли мы и для гоно рреи венеритеской. Больной должен в требление наблюдать пищеу потребление прохладительное. Ему прохлади надобно пустить не много крови, и дать нёсколько кровопу. при мов в Глауберовой соли сб манного, как в - то сте вкание. предписано на стран. 14 и слёд. сего Тома.

Частиыя бани.

Мягчи» тельныя припарки» Должно весьма часто промывать больную часть, или лучше распаривать тенлым весьма пополам пополам съ водою; а ежели соспаление будеть велико, то къ оной части надобно прикладывать млегитальную припарку. Сти средства достаточны въ большей части обстоятельсть къ утоленто воспалентя и къ пртуготовлентю больнаго принимать меркуртй тъмъ самымъ образомъ, какъ совътовано и въ пользованти втораго состоянтя венеритеской гонорреи, стран. 18 и слъд. сего Тома.

члень п.

О шанкерах венеритеских в от в других в вользней происходящих в.

Свойства Симптоматитеские или от других бользней сего рода происходящие шанкеры бывають обыкновенно сопровошанкеровь. ждаемы вередами в торль, почною болью, плотию при при корнѣ волосъ и многими другими признаками Венеритеекой бользии екорениешейся. Хопа могуть они
быть и на тьхъ же мъстахъ, на какихъ шанкеры мъсте
первобытные: однакожъ находятъ ихъ обыкновенно на оныхъ
частяхъ дътородныхъ и между лядвеями. Не столько
боли причиняють они, какъ тъ, о коихъ мы предъсимъ
говорили; но весьма часто распространяются они больите и бывають тверже.

Пользование таковых в шанке робб.

Какъ пользование ихъ есть то же самое, какое бы то самое, ваетъ и Вене ритеской бользии вко ренившейся, кое я они почи венериче- таются признакомо: то мы объ ономъ здъсь ничего ской больне скажемъ, а къ сему пользованию отсылаемъ, смотри зни внорения 7 сей главъя.

члень не.

О шанке рахо невене рите вкихо.

Смой бользии, котя она чаще всего причиною имъ бынеопрять несть или ваеть. Недостатокъ въ тистоть можеть причинечистота.

нить оные, какъ-то неръдко случается, что у неопрятныхъ или ненаблюдающихъ чистоты людей лънгретьо; бывають они около голоски дътеродниго уда. Но въ чистота.
шакомъ случав прямое на нихъ лъкарство есть тистота. Отъ простыхъ облываний водою, виномъ и проч. обыкновено они пропадають; но естьли бы и ейн средства остались недъйствительными, то надлежало бы тогда имъть приовжище къ какимъ нибудь водамо теплымо, какъ на примъръ къ Баларукъ водомъ скимо, кои равнымъ образомъ употребляются на подоскание; и оное должно повторять часто всякой день: г сего и довольно къ ихъ излъчению.)

\$ 6.

О многих других признаках венерических, как то о бородавках продолговатых и круглых, о шиш-ках в в заднем проходь, о гребешках, смортках и прот. о странгури или мотерых, о трудности мотерых, о незалупь и неотлупь, или воспалени конетной плоти, о станих и о лдовитой тети, или напря-женной гонорреи.

Товоря о вене ритеской гоно р реи, мы описали большую часть признаково оную сопровождающих в, или за нею послывающих в, и дали вы коротких в словах в понятие о пользовании каждому из в них в приличном в; однакож в есть еще и другие многие, сопровождающие иногда сию бользнь, как в то бородаеки продолговаты я и круглыя, шишки, гребешки, смортки и проч.; етрангурия или мотерыз в, трудность мотения, незалупа, неотлупа, станиха и ядавитая теть; а теперь станем в заниматься сими признаками:

члень І.

О бородавках продолговатых и круглых, о шишках ва заднемо проходь, о гребешках, смортках и м прос.

Слойства сихъ признаконвъ; оныхъ мбста.

(Подъ симъ именемъ разумъются небольште наросты, въ большемъ или меньшемъ количествъ оказывающтеся, кои различествують между собою только
видомъ. Мъсто ихъ особливо бываетъ около конца
заднеп роходной кишки, въ такъ и проч. Они повреждають еще голоску и крайнюю плоть дътороднаго ствола,
и выпускають изъ себя иногда въкоторой родь сукросицы, а особливо бородаски.

Не всегда эзвисять они отв Венеричеекой беявлянь. Сти признаки чаще всего бывають следствтемь Венеритеской бользии: однакожь могущь существовать и независимо оть онаго яда.)

TI:0.13-

Пользование, когда не зависять они от Венерической бользни.

Когда признаки сій не зависять оть вене ритескаго лаа, вод фотенто можно истреблять ихь прижигательными или сив даго деническая нан смвщими и тистительными с редствами, какь то водого фаге шанная съ
денитеского, или св в дкостьми смвишанного, коровьимо ваностьмя, масломо сурманымо, адскимо камиемо (lapis inferna масло сур.

величайтею предосторожностю. Иногда употребляют мень.

сл и ножницы или перевязки, какъ скоро ихъ форма сіе нозволяеть; иногда сгоняются они жжеными ква. квасцы виами, порошкомо изб казакцаго можжевельники (ригиройокъ проч; ими должно пересыпать больное мъсто намочивши каго можевельние прежде слюною, и по томъ прикладывать назь базимикумо и проч.

Пользование, когда еги признаки зависять от Вене на.

(Когда сін признаки будуть венеритескіе, какъ то же его то очень часто случается; то надлежить, при мое, ното употребленіи выше предложенных средствь, давать венеричевнутрь лъкарства противу сей страшной бользни ской бользовредписанныя, смотри ниже \$ 7 сей главы.)

ни предписано бутисано б

членъ П.

О странгирги или могерьзь.

II putuns.

Странгурія или мотервов приключается или отв сжетіе сулорожнаго сжатія ствола метенспускательнаго, или судорожно отв воспаленія сей части и тъхв, кои близь шейки ное, или музыря находятся.

Acmib.

(Сти причины чаще всего бывають венеритескія; однакожь могуть они зависьть от употреблентя, даже и вившнаго, шпанских мухв и пива молодаго.)

Томв 1У. Ж

Признаки сухорожного сжатія ствола могетогнаго, присина могепвза.

Когда могераза от сей причины зависить, то больной начинаеть мочиться съ довольною удобностію; но какъ скоро мога обмость часть ствола мотетотнаго, которая въ язвахо или въ воспалени то дълается внезапное сжатте въ семъ месть и не можно болье мочиться какъ съ остановкою, а иногда полько по капелькамЪ.

Признаки воспаленія ствола могетогнаго, другая присина могервза.

В восервзв. происходящемь отв воспаления етвола мотетогнаго, больной чувствуеть жарь и боль безпрестанно въ сихъ частяхъ: безпрестанно бываешь у него позывь къ мочеиспусканію; но онь выпускаеть развъ ньсколько капель вдругь, и мучится натугого или позывомъ всегдашнимъ къ испражнентю.

Пользование могервза произшедшаго отб судорожнаго сжатія стволя мотетотнаго.

Когла могерьзё произойлеть оть судорожнаесь ежатія ствола мотетотнаго, то надлежить принимать авкарства удоборазводящія или притупляющія соленыя кастицы, изъ коихъ составлена мога; таковыя лёкар. ства, кром в обыкновенных в мокротожи дительных в напишковъ, воды изъ ланянаго семени и проч. суть хладительное молоко миндальное или изъ других в свменв, подслащенное маковыми сыропоми.

Вода изЪ ДВИДИЯ ГОевмени, молоко миндальное и проч. Кровопупарки.

Nony Ban IM.

Ежели сін средства не производять действія желаемаго, то надобно пустить кровь, прикладывать оначів, при- мягсительныя припарки къ дътороднымъ частямъ, и предписывать полуванны.

Пользование могерьза произшедшаго отб воспаления шейки пузыря.

Когда могврезд происходить очевидно оть сос-кровопупаленія частей смежныхь съ мейкого пузыря, то насканіе.
Добно пустить довольно крови, и оное кровопусканіе
повторить смотря по необходимости случаевь. Ежели посль кровопусканія могерьзд еще не проходить, то должно давать утолительныя промыватель промываныя, и прикладывать на пузырную тасть мягтительныя припарки.

Въ то самое время больной долженъ принимать мочетоние трезъ каждые четыре часа по чайной чашкъ моте- тельное. иншье.

Возьми леной воды, - - - одинъ фунтъ; Сиропу изб рожи - - шесть унцій; Сладкаго миндальнаго масла, четыре ун-

Соли селитряной - - полунцін;

Смъщай.

По Лашынь:

Recipe aquæ hordei, - - - unam libram;

Syrupi malvæ, - - - uncias fex;

Olei amygdalarum dulcium, uncias quatuor;

Salis nitri, - - - unciam femis;

Misce.

Ежели сти лекаретва не помогають, а остановка моги следа совершенная, то надобно будеть вновь отворить кровь, и посадить больнаго вы теплую ванну по самую грудь; но тогда должно оставить моге-гонительное питье нами теперь предписанное, (потому что могегонительных, производя отсёдо вы моги, теплак и собирая оную вы пузырь, коего запирка или сживанна. Остановле-

ніє мочето мателіная мышка не подается болье къ испражне ниметьнаго нію, могли бы еще болве возбудинь желаніе к'в мочеаль чего испускантю, которое уже и безъ того весьма умножилось: чемъ самымъ увеличилибъ напряженте пузыря в савдовательно и самую боль усугубили бы.)

> ВЪ такомъ случав нужно иногла дать проходъ мога посредствомь мотеизвлекательного катетера или щупа; но как в больной редко можеть снесить ввеленіе онаго, то мы лучше предпочитаемь употребленіе мястительных севтек (конх в составление покажемъ мы во всеобщей таблиць Том. У смотри севеки мягтительныя (bougies adoucissantes). Они Авлаюшь слизкимъ проходъ, и чрезвычайно способситвуютъ къ испражнению моги. Но какъ скоро и они начинаютъ производить раздражение, или причинять изкоторую боль, що должно их в топчась оставить.

(Когда всь припадки утолены будуть, и больмой удобно станеть мотипься, то, ежели венеритеекой ядо существуеть, надобно приступить къ употреблению меркурія, какв-то сте предписано было вв nonbrokaniu emoparo coemonnin seneputechou converses спран. 18 сего Тома

TAEH BILL

О запоръ моги или в трудноети могецепускайтя.

Coonchiso SHE

WATEH H

тельныя

CHESTE .

(Есть другая бользнь, имьющая великое схолсей боль ство св мотерьзомв, и которая весьма часто свонымв смышивается, извыстная поды общимы именемы запора или трудности мотеченускания съ большимъ или мень шимъ жаромъ. Стя бользны называется дизуриего или запоромб моги.)

Признаки запора моёч.

тыб раз- (ВЪ запоръ моги истекаетъ мога съ великою личеству- прудностию; по позывь къ моченепускалию минуется, em'b Kakk

какъ скоро пузырь опорожинися; а напрошивъ того мечерезъ въ могерізъ, безпрестанные бывають позывы къ моче от запом пепусканію, контя не можно испускань моги, какъ только по капельки, да и то съ величаймею болью. Иногда, а притомъ и часто, объ сіи бользни встръ. чающея вмъсть или одна за другою послъдуетъ.)

Прикины запора логи,

(Запора моги бываеть обыкновеннымь действіемъ Венеритеских вользней, и въ такомъ случав приключается онь оть техьже самых причинь, оть конхъ и странгурая или мотерьзо: смотри выше стран. 49 сего Тома. Нароств дикаго мяса около рань въ Спволь, следенные довольно частое Венеритеской гопорреи, оной причинить можеть. Но еще можеть онь произойти от употребленія, как внутренняго так в и внышнаго, шпанских мухв, от питыя молодаго пива, от в остановки месятнаго отищения, или кровей у женщинъ послъ родовъ. Мнё случилось найти запорб моги от в сообщения у такой женщины, которая не могла часто видаться съ мужемъ, и проч. Не ръдко имъ страждутъ, старики, которые отъ него и совсемь не вылечивающея; цинговиные, ипохондрики и MPOT.)

Пользование запора моги.

(Въ запоръ моги употребляются совершенно тъ же самыя лькарства, кои и вы могерьзь: смотри выше самыя лькарства, кои и вы могерьзь: смотри выше самыя лькарства, ной и самыя лькарства, ной и простивуеть онь оть могерьза тымь, что не столь тивь моче ко имьеть напряженности. Самыя лькарства должно рыза. размърять относительно къ степени признаково; а какъ скоро оные укрощены будуть, то надобно присступить къ меркургю для тыхъ больныхъ, коихъ больных приключилась отъ венеритескаго яда, а упо-

ипреблящь его maxb, какb выше сего на етран. 19 и слъд. сего Тома ошb насb было предписано.

Жогла онЪ Тъ. у коихъ не можно полозръващь сего лла. не отъ лолжны употреблять такія средства и противъ ме-Венеричееной боль териза, и оныя весьма часто бывають достаточэчи произ- ны. Женщина, о которой я говориль, выльчилась въ ходинъ. три или четыре дни посредствовь мягсительныхв. Промывапромывательных, ванно и сыворотки св селитрого. Наmienbung. лобно стараться о привеленти въ прежнее состоянте ванны и мвсятнаго отищения и кровей, какв скоро оныя остано-«выворотка оБ селивашся, а минготных в и ипохондриков пользоващь DOIG. такЪ, какЪ мы совътовали вЪ Томъ III, глав. 35, 6 г. и глав. 45, 6 13.

Когда онЪ Чтожь касается до техь, у коихь запора моги произкомотетотномо стволь, следствий весьма обыкновенных в нароста венеритеской гонопреи, и которыя оказываются иногла дикаго Maca H чрезъ насколько лать по совершенномъ уже излачении проч. въ оной: то кромъ ванно, мягительных промывательмочето ных в и питья, должны они унотреблять севски нарывныя **Тионъ** спиволь. или гноготія, которым в савлано будеть описаніе во всеобщей таблиць, Том. V, въ словь севски нарыеныя. А какъ Свтчки нарывныя. налобно имъ позващь Лекаря для руководства къ употребленію сего лакарства, що мы и не станем в злысь болье объ немъ говорить; а только и совытуемъ имъ въ такомъ случав прибъгнуть къ Лекарю искусному.

Севчик СтарикамЪ должно употреблять севски мястимягчимельныя, каковыя недавно были предписаны вЪ пользованти мотервза, стран. 52 сего Тома.

ЧЛЕНЪ IV.

О незалупъ и неотлупъ, или о воспаленти конетной плоти.

Съойство Незалупа есть столь великое сжате понетной незалупи.

плоти, что оная не можеть залупиться, и открытаь



головку дітороднаго уда: неотлупа есть бользнь про-неотвуни, тивная, въ конгорой конетная плоть такъ распухла н залунилась, что головки покрыть не можеть.

Пользование незалупы и неотлупы, или воспаления конесной плоти.

Пользованіе сихъ обоихъ припадково столько кровопусходствуеть съ пользованіемь Венеритеской гонорреи, сиснія, что безполезно въ подробности, и говорить объ оныхъ. прохадивообще кровопусканія, прохладительныя тистительныя чистии припарки достаточны къ утоленію припадковъ отъ припарки воспаленія происходящихъ.

Но ежели сти средства не достаточны к умень обстоя шентю опухоли, и можно опасаться, чтобы на тех тельства частях не приключился антоново огонь, то надобно требую тогда больному дать рвотное из пятнатцати или наго. дватцати гранов и илекакуанги, или из одного грана рвотнаго виннаго камия, которое дъйствтю вепомоществовать должно теплою водою, или самым жидким из крупь отваром во.

Однакожъ случается иногда, что, не взирая на что долвст наши усильныя старанія, соспаленіе продолжается жно дтбезпрестанно увеличиваясь, и антоново огоно подаеть пать, нопервые знаки своего существованія. Въ такомъ случать новъ огоно
надобно подръзывать крайнюю плоть ланцетомъ; а начинаеть
ежели нужно, що и совствь сръзать для воспрепять
ствованія тому, чтобы оная опять не сжалась; а въ
незалупт надобно совершенно открыть всю голоску
дътороднаго уда. Мы не станемъ описывать, какимъ
образомъ дълается сія операція, потому что оная
должна быть всегда дълана Лъкаремъ.

Когда антоново огонь уже будеть существовать, когда онь то, кромъ упомянутой шенерь операціи, надобно весь аттельно бущеть.



на часто припаривать зараженныя части тряпочкою обмоченною въ крипкомъ лекокти изъ ромашки св хиною; перевязань рану съ бальзамомо Женестево, и давашь больному чрезъ каждые два или или при часа принимать по драхив хины въ порошкъ.

Время, Когда употреблять

(Какъ скоро разбито будетъ воспаление и антоност огона, ежели онъ уже приключился, погла надобно меркурій. употреблять меркурій, так как в мы сов втовали сіе вЪ пользовании втораго состояния венеритеской гонор. рец, стран. 19 и след. въ семъ Томв.)

члень У.

Ocmanux B.

сей больз. HH.

(Станиха, то есть безпрестанное и невольное напряжение съболью мужескаго ствола (езъвсякаго желания и удовольствія, оное причиняющаго, весьма часто сопровождаеть венеритескую гоноррею вь ея первомъ состояніи.

Но она не всегда бывает в празнаком венери-Фна же всегла бы-теской бользни. Запора мохи и мотерьза, даже когла взеть при и не венеритеские бывають, иногда ее прчиняють. знакомЪ Закутусв Лузитанусв говорить объ одной станих в Венеричесной боль приключившейся от в стужи. Порошок в изв ипписких в мухб, принятой внутрь, даже и въ маломъ количезни. Друria upuствв, можеть произвести станиху съ несносною ANHPL. болью сопряженную, которая сопровождаема бываеть весьма бълетвенными приключентями, какъ-то мы сте показали въ Томѣ III, глав. 48, § 2, член. V.

> Станиха довольно часто бываеть действиемъ напряженности дътородных в частей, сопровождаемой ненасыпнымъ желаніемъ къ плотскому совокупленію: а сте желанте простирающееся иногда до помъшательства разсудка и потерянія всякаго стыда, равномфрно

заражасть оба полы. У женщинь называется опо бышенствомб матки или муженеистовствомб.

Бъщенство матки ръдко зависить отъ Вемеритеской бользни; по крайней мъръ я сему не имъю мримъра, да и не нашель ни у одного Автора: и такъ, что касается до сей бользни, то мы отсылаемъ къ у слъдующей главы.

Станика приключается токмо людямъ самыхъ кто оной мвътущихъ льтъ и весьма горячаго тълосложента. Не подвервесетда бываетъ она долгопродолжительна: но иногда бываетъ смертоносна. Не столько опасна она у стариковъ, которые впрочемъ гораздо меньше ей подвержены: но у нихъ ста бользнь гораздо мятежнъе.

Мы не будемъ предлагать о признаках станихи: они довольно извъстны изъ самаго опредъления сего слова.)

Пользование станихи зависящей отд Венерической бользни.

Станиха требуеть совершенно тьхь же са-тоже сажыхь лькарствь, какихь и венеритеская гоноррея: мое, каное смотри у 1 сей главы. Ежели однакожь боль будеть венеричечрезвычайная, то надлежить давать ввечеру по ньеколь- ской гоноржу капель лаудана ликвида Сиденгама въ стаканъ миндальнаго или другаго молока, а особливо въ тъ дни, рымкъ когда больной будеть принимать тистительное. миндаль-

Пользование станихи независящей от Венерической вользни.

Первое лъкарство, которое должно предписать кровопупротиву сей бользии, состоить вы томы, чтобы убы- сканіе, сыгать причины оную произведшихы; но томы слыдують молоко
укротительныя, прокладительныя, какы- то кровопуска- миндальчіе, когда опасаеться какого пибудь воспаленія; молоко, ное, питье
Томы IV.

Haro Mozom

Ra BBe-

черу.

мое, ван- сыворотка, лимонадо, оршато, миндальное молоко, мы и проч. селитряное или кисловатое питье, ванны, полуванны умъренныя, холодныя и проч.)

члень VI.

О ядовитой теги или напряженной гонорреи.

Свойства (Адовитого техью (gonorrhea cordata) называетсей бользин.

ся вене ритеская гонор рел, доспитнувшая до такой степени, что напряженте ствола бываеть сь величайшею болью, и больной чувствуеть ощущенте подобное тому, которое произвела бы сильная рука, сжимающая крыпко самый стволь. Вы семы состоянти воспаленте бываеть сильное; жилка двтороднаго ствола изтибаеть его во время напряжентя, и тогда оны
кажется какы бы струною натянутымы.

Всякъ видишъ, что ядовитая тетъ есть не не не то же иное что, какъ сильный степень вене ритеской гоно решеное, на по тому и пользование оныя совершенно то нерической же самое, которое мы описали въ у 1, член. П и П гоноррен сей главы. Когда причиняетъ она сильную и нестернимую боль, что весьма часто случается, то не должно пропускать, дабы не давать больному ввечеру худанъ. по нъскольку капель лаудана ликеида, а особливо когда онъ приметъ днемъ тистительное; и какъ скоро сей припадокъ укротитея, то должно приступить къ меркурию, такъ какъ сказано на стран. 18 и слъд. сего Тома.

5 7.

О Венеритеской бользни вкорениешейся.

Досель говорили мы токмо о признаках Венеритеской бользии, въ коихъ лдо предполагается остановившимся въ той части, которая онымъ заразилась; а теперь станемъ разсматривать Венеритескую болёзна льзиз такъ какъ екорениещуюся или застарълую, то есть, которая какъ бы прошла въ крось, обращающуюся во всъхъ частяхъ тъла; смъщивающуюся со всъми елажностьми от вълющимися от в кроси; наконецъ изливающую ядъ во все тълосложение.

ЧЛЕНЬ І.

Признаки Венерической бользни екорениешейся.

Признаки Венеритеской бользни екорениешейся сушь бубоны въ пахах, боль въ головъ и членахъ, а особливо ночью, или когда больной согръешся въ постели.

(Главивишимъ свойствомъ сей боли почитается то, что она сперва чувствительные бываеть ночью, а по томъ столь глубоко вкореняется, что кажется внутренность самыхъ костей гивздомъ своимъ имветь. Она бываеть еще постоянная или бродящая, то есть переходящая въ другія мыста; но по означеннымъ нами обоимъ свойствамъ сій боль должна различаться отъ той, какая бываеть въ подаеры и цинготной бользни, съ которою она часто смышвается совсымъ безразсудно, какъ то мы уже савлали наблюденіе о семъ въ Томь III, глав. 35, § 1, член. II.)

Другіе признаки сушь короста, лишаевыя сыпи желтаго цввту, похожія на сошы медовые, на разных в частях в твла, а особливо на голов в, тогащія ранки,
начинающія оказываться в в горл в, и мало помалу
подступающія кв небу рта, кв хрящам в носа, которой совс в м в истребляють, и проч.; наросты, горбы на середней части костей, коих в ноздреватыя
конечности двлаются иногда хрупкими и ломаются
при самомальйшем в удар в, хот в в прочем в мягки и
бывають гибки как в воскь.

Кругловатыя жельзы становятся твердыми намодобіе мозолей, а притомы и производять на шев в подб мышками, вы пахахо и вы брыжмейникь опухоли твердую, удободвижущуюся, подобную опухоли, какая бываеть вы волотухь. Еще дылаются опухоли различныхы свойствы вы сосудахо пасотныхо, вы хрящахо, вы сензкахо и вы сухихо жилахо, какы то шишки, узлы, горбы на костяхо, желеаки и такы называемые грибы (tumoves gummofi).

ВЪ глазахъ бываетъ зуда, лома, а иногда и совершенная слепота приключается. Больной чувствуетъ звонъ въ ушахъ съ нъкоторою болью; наподаетъ на тего глухота, и спутрениее ухо покрывается ранами и гнонтся.

Всв двйствій душевный, жизнейный и естественныя повреждаются; лице двлается блёдным в и синеватым в, тёло изсыхает в. Наконец в заразившійся сею болёзнію нещастный становится неспосостым в ни кв какому движенію, и впадаєть вы сухотку или вы смертоносную тахотку.

Кончани, некіе быпанть ў женцинь. Женщины имъють припадки особенные, кой свойственны ихь полу; таковые суть: рако на груди, сильныя мъсячныя крови, или оных в осталовка, бъли, припадки маточные; воспаление, нарывы, желвако, антоново огонь, рако, или опасная рака въ маткъ. Женщины имъющія стю бользнь бывають вообще безплодны, или не донашиваюто, или, ежели и родять, то дъти ихь при самомь рожденій бывають частью новреждены, или всъ покрыты ракками, или рожею по всету тъху распространившеюся:

Таково есть описанте ужасных в припадкова стю етрашную бользны сопровождающих в, когда она единожды вкоренищся или застарьеть. Подлинно, всь они рыко встрычаются у одного человька, или вь одно и то же самое время. Однако вообще бываеть ихъ всегда довольно великое число, такъ что больной не безъ причины можеть совершенно оными быть потревожень. Но какъ скоро примътно станеть, что ядя прошель въ кровь, то онь и должень съ крайнею носпытностию стараться о изгнании онаго; а безъ того подвергнуться можеть самымъ ужасньйшимъ слъдствимъ.

Свенеритеская болезнь болье или менье бываеть опасна вы разсуждени ся древности, числа призна-ково оную сопровождающихы, свойства зараженныхы частей, и стечены различныхы случайностей. Иногда кроется она весьма долгое время и ни мало не безнокоить: ныты ничего обыковенные какы то, что встрычаются люди, у коихы сля бользны оказывается чрезы дватцать или тритцать лыть: по сему легко разсудить можно, что вы тогдатнее время ее ничыть преодольть не можно.

Весьма трудно изавливается она, когда встры чается вмысть сы цинготного бользийо или золотухого; когда застарыеть, или когда произшедшее во внутренности повреждение довольно усилится. Всего опасные она у младенцевы и у стариковы. Женщины не чувствують оты нее безпокойства, пока имыють мыстичение; но то время, какы перестануть вовсе имыть оное, бываеты началомы ихы страдании. Запущеная же бользиз Венеритеская часто оканчивается водямою или сухоткого.)

члень п.

Пользование Венеритеской бользни вкоренившейся.

Единое лекаротво, понынь въ Европь извъстное собетвенкъ благопадежному излъчению сей бользни, есть мер нодъйкурги стъующее

для Вене- курій употребляемый во многоразличных видах в, кон рической всь почти сопровождаемы бывають равномърнымъ бользни явкарешво успвхомЪ.

есшь мер-WVDIH. Ae KHTe мэведенія слиношеменія.

Прежде сего всякъ почиталь за невозможное онь поль- выльчинь Венеритескую бользнь окоренивануюся безь эуеть на- саливации или слинотегения. Однакожь нынь сему спобезъ про- собу вообще довольно мало следують; да и найдено, что меркурій столько же сильно действуеть, сколько впрочемь сильнъйшимь почитается онь къ искорененію венеритескаго яда, когда унотребляется такъ, что чрезъ слиныя жельзы не выходить, какъ то ны уже показали въ 6 и 3 примъчаніяхъ сей главы.

Самое проет вишее mpiyromos-

Каждый въкЪ, каждый АвторЪ хвалился своими пріугошовленіями меркурія кі врачеванію Венеритеской лене дол- болвани; но всъми напослъдокъ признано, что самые жно быть проствиште виды, подъ какими онъ внускается въ жредпочте- тъло, вообще удаются столько же хорошо, какъ и самыя искусньйшія пріуготовленія химитескія: сльдовашельно мерку ріальныя пилюли, или мазь пріуготовленная из в сотренія меркурія тистаго, то есть оживленного киноварью съ саломо, такъ какъ мы о семь будемь говоринь во всеобщей таблиць Том. V. при словъ мазь; меркургальная или такожъ съ смолого или съ густыло сокомо, какъ то сте показано. выше на стран. 25 и сабд. сего Том, выабчивают Б венеритеские признаки самые упорнъншие, ежели унопребление сихъ дъкарствъ продолжится довольно времени, только бы телосложение не было столько повреждено, чтобы излъчение оных ведълалось невозможнымЪ.

(Когда Венеритеская болвзив будеть не очень Ме должно умножать сильна; когда она недавняя и никакте припадки стеепособовЪ. ченія не имвющь: то вообще довольно одного споcoba

соба къ изътчению ея. Не должно такожъ умножать оныхъ по легкомыслию, да и безъвсякой пользы. Самая сущность состоить въ хорошемъ выборт и расположении онаго по свойству болтзни, по важности признаково, по телосложению больнаго, и по предчувствуемому дъйствию меркуриальнаго приуготовления, которое употребить должно.

Следоващельно перазпущенный меркурій, или меркуріальныя пилюли приняшыя внушрь, и меркуріальная мазь упошребляемая въ натираніяхо, могушъ каждое особо вылёчишь, да и въ самомъ дёлё довольно
часто вылёчивають Венеритескую бользив екоренившуюсл. Но какъ не всегда онё могуть ее вылёчить, то
и нужно весьма показать тё обстоятельства, въ
которыхъ можно надёяться на особенное дёйствіе
каждаго изъ сихъ средство: что самое мы тенерь
показать намёрены въ изъясненіи слёдующихъ способовъ.

Прежде нежели приступинь къ послъдующему, прочитай ниже § 8 сей главы.)

Ул. збяснение главный ших в способов в, как в пользовать Вене рическую вользив.

Способб какб употреблять неразпущенный меркурій чили меркуріальныя пилюли одни.

(Должно предпочитать неразпущенный меркурій, то есть меркуріальных пилюли, всякить другимь пріуготовленіямь меркурія разпущеннаго,, когда го, ворить Г. Горно въ приведенномь сочиненій въ сей , главь, примеч. 2, будуть мокроты густыя и спер-признани , шіяся, производящія заваль въ железахо и во внутеть етвующія , репности, повреждающія оныхъ сплетеніе и члено- нь сему , составленіе: тогда потребны силы, наиболье на-способу , правляемыя на твердыя, и которыя, возбуждая во-

э локно и увеличивая онаго упругость, умножають, самыя потрясенія, производять постепенно дей. , ствіе усильное надь мокротами, которыя впрочемь, стараются разделить и пріуготовлять къ очищенію , посредствомь питья.

"Тщетно бы кто нибудь сталь утверждаться "въ такомъ случав на средствахъ легчайшихъ: по той "самой причинъ будуть они недостаточны, и оть сего "произошла бы наконець недвижимость волокиа, "что не было употреблено раченія о возбужанию онаго въ надлежащее время, а за сею по томъ "за растейе запертыхъ сосу доеб; что самое воспре"пятствовало бы совершенному поправленію поврежанныхъ должностей естественныхъ и часто оста"вило бы самый органб въ разстроенномъ состояніи, "котораго бы уже никакъ исправить не можно было.

"ВЪ сихЪ- то обстоятельствахЪ пилюли Кейзе"ровы, которыя впрочемЪ столько употребляемы бы"ли во зло; пилюли Беллостовы з панакел или услажденная
"сулема, мореная ртуть, или сладкой меркурій, и другія
"пріуготовленія не разпущеннаго меркурія, умножаемыя
"до безконечности, но коихЪ разбивающее дъйствіе быва"еть почти одинаково, должны быть употребляеми
"преимущественно, и оныя производять часто та"кое дъйствіе, какого тщетно бы мы стали ожи"дать оть другихъ способовь льченія.,

Прежде употребленія пилюль меркуріальных , вытельныя конть рецепть предлагаемь мы во всеобщей таблиць, средства; Том. V, вы словь пилюли меркуріальныя, или всякаго сканіе, де-другаго пріуготовленія изы неразпущеннаго меркурія, нокть изы должно больному пустить кровь, ежели есть признаки сарсепари.

жи, чисть требующіе кровопусканія; предписать ему декокть тельныя и изы сарсепарили, котораго оны должень пить по полужины.

ттофу въ день; дать ему чистительное раза два; такъ какъ сје предписано на стран. 14 и слъд. сего Тома; и ежели ему способно булеть, то вельть ивсколько разъ сходишь и въ ванну.

По томъ должно предписать ему по шести гранъ примы меркуріальных пилиль поутру, и по стольку же меркуріввечеру: и далбе умножать прибавляючи всегда до ось пилья. мнашцати грановъ ноутру, и по снюльку же ввечеру. Обетел-Какъ скоро десны начнутъ пухнуть, тогда должно требуюперестать, и очистить шестью или осьмыю тисти щее слабно тельными пилюлями меркуріальными, или Беллостовы шелькыхв; ми, болве или менве, смотря по тому, какъ крвпка меркуріго или слабаго сложенія будеть больной.

альныя пи--NW NEGER CHIMBREAL.

На другой день должно опашь приняшься за мерку- ныя. ріальныя пилюли разбивающія, полагая на каждый пріемъно три, поутру и ввечеру, и продолжать такимъ образомь, очищая систительными пилюлями меркуріаль-Сія мень ными, или Беллостовыми, чрезв каждые восемь или ства подесящь дней, до того времени, пока не минуются чрезъпять всь признаки, и посль еще дней пяшнамиать. Пользо натиать ваніе таковое кончить надлежить двумя слабительны. Аней по ми, а именно: систительными пилилями меркуріаль- номъ вызными или Беллостовыми.

доровленія.

Во время пользованія больной должень пишь каж- Сарсепадый день по полуштофу декокта пзъ сарсепарили, риль чрезъ и следовать строжайшимь образомь діэть, предпи-пользовасанной выше на стран. 11 и 27 сего Тома.

Сей способъ довольно ностоянно благопоспъте- дізна. ствуеть и одинь, какъ скоро употребляется въ вышеозначенных в обстоятельствах В. Однакож в телосложение сего рода больных и свойство пред-нужно сшавляющихся въ нихъ припадково бывающь шаковы, инстав къ что требують иногда вспомоществованія каких в ни- сему опо-JOME IV. будь

нія пріоб- будь лекарство противу действующих в цинготной бользшать и ии: шакъ какъ и упошребляющся оныя съ великимъ MDOMINBYуспъхомъ въ семъ способъ лъчентя. Надлежить же дажинголтныя явнара вашь промивоцингомных в соков от двухь до чешырехъ упий на день, смотря по тому, сколько оныхъ. cmaa. ПріємЪ. болве или менве, потребно будеть.

CAVERE . въ которыхъ сей Aocmam. ченЪ.

Но какъ скоро надобно привести въ прежнее со стояніе новредившіяся должности (дійсшаїя) естественепособъне ныя, и предупредить разстройство органова, то неразпущеннаго меркирія не довольно; а должно пріоб. щить его къдругимъ пріуготовленіямъ мерку ріальныма)

> Способб какв употреблять неразпущенный меркурій. совокупно св сулемого (fublineatus corrofivus).

признаки. требуютіе такоmaro comoнупленія.

(И такъ, когда нужно дать ослабленнымъ волокнами упругость, какая онымъ потребна для освобожденія их в от в жидких в, которыя их в обременяют в и гивтуть, отделить и вивств очистить гигочія мокроты противоборствующія изсушенію древняго тегенія евмяни, или заживленію старых в ранокв, когда застарьлые шапкеры требують собственно двиствующа. го весьма сильнаго, которое бы их в так в сказать вычистило и заживило, и разбивающаго, которое бы разверзло оных в края, и которое бы повторенныжи испражненіями отврашило мокроты собирающіяся туда какЪбы кЪ природному для оныхЪ отверстію: то всё сїн выгоды находятся соединены в в совокупном в дъйствін меркургальных пилюль съ сулемою, кои должно употреблянь сладующимъ образомъ.

Пріуготовив Б больнаго, как в мы совътовали на Haiyromonnenie. предылущей страниць, должно начать прежде давать ему сулему, по четверти грана въ пртемъ, разпущенсулемы въ ной въ полуштофъ декокта изъ сарсепарили, на дечь чет- каждый день. ВЪ такомЪ пртемъ продолжать оную осьвершь грамеро на.

меро сутокЪ: но томЪ давать ее до полуграна, раз-половина разпущенной вЪ такомЪ же количествъ деколту грана. чрезъ другія осьмеро сутокЪ; напослъдокЪ приступить должно къ тремъ четвертямъ грана, которой три четпріемъ и продолжать до сокрытія признаковъ, ежели верти граноный не будетъ приводить больнаго въ сильное изирреніе.

Между тъмъ, какъ онъ станетъ принимать каждый день по предписанному теперь отъ насъ пртему сулемы, надобно ему давать равнымъ образомъ каждый день, считая съ пятаго или шестаго дня отъ употреблета сулемы, по шести гранъ меркургальных пилюль, пртемы которыя можно умножать постепенно до двънатцати: меркуртсверьх того должно давать проносное чрезъ каждые пилюль сверьх того должно давать проносное чрезъ каждые пилюль пистительных меркурталь-чисти. восемь дней изъ пилюль тистительных меркурталь-чисти. пыхб, или Беллостовыхб, въ вышепредписанномъ на тельных больной не долженъ принимать ни сулемы, щи меркуртальныхб пилюль разбивающихб.

Пищеупот ребление, какое должно наблюдать во пищеуповремя сего пользования, есть то же самое, которое требление предписано и въ предъидущемъ способъ; а чрезъ двъ недъли послъ того, какъ всъ признаки минуются, надлежить очистить больнаго раза два, такъ какъ мы предъ симъ совътовали.

Способб какб употреблять меркурій неразпущенный; совокупно сб промывательными противувенерическими.

(Ежели по слабости желудка у больного и по обетоядругимъ обетоя нельствамъ не можно будеть упо тельства треблять сулемы, какъ то сте довольно на требуюсто примъчается, и о чемъ мы говорять станемъ въ нтобы способъ употреблентя сулемы одной, то надлежить промизасъ пилолями меркуртальными разбивающими давать противувенеричеdin ening mb сулемь.

промывательный протявувенеритескія, которыя булускія пред- чи составлены из в мерку ріальнаго пріуготовленія надлежащим в образом в разпущеннато, имвющь величайшее сходениво съ распущениемъ сулемы. Таковыя сложенныя лекарства должно предписывать следующимъ образомЪ.

Hperyromoszenie. Ho gaa прошивувенеричеснихъ из день.

Пользоваще начинается предуготовлением вышено. казаннымь: по томь должно употреблянь по два промывательных противувене рисских на день, как в то вы о сем в промывать пространные говорить станемы послы вы способы какв употреблять противнеенерическія промывательиыл одни; и продолжать то же самое количество сих в промывательных каждый день, даже и спустя пятнатцать дней посль того, как всв признаки минующел. Во время употреблентя сихъ промывательных больному должно принимать отв шести до двънатцати грановъ меркургальных пилоль поутру и ввечеру, и чрезъ каждые восемь дней давать ему вывето слабинельного пилюми меркуріальных тистительныя или Беллостовы, шакъ какъ сказано было выше. То же самое пищечнот ребление во время пользованія; що же число тистительных в, когда оное кончится, какъ и въ способъ предвидущемо было предписано.

ПріемЪ мернуріфхиник Б TIN AHO AL. MUCHINтельныя, Пищеупотребленіе.

> Однакожъ когда венеритеской яда будетъ сопряжень съ другими припадками; когда онъ будеть весьма застарълый, и, такъ сказать, совитщенъ съ больнымЪ; когда многія части тёла онымЪ вЪ одно время хотя и различным в образом в, заражены булуть относительно исправлению ихв должностей, и когд бользнь въ самой высочайшей степени, тогда весьма прудно исполнить всь предписанія съ сими способами, даже и взятыми вместе; ибо довольно часто случается, что Венеритеская бользив, надъкоторою не подъйствовало одно или многія пріуготовленія мер-

Сей совомупный способъ не RCCTAR Bblполняеть metab предписа-HIM.

жургаленыя, выльчивается унаровлентемь какихь нибудь аругихь, хотя и не можно всегда дать тому достаточной причины. Вы нькоторыхы случаяхы, говорнты Г. Горко, надобно жногда испытывать ихы для чего? одно посль аругаго, располагая однакожы сы разсуждентемы оныхы принаровку смотря по нужды, и по ихы действтю испытанному: что самое, при умножентя различныхы сложенти сето лекарства, долженствуеты представлять новыя послыдствтя выгодныйшта, а слыдовательно и усугублять источники Врачебнаго Искусства.

И такъ не надобно пренебрегать, ниже отвертать никакого способа; но, ценя ихъ единственно по самому основательному раздроблению, должно знать относить ихъ къ надлежащему классу; а по томъ и судить объ нихъ определительно по самымъ оныхъ действиять.

Естьми же, посреди пользования расположеннаго надобно по тому или другому способу совокупному, о ко- иногда ихъ мы предъ симъ товорили, пришъчено будетъ ма- лать нъ- ло или никакото уменьшения въ припадкахъ, то дол- сколько на- жно знать благовременно употреблить нъсколько на- шираній или окуриваній тастимх в. Не возможно опре- дълить того, сколько разъ надобно употреблять сін въ наномъ средства. Ибо какъ они въ таковых вепособах велужать ноличе- средствами какъ бы вепомогательными, то единственны- ставъ ти путеводителями Врача долженствують быть напраженность и важность самых вризнаково.

Въ следующемъ способъ мы станемъ разсматривать, какимъ образомъ употреблять нати рангя одни, а по томъ сопряженъыя съ другими пртуготовлентями мерку рталеными; послъ чего станемъ говорить о способъ оку риванти, о способъ промывательныхъ противувене ритескихъ, о способъ сулемы и наконецъ о способъ потовыхъ или потогонительныхъ.)

И 3

CNOL

Способо како употреблять меркурій посредствомо одних в натираній.

Признаки пребуюmie cero способы.

(Всякой разв, когда венеритескій я 28 еще не засшарветь, когда онь будеть занимать еще свточнию пече. понку кожи, или когда остановится на теле и на железах 3. и не произведеть впрочемь никакого воспаленія опаснаго, то меркуріальных натиранія, употребляеныя съ разумомъ и предосторожностію, почитаются достаточнымъ средствомъ къ излъчентю; поколику меркурій, проведенный симь способомь вь органа кожи, производить тогда действе скорое и натурально направленное на оной ядб, такъ сказать, въ его частяхь концентрированный или соединившисл. Въ такомъ случав действие онаго часто бываеть столько же върное и совершенное, какъ желать того можно.

Есть даже такія обстоятельства, въ которыхъ Требуюmie moro, сей способъ, кажется, заслуживаеть предпочтение предъ чтобы нъсколькими другими: а именно когда главные органы оной всякому дру-жизни и здоровья довольно новреждены; или когда. гому быль въ разсуждении ихъ силешения, нъжности и образовапредпочинія, надобно опасаться таковаго поврежденія. таемЪ.

Качества кожи нуди винж vnompe6ленію натираній.

Но дабы предпочесть вЪ такомЪ случав натираніл всякому другому способу, по надобно, чтобы на поверхности кожи не было рожи или воспаленія препровож даемаго всегда тувствительным в жжением в твла, ниже сжащих сильнаго, котораго и самыя ванны преодольть не могушЪ, какЪ-то сте нами выше показано вЪ примъ. чанти з сей главы. Сверьхъ того не должно быть согодятся, всёмЪ, или очень мало истечентя гоноррентеского: ибо доказано, что меркурій, употребляемый въ натиратечение го- наяхб, удивительным в образом в спирает в и ослаблянорренче- ешь пасотные сосуды, авлаеть оные открытыми и лишаепъ

Оныя ме когда бываеть ис-CHOC. ARE Tero ?

шаеть ихв почти всей ихв упругости: что самое и авлаетъ таковыя истеченія иногла неизлічимыми, а особливо, ежели и употреблены булуть натиранія, какъ. то сте вообще делается, при конце пользовантя гоно ррей.

И такъ когда всъ обстоятельства совершенно предугобудуть подавать надежду въ успъхъ оть одного спо- товление. соба натираній, тогда должно начать кровопускані кровопуемЪ, ежели припадки больнаго того пребуютЪ; по-снаніе, ель чего предписать ему двь ванны въ день, одну ванны, ввечеру, а другую поупру, и продолжать оныя до щельных. дващияти, болье или менье, смотря по дознанному свойству кожи, и дать ему принять разъ или два тистительное такое, какое предписано предъ симъ на страниць 14 сего Тома.

По том'в двлается первое нати ранге, для коего бе-количерешея двъ драхны меркургальной мази хорошо пріугошо- ство мервленной, въ которую бы входило по равной доль меркурія мази для и сала, такъ какъ сказано было на 25 страницъ сего наждаго Тома. Черезъ день послъ того производится второе натиранія. натираніе, и продолжается такимъ образомъ всегда чрезъ день каждое натирание. Первое натирание дъ чаети долпо женетвулаенся по лодышкъ одной ноги; второе ющія быть другой ноги; трете от лодышки икры; четвертое по тому же масту другой ноги; мы. пящое от в икры до самаго кольна и проч, и так в какимв далье, восходя постепенно вдоль лядвей, задницы, оныя напоясинцы, спины, плечь, и переходя попеременно от в тиранія одной стороны на другую. AOAKHET. происко-

Когда по всъмъ симъ частямъ по порядку сдъ лишь. лано будешь натирание, а больной не выльчится, то не должно опашь должно начашь св лодышекв, и поступать такв мако. как' и прежде. Однакож всегда должно беречься, чтобы выкъ на. не дълать натираній по груди и по брюху.

употребшираній ни по груди,

Ко- ни по брюжу

Когда признаки, хотя и недавніе, будуть отвежно усугу-сим, тогда количество мази умножається до трехь бить ноличество и даже до четырехь драхив; однакожь на первых мази. чати ранія должно всегда употреблять только по двъ драхмы.

Какъ скоро во рту начинается жаръ, тогда на-КакимЪ •бразомЪ тиранія прерывать должно, и дать проносное; по должно дътомь опять продолжаются натиранія по прежнему жашь. напрелписанію. Естьли же, не взирая на пропосное, мерmupania. когда мер- курги опять станеть производить сильное абистые курій силь. во ріну, що надобно отложить натиранія на день, и но дъйавлать оныя чрезъ два дии. Ежели и сте средство cmsvemb будеть безуспешно, тогда должно уменьшань колиso pmy. чество мази меркургальной при каждонь натирании, и довести до одной драхмы, буде только такимЪ количествомъ можно наконецъ унять сильныя оной авиствія во рту. Но когда и при семь последнемь количествь ть дъйствія будуть еще продолжаться, тогда должно прейти къ другому способу, и избрать тоть, который сходственные съ обстоятельствами.

Во время сего пользованія больной должень упо-**Ленокт** Б шзЪ сарсе∗ 2 фунта или по полуштофу треблянь по жарили. канить об. Декокту изъ сарсепарили; не выходить на воздухб, но остаться въ своемъ поков, держа себя въ умърентазомЪ ной шенлошь. Во все время пользованія не долженъ больной еодержать он в перемънять ни портовь, ни чулокь, а скинуть долженъ ихъ недали черезъ двв послв того, какъ всв присебя во эремя поль- падки совство минующся. Тогда надобно разъ или вованія. два дать ему проносное.

дізта: ВпрочемЪ больной долженЪ следовать діэті предписанной выше, на стран. 27 сего Тома. Но хотя мало бользнь будеть безпорядочна, то рыдко случается, чтобы отстала она оть однихь натираній; а надобно чаще всего пріобщать кь онымь какой нибудь и другой способь; изь всьхь же меркуріальных пріуготовленій пыть ни одного, которыхь бы совокупленіе было удачные и вообще употребительные, какь совокупленіе сулемы сь натираніями меркуріальными: таковой соединенный способь извышень вы Парижь поды именемь смышеннаго (тіхте).

Способт какт употреблять натиранія меркуріальных соединенныя ст сулемою.

Когда къ прочимъ вене ритескимъ признакамъ присоеди въ ношоняшся вереды, прыщи, лишаевыя изверженія, истеченія ядовитыя и проч.

прочимъ вене ритескимъ признакамъ присоеди въ ношорыхъ должно употреблять

ВЪ такихъ случаяхъ, пустивши больному кровь, способа ежели его бользнь сего требуеть, очистивъ онаго пропоснымъ, предлисавъ ему употребить нъсколько тругований и мястительного питъя, надобно давать ему пріемъ по четверти грана сулемы въ день, и пріемы сіи сулемы, увеличивать постепенно, такъ какъ сказано было выше, на стран. 66 и слъд. сего Тома.

На другой день надобно употребить пати ранге Количеизъ меркиргальной мази, нополамъ пртуготовленной, курічльной коей берется одна драхма. Сте натиранге должно быть мази. повторяемо чрезъ всякте четверо или пятеро сутокъ, смотря по тому, какъ сего требовать будеть сила бользни, или успъхи самыхъ лъкарство.

Естьли же произойдеть слинотегение, то надлежить остановить натирания и сулему, а дать чистительное: и опять начать, когда оное перестанеть. Наконець еще должно дать чистительное спу-Гомо IV. стя недъли двъ нослъ того, какъ всъ признаки про-

Способо како употреблять меркургальных натираніх, совокупно со промывательными противувенеритескими.

(Ежели распущенная сулема, соединенная съ меркуріальными натираніями, способствуєть оныхь успъху; ежели меркурій, будучи прикладываемь къ кожт въ видъ семь, имъеть иногда нужду въ жидкости для опредъленія и ускоренія ихь дъйствія: то промывательных противуєтеритескія, коихь основаніемь бываеть распущенный меркурій, долженствують производить равномърныя дъй півія въ подобныхь обстоятельствахь. Они заслуживають даже быть употребляемы преимущественно, когда желудоко будучи разслаблень, оть чего бы то ни происходило, не можеть перенести перваго дъйствія сулемы.

Случай требующій необжодимо сего способа смъшеннаго.

> Но есть случан, въ которых в противувенеритескія промывательныя, соединенныя съ патираніями жеркуріальными, производять действія еще благонадежнъе и примътнъе, и съ трудностію могуть быть заменены другимь способомь; что самое случается тогда, как в кв венеритеским признакам обыкновенным в присоединятся давнія гоно рег, устоявшія противу всяких в средство, или которыя булучи пользованы не по правиламЪ Врачебнаго искусства, болье усиливались, и представляють купно напряжение и ослабление, препятствующий врачеванию, и кои съ великою трудностію преодольнь можно. Я ромывательныя же противувенеритескія, исправляя в в семъ случав должность ванны ранопвлительной и крвпи. тельной, направляемой на самое мъсто больное, дъйствують съ явнымь превосходствожь, и производять весьма сильное впечаплание во всв заняпые

> > 16 36 3

Каним Б образом Б дъйствуют Б прошивувенерическія промывашельныя ? им: откуда следуеть почти завсегда переломо полный и спасительный, происходящій оть совершеннаго очищенія гоноррештеской мокроны, и сматія соразмернаго, и непрерывнаго соложно ослабленныхь и разтянутыхь излишествомь сей мокропы; почему для произведенія такого втораго действія почти никогда не нужны бывають и слательныя, столь опасныя кь употребленію, даже и тогда, когда почитаются за самыя необходимыя.

Ястиранія способствують, съ промывательными противовене ритескими, къ совершенному истребленію яда, и еще върнъе въ томъ обнадеживають:
почему и можно сказать, что отъ соединенія сихъ
обоихъ средство происходить часто такое дъйствіе,
котораго не можно бы было никакъ ожидать отъ одного изъ нихъ въ толикомъ совершенствъ.

Пріугомовив больнаго, мак в как в и для пред пріуго паущих в способов должно даващь ему по два мовлене проливательных противувене ритеских в, одно поутру, количестванем в говорить, в способ как употреблять ных промеркурій посредством противувене ритеских промывательных одних смотри стран. Го сего Тома. На трети пельных одних смотри стран. Го сего Тома. На трети или четвертой день должно предписать ему натирати или четвертой день должно предписать ему натирати мази, меркусмотря по напряженію признаков , и сте натираніе велійньной мази, по вторять чрез каждые три или четыре дни, не перерывая и промывательных противувене ритеских в, но два в день.

Естьли же произойдеть слинотегение, то должно оставить на время оба сти средства, и дать проносное; посль чего надлежить опять приняться за оным и продолжать даже за плинатцать дней посль того, когда никакихь уже признаково не будеть

риль: употреблять по полуштофу декокта из в сарсепарили, и слёдовать діэтё предписанной на 27 стран. сего Тома.)

Способы какы употреблять меркургальным натиранія совокупно сы окуриваніями.

пребующе соедишенія сихъ присоединяющея нагнонвающісся прыщики по всей кокобовь.

употребленію, или вереды точащіе и противящієся какъ сему первому вратеванію, такъ и всякому по правиламъ искусства употребляемому средству: то окуриванія тастныя стоняють тогда оныя и заживляють; и не токмо не противящея дъйствію натираній, но
способствують напротивь того онымъ и весьма много
содъйствують.

Предписавъ больному кровопускание, ежели об-Mpiyromosженіс» стоятельства онаго требують, нъсколько ванив и проносное, должно начащь, съ натиранія из в двух в драхм в меркургальной мази, пртугоповленной пополамь; на Колнче етво мер другой день сделать надь нинь окуривание изв одной драхмы сладкаго меркурія, которое особенно обра-M23H* щать должно на тъ мъста, на конхъ сизять прыщи-Сладной ки и вереды , какъ- то мы о семь будемь говорить мернурій въ окурия ниже въ способъ како употреблять окуриванія одни. ваніи.

На третій день дёлаєтся второе патираніе, а через день послів второе окуриваніе. Однакож сему порядку не должно слідовать во всей строгости; ибо нужно иногда унотреблять нівсколько дней сряду окуриванія, смотря по тому, как тужно проникать, очищать и заживлять; или остановить их в, относительно к в дійствіям в, какія они производят в. В в

такомъ случат руковолешвомъ служить должны госполетвующе признаки и самыя обстоятельства.

Какъ скоро слинотегенте покажется, то ста меркургальныя средства отлагаются, и замъняемы бывають чистительнымь. Но когда оно утолится, то средства сти онять возобновляются и продолжаемы бывають до плитнатцати дней по совершенномъ скрытти всъхъ припадковъ

Во время пользованія больной должен следо- пищеупом вашь пищеупом ребленію предписанному на 27 спран. се- пребленію то Тома, а пишь каждой день по небольшой бущылкь риль. декокта из сарсепарили.

Способб какв употреблять меркурій посредствомв

(Когда по шёлу выступять прыщики или ли- признани шаи нагнопвающеся; когда будуть оставаться еще требую- давнишній истечній гопоррецтескій, или безпрерывныя ба окури- ранки на дётородных в частях в и вы заднемо прохо ваній. Ді: то окуриваній бывають нужны, потому что вы семь видё меркурій удобнье проходить сквозь, су- шить и надежные чистить и заживляеть ранки.

Но как употребляемый таким образом тер-напрешив хурій производний действіе кринтельное, и как бы того опой сязательное, то и надобно убъгать предписанія шістомуриваній всякой разь, когда бываеть внутренній или наружный жарб безб опухоли, воспаленіе, чувствительная боль или расположеніе кв опасной ранв. Равным образом в надобно от в них воздерживаться и тогда, когда больной имбеть груды слабую, когда страдаеть удушием сухим и судерожным когда угрожаем бываеть, ежели то женщина, ранкою вы маткв; ко-гда больной твлосложенія весьма сухаго и бользнію изнуреннаго.

Mep-

бирряванія бывають или всеобщія или частныя. Канимь образомь должно дъдать всеобщія:

Меркургальныя окуриванія супь или всеобщія: или кастныя. Всеобщія окуриванія деляются посредствомь окуривательного стула, изобрытенного Г. ла Яуэттома, Локторовъ правящимъ въ Парижъ Мелицинским в факултеном в, коему мы обязаны усовершенствованием в сего способа, бывшаго до него не столько благо успъщным в, Авйствовавшаго почти завсегла съ нъкошорою онасносшію, а слъдственно и вовсе оставленнаго. Но не клеаясь до сей машины, коея описанте сообщимъ мы во всеобщей таблица, въ нятомъ Томв, при словв стулб окуривательный, и которая, защищая голову, предохраняеть глаза и зубы оть сильнаго впечаплънія, какое наль сими органами произвести можеть меркуріальное окуриваніе, оное пріуготовление, меркуриальное имъ прелписанное, дълаетъ самыя охуриванія весьма полезными. Следовашельно сей способъ можешь почесться самымъ лучшимъ средствомъ споспъшествующимъ къ истребленію венеритескаго яда, и никакъ не должно пренебретать онаго.

и какъ дълаются частныя.

Таковыя какъ- то о семъ говорено было выше, смотри способб какв употреблять, ка- то о сего тома.

пріугошовленіє. Количеещео нановари или сладной ригуши.

Прежде всего должно начинать кровопусканиемо, ежели припадки больнаго того требують; предписывать ему нъсколько ванно, и очистить его проносными. По томъ все тъло его выставляется на паръ одной драхиы артифициальной, то есть искусствомо дъланной кино.

киновари или слажкой ртути. Лоджно наблюдать, что- некусбы не употреблять никакь киновари натуральной или ствомъ самородной, пошому что количество меркурія, нан состакотпорое содержить стя последняя, можеть быть раз-вызя киноличное, а въ искуственной киновари содержащееся ко. вары, пред. личество всегда бывает в опредъленное. Впрочем же ся и тувсякъ бол ве долженъ удостовъриться и въ самой доб- ральной. рошь меркурія употребленнаго в киновари составной, Для чего? потому что прежде составленія из в него киновари жегко можно очистить его от велких в тълв постороннихЪ, сЪ коими онЪ можешЪ бышь соединенЪ при выкапыванти изъ рудника. Но мы совъщуемъ предпо- но должно чишать, сколько возможно будеть, сладкой меркурій еще предкиновири, даже и искуственной; поколику дъйствуенть ей сладонъ всегда надежнъе, а притомъ и скоръе (10).

Черезъ день послъ того должно употребить нурій. второе окуривание въ одинакомъ количествъ, и продолжать такимъ образомъ чрезъ каждые два дни, въ течени двухъ или трехъ недъль. Тогда количество искуственной киновари или сладкаго меркуріл увеличивается до полуторы драхмы; и сте окуриванте черезъ день продолжается до твхъ поръ, пока всв признаки совершенно не пропадутъ.

Часто бываеть нужно употреблять окуриванія эвсток. тастныя, совокупно со ессобщими, а особливо въ слу. тель тва

щія окуриваній ча-

⁽¹⁰⁾ Еще надежние можно бы употреблять меркуріальныя пріуготовле стимкь. нія Г. ла Луэтта, описанныя въ его новомъ спосово лоченія Венерыческимь волбаней посредствомь окуривания и проч., напечатанномь по Королевзному Указу въ Парчит у нингопродавца мериго - Старшаго въ 1776 голу. Г. ла Луэтть предувадомляеть, что онь порядонъ сего способа извясния славному Апшекарю Г. Рузляу, что на улить Ганова въ предмъсти Сенъ - Жермень, у котораго и находятся стя Абиаретва советмъ приготовленныя: не давно мы линимись сего искуснаго художника, но самыя пригошения меркуріальныя найши можно у оставшейся посль него жены, или у его преемника въ томъ же месть жишельство имеющ х.

мать еередоов или ранокв и истеченій упорных в. Тогда надлежить устремлять пары или дымы целой драхмы сладкаго меркурія на самую часть больную посредствомы воронки. Сте окуриваніе должно делать ввечеру посль окуриванія всеобщаго, или на другой день.

Пищеупотребленіе.

Сарсепа. Риль. Во время таковаго пользованія больной должень наблюдать пищеупотребленіе, какое предписано на 27 стран. сего Тома, и пить въ сутки по бутылкъ де-кокта изъ сарсепарили).

Способ как употреблять меркурій посрежством в одних в промывательных противувстврических в.

("СпособЪ впускать меркурій вЪ тёло человѣ, ческое посредствомЪ промывательных сказываетЪ
, Г. Горно, есть довольно новый; да и надобно при, знаться, что оный весьма разумно выдуманъ. Симъ
, обязаны мы Г. Рогеру, знаменитому Хирургу и
, Секундъ-Мафру, который въ небольшомъ сочине, ніи, вышедшемъ въ свътъ въ 1764 году, и которое
, недавно вновь напечатано, довольно пространно м
, подробно описалъ причины, побудившія его издать
, сей способъ.

обстоя. "Сей способь употребленія меркурія всегда тельства "Должно предпочитать, когда надобно пользовать тапринужда "Кихь больныхь, у коихь грудь слабая и нёжная; кои треблять "бывають подвержены желу досной боли со оды шкого, епособь "реотв, или имвють непреоборимое отвращеніе оть противу. "Авка рстеб внутреннихь, и которые не могуть венериче. "Пользоваться нати раніями, для вышепредложенныхь мыватель. "причинь: смотри стран. 70 сего Тома.

принадки ,, Посредством в промывательных противувене риемы способом в иззачаемые. ,, или ранки, бо родавки и другіе сего рода наросты : гни" лость портящая кости, и горбы на оных в случаю, щеся часто не противостоять симь средствамь, равно как и всякая боль и безсонница венерите, ская.

"Скодньй предь всьми досель извысшными въ раззуеть осуждени пользования стародавних в соноррей, а кольонъ въ ми паче недавно приключившихся. Всякому не безъ гонорреахъ, извыстно, сколь трудно лычить сию бользнь, и сколько она упорна, а особливо у женщинъ: протисувете ритеския промывательныя оканчивають ее, иногда чудеснымъ почти образомъ; однакожъ подобливе успыхи должно болье всего приписывать то, му, какимъ образомъ сте средство бываетъ унотрезу, бляемо.

, Въ самомъ дълъ надобно почитать его за соб-каное по-,, ственно двиствующее, прикладываемое почти непо- няте доль , средственно на самую такъ сказать болячку, опротиву-" сквозь которую оно проникаеть удобно, скоро и безь венериче-, всякаго поврежденія: оно есть такое наружное лікар-сних про-,, ство, которое действусть только тогда, когда его при-" ложишь къ больному мъсту; или лучше нъкоторой "родь частной ванны, коея двиствие продолжает-, ся иногда нъсколько часовъ сряду, не увеличивая ", чрезъ то ослабънія, столь опаснаго въ сей бользни; а " когда сте средство дъйствует в несомнительным в обра-,, зомв, такв какв собственно двиствующее, то произво-"дишь почти столькоже совершенно свое дъйствіе "криштельное, и даже постепенно вязательное, на ча-,, сти сначала засорившіяся, а иногда совсымь въ раз-" слабление пришедшия. "

Но дабы меркурій, составляющій основаніе про- что потивувене ритеских в промывательных в, могь производить требно къ Гом всъ тому, да-

Вы ейн HDOMBIRSжельныя Ventrb EMTAN.

всв сін действія, то больному надобно употреблять оныя довольное время, безъ чего самое втагивание или поглощение онаго было бы несовершенное, или совстыть невозможное.

КакимЪ больнымЪ упошребджи ашьк

Еспь и другое равнымъ образомъ къ успяху сего средетва необходимое обстоятельство, то есть. чтобы оно не производило ни колотья, ни сильной боли, миже потетуя воспаленняго: какъ то и неудобно опо для техь больныхв, у коихв внутренность же должно нъжная, удобораздражаемая, а особливо для подверженных в ипохондрии; ибо немогущие ни минушы выдержать обыкновеннаго промывательного по чрезвычайчувствительности еще менъе могли бы снести дъйствие подобныхъ промывательныхъ, которыя не обходимо должны произвести накоторое потрясенте.

Bcero AVYше упопромыважельныя жолодныя. и всколько **ж**БкарешвЪ еноппвориыхъ.

Однакожъ не смотря на оба сти неудобства, треблять можно иногда удачно употреблять противувенеритескіх промывательныя, прибавляя кЪ оным'в несколько лёкарство снотеорныхо, которыя не токмо чтобы прибавляя уменьшить их данстве, напротивъ того болье еще оному способствують; а таковой придачи вообще и довольно кЪ предупрежденію перваго изЪ вышеупомянушых в неудобствь, и къ вспомоществованию другому. Но въ сихъ самыхъ случаяхъ должно ихъ употреблять почти холодныя.

Необходимосшь очижде и во время поль-BOBRHIN.

Но кЪ принящию съ большею пользою промыващать пре- тельных в противнеенеритеских в потребно, чтобы кишетный каналь быль свободень; а сте самое и побуждаеть почти всегда очищать больных предъ начаштемъ оныхъ, а пришомъ возвращащься иногда къ подобнымъ проносиым во время пользованія.

Внъшнія свойства. меркурі-2 льной

Противувенеритеская жидкость, входящая въ составь таковыхь промывательныхв, есть меркурий совершенно разпущаемый, и удобоемышивающійся со

ветми нашими мокротами. Она бываеть красновата и жидкости, прозрачна, занахь имбеть самый отвратительный, въ составляющей сій которомь болье всего ощутительные запахь калифорт промывать; но реценть са хранится еще въ тайнь: должно тельный. уновать, что Авторь со временемь обогатить онымь матерію медицинскую. Пріємь сей жидкости полагается пріємь. въ точности оть десяти до дватцати драхмь, и оную должно хорото размычать въ отварт изь леняна-

Макъ скоро больной будетъ пріуготовлень крово-пріуготов пусканіель , ежели обстоятельства онаго потребу-леніе. ють, и однимь мля двумя хистительными, кои въ семь пользованіи необходимо нужны, то надобно ему предписать по два промывательных противу- по два вене ритеских въ сутки, составленных пакъ какъ промываты теперь сказывали, изъ отвара льнянаго съмени, въ противу-котором в хорошо размъщать должно десять драхмъ михъ венериче-кости противувене ритеской Г. Рогера; и продолжать то же свихъ въ самое число промывательных каждый день, увеличи-сутки вая постепенно пріемъ оной жидкости до дватцати драхмъ. Таковое пользованіе оставляєтся не прежде какъ спустя пятнатцатеро сутокъ по совершенномъ закрытіи всёхъ признеково.

Во время пользованія больной долженъ наблю діяма и дан дру- очищеніс. З дань ту же самую діяму, какая совышована и для дру- очищеніс. З тихь способовь, асверьхъ того надлежить давать ему чистительныя, какъ скоро примьчено будеть нькоторое укосненіе въ успых діжарство сихь; изъ чего можно заключать, что собравшіяся въ кишетномо каналь матеріи препятиствують дыйствію противувене ритеских промывательных в.

Мы сказывали уже, что таковыя промывательмыл должно почитать за средства вторичныя наи К 2 вспомогательныя, способствующія часто в другимя способами къ излъчению венеритеских вользней самыхъ пляжких и непорядочных в. Завсь мы не станем в показывать техь обстоятельствь, вь которыхь сте совокупленте бываеть столь полезно; поелику оныя предложены нами въ способахъ предъидущихъ: смотри стран. 62 и 63 сего Тома.)

Способб какв употреблять меркурій посредствомб противувене ритеских з ванн в одних з.

знаменитому Парижскому Аптекарю и Королевской Академіи Наукъ Члену Г. Боль. Онъ не токмо что-

(Симъ новымъ и важнымъ способомъ обязаны мы

бы ущанвать, какъ то многіе делають, пріуготовление мерку риальное, найденное имъ предпочтительнъе другимъ и самымъ достовърнъйшимъ образомъ его намъреніямъ удовлетворяющее; напротивъ того объявляеть оное сь откровенностію и благонадежнымь увърентемъ, приличествующими его безкорыстию и въ проти- знанію. Сіє пріуготовленіе противувенеритеских в апно эувенери. состоить изв сулемы, распущенной сперва, полагая ских ван- на прісмъ по полуграну, въ каждой пинть или полуштофъ воды, умножаемой по томъ въ одинакомая есть вомь количествы и по надобности приводимой вы прі-

нажъ упопребляе-

разпущень емЪ сильнайшій.

мая сулема. соба про-

аниЪ.

Хошя противувене ритескій ванны и долженствувь каких вопъ вообще почитаться не иначе какъ средствомъ вспомогашельным в къ врачевантю Вене рисеской бользии, етвахь до- однакожь находятся случан, въ которыхь они могуть вольно нъ быть достаточны и даже употребляться пногда предизятичению почтительно, а особливо когда прочте способы были одного епо-почти безполезны, или когда органд кожи будеть тивучене. такъ объять и ослаблень ядомо венеритески по, что рическихь нужно подкрыпить опую продолжительным и непрерывнымъ содъйствиемъ ванив; тогда сугубая бываетъ

выгода, ибо одинив средствомы выполижется сте первое и необходимое вратеванте; а по томы и самый яда вемеритеский изгоняется меркургального сольго распущенного вы ваннаха, боезсиливается его дъйствие и оны мало номалу совершенно истребляется.

Особливо находится одно обстоятельство, въ признани которомь противувене ритескія ванны весьма пригодны; неказывали именно когда припадки, происходящіе оть нереб и оть ипохондрій или задумтивости, соединяются съ мость сего Вене ритеского бользніго, предваряють оную или сопростособа, вождають, а следственно и учиняють ее тяжнайшею и къ льченію трудньйшею. Въ таковых вобстоятельствах не безьизвыстна опасность других вспособовь: да и большая часть оных виногда неудобомпотребительна. Но противувене ритескія ванны напроставь того могуть всегда въ семь случай употребляться съ хорошимь успыхомь, и приносить по малают мёрь нёкоторое облегченіе.

Мы опишемъ теперь наблюдение Г. Гориа, доказывающее пользу сего способа: по важности онаго не можемъ мы пройти его въ молчании; ибо впрочемъ послужить оно еще и руководствомъ въ употреблении противувене ритеских б санно или баней.

Одна двашцатичетырехльтиля женщина по-наслюдей чувствовала от самаго рождентя своего многе при-нее, падки непрерывно одни за другими послъдовавште и весьма часто ее безпокоивште. Главнъйшими были боль об глазахо почти всегдашняя и разныя пятна и прыщи на кожъ. Четыре года особливо сей послъднти недостатокъ болье сталъ увеличиваться, по которымъ признакамъ не можно было сомнъваться болье о существованти Венеритеской бользии.

K 3

*

1286-

Питаи почти по всему тълу распространивштеся, отрубистые, четуйчатые, бъловатые, иногда загноивающтеся, ослабляя и повреждая всю кожу, сей столь важный для ослагита органд, причиняли безпрестанный зудд и побужденте къ чесоткъ и совершенно ее обезображивали.

Выступившая повсюду острота лишаевая, которая не пощадила даже и собственнаго корня волось, противилась досель всякимы употребляемымы среденвамы и лекарствамы: а всего еще удивительные покажется то, что сія больная нежившая никогда ни сы однимы мущиною и сохранявшая самые несомныные опыты естественные воздержанія, подвержена была истеченію качествомы своимы подобному остроты лишаевой распространившейся по всей поверхности сл тыла.

Какъ всякъ подумать могь, что сїн острота происходила от больни наслъдственной, пототу что по всей справедливости не льзя было оныя приписывать прямо сей больной, и что, какая бы причина тоту ни была, употребленіе сулемы долженствовало
произвести перемьну для ел состоянія благопріяттую: то и пріуготовили ее къ принятію сего лекарства кровопусканіемо, пропоснымо и ванами просто
умлекающими. Она начала принимать сулему 20 Октября 1776 года, съ такою предосторожностію, чтобы
продолжать и самыя ванны изъ теплой воды по крайней мъръ чрезь каждые двое сутокъ.

Вначаль давали ей по четверти грана сулемы, разпущенной вы полуштофь отвара умястительнаго, и днемы пила она по ныскольку стакановы сыворотки. Сте самое лыкарство вы одинакомы количествы и сы тыми же предосторожностьми продолжала она 21, 22, 23 и 24 числа. Въ савдующий день, то есть 25 числа, увежиченъ быль приемъ сулемы одною четвертью грана, и такимъ образомъ принимала она по половинъ грана въ сутки савдующие шесть дней, не чувствуя отъ сего ни мальишато неудобства, такъ что и въ самой бользни не произошло никакой перемъны.

Ноября і приняла она три четверти грана сулемы разпущенной вы томы же самомы количествь ясной воды, и продолжала принимать каждый день вы такомы же количествы по 5 число, безы всякаго поправлентя вы своемы состоянти и безы малышаго себы безпокойствы; не было никакой боли, никакого поноса, никакого слинотесентя: всы естественныя дыствыя накого слинотесентя: всы естественныя дыствыя находились вы надлежащемы порядкы, и охота кы ыды особливо продолжалась такы какы и вы самомы совершенномы здоровый.

Ноября 6 сія больная приняла цёлой гран в сулемы, разпущенной вы полуштоф вотвара потогонительнаго, и вы одинакомы количеств в ежедневно продолжала употребленіе оной по 20 Ноября, котораго числа и примечено было небольшое уменьшеніе вы острове лишаевой: зуды также сталы слабые, струпики начали даже спадать и истеченіе изы тайнаго уда довольно убавилось.

Но въ то время принуждены были оставить сумему, коея больная приняла уже дващить четыре грана, по причинъ что оная производила позыво на реоту и тошноту, такъ что питье сте сдълалось неспосный в почему на мъсто онаго и предписали ей противувене риссектя ванны то есть перемънили только употребленте сего лъкарства, но чрезъ то самое не покидая еще онаго.

Ноября 22 приняла она противувене ритескую баию, по приему предписанному от Б Г. Гоме, а имен-

но полагая по половинъ грана сулемы разнущенной въ Количеетво суле- каждомъ полуштофъ воды, что и составило до пяпи-MpI H2 лесяти грановъ сулемы на каждую ванну: въ оной сикаждую двла она цваме два часа безъ всякаго дурнаго слва. ванну ; сптвія.

ВЪ которой должно сидые два дни. Сарсепа DHAD.

Ежелневно увеличивали пріемЪ сулемы, и нечувствительно доведень быль до ста грановь; и она деть че- сидела въ сихь ванняхъ черезъ каждые два дни, и резъ каж-поперемънно пила легкой отварв потогонительный.

> Ноября 23 чешуйчатые лишай начинали спалать; а шт которые нарывали, стали подсыхать, и кожа явно очищалась; исшечение же гоно р рештеское почти совершенно перестало.

> Лекабря 10 кожа почти совство была очищена оть лишаевой остроты; а хоня и оставались еще на ней нъкоторыя мъста негладки и шереховаты олнакожъ истечение совершенно перестало.

> По томъ 15 числа не видно было болъе никаких в лишаевв, и кожа стала так в гладка, как в только желать можно, чего бы прежде никак в не льзя было и чаяться.

> Наконець Декабря 17 перестали употреблять противувене ритескія бани, которых вообще приняла она двънапиать, и кои не причиняли ни мальйшей бохи, ниже какого либо раздражентя или отищентя необыкновениаго.

> Посль сего пользованія больная очищена была аважды пилюлями Беллостоеыми, и ей присовътовами принимать сте проносное по крайней мъръ каждый мъсяцъ. Но какъ она пренебрегла таковую предосторожность и жила безъ всякой діэты, то ея лишаи опять появились насколько сладующею весною: но

нъсколько полуштофовъ отвару слабительного и простой мази довольно было тогда къ осущению оныхъ; и съ того времени они болъе никогда не появлялись, такъ что гладкая, бълая и нъжная кожа кажется навсегда отъ нихъ освобожденною. Впрочемъ сия больная находится въ самомъ лучшемъ состояни своего здоровья.

Никто не отважился бы давать принимать внутрь сей больной такого количества сулемы, сколько было нужно къ совершенному оныя излъченію. Но когда вся кожа подвергнута была содъйствованію сего лька рства, то кромь что вспомоществованіе онаго могло быть непосредственное и надежньйшее, втянуто было его довольно къ произведенію перемьны и къ истребленію вене ритескаго яда, безъ всякаго поврежденія внутренности.

Мало находится бользней сего рода, столь продолжительных в и етолько шяжких в; но сего примъра довольно къ уразумънїю, чего можно ожидать и чего надъяться должно от сулемы употребляемой постоянно, и которой не можно предписать въ толикомъ количествъ, кромъ какъ въ ваннах в (11).

Не возможно подлинно опредълить и точнаго не можно го количества лекарство употребляемых вы каждомы спредълить камаго времени, сколько надобно продолжения жать опыя для совершеннаго излычения. Сти обстоя- меркурія, тельства различествують по телосложенто больнаго, потребнаго вы кажаромы года, по тяжести больнаго, потребнаго вы кажаромы года, по тяжести больнаго, потребнаго вы кажаромы года, по тяжести больнаго, вы кажаромы спостоя в кажаромы года, по тяжести больнаго, вы кажаромы спостоя в кажаромы спостоя и прочемени года, по тяжести больнаго, вы кажаромы спостоя в кажаромы спостоя в кажаромы спостоя и прочемени года, по тяжести больнаго, вы кажаромы спостоя в кажаром

Jome IV.

 Λ

Ho

⁽¹¹⁾ сулема пользуеть ловольно успешно вы таких бользняхь, когда на ложь бывають лишан; но нъ ней должно присовонупить санны, прохладительную дідту, давать оную долгое время и малымь прісомомь.

Но хотя и трудно вы самомы деле, и какы то применаеть славный Яструко, определить сы пасале точное количество меркурія, какое надлежить дать кы произведенію совершеннаго излеченія Венеритеской болезни, однакожь вы последованіи можно узнать сіс смотря по уменьшенію и перерыву признаково. Сей же самый Авторы делаеть наблюденіе, что вы случаяхы обыкновенныхы не должно употреблять мене двухы унцій меркуріальной мази крыпкой, когда вы леченіи болезни надлежить следовать способу натираній в предложенному выше на стран. 62 сего Тома.

Изъ всъхъ химитеских пріутотовленій меркурія, столько выхваляемых для врачеванія Венеритеской больше, мы не станемь больше товорить, кромъ какъ о сулемь (текитіия fublimatus corrofivus). Знаменитый Баронъ Венб-Свитенб употребляль сї пріутотовленіе въ Терманіи за нъсколько уже до сего льть; а вскорь по томь ученый Докторь Принглесб, бывшій тогда первымь Медикомь въ Аглинской арміи, ввель оное въ употребленіе и въ Англіи.

Способб какб употреблять сулему одну.

Рецептъ; Сте лекарство составляется следующимъ обрачтобы дв. зомъ:

въ виде жидкости.

Возьки сулемы, - - один'в гран'в; Французской или Франкарной водки, - - двъ унцін.

По Лашынь:

Recipe mercurii sublimati corrosivi - - I granum unum;

Aquæ vitæ Franco-Gallicæ vel

Spiritus cremati, - - - uncias duas.

Распусти сулему въ семъ количествъ Француз-

Боль-

Больному должно давать по столовой ложкъ сего состава или по полуунціи дважды в в день, и продолжать до тьк порв, пока всь признаки не пропадутв совершенно. Когдаж желу док в не может переносить сего лькарства в в таком видь, тогда надлежит давать сулему в пилюлях в, прі уготовленных въ таков ев розового консервого или яго дником в.

(Хотя бы сулема предписана была въ пить должно ее или въ пилюляхо, однакожъ должно всегда давать ее самомъ сначала въ весьма слабомъ пріемь, какъ по по четверти маломъ грана, то есть по одной столовой ложкъ выше количе помянунато состава, а притомъ однажды въ день, развъденнаго въ полушнофъ декокта изъ сарсепарили тъ изъ рыбъяго клею или Ярабской камъди. Равнымъ обрасаренарие зомъ больной долженъ принимать не больше какъ по четверти грана сулемы, смъщанной съ небольшимъ клет или количествомъ розовой консервы, когда ръшится, для Арабской чего бы то ни было, употреблять пилюли.

Увеличиваются же пріемы сулемы постепенно, и когда примѣтно бываеть, что тьло не чувствуеть никакой неловкости или тягости, и когда напротивь того оно вы лучтемь находится состояніи, нежели какы преды начатіемь оныхь. Однакожь мало помалу можно прибавлять оной по четверти грана и довести до цълаго грана вы день; но никогда не позволяєтся употреблять болье сего пріема, который впрочемь самымь опытомы дознань за достаточный, и который даже не нужень для всякаго, а можеть иногда быть слишкомы сильнымы для многихь.

И такъ пустивши кровь больному, ежели крово-пріугопусканіе нужно, и очистивъ его проноснымъ, долмровопужно начать даваніемъ ему по четверти грана сулемы, сканіе чиразпущенной въ полуштофъ того или другаго изъститель.

Л 2

вышеозначенных лакарственных отваров , и въ ша-Чептвершь ком в приемъ продолжать ему употребление опой от в грана суzembi. семи до осьми дней. Тогла, ежели не булеть ника-Половина кого препятствія, надобно прієм умножить до полуграна. грана, которой и давать больному еще от в семи до осьми дней; наконецъ простирается оной до трехъ четверней грана, и въ такомъ количествъ больной Три четверши гра- долженъ продолжать даже дней пятнатцать по закрына. піїн всьх в признаков в. Во время пользованія сего боль-Aiema. ной имбеть следовать діэть предписанной на стран. 23 cero Toma.

"Мало которые Врачи отрицають нынь силу " сулемы къ врачеванію Вене ритеских в бользней; и дока-, зано уже, что она не можеть производить никако-"то дъйствія зловредняго, когда съ осторожностію , употребляется. Но сколько во зло употребляема бы-,, ла и самая легкость, какую нашли въ доставлени отъ жудаго упош-,, себъ противулдія столько же върнаго, какъ и неребленія ,, убыточнаго: столь многіе дозволяли себъ употресулемы дависять. "бленіе оныя, и брали кЪ ней прибѣжище, совсѣмЪ бъдсивен-"ее не зная, что могли от того происходить ныя слёдствія оной, следствія дурныя, которыя великое число особь и .. лаже люди во Врачебной Наукъ упражнявшиеся неприписываемыя. , справедливо относили кЪ самому лекарству сему. "когда они зависѣли единственно отъ дурнаго упо-" требленія онаго.

,, Но люди знающие свойство сулемы, довольно Она не притодна для ,, испытавите оныя дъйствтя, не почитали всегда се всянаго ,, за лекарство приличествующее безъ разбору всякобольнаго ,, му человъку; ибо напрошивъ того многократно пониже во " вторяли они, что должно весьма распознавать обстовсткъ обemoameab. етвахь для, ятельства, въ которых она нолезна, отъ техъ, ,, въ коихъ быть можетъ вредною, а особливо разmoro жe ,, числять ея действия по телосложению больных в, для camaro больнаго. 20 KO=

"конхъ она предписывается. А какъ они руководству"емы бывають сими правилами, то и не удивитель"но, когда они не испытывали худыхъ слъдствйй
"оть сулемы, которая при ихъ вспомоществовании
"была веегда во многихъ обстоятельствахъ сред"ствомъ столь же надежнымъ какъ и удобнымъ къ из"лъчению Венеритеской бользни. Они спознали еще
"и то, что въ нъкоторыхъ частныхъ случаяхъ безъ
"помощи сего лъкарства самое излъчение было ино"гда невозможнымъ.

"Но когда посмотришь на великое множество " Людей всякаго состоянія, которые не имъя э, никакого достойнетва, будучи безъ всякаго побезъ всякой предосторожности, безъ " знація. различія льшь, пола и телосложенія, " и безъ всякаго уважения къ существенному свойсту ,, бользни, дають безь разбору сте лекоротво всяко-,, му: то не лыя не воздохнуть видя злоупотребле-,, ніе, могущее неръдко имъщь слъдствія опасныя, и " желашельно бы можеть быть было, чтобы силы ,, сего собственно двиствующаго лекарства оставались ,, еще неизвъсшными. Въ саномъ дълъ нъшъ ни одно-,, го добросовъстнаго гражданина, который бы по се-, му послъднему и самому истинному описанию , не возжелаль можеть быть того, дабы правитель-"ство запретило вовсе внутрениее употребленте ,, сулемы. Но естьям доказано, что сте лекарство са-,, мо по себъ есшь весьма хорошее, и будучи надлежащим в "образомъ употребляемо, не сопровождается ника-, кими дурными следствілии: то всёхь желанія то-,, гда соединяются, дабы, вивсто совершеннаго изклю-"ченія могущаго лишинь Медиковь лікарства, не ръд-,, ко самаго необходимаго и никаким в другим в неудо-,, бозамъняемаго, лучше приняты были средства кЪ "предупрежденію злоупотребленій онаго.

"Все должно уступать опыту, а наипаче во Врачеб-"ной Наукь: съ нимъ надлежитъ совътоваться и се-"му единственно вождю послъдовать надобно къ "узнанію того, должно ли отвергнуть употребленіе "сулемы, или принять оную съ надлежащими и осто-"рожными ограниченіями.

"Но ежели, по всъмъ умозаключентямъ наконецъ и СпособЪ употреб-"ствовать не можеть всьмь видамь бользней Венеримы есшь самый луч-,, тескихб, то самый опыть доказаль, что она есть шій къ из-"одно изъ наплучшихъ лакарство къ пользованію ивченію манкеровь, поинкерово, гнойных прыщей или нарывово, опухо-, лей конегной плоти, пятенб выступающих в на кожв. тнойныхЪ , и что въ венеритеских гонорреях , требующих в попрышей. •пухолей ,, чти завсегла съ самаго начала употреблентя мермонечной плоши, пл., кургя, не можно его предписываннь въ видъ благо-, успъшнъйшемъ и болъе соотвътствующемъ разтенъ на ,, умному пользованію сей бользни, как в в видь су-KOKE TOноррей. венериче- , лемы. Она сильно дъйствуеть въ случав гигентя еная гин- ,, костей, и можеть почитаться тогда за самое помость, пор-тящая ко. ,, лезнейшее и лучшее противу гнилости лекарство.

сей способъ "Но не всегда имветь онь усивхь столько же жения не "вёрный и постоянный вы разбити пасотных засореудзется "ній, а особливо когда оныя застарвють. Бубоны и разномбрно прошивь , всякаго рода ноздреватые наросты, наипаче же горбубоновь, "бы на костяхо, одинаковаго сь оными свойства, по моздревго , крайней мврв вы своихы началахы, не всегда равнотыхь наростояь, когда оно дается одно.

мости, и пром. "БезЪ сомнѣнїя есть многіе другіе случаи, вЪ противъ "коихъ не должно употреблять сулемы, и въ козасореній причиняютричиняющикъ вос"на примъръ когда засоренія будутъ сопровождаться

5, воспаленіе мід, и уже очень усилятся; когда завалы совер-паленіе ; , шенно сдълается и булуть примытны; когда будуть заваловь , имыть ныкоторое подобіе жельака, а и того болье, когда лыкь на, можно онасаться, чтобы на ономь жельакь не сды-подобіе жельана, лалось рака-

"Хотя сулема и превосходно действуеть кь противь почищению и заживлению ядовитых ранд, однакожьтубонижь давать ее должно сь осторожностию, и такь скарань; вы случать ощупывая, весьма ли велики оныя раны, какь внутреной глубоки или не занимають ли частей весьма важ-михорадки, ныхь, и благоразумные всего оть оной воздержать удоборазирано, ся, ежели сь Венеритеского бользийо будеть соедисти нервы, нена внут реная лихорадка, означающая повреждение сулороги, какихь нибудь частей внут рениости; ежели всв пербользии и обы будуть весьма чувствительны и удобораздра проч.

" жаемы; ежели больной подвержень судорогалов. а проч. ста бользии.

, Не можно без великой опасности употревь случав, блять сего лекарства, когда бывает в позыв в на рво-рвоты, поченуев в туй съ болью и воспалентем в, или когда бользив Венія больза, перитеская сопряжена съ какою нибудь другою бо-ни важной, лезнію важною, котторую бы сулема больше только, могла увеличить.

Впрочемъ, когда вышеописанные признаки, и надобно всъ обстоятельства зависящія отъ больнаго, требу, оставлящь ють употребленія сулемы, должно однакожь поки-деніе суледать оную, въ какое бы то время пользованія ни бы-мы, накъ ло, какъ скоро окажется нашель, колотье и проч. скоро онажется нашель, колотье и проч. скоро онажется на были. Вмёсто ее должно шель, но-принять средство легчайшее, какъ-то промыватель-потье, дамил или санны, противувене рисескіл о конхъ говорено же и лего кіль.

было выше на страницах во и 84 сего Тома; или ожидать, для продолжентя употреблентя оной, пока сти припадки не утолятся совершенно.

Сумема Однакожъ находятся и такія обстоятельства, служеть въ коихъ сумема бываеть вспомогательным мекарствомъ ствомъ весьма важнымъ, и которымъ пренебрегать вспомоганикакъ не надобно, какъ-то мы предложили о семъ тельнымъ выше: смотри способъ какъ употреблять пераспущенью многихъ обстоятель- сумемою, на стран. 66 и 73 сего Тома, стважъ.

Способо како пользовать Венерическую бользив посред-

Превозносящел похвалами многіе коренья, многіє помовыя, виды деревь и корокь потогонительных , споспівново помогонительных , споспівново мерку- единое изь нихь не соотвітствовало, по крайней ріємь, уставов по учиненнымь досель опытамь, тому высоко-корыють му мнівнію, какое многіє обь нихь иміли. Однакожь ствія, когда они употребляются одни къ издівней растіній, когда они употребляются одни къ издівней весьма способными къ ускоренію того, естьли давать ихъ совокупно съ меркуріємь.

(Сін потовыя лікарства полезны бывають осо-Обстолmeльства, бливо въ такихъ обстоящельствахъ, когда твлослорых они жение больнаго ослабьеть, и вы тьх случаяхь, когда имъемъ причину опасапься, чтобы отъ пріобще-MORESHOR. нія меркурія не произошло ослабънія. РавнымЪ образомъ бывають они нужны всякой разъ, когда надобно пользовать больных в твлосложения флеематите. Особливо скаго и мокротами изобилующаго, или которое учидля штисфлегмати- жилось таковым в от в бользни и чрезмърнаго испражиенія влажности гоноррентеской или маскоподобной. ческихЪ. Изъ

всёх врастеній для сего должно предпочесть сарсепариль, из в коей декокто делается следующим в образом в:

Возьми коренлеев сарсепарили сухой и очи- Денонтъ щенной - - двъ унцін; парили; Стружекъ Ямериканскаго дерева способъ гвияку - - одну унцію. накъ дъсе

Вари на маломъ огнъ въ трехъ полуштофахъ воды до тъхъ поръ, пока оныя не утопятся такъ, чтобы оставался одинъ только полуштофъ.

Напослёдокъ для вкусу прибавь

Дерева сассафрасу - - половину унціи;

Солодкаго корня, - - три драхмы;

И процёди.

Въ каждые сушки должно пишь сего декокта отъ пріемъ. одного до двухъ полуштофовъ.

Сей декокто, кромв пригодности его кв до- свойства ставленію скорвишаго отвользни облегченія, имветь сего декоеще то свойство, что укрыпляеть желудоко, и дви кта ислуствуеть такь какь настоящее крыпительное: а слынеторых довашельно и бывасть чрезвычанно полезень вы та- онь особенкихь случаяхь, когда больные будуть весьма слабы но пригодины почти измождены бользнію.

(Но сарсепариль имфеть еще и другія полезныя противусвойства. Воть наблюденіе доставленное мит вы Ген-венеричеварт мъсяцт 1779 года однимь за тритцать льть стое свойчеловткомь, росту небольшаго, страдавшимь Яглииского бользніго вы самомы еще младенчествь, худоща наблюденіе вымы и изнуреннымы какы оть Венеритеской бользни, до больнаго которую оны имъль болье десяти мъсяцевь, такы и Полю IV. то ожною сарсенари»

ощЪ множеетва лекарство, какія принималь онь, почити непрерывно, въ продолженти сего времени.

Картина болжани сего челоБользнь его открылась было сильною вене ритеского гонорреего, сопровождаемою шанкероло въ стволь, а вскоръ по птомъ двумя пахевиками, по одному въ каждомъ паху. Онъ положился на одного Лъкаря, который, пользув его но своему способу, разбилъ еги припадки почти на мъсяцъ времени; послъ чего открылся шанкеро, точащій язытеко и объ перегородки находящіяся въ оболоткъ неба во рту. Сей самый Лъкарь употребляль тогда мнотія лъкарства, но беза полезно. Напослъдокъ призваль въ совыть одного сотоварища своего, и соединенныя ихъ вспоможенія не больше успьховь имъли.

ВЪ сте время пришла сильная боль вЪ голову, которая лишала совершенно сна. Родственники больнаго позвали весьма искуснаго Врача, который выжычиль шанкерб вы горяв, и утолиль боль головную: но больной сей, по совъту одного пріятеля, оста виль своего Медика, и положился на накоего шарлатана, который объщался вылачить его въ два недажи. И дъйствинельно, по прошестви сего срока, гоховная боль, по видимому, совершенно миновалась, и больной думаль, что вовсе оть оной избавился, какъ трезъ пять или шесть недель после головная боль оказалась вновь гораздо сильные прежняго. Больному казалось, что у него драми оболотку головную, и векрывали герепв. Сіж нестерпиная боль, приходившая къ нему почасту, принуждала его испускать вопль ужасный; приводила его до отчаянія пакъ что онъ бросился было однажды въ окошко, и ушибсябы, есшьли бы не прилучилось тогда одного сильнаго человъка, который подхватя его на руки, упаль съ нимъ

посреди комнаты. Ночью особливо чуветвоваль онь безпокойство неимоверное; не сводиль даже глазь, котя и принималь обыкновенно по шести драхив сиропу маковаго.

Посль чего оный илощадной врачь быль опящь мотребовань, и не взирая на множество тистительных всякія питья, лькарственные отвары и натиранія, кои приготовляль и дълаль онь самь, достявня облегченіе на самое малое время; ибо вскорь посль того боль опящь была почти та же самая, и больной приходиль вы крайнее разслабленіе, хотя и имъль всегда кы вдё довольную охоту, а притомы хотя и оный знахарь безпрестанно совытоваль ему больше всть и пить, а особливо вина и содки ввечеру. Наконець выведень будучи изы терпыта какы смышнымы льченіемы, которое нады нимы производилось, такы и слою болью, рышился онь отпустить своего лькаришку, принявы твердое намыреніе представить свою участь натурь.

Прошло около двухъ мъсяцовъ, какъ онъ не примималь болье никакого лъкарства; а притомъ старался разогнать псчальное свое положение, ходя часто
къ приятелямъ своимъ, вдавансь во всякия роскоти,
напиваясь безъ воздержности; а особливо по вечерамъ
употребляя довольное количество содки и обыкновеннаго
маковаго сиропу, какъ будучи первое число Генваря у
одного своего родственника, увидълся со мною въ первый разъ. Тогда сей случай употребням въ его пользу, попросивъ его расказать о подробностяхъ его бользни, и уговаривая меня приняться за пользование оной.
Устрашенъ будучи слышаннымъ мною, не могъя объщать инаго, кромъ какъ только сдълать опыть, не объщаясь ни мало имъть въ томъ успъжъ. Прежде всего
в потребовалъ, ятобы мнъ видъпься съ больнымъ на-

CAM-

единъ, и мы назначили для сего упро слъдующаго дня у него въ домъ.

Воть что я открыль еще кромъ вышесказанных в припадково. Горхо совершенно зажихо: въ немъ видны были и теперь еще примечаются следы язвъ причиненных в шанкеромв; язытокв източень быль въ нижней онаго части, и остался какъ бы погнутъ. Лъвая стенная кость терепа представила мнъ около середней ел части опухоль величиною въ рублевикъ, почти въ правильномъ размъръ, мягковатую, ноздреватую, легко подающуюся, когда притронешься перстами, и причиняющую боль ужасную, как в скоро хотя мало подавишь. Другая но гораздо меньшая опухоль оказалась на лобной кости около шва висотнаго, съ той же стороны. Сія опухоль, такъ какъ и третья на верхней части запылотной кости, давлению противустояла. Всъ шем костей терепных высунулись и были тверды. Сверьх в того находился весьма ощутипіельный горбо на самомъ гребешкъ берца лъваго; во всю почти длину онаго. Онъ былъ не столько твердЕ, как Выдавшаяся часть шеоей, но больль чрезвычайно. Львой глазь быль вдавлень, и видь имъль смутный; въка и всъ оболотки лица на сей сторонъ распух. ли. Больной быль чрезмерно худь, и по всему лицу ивъпъ имъль синеватой.

Таковое множество устрашающих в признаков не позволило бы мн в ни мальйшею ласкать себя надеждою, естьли бы ж не примътиль, что вся внутренность, даже и самый мозго были невредимы. Больной не чувствоваль боли ни въ груди, ни въ желудка, ниже въ брюх , и головная его боль от тиханга ни мало не умножалась. Одна ноздря была заложена струпьями, кои безпрестанно въ оной вновь зараждались; однакожъ

онъ высмаркивалъ въ другую ноздрю, ни мало не увеличивая своей боли. Наконецъ я заблагоразсудилъ утверлишельно сказашь, что состояние больнаго не совсемь еще было безнадежное, и самое собыште оправмало мое предсказаніе.

Я пачаль предписаціємь больному сидъть дома дізта преди въ умъренномъ непав, пошому чио время тогда сему больбыло весьма холодное; запрещено ему было от в меня ному. вино, кромъ шолько сшола, да и шо съ довольнымъ количествомъ воды. Самъ онъ отказался отъ водки, и даже оть сиропу дакоди, который не производиль надь нимь никакого дъйствія, и которымь я не захопъль умножить его пріемовь. Вельль я ему давань на завиракъ спакана по два молока съ бълымъ хльбомЪ; за объдомЪ жирной похлебки сЪ малымЪ количествомъ мяса; а за ужиномъ молоко такъ какъ и на завтракъ.

СверьхЪ того, дабы приготовить больнаго кЪ пріемъ меркурію, предписаль я по три унціи сарсепарили, сепарими. вареной въ трехъ полуштофахъ воды до тъхъ поръ, пока не выкипить цълой половины: наконецъ прибавляли къ сему по немногу солодкаго кория, и онъ унопребляль по такому количеству сего отвару въ день. Должно еще примътищь, что въ сей декокто не было кладено на гваяка, ни сассафраса, а только одна сарсепариль употреблялась.

ВЪ первые осьмеро сущокЪ не показалось никакой перемъны въ его положении; но по прошествии сего времени началъ онъ чувствовать великую испарину, и вЪ ночи сЪ третьяго надесять на четвертойнадесять день быль у него сильной потв, освободившій его почти совершенно от головной боли. ЧрезЪ восемь дней послъ шого ни мальйше оной уже и не чув-

M 3 . CITIBO~

ствоваль. Самь онь вы великое притель удивление оть сего случая, что боль его совершение миновалась; единственно и оставался въ немъ страхъ. нтобы не пришла къ нему опять сія боль, которая болъе полугодичнаго времени едва давала ему время опомнишься; но оная боль уже совствы не оказывалась послъ. Крвпкил какъ кость опухоли на головъ и ногь пропали менье нежели въ мъсяцъ. Между птымъ однакожь продолжаль онь всегда свою діэту и сарсепариль въ одинакомъ количествъ пріема, и даже последующий весь месяць непрерывно.

COMPANIE умрошествін мвеяца.

КакЪ благосостоянте больнаго утверждалось уже везять при болве месяца, ночи были очень хорошія и сонъ весьзнановъ по ма спокойной, а при помъ какъ онъвоспринималь съ здоревьемь вижент и обыкновенной свой правь весслый, ивътъ самый природный и дородность: то я и покусился было на семъ только остановиться, и не предписывать уже меркурія. Однакожъ частыя от рыжки, кои случались съ симъ больнымъ; долговре менность самой бользни; несносная боль, какую онв претерпъваль; нъкоторая недовърчивость въ разсуж деніи действительности сего пользованія, приводившаго меня въ немалое удивление; наконецъ укоризны, кои бы в должень быль себъ сделань вы случав отрыжки самых в признаков в, естьли бы пренебрег великое средство къ предупреждентю того извъстное. словомЪ, все принудило меня приняпься за собственноавиствующее лакарство.

> ВЪ емъденийе чего я и предписамъ натирания, которых в надв больным в учинено было до десяти, и изв оныхв нять вв двв драхмы мази мерку ріальной, мпри въ при драхмы, и два въ четыре драхмы. Маза прічготовалема была пополань, и между каждымь на

ти рангемо пропускали два дил. Больной продолжаль са респариль въ томъ же самомъ количествъ во время натиранги, и чрезъ четыре дни послъ послъдняго дано было ему чистительное.

Въ семъ видъ меркурій не произвель ни мальйшаго дъйствія, ниже какой либо перемъны; едва и во рту чувствовань быль нъкоторой жаръ; съ Марта же мъсяца, какъ сей человъкъ выльчился, наслаждается онъ совершеннымъ здоровьемъ: о чемъ я могу засвидътельствовать, имъя случай часто видъться съ нимъ, или съ нъкоторыми его родственниками.

ВсякВ, кто станеть разсуждать о семь пользованти, не признается ли въ томъ, что сарсепариль есть превосходное средство природою намЪ ниспосланное кв отражение жестокой бользии? Ибо сей больной, за мьсяув еще до употребленія меркурія, быль такЪ же здоровь, какв и шенерь находишся; и есшьли бы я имълъ еще подобныя наблюдентя, то ничтобы не понудило меня предписывать сей минераллъ. Мнъ случилось уже видеть, какъ одинъ знаменитый сей столиць Практикъ предписантемъ сарсепарили выльчиль такой шанкерв, который появлялся въ прети разъ, бывъ прежде пользованъ меркургальными нилилями, а по том'ь натираніями; и во время: сей трешьей отрыжки такь источень быль онымь язытокв, что сововыв отленияся отв перегородки неба въ самой срединъ, и держался только за двъ съпточки съ каждой спороны. Но сей Медикъ, не взирая на то, что шанкерв совершенно пропалв, немедленно предписаль напиранія; почему наблюденіе его еще менье было бы заключительные, когда я предписальмеркурій уже чрезь мысяць по совершенномь скры. ти всяких в признакова.

Прошивувенерическая сила сарсепарили доесл' не извъсшна была.

СпособЪ пошовыхъ **ж**БнарешвЪ лко недоч оставленъ.

Между потогонительными выхваляемыми отъ древнихь, къ врачеванию Венеритеской бользни, гваяка болье всего похваль удостоился; а хотя и было въ употреблении прибавлять къ оному въ дъланный изЪ него декокто сарсепариль, однакожъ и ей не болье приписывали Авйствія, какЪ и сассафрасу, хинь, волгаему корню и проч. которыя къ нему также прибавляли: да и всякому довольно извъсшно, что способЪ потовых в лекарствв, яко недостаточный давно уже оставлень. Самь Г. Горив, хотя и предлагаеть ешашочный наблюдение объ одной женщинъ выльченной посредством в потовых в останавливается еще принисывать оное совершенно однимъ симъ лакарствама. "Есть-"ли они и приносять пользу, говорить онь, то раз-,, въ тогда, когда меркурій быль безуспъшень. Въ та-, ком в случав производять они действие темв ощу-. тительные, что тыло бываеть обременено мер-, кургемв, котя онв и не произвель никакой пере-,, мъны въ самой бользни; поелику сіи потовыя дви-, ствують почти необходимо и надъ самымъ мерку-"ріемв, которое действіе подвигаеть его, делаеть ,, летучимъ, и по томъ приводитъ къ отеерстияма "телесныма; что самое и способствуеть уже къ "скоръйшему выходу онаго; а сте изгнанте и быть ,, не можеть безь того, чтобы меркурій не от-,, брасывал В дъйствія своего на самыя части за раженныя, .. и съ собою не уносиль бы оныхъ.

> "Средство сте льчить Венеритескую бользив, ,, продолжаеть Г. Горнд, зависить по справедливо-, сти сколько от в меркурія, столько и от в пото-,, вых в : но безъ помощи сихъ послъднихъ лекарство , первый быль бы по крайней мъръ недостаточнымъ. , Находятся друге случаи, въ конхъ потовыл одни ,, могли бы навърно содъйствовать излъченію; но оныя " Очень

"очень ръдки, и мив не удалось никакъ удостовъ-"ришься о семъ по собственному опыту, потому "что не льзя удобно оставить способы лъченія из-"въданные и достовърные, а принять другіе, кои по "крайней мъръ сомнительны.

КакЪбы то ни было, но сарсепариль подлинно налобие есть такое лекарство, которое должно единственовыть но испытывать. Врачей дело умножать опыты и надъ сарраспространять ихъ наблюдентя: все свое вниманте сепарильт должны они устремлять на способы простые: въ одной, нихъ мы всегда будемъ терпъть недостатокъ, пока станутъ почитаться весьма общими способы лечентя сложенные.)

Корень лаврика или волгий (thymalea vel laure сообство ова вте техетеоп деттапісит), почитается такожь волявать весьма способных в к в содействию сулемы, или всякаго другаго приготовленія меркуріальнаго. Его упо-лобелін требляють или одного, или вывств св сарсепарилью противь Когда составляющся они вывств, то количество коры венеричесвъжаго кория волгаясо. полагается въ одну унцію съзна. осмью унціями сарсепарили на четыре штофа воды, пока утонится до ноловины: а сверьхъ того прибавляющь немного солодкаго кория, такъ какъ выме означено. Естьлиже употребляется корка одного кория волтьяго, тогда надобно взять его одну унцію свіжаго и варишь въ шрехъ штофахъ воды до техъ поръ, пока останется двъ только трети; и напослъдокъ прибавишь унцію солодкаго кория:, сей декоктв употреб. ляется въ равномъ количествъ съ сарсепарилью.

Не безбизвъстно стало намъ, что природные жители Америки вылъчивали болдзив Венеритескую, въ какомъбы она состояни ни была, декоктомо изъкорня одлого растъния, называемаго ими лобелия, которой Гомо IV.

употребляють они какъ свъжій, такъ и сухой; но мы не имьемъ ничего достовърнаго о количествъ пріема онаго. Иногда мъшають они сей корень и съ другими кореньями, какъ- то съ ранункуломъ, гладкимъ дергономъ (сеспотьия Атего дълають сте, для вспомоществовантя ли онаго дъйствтю или для перемънентя его вкуса. Поутру больному дають сего декокта въ великомъ количествъ, и послъ продолжаеть онъ употреблять его такъ какъ обыкновенное питье весь день тоть (12).

Хотя мы и весьма мало свёдущи о способё, каковой природные жители Америки употребляють къ излёченію себя оть Венеритеской болёзки, однакожь нёть

мы не сообщаем ватей никаного описанія сей правы, послину она досель еще накодишся шонмо у одного Г. Аюпо, да и видъщь и узнащь се не иначе можно как у него; впрочем всяк можеть объ кей справиться и вы вышеозначенных в номерах в Парижскаго Журнада.

⁽¹²⁾ Судя по сему Г. Бумана описанію ловелів и врачеванія употребительнаго у прародных в Американцов в видень можно, что онв имбав сведение о записи в Г. Кальма, ученина славивишаго Линиен, представленной въ Стокгольмскую Королевскую Анадемію Наукъ въ 1760 году; поелику перечень изданный о сей записит въ № 209. вов и вот Париженаго Журнала ттво года, присланной въ Медицина ской фанулитеть медицины Доншоромь Г. Дюпо, не говорить ничего достовбрнаго ни о количествъ прісма сего растонія, ниже о способъ какъ оное упомреблять. Однакожъ Г. Дюпо упомребляеть его преимущественно. Онъ выписаль жэв Америни извъстное ноличество сего раетвнія, которое самь лаже разводить и любуєтся опымь, поназывая всякому, кто береть учасние въ успъхахъ Врачеблыя Науки. Меня также удостоиль онь бесьдованиемь о семь раствии. Разумь его и растороплость, съ наковою располагаеть онь пріемы сего лвиарства. относительно нь твлосложению больнаго, нотораго намерень бываеть пользовать не позволяють ин мало сомивваться объ успехахь онаго. Желашельно, чтобы онв часшые имвав случан употреблять его. Чеетность его и искусство непременно могуть придать великую важность его наблюденимь, и по его единственно трудами можно будеть ценить ловелію, и определить самую степень, которую должна она занимать между благод влијями природы.

ньть ничего достовърнье, какъ то, что они изцъляются от нее скоро, надежно и совершенно, не имъя ни мальйшаго познанія о меркуріи; почему весьма важное было бы открытіе, естьли бы способъ сей учинился извыстнымь. Но мы до того не можемь иначе достигнуть, какъ дылая опыты надъ растыніями приходящими къ намь изъ сей части свыта, а наипаче надъ тыми, о которыхъ мы знаемъ, что ихъ употребляють въ такомъ случав дикіе народы, оную паселяющіе.

Сїи народы заимствують главнейшія свои лекар вто от дарства растеній, и не редко стяжать таминства весьма сильныя, относительно къ произрастеніямь, кои не сведомы совершенно народамь просвещеннымь. Правда, не можно сомневаться и о томь, что многія растенія нашихь земель, естьли бы только захотели мы принять на себя трудь оныя испытывать, были бы столько же действительны противу болезни Венеритеской, какь и растенія Американскія: но доколь Врачи будуть руководствованы одними только именами славными, а никто другой не отважится на опыты пускаться, дотоле сіи растенія будуть всегда для нась совершенно неизвёстными.

Могли бы мы упомянуть о многих других в ко-гваянь, реньях в, о многих в також деревьях в, о многих в сассафрасв, иных веществах в и проч. похваляемых в кв врачева проч. не нію сей бользни, как в-то о корн хины, мыльной боль примавы (Saponaria), лапушника или репейника (lappa голностей им вють пароч ант вагдапа), и проч: о деревцах в гвалк в, сас им вють и саф рас в и проч: но ни сій деревья, ниже раствитя не упомяну кажутся ни в в чем в превосходн в тых в, о конх в мы тыя терь раствить.

Рыбій клей,

(Мы упомянем вединентвенно о рыблем в клей. которой одинъ Врачь знаменитый и по дарованіямъ своимь и знанію достойный почтеннаго мьста, какое занимаеть. съвеличайшимъ успъхомъ употребляетъ въ Велеритеской бользни еко ренившейся, когда пользование, по правиламь науки предписанное и по примъру других в расположенное. отвесей бользни совершенно не выльчивало. Мы не имвемь ничего точнаго и опредвленнаго вь разсуждении, какЪ оной предписывать и даже не имъли еще случая употреблять его; но извъстно намъ, что многіе тому дълаются опыты, которые, какъ сказывають. совершенно были удачны. Мы предписывали его единственно вы декоткв, говоря о способв како чпотреблять сулему, дабы служиль онь жидкостію сей меркургальной соли. Вврояшно однакожь, что какъ скоро многочисленными опытами утверждена будеть авиствительность и сила рыбьяго клея, то сей МедикЪ, будучи другъчеловъчества, издасть въ свътъ столь важное открытте.)

Мы кончимъ теперь вст наблюдентя и предписантя наши въ разсужденти Бенеритеской бользии, нъкоторыми разсуждентями всеобщими о самомъ вниманти и попеченти, каковато требують больные, сею бользытю одержимые, и о свойствъ яда, оную производящато.

\$ 8.

Всеобщія разсужденія о врасеваніи Венерисеских боль-

Вниманіе, Надлежить всегда вникать въ телосложение и состожаное дол- янте больнаго, прежде предписывантя ему меркурта, жно имъть въ какомъ бы то видъ ни было.

еможенію.

мерчурій Равным в образоч в бывает в он в опасен в мало выль бы успъщен в, когда давань его челов вку одержимом у больз-

ийно остроно, как Б-то гнилоно ликора дкого, колотъем во описен въ в бокахв, воспалением в легкихв (peripneumonia), бользыей H POOT. острыхъ.

Меркурій шакже быль бы вредень вь бользилх вольней Долговременных в , как Б-то в в содяной бользии, в в долговрезатер двлых опухолях или желеаках в в лихора дкв только бы внит ренней или нервной (febris lenta seu hectica), въ по-оныя не следнемь степени Яглинской тахотки (con/umptio) и происхопроч. Однакожъ какъ объ сін последнія болезни иногда бользни происходящь ощь Венерической бользии вкоренившейся, венеричето вЪ такомЪ случав меркурги бываетЪ необходимо ской. нуженЪ.

Когда долговременныя больяни бывающь не очень можно да онасны, как в на примъръ одышка (авьта), камен вать его, ная бользив и проч: то во всякой безопасности мож- бользии HE OWER но упопреблять меркурій. CHbl.

Естьли человькь, имъя Венеритескую бользив, бу-не должно деть измождень оною, трудомь, воздержаніемь, или давать его какою инбудь причиною подобною, шогда должно ошложить употребление меркурия до техь порь, пока нія или посредством' времени, покоя и питательной діэты разслаблене будеть онъ приведень въ состояние переносить его дъйствія: наставленіе весьма важное, и которому следовали мы вЪ пользовании больнаго, бывшаго предметомъ наблюдентя описаннаго выше на стран. 98 и следующих в сего Тома.

Надобно весьма остеретаться, чтобы не давать во время меркуріл женщинамЪ во время ливсятнаго отищенія, у женкогда оное скоро къ нимъ пришти должно, или въ щинъ последние месяцы ихъ беременности. Но когда женщи- ниже въ на чревата несколько месяцовь, и какъ скоро по об менды стоянельствамь меркуріи булеть для нее нужень, беременю.

H 3

ещи, но то можно предписывать его, однакожъ въ весьма малыхъ пртемахъ, и въ сроки продолжительнъйште, неенцы. жели какъ онъ обыкновенно употребляется: съ таковыми предосторожностьми часто исцъляли мать и рабенка вмъстъ.

Ежели не удастся выльчить бользни, то по крайней мьрв воспрепятствуеть оной болье укорениться до тых поры, пока женщина не разрышится оты бремени; ибо когда вы силахы своихы она довольно оправится, то можно будеты употребить способы надежныйй, который, естьли она кормиты рабенка, выроятно будеты достаточены кы врачеванию какы его, такы и самой матери.

Самый лу-(Г. Горий объявляеть, въ сочинени упомянучини способъ приго- томЪ примъчании сей главы, о наблюдени ВО дный жен- объ одной женщинъ беременной съ четвершаго на плтой мъсяцъ, выльченной совершенно отъ сильной пинамъ беремен. Венерической бользни посредствомъ противувене ринымъ, со= етоинь въ теских в промывательных в, которых в способь предпромыва. доженъ нами выше на стран. 80 сего Тома. Онъ готельныхЪ ворить такожь вы последующемы наблюдении, что олпрошивуна женщина приняла сем деся и в четыре п роль вательных в венеричепротивувене рихескихв, по два въ сутки, не прерывал скихЪ. Кои мооных в и во время отищения масятнаго, которое прихоrvmb быть пред. дило къ ней чрезъ каждыя три недъли, такъ какъ писываны и прежде съ нею обыкновенно случалось. даже и во

даже и во время мъсячнаго очищенія.

Но, прибавляеть онь, какь она не чувстовала никакой боли, то и промывательных для сего не были пресвчены, кои вы самомы двав имвють свойство, можеть быть имь однимы токмо принадлежащее, кромв некоторых особенных случаевь, что можно ихь употреблять, даже и во время самыхы месятных отищейй.)

ЧтожЪ

Чтожь касается до дътей, то не льзя пред-предостописывань имъ меркургя какъ съ крайними предосто рожносшьми: поелику нажное оных в талосложение, со требуеть дълывая ихъ неспособными къ перенесению саливации предвисаили слинопистения, пребуеть того, чтобы и самыя лег ніе мерну. чайшія пріуготовленія сего лекарства даваны были съ детей. величайшими осторожностьми, какъ-то мы пространнъе о семъ говорить станемъ ниже въ главъ 51, § 16 сего Тома, предлагающемь о Венерической больони у авіпей.

Сте правило равнымъ образомъ наблюдать дол- Для стяжно и въ разсуждени стариковъ, кои по нещастию бывають подвержены сей бользни. Ньть сомныйя, чтобы немощи пожилых в людей не долженствовали Авйствій слинотетенія учинить еще болье опасныйшими; но, какъ то мы уже сделали примечанте, редко бываеть оно нужно.

Впрочемъ мы примътили вообще, что меркурій не столько имфеть действія надь стариками, какъ надъ людьми еще не шакъ пожилыми.

СЪ великою такожъ предосторожностію надле- для поджишь предписывань его людямь подверженнымь исте-верженрикв, ипохондріи, тъмъ, кои обыкновенно страждуть перинь, поносомв а особливо кровавыль ; кои чувствуют в ча инохонарии. стые и сильные припадки падутей болвяни, наконецъ для тъхъ, и швыв, которые страждушь жабого и цинготного бо- нои стражмвино. Какъ скоро одна изъ сихъ бользней будеть вавымъ погосподствовать въ больномъ, то должно, ежели толь носемъ, пако можно, опую выльчить, или по крайней мъръ хо. дучею ботя нъсколько ослабить, прежде. употреблентя лер-жабою, курія. Естьли же в'в этом'в успыть не льзя, то да-цинготною вашь его надобно въ весьма малыхъ пріемахъ, и го. больнію раздо реже, нежели какъ въ другихъ болезняхъ. (На

стран.

спран. 63 и слъд. сего Тома видъпь можно въ предложенных в главивимих способахв, как в врагевать болвзни Венеритескія, тоть способь, который каждому изЪ сихЪ больныхЪ приличествуетЪ.)

Времена года пристойныя упошребкурія.

Времена самыя благопріятивнийя къ употребленію меркурія супь весна и осень, когда воздуха бываемів умъренно шеплый. Однакожв, ежели обстояленію мер. шельства таковы, что отлагательства не териять, то можно и не ожидая способнаго времени, всегда его предписыващь; но въ семъ случав надобно старашься о шомъ, дабы больнаго держашь въ поков, который бы быль или теплье или холодиве вившияго воздуха, смотря по времени годовому, как в то видъть можно въ наблюдении на стран. 48 и слъд. сего Тома.

HYMHO -omornan вишь бель-Haro.

Что касается до пріуготовленія, какого требуеть больной, прежде нежели надобно приступить кЪ употребленію меркурія, то многіе врачи почитають оное за самое существенное; ибо примъчають, что естьли начать ослаблением сосудова и поправленіемь испоршившейся крови, то меркурій не токмо станеть двиствовать съ большею силою, но еще и очень многія неудобства тъмь самымь предупреждены будушЪ.

Хегними W. CHH тельпыми. проволуваннами. повторяе-OH HMIGM o6: mонтельспівамЪ; Aismow.

Совътовали мы на стран. 14 сего Тома и въ примъчании 5 сей главы легкія тистительныя и кровопускание прежде унопребления меркурия; а здъсь присканіемъ и бавимъ только, что надочно повторять сіи лакорства, болье или менье; смотря по льтамъ, силамъ и твлосложению больного. Естьли обстоя пельства дозволять, то должень онь сидьть посль по одному или по два раза на день, въ прододженти и вкотораго времени, въ ванив изъ теплой воды; наолюдань даэту

ACI-

легкую и прохладительную; воздерживанные на, крвпких в или горятих в напитково, и от всякаго излишняго упражнентя душевнаго.

Во время употребленія меркурія должно та важитсяв кожъ наблюдань и діэту; а сіе тьмъ важнье, что не- міты во радивость въ разсужденти сего предмета не токмо преблентя препятетвуеть часто излачению больнаго, но еще меркули; можеть и самую жизнь его подвергнуть опасности. Тораздо меньшее количество меркуріл потребно для человька наблюдающаго діэту умъренную, убъгающаго всякаго рода излишествъ, и который держитъ себя вЪ теплъ, нежели для тъхъ, кои не могутъ никакъ поневодишь себя въ своихъ склонносшяхъ къ различной пищь. Надобно то сказать, что сти послъдніе люди ръдко оть сей бользни изцыляются совершенно.

BILECTBO BHEJIOTEHA

Нешь ничего важнее къ предупреждентю или и чисте врачеванію Венеритеских в бользней, как в тистота или пы или опрятность. Стараясь объ ней благовременно, можно сти. предупредить не ръдко усиливание яда венеритескаго, воспренятствовать тому, чтобы оной не повредиль всего талосложения; а когда сте зло приключится, то можно довольно остановить онаго действія, наблюдая чистоту съ той самой минуты, какъ скоро станешь подозрѣвать, что онымъ ты заразился. Надобно промыванть себъ дътородныя тасти во того съ водкого или масломв деревяннымв, или водого св молокомв, а при тонь, ежели можно сте легко савлать, шприцоваться не много водого съ молокомо въ мотетотной стеоло.

Трудно рышишь, ведешьли сля бользны начало можеть отъ мечистоты или неопрятности; но по крайней вемфрв достовърно то, что повстау, гав стя неопрать 6 абань носпів волворяспіся, признаки и ядовитость быва- начало свое JOME IV. Tomos

ють вь самомь высочайшень степени; а сте и повелетъ ошр нечилаеть поволь думать, что посредством великой тиcmombi. стоты чаящельно можно доспитнущь до совершенцаго истребленія оной,

> Многократно примътилъ я, что недавияя болазиз Венеритеская не шокно пропадала въ самое корошкое время ошь наблюдения гистоты, а именно от в баней, теплых в примотекв, шприцований и проч. но еще и то, что сей способъ производить удачнейшія действія и надь бользнію гораздо болве застаръвнею.

Наблюже-V в Бришь.

Недавно я имъл убъдительной тому примъ Ъ нія могу- вЪ одномЪ человікь, у котораго почти весь стволб щія болье быль источень венеритескими ранами. Никакого не было прилагаемо старанія о прочищеній оныхЪ, такЪ что не взирая на употребление меркурия и других в лвкарство дошли они до сего состоянія. Я предписаль, чтобь шприцовали раза три или четыре на день молоком всв водою всв тв раны, в в которых в накоплялся гной, дабы вывести оной; по томь покрывать их в корпісю для высасыванія самаго гною, по мъръ какъ онъ накоплаться станеть: а между тъмъ больной принималь ежедневно по половинъ грана сулемы, распущенной въ одной унціи содки, и пиль по полуштофу декокту, изв сарсепарили. Чрезъ сте пользованте совершенно исцълнлся онъ въ шесть недаль, и, что весьма примачательно, опять наросла та часть ствола, которая прежде была источена.

> Докторъ Джилькриств доставилъ намъ исторію о некоторомь роде Венеритеской болезни, весьма общей въ западной части Шотландіи, подъ именемъ Сиббинев или Сиввынев у жителей тоя земли извъст. ной. Примъчаеть онь, что бользнь сія вообще распро-

empa-

страняется единственно от в недостатка в в тистотв, явав, бои по видимому думать надобно, что обращентемъ на лезнь обсей предметь надлежащаго вниманія можно бы оную щая въ бользнь истребить совершенно. Пользуется она так-двунися же как в и Венеритеская бользив вкоренившаяся. Подоб. такв накв нымъ образомъ можно еще выльчить леса, бользнь и Венеривесьма общую пынь въ Америкъ и на островахъ (13). ренившая. CA.

00

(13) Н тт ни одного Практина, которой бы не сд влаль подобнаго наблюденія. Очень часто случалось мий видіть, что ві весьма короткое время пропадами опужоми воспамительным, небольшім скадки на ножь (excoriatio), шаножь легије шанкеры венерические, кородавин и проч. от в одникъ измывания дътородныхъ частей: въ семъ намтренія я употребляю обынновенно сегето минеральную воду Гулардову, чистоть и наможу, что она въ подсбиыхъ случаяхъ совершенно со- есть къотвътетвуеть похваламь, какія воздаеть ей самъ изобрътатель карство Припарии, двланных изв маниша жавбнаго св сею водою, разбивающв унимаю. равнымъ образомъ венерические жуконы. Но ни Г. Буканъ, ниже дру- щее на гіе Врачи не печитають сирытія сихъ признаковь, за излъченіе Ве- время Венерической колбани, а сабдоващельно измываний, ниже чистоты за истинныя неричепредомраннтельныя средства от заразы венерической; однако мив-скую боніе их в в в разсужденій сего было бы шъмв безразсудные, чио опытв лынь, з ежедневно доказываеть, что естьяя оставить употребление сикъ не есть измываній и оных припарокь, не давая внутрь принимать мерку-предокрарія, що вет сін признажи опашь появяшея.

То же самое заключать можно еще и съ большею втроятно- от вной. стію в других в мнимых в предохранительных в средствах в, конх в недоставелиное множество въ публикъ извъстно стало съ чедавилго времени точестве Таковыя сущь, квасцовая вода Г. Малона, масло и мазь меркуріальная мнимых в въ измыванін; жгучій алкали (alcal eausticum) въ шир цованін, Т. Варена, предокра-Эдимкургского прача; развисающая вода предомранительная Г Тиль нительверта де Преваль; нован вода развивающая г. Сезана, Динтора приващите Периженный мед цинским ф кулпетом ; сегето меркурі умножаеальная вода Г. Прессавена, Члена Ліонской Кирургической Коллегін, и мыхъ

Вет сів локаретва, предетавляемыя ві виду важномі, тем в наме вренеспособивниции должно почитать ив соотвытствованию пользя, ижь мя. Авторами предполагаемой, что эпзательный существа, кои суть основаниемъ оныжь состава, моган бы савлать ихъ опасными. И такъ пускай дадушь намь, говоришь Г. Горив, явкарства надеживиния. не стольно противныя слабости на шижь органовь; пускай изобрыта-

КакЪ

Какъ скоро Венеритеская бользые булеть оставлена въ небреженти или пользована худо, по не ръдко превращается она въ бользнь какъ бы собственную пому человых, который сю заразится. Въ такомъ случав надобно испытать авчение оной крепительными, как вчто наже то молокомв, декоктомв изв сарсепарили и проч., но авлать, къ конмъ можно прабавлять и меркурія, смотря по когла ВеобстоящельствамЪ. ВЪ Съверной Англіи есть вЪ обынерическая. кновении опсылать таковых в больных в в деревню, оставлена чтобы пили они сыворотку койзго: который способь монебрежени жеть почитаться только за самый благоразумный, тольван поль- ко бы венеритеской ядб прежде быль истреблень совована жу вершенно; ибо безъ того, и когда къ довершение издеченія станешь полагаться только на сіе с редство, можно чрезвычайно обманущься въ своемъ чаяніи. Миж случалось видеть многократно, что сія бользнь воксей ея сил в опять приходила и посл в употребленія козвей сыворотки вЪ продолженій нарочитаго времени, и когда совершенно полагали, что сей діэты прямо довольно было къ совершенному излачению.

ВБДСПВІЯ проискодя: autia omb тла ито movemb. Выльчишьбользни

бользив

была въ

Самое бъдственное обстоящельство для страждущих в сей бользнію есть необходимость, въ кототего, ко рой они не редко находятся, чтобы вылечиться скоро; ибо чрезъ то самое принуждены бывають они принимать лёкарства очень поспешно, и осталять ст от сей их в по прошестви весьма короткаго времени. Часто: къ совершенному изажчению довольно бы было нъскольочень сис- ко гран в менкургя больше, или несколько дней больепросидъть въ комнатъ; а напротивъ того, не радля ни мало о сихв предосторожностихв, можно по-

ють предохранительных средства благопріятивний и не столько опасныя для правовы и здоровья; и да престануть выхвальть предынами способы споль же гибельные накъ и ненадежные и въ върности которых в часто встрачаемь, мы горесть и прискорбів, вмасто безопасноситя и удовольствія, чего мы единственно и искали.

кинуть некоторую малую частицу венеритескаео лда въ самыхъ иокротахъ, которая, сколько оы мала ни была, повреждаетъ ихъ постепенно, и наконецъ всъ оныя заражаетъ.

Для совершеннаго отвращентя погрёшности, должно постоль объетвенными следствиями сопровождаемой, мы нидать советуемь, а притомы и самымы строжайшимы об не прежде, разомы напоминаемы, чтобы не покидать никогда лекарстей тотчась, какы скоро применено будеть со стя некрыште признакова; но напротивы того продолжать оскольно ихы еще несколько времени, убавляя постепенно количество оныхы пртема до техы поры, пока не уве- номы изришься, что болезны совершенно вылечена.

КакЪ прудно, а припомЪ и вовсе не возмож-виагонано опредълить точно степени венеритеской заразы, леживе коею бользнь еіж можеть сопровождаться, то всегда продокблагонидежные гораздо продолжить лекаретва долье, нарешва нежели сколько надобно времени, нежели покидать гораздо бое оныя очень скоро. Одинъ искусный новъйшій Медикъ, мени неславляйся врачеванием в сей бользни, кажется, по-жели поступаеть совершенно по сему правилу: поелику онь индать всько больных в своих в заставляеть выдерживать не- вко очень которой карантинЪ, въ продолжени котораго даетъ имъ приниматъ по сороку бутылокъ декокту, какъ думаю я, изъ сарсепарили, или какого нибудь другаго простаго лекарства противувене ритескаго. Но какЪ бы то ни было, однакожЪ слёдуя сему способу, и принимая совокупно попіребное количество сулемы, или какого нибудь другаго приуготовленія меркуріальнаго, редко случается, чтобы больной не изцелялся втв Венеритеской бользни скоренившейся.

Есть еще одно злоключение, особение съ вра-приключечеваниемъ сей бользни сопряженное, что изъ де-ил блинещия по-

eakaemaiемъ отъ жудаго на-6 люденія Idmeir. Bo Bpema vпошребкурія.

сяти человъкъ, кои ею заражаются, едва ли нахолится одинь, который бы вь тверломь быль расположени, или который бы имълъ охоту покорить себя наллежащей діэть. Больной хощя и хочеть прибольными нимашь лекарства, но обязанъ бываетъ дъла свои исправлять; а для предупрежденія всякаго подозрѣнія женія мер- Должень онь пишь и всть, такь какь и всь вь домь живущіе. Таковый - то есть жребій девяти - лесятых Б частей злоключеній, от Вене рихеских вользней проистекающихЪ.

> Мнъ не случалось никогда видъшь, чтобы трудно было выльчить стю бользнь, или чтобы она сопровождалась онасностьми, когда больной строго слъдоваль совътамь Медика; но целаго Тома не достало бы кЪ описантю ужасныхЪ послъдствтй, происходящих воть поступка противнаго. Желеаки въ ларахв. вереды в в горав, Яглинская хахотка, гниение костей, больныя дещи и проч. сунь малое число былствій. изъ сего источника проистекающихъ.

Ложное умозанлючение о Венерической болвэни . содълыва... ющее оную 6 Бдешвен-RAK GIOH BEANKARO числа больныхЪ.

Мы не можемъ довольно предваришь прошиву того ложнаго умозаключения, какое дълають часто о сей бользни, и которое учиняеть ее быственною для многих в людей. Крынкаго твлосложения человыкь, заразившись Венеритеского бользий легкою. скоро от оной изпранется без всякаго почти труда, или не принимая многих в лекарство; почему и заключаеть изъ сего, что съ его сложением3, всегда ему шакже удаващься будешь. Нъсколько спуста послѣ того времени вновь заражается тою же самою болъзнію, и съ признаками вдесятеро сильнъйшими; но по своему высокоумному разсуждению двинися шакже слегка, какъ и прежде, а шъмъ самымъ и повреждаетъ свое твлосложение. Изъ сего явствуеть, что не льзя довольно предостерень себя от подобнаго заблужденія.

Различности успъховъ въ сей бользни бывають венеричевсегда столько же велики, какъ и въ оспъ, о которой ская боСиденгамо говориль, что въ нъкоторыхъ случаяхъ ставынеть
н самый искуснъйшій Врага не межеть спасти разнообразбольнаго, а напротивь того въ другихъ случаяхъ и самое невъжественное попеченіе умертвить онаго не можеть. Хота кръпкое тълосложеніе и бываєть всегда тълослоблагопріятнымь обстоятельствомь для больнаго, одженію
накожъ и оно можеть содълаться весьма пагубнымь, борствуюжели на него слишкомь надъяться станешь.

Въ самонъ дълъ, какъ многими наблюдентями до- самое казано, что и кръпчайщее телосложенте не мо- пръпкое телосложенте не мо- пръпкое телосложенте не мо- пръпкое телосложенте не ронней помощи, силы къ преодольнтю сенеритескаго можетъ нада, или такъ сказать къ восторжествовантю надъ преодосонымъ, когда онъ однажды прошелъ въ кроез: то рическаго надъянься въ подобномъ случав на свое телосложенте яду, просеть великое злоупотребленте, послику надобно все- шедшаго гда имъть прибъжище къ лекарстваль, такъ какъ въ кроез. Лънаретва оныя бываютъ необходимо нужны.

Хотя по различнымы степенямы сенеритеской необхозаразы, вы сей бользни примычаемымы, и совершенно не возможно положить точныхы правилы о врачевании, какого она требуеты, однакожы всякы найдеты, что начертавленый нами планы всеобщій будеты самый безопасныйй, и что оный завсегда будеты сопровождаемы успыхоны желаемымы.

Слвдуя сему нлану, надлежить пускать кровь кратное св предосторожностьми, показанными вы примъчанти повторене того, кавых легких во время воспалентя; по томы и вскорь, разомы какы сти признаки минуются, давать меркуртй вы виды должно посамомы пртятный шемы дая больнаго; а сте послыднее вы пользо-

манів ве- лікарство, при помощи декокта из в сарсепарили в нерической пристойной діэты, как в то предложено на спраняціх в совершен во слідани. 27 и 62 сего Тома, предохранить его не токмо от в но-слідаствій бользни Венеритеской екоренившейся, но еще руководствовать будеть кв совершенному изціленню.

ГЛАВА 50.

О бользнях в женских в сообще, о тьх в, кои засисят в от в непорядочного мысячного отищения, остановивша-гося или слишком в сильного; о беременности; о родах прежлевременных в, или о выкидывании; о родах в; о бользнях в родильний в; о безплодности или без дытности и о муженеистовств или бышенств матки.

S I.

О женских бользилх вообще.

V всехь просвещенных в народовь ныне вошло вы Упражиемія, къ употребление поручать женщинамъ попечение о дъепредвлены лах В домоводственных В; а сте и не без В великой прижанимъ чины, поколику природа содълала ихъ не столько бывають женщины, снособании, какъ мущинъ, къ упражнентямъ дъяшельпрошивны нымъ и многотруднымъ. Но вообще снизхожденте, ихЪ здо. въ разсуждени сего предмета простерно очень д же-BORDIO. ко; ибо женщины вивсто того, чтобы имвть себъ облегчение, от в самаго сего обыкновения много препериван, по недостатку твлодвиженія и по шому, что свободным воздухом в пользуются мало.

доизэз. А чтобы вЪ этомЪ удостовъриться болье, то тельство надлежитъ сравнить здоровой видъ нашихъ кре тысвъятое нокъ съ блъднымъ цвътомъ лица женщинъ въ заклюключении. Без в сомивния природа установила весьма ощути- ности нательное различие между женщинами и мужчинами, кодыщейотносительно къ крвиости твлесной и самаго сло-женщинаженія; но конечно не было никогда намъренія ея, ми живучтобы одни всегда сидели дома, а другіе вні жи- щими въ лищь своих в подвизались безпрестанно.

женщинами деревенсиими.

членъ І.

Присины женских вользней вообще.

Заключенная жизнь женщинъ не только вредить в этони наружному ихъ виду и сложению, но еще повреждаеть вывающи их в твердыя, ослабляет в способности душевныя и ми обык. всь их в дъйствия тълесныя разстроиваеть. Оттуда новенной неваренія желу яка, обтры, завалы, преж лев ременные жизни жен. роды, и множество болвзией нервных в бользней, ко торыя не только делають женщинь неспособными къ тому, чтобы быть матерями и кормить детей, но такожъ своенравными и неръдко достойными смъха; ибо въ самомъ дълъ духъ зависить столько отъ здоровья, что редко находится дух в здравый в немощномъ швлъ.

Всегда примвчаль я, что женщины, которыя Деревечбыли упопребляемы внъ дому, на работы садовыя и снія жен. прочія сельскія сего рода упражненія, бывають по-щины бычти сполько же кръпки, какъ и самые ихъ мужья, а дъ- стольно ти такъ здоровы, какъ и матери. Но мы описывали же почти уже неудобства жизни сидячей и праздной как в то- сложені. го, шакъ и другаго пола, смошри Томъ I, глава 2, емъ, канъ и самые № 8, 2 и 3.

Теперь станемъ мы показывать различныя со-расположестоянія и должности женщинь, зависящія ощь ихьніе сей гла. твлосложенія и самых в намъреній, съ коими произвела ихъ природа: должности, по которымъ они бывають полвержены бользнимь частиймь, изв коихв JOME IV. TAAB-

главнъйшія сушь, місятное отищеніе, беременность, роды и проч. Правда, что говоря собственно, не можно называть бользнями ни місятнаго отищенія, ни беременности, ниже родооб: однакожь по ніжности женщинь и дурному образу, какимь большая часть себя содержать, вы таковыхь случаяхь сій естественныя дійствія ихь сложенія не рідко бывають обильными источниками немощей.

ЧЛЕНЪ П.

Всеобщія попетечія, каковых в требують женщины еб состояніи здорогом в и еб бользни.

(Следовательно женской поль требуеть особеннаго вниманія со стороны техв, кои пекутся о ихв здоровье: ибо, такв какв неразделимыя существа рода человеческаго, подлежать оне всемь бользнямь, коими страждуть мужчины; и такв какв женщины, подвержены бывають множеству немощей, свойственных единственно ихв сложенію телесному. Но сами оне должны непреставно быть осторожны вы образе житья своего, поелику свойственныя имь бользни чаще всего не иныя имеють причины, какв те погрешности, какія делають они вы своемь пищемот ребленіи.)

§ 2.

О месятномо отищении ими о месятныхо кроемхо, и о болезняхо произойти ото нихо могущихо, како то о непорядотномо и трудномо оныхо извержении, о заносё ими остановкё ихо, откуда произходито блёдчый цевто или белая лихорадка, и испортенный вкусо; о неумеренныхо кроемхо; о сильномо кроеотетии и о тети маточной; о полипе ими каратиць, матки и о полипе ложесно ими влагалища; о беляхо и о томо времени, когда женщины перестануто иметь месятное отищение,

члень і.

О мёсятном отищении или о мёсятных кросях вообще.

Женщины начинають вообще имыть мысятныя каного вож проси около пятнатцати льть, а перестають на расту инпидесятомь году; что самое и сольлываеть сти начинають два пергода ихъ жизни весьма критическими.

(Нужно предваришь еще, что возрасть, въ ка щене. ком в месятныя крови оказываются у женщинь, не сей возвсздъ бываеть одинаковъ. Климать, въ которомь онъ дичествуживушь, родь жизни, какой велушь, и крепость или еть по слабость ихъ телосложения, нарочитое влиние имъ-илимату; ють вы первые признаки сего тегенія періодитеска ни и прож во. Вь странах в жарких в девицы начинаю пъ имъть месятное отищение на десятомъ году, а часто и ранве: как в то нов вствуств исторія обводной дввушк в, которая въ Индін имъла мѣсятное отищение на четвертомъ, а родила на шестомъ году. Въ холодныхъ же напротивъ того странахъ женщины едва начинаютъ имъть мвсятное отищение на дватцатилътнемъ и дватцашиняшильшнемь возрасть; а въ самых в студеных в мъстахъ, какъ-то Гренландки и совсъмъ оныхъ месякчых кросей не имвюшь.

Въ одной и той же самой странъ въ разсуждени сего находится великое различие. Женщины, живущия въ городахъ, вообще начинають имъть мъсятное отищение ранье, нежели сельския; и тъ, кои живушъ на горахъ, нежели на ровныхъ мъстахъ обятающия. Въ Парижъ время отищения мъсятиаго вообще бываетъ отъ двънатцати до четырнатцати лътъ, а въ полудениыхъ провинцияхъ (рранции отъ десяти до двънатцати.

Сте очищенте елиножам приключившееся Сколько времени каждой мъсянъ, а именно dmuroxugu проходишъ каждые дватцать семь или дватцать восемь дней: между капо крайней мъръ срокъ сей бываетъ самый обждымЪ мъсячмій. Ибо впрочемь находятся такія женщины, кои не -NEO GMIGH будучи больны, инфоть сте отишенте лважды въ мъженіем Ъ. сяць, или при раза въ два мъсяца, когда другія напрошивъ того оному бывають подвержены однажды въ пять нелаль.

иродолжение сего отищения бываеть довольно віе мѣсяч различно. Однакожь рѣдко случается, чтобы не было оно трехь сутокь, или бы простиралось болье осьми.

Трудно вычислить количество крови, истекаюопредьдань номичество
мичество
мрови, исвозвращени у одной и той же самой страждущей. Вотекающей
во время
очляденія.

очляденія.

трудно вычислить количество крови, истекаюпри каждом возвращено оно у каждом женщины, и часто даже при каждом в
мрови, исвозвращени у одной и той же самой страждущей. Вотекающей
во время
очляденія.

очляденія.

очляденія.

Кровь мв. Кровь, истекающая во время отищенія місятного запичаго запичаго запичаго запичать бываеть у женщинь такихь, кои сами запичать ровы и сложенія кріпкаго: слідовательно все, что женщя и говорять о адовитолю свойстві опыя, о особеннах застровыхь и ной силь ея, будтобы окисають оть нее вина, ягодровыхь и ноки и проч. есть глупый предразсудокь, незаслусьюйства живающій ни малітивого вниманія.

месячное Испражнение мвсятных кровей бываеть предсч щение варяемо или сопровождаемо, въ продолжени больвосбще шаго или меньшаго времени, истечением пасотным , мо или болве или менве обильным , относительно къ сосоправождаемо бымного есть женщинъ здоровыхъ и півлосложенія коро ваеть исшаго, въ которыхъ не примътно ни прежде, ни по- теченіемъ сав отищентя никакого подобнаго истечентя.

бълаго ивъ-

Масятныя крови не приходящь вы беременности, у какихъ а особливо въ последние мъсяцы; ибо случается ино-женщинъ гда, что бывають они еще въ проделжении первых но не притрехъ мъсяцевъ. Не носить ихъ также большая часть ходать кормилиць; наконець не бывающь они у нъкощо-мъсячных рых в крестьянокв, у некоторых в женщин в рабо- тя оне и чихв, у некоторых в танцовщиць, кои не имеють больны никогда сего очищентя, не чувствуя отв того ни- от того какихъ припадковъ, и которыя впрочемъ весьма спо- не бывасобны къ зачащію. Очевидно, что въ сихъ случаяхь потв и другія трашы замыняють мысятное истетение.

Наконець месятныя крови продолжаются течь въ какія въ одинакомъ порядкъ, и наблюдая шъ же самые мъта мъперіоды, до сорока, сорока няти и до пятидесяти льть, вь которое время сами собою пере-рестають стають вовсе. Правда, что какъ время прихода течь: их в бываеть различное, так в и время, когда они перестають, равнымь образомь не одинаково; ибо случается сте ранве или пожже, по сложентю твла и роду жизни женщинъ, по бользнямъ, коимъ онъ были полвержены, или по климату, въ которомъ живушь, и проч.)

Около того времени, когда первые знаки мв. мвстчное еятнаго отищения появляющия, твлосложение чувищвые еть перемьну поистинны великую, и вообще всегда мо бывакъ лучшему; однакожъ бываеть иногда совсемъ про- етъ наротивное: следовательно сей круг времени требует в читою невсяких возможных в попеченій; поколику здоровье вы шело. и благоденствие булущия женщинь зависять большею сложения.

частию ошь того, какимь образонь стануть они содержань себя въ сте время (а).

ЧЛЕНЬ И.

О первомо появлении мѣсятномо.

вантвен чи-Спиымъ INTROABIL medin?

Ежели двица четырнатцати или пящнатильтв. нужно ме больше или меньше, судя по климату, въ которомъ дъвенамъ живетъ, какъ-то мы показали выше, смотри стран. 123 сего Тома, принуждена бываеть жить въ заперши въ комнашъ, всегда сидъшь, не имъя возможновоздухомъ сти тамъ играть и бъгать изъ одного мъста въ друи быть въ гое; наконецъ не будучи употребляема ни на какое упражнение дъятельное, могущее привесии въ движеріе всв части твлесныя: то слудается она слаба. безсильна и хида; худо выработанная кроев ея ласть ей прыть блыный и блеклый; здоровье ея, бодрость и силы уменьшашся, и она сделается кворою весь астатокъ жизни.

> ТаковЪ жребій множества нешастныхЪ львицЪ, которыя по излишнему ли нерадентю со стороны их в манерей, или по трудным в обстоятельствам в. въ каковыхъ находятся, лишаемы бывають около сей важной перемены вы жизни выголь телодеижения и

> > воль-

HVKHO, umobit Moвицы были изещавиле-ME MOMY, HINO . DONNE ны онв переноda, 4 BD то время, RIPES HOW нажушея мвсячныя кровж.

лодыл дв. (а) Долгв матерей и женщинв, коимв поручено воспитание молодыхъ двенць, наставлять оных в заблаговременно тому, нанв онв должных есбя вести и беречь въ семъ столь самномъ пергодъ икъ жизни. Худо понимаемый стыль, нерадение и невъжество въ томъ, что благоприжино ман эловредно для сей эпохи, бывающь источниномъ многикъ золь и бользией, кои разумная и опышихя женщина могла бы предваришь ибношорыми благовременно данными наставленіями.

Не менве нужно наблюдать всликую осторожность и въ слъ дующія возвращенія мів спчимкь провей. Пища нездорован или твлосложенію прошивная; сильныя страств душевныя; стужа захваченная по неосторожности, достатечны не редно къ повреждению заоровыя и къ приведению женщины совершенно виз состояния имъщь дътей въ носяблованін,

вольнаго воздуха, конторыя для нихъ столь важные, какъ то мы гозорили въ Томв I, на стран. 107 и слъ. дующихЪ.

Безпечность и склонность къ лености быва- следотви вошр равномбрно зловредны для двиць сего возрасии; безисчтоибо между женщинами ведущими жизнь двашельную сии у ази трудолюбивую едвали нанти можно такихъ, кои бы жаловались завалами, когда напрошивъ шого женщины ленивыя и безпечных редко от в оных всвобождающся и всв почти бывають жертвою блединго цевта или былой лихорадки и других в бользней подобных в: почему и совъщуемъ мы всъмъ шъмъ, кои закотять избавишься от сих в немощей, убъгать нельйствия и лъности, яко смертельных врагов встовы, и открышымь воздухомо пользоващьем сполько, сколько имь возможно будешь.

Другою причиною болбаней у дъвицъ въ семъ болбачи період в жизни почитается пица нездоровая. Ибо в в са бывающія мом в дель страстны будучи ко всему так в называ- ми дуртей емому лакаретвеннымв, употребляють онаго безь мв-пици и ры и до шехь поръ, пока все ихъ соки не явнарешев, испоршанся совершенно. Опсюда худое варение вы коножелудка, совершенное отвращение от пищи винь воби другія безчисленные припадки: ибо когда жидкія ще стране будуть короно пріуготовлены, то совершенно стимь не возможно, дабы от деленія могли следаться надлежащимь образомь; какь то мы видимь, что двицы ведущій жазнь ві праздности и ліности, и питающіяся одними почти лькарствами, не токмо бывають полвержены остановка масятных кровей, но такожь засореніямо въ железахо, золотухв и проч.

Печальное и унылос расположение души бывает В начани и еще вредно девицамъ сего возрасна. Редко видель залумин-MO- BOCHH , AL посторой онъ быватеть склон-

ножно молодую девушку резвую и веселую, которая бы не наслаждалась самымъ лучшимъ здоровьемъ, когда напрошивъ того угрюмыя и печальныя сивлаемы бывають грустію и припадками истеритескими. Поелику юность есть время разсвянія и веселости, то следовательно молодымь девушкамь и нужно предавашься онымь; и сте должны онв почишать себъ за правило.

AOARHO. имъ поспавишь веселоств и разећанів мыслей.

Запастись здоровьем в в молодыя лета есть атиствие благоразумия столько же необходимое, как в и за правило предостеречь себя противу бользней старости. И так. в. поколику мудрая природа влечеть юность къ наслажденію шумными забавами, то да не противятся сему полезному побуждению строгие совыты охладылаго возраста, да не отравать мрачною печальностью сей прекрасной весны жизни, предопредъленной къ веселости и ко всякии вабавам в невинным в.

Сколько шнурэванья бёл епвениы ANA COPO возрасша.

Но болье всего патубными для женщинъ въ семъ возраств почитающей шну рованья очень стянутыя. Хотянь онь со всевозможною силою имънь станъ тонкой, и по глупому воображенію своему думають, что достигнуть до сего могуть стягивая себя весьна крвико, когда ихъ шнуруютъ. Однакожъ ничто такъ не вредить варению желудка и не причиняетъ большаго числа бользней неизцылимых в, как в безуміе стягивать себъ желудоко и кишки такимъ образомЪ; смотри о семЪ Тома I глав. и примъчанія с

Надобно однакожЪ признашься, что таковое безуміе есть не столько общее нынв, как в прежде сего было; но поелику нъшъ ничего непостояннъе, какъ моды, а пришомъ и стя самая, сколь она ни безумна и ни смертоносна, могла бы еще опять быть приняша, нята, то предлагаемое нами здъсь не должно почитать за ненужное и безполезное, да и не возможно довольно показать всей глупости таковаго злоупотреблентя.

Я знаю многих в женщинъ, которыя воспоминають еще и теперь о бъдственных в дъйствиях сего жалости достойнаго обычая, толико прежде славившагося, стягивать съ великимъ усилиемъ дъвицъ около средины тъла, такъ чтобы они сколько возможно въ семъ мъстъ были тонки. Никогда человъческой умъ не могъ изобръсти употребления противнъе сего для здоровья.

О перволя извержении мъсятных кровей, оказывающихся трудно.

Когда двица достигнеть до того предвля вре-что надомени, въ которое мвсятных крови долженетвують бно дълать обыкновенно оказываться, и когда не токмо что не того. даоткроются, но примъчено напротивь будеть, что бы давать здоровье и силы ся начнуть уменьшаться: то мнъ лънаретва? ніе мое вЪ такомЪ случав есть, дабы вивсто содержанія оной вь заперши и кормленія стальными опилхами, гортовым в каломв (fercus diaboli) и другими сполько же опвращипельными лекарствами, послапь се въ такое мъсто, глъбы могла она дышать свободнымъ создухомо и пользоваться пріятнымъ обществомъ; дабы тамъ питалась она здоровою пищею; имела бы довольное тело движение и старалась бы потулять и повеселиться самым в пріятивищим в обра. зомъ; и мы мало будемъ имъть причины опасаться. чтобы вспомоществованная такимъ способомъ природа не довершила своего дъйствія; ръдко въ томъ она имветь неудачу, да и то развъ тогда, когда мы сами бываемъ во всемъ виновными.

Ofemora и ельстива долженсопровожвсе изверженіе мбdxidires гда оныя благопрі OH HMHJE жишающея.

(Полезно всегда, когда масятныя крови приходять кь дъвицамь въ пристойномь возраеть, а именетвующія но, около двінатцатаго, тринатцатаго, четырнатцатаго или пятнатцатаго года, какв - то выше годать пер- ворено было на стран. 123 и следующь сего Тома, когда приходять они легко и безь всякаго припадка; поелику извержение, сопряженное съ сими условиями, кровей, ко- предохраняеть давицу оть многихь немощей, возващаеть доброе твлосложение и объщеваеть самыя благоятетвую- получныйшія расположенія къ плодорожденію.

> Нещастве же для дъвицъ при расположентяхъ прошивных в есть, когда в семь извержении будеть доставать какого нибудь из оных предполагаемыхЪ, обстоятельствЪ, а именно когда мвсятное отищенте придеть или очень рано или слишкомъ поздо; когда уставится опо не безъ трудности или будеть сопровождаться опасными припадками. Ибо кромъ того, что оное почитается знакомъ почти върным в худаго сложенія матки, еще и самый опыть научаеть, что дъвицы, которымь сте приключается, не редко бывають полвержены немощамь упорнымь, ночши всегда страдають отищентемо лесятным многотруднымъ, и обыкновенно не столько способны бывають къ рождению детей, а особливо детей здоровых в. Яструка, о женскиха бользилха, Томв 1. спран. 109 и 110.

> Признаки предшествующие первому извержению мвсякных в жровей.

> Месятныя крови редко приходящь такъ внезапно, чтобы постигнули девиць вь такое время, когда онъ ни мало того не чаяли. Обыкновенно бываютъ оныя предваряемы припадками, по которымъ признашь их в можно: таковые припадки сущь жарв, тя-· rocmb,

гость, потаенная боль въ поткахо; напряженте ж тверлость въ груди; боль голосная, потеряние охоты къ вдв, слабости, бледность на диць, а иногда и самая лаже небольшая горятка.

Пользование, каковаго требиють сии признаки.

Когла дъвица находится въ такомъ возрасть, что мвсяхныя прови притипи кв ней могуть, и сти припадки приметить, то должна она всевозможное прилагать стараніе, дабы не сдёлать ничего, могущаго остановить сте полезное и необходимо нужное охищение; а напрошивъ того надобно ей употреблять всякіе способы кЪ вызыванію онаго; должна она пары тепсидень часто надъ паромъ теплой воды, пинь мок- лой воды; ротожидительные отвары пеплые, а ноги по самыя мокр толядвен ставить въ теплую воду, и проч.

О томв, какимв образомв сести себя во время месятнаго осищения.

Какъ скоро однажды месленый крови шечь на- дізта. чнушЪ, то и надобно прилалагать всевозможное ста-какую въ раніе о предохраненіи себя от всего, могущаго их все время осшановить. Следовательно женщины во время мёсятнаго отищенія должны бышь весьма осторожны въ женщины. пищь и пишьв. Нужно имъ убъгать всего холоднаго, или удобозакисающаго въ желу жив, какъ-то сы рых в плодова, кислаго молока и проч; надобно воздержащься имъ такожъ отъ рыбы и отъ всякой пищи къ варению желу дка трудной.

Но какЪ не возможно упомянуть обо всемЪ, мо должны гущемъ вредить каждой женщинъ въ особенности, въ онъ убъподобном в случав находящейся: по мы совытуем в имв гать всего всьмъ вообще воздерживаться от того, что обы- имъ обыкновенно кажешся имъ прошивнымъ, и онаго не упо- кновенно треблять никогла въ сте время.

проши-

тельное

ногъ ж

Спу-внымъ.

CHARSKO RVEHO беречься SIR III o

Стужа чрезвычайно вредна для женщин во вредля нихъ мя отишенія мфсятнаго. Мы вилимъ множество женщинъ, коихъ бользни происходять болье от простуды. оть сту которую захванывають онь во время мисятного отищенія, нежели от в какой нибудь другой причины: почему и должны онъ беречься от оной, и осторож. но поступать въ такихъ случаяхъ. Нъкотораго степени стужи, немогущаго вредить имъ во всякое другое время, довольно, когда имъющь онъ масятных крови къ совершенному повреждению ихъ здоровья и самаго твлосложенія.

O AVIIIeempaemiо и бжа

Женщины не менте должны имты вниманія кЪ эныхъпри-состоянию ихъ духа, которой должны содержать въ величайшем в спокойстви и веселости. Страсти им вют в етрастах самое величаншее вліяніе во всь двиствія жизненнаго усті роенія; но ни на какое из оных в столько не двиствующь, какь на месятныя отищенія. Гнево, страхо, петаль и другія пристрастія душевныя часто производять остановки кровей, кон бывають неизличимы, какв - то сте уже показано въ Томъ I, глав. 11, 66 2 и 3.

YAEHB III.

О остановка масятных кровей.

Дігта, какую надобно предписывать в остановкв мвсятных в кровей, от в тего бы оная ни происходила.

Какая бы ни была причина произведшая останоску масятных в кросей, выключая токмо в в случав беременности, кормленія грудью, танцованія, трудной работы и проч.; какъ- то сте показано было выше на стран. 125 сего Тома; но должно стараться о приведении их в в прежнее состояние: в в савденые чего мы совыпуемь женщинамь, находящимся вы подобномь слу чав, имвить довольное движение, питаться воздухомв свободнымъ, сухимъ и прохладнымъ, и нишу употреблять здоровую.

ТБЛОДВИеженіе, вольный воздукъ. эдоровад THE STATE OF

Ежели тъло будетъ слабое и безсильное, то обстоя должны онв пишь напишки крвикіе, продолжать вре- техьства мя въ компаніяхь пріяшныхь и всячески стараться ющія упосебя увеселять; естьли же сін средства будуть без- требленіе успъшны, тогда надобно прибъгнуть къ лекарствама, начитновъ о коихъ мы теперь говорить намърены.

тельныкБ2

Пользование остановки мфсятных в кровей, произшелшей от в ославления.

КакЪ скоро встановка месятных кровей зависить признаки от в ослаблентя въ твердыей (сте признать можно остановки по нижесльдующим в припадкамв: больная чувствует в ныкъ нреизнеможение, слабосив, боль и шягосив в полениць; вей отъ бользни соловныя, безсонницу, принужденное дыхание, ославления вътры и пучентя въ желудкъ; позывы на рвопту, колотье; всеобщую блёдность распространяющуюся по всей кожв, весьма приметную на лицв, которое отв того бываеть иногда зеленовато: сей послёдній припадок в производить бользны так в называемую бледный цевто, или былую лихорадку, о которой мы говорить станемь вы савдующемь члень): то выполобномы случав надобно упошреблять лекарства удобономогающія вареніго желудка, способствующія кі украпленію твердых викв приведению органова въ состояние приуготовлять жорошую крова. Главными из в сих в лекарство почитаются желвзиыя опилки и хина, смышанныя съ други-женым ши горькими вязательны ми.

опилки : жина.

Желвзныя опилки принимаются настоянныя в в способъ виноградном в винь или въ корошемъ пивъ следую. какъ прішимъ образомъ:

Yromon-TANTO CHIER

Возьми жельзных в опилокв. - - двв или три унцін; Вина или пива хорошаго, два фунта или полуштофокЪ.

Лай настояться въ тепломъ масть чрезъ двъ жан три нельан; по томь процеди.

Больная должиз пишь сего настоя по рюмкъ два раза въ день, или шакожъ принимать желвзных допилок в прі уготовленных в по тритцати гранов в, которыя смъщать надобно съ небольшимъ количествомъ меду или тергаку, и сей пртемъ повторять раза три или четыре на день.

Хина и другія лікарства горькія можно принимать или въ самомъ сещестев, или въ настов, спотря по вкусу больныхЪ.

Пользование остановки мъсяткаго отищения, произше дшей отв полнокровія и отв густоты крови.

Когда сія бользнь причиною имбешь кровь стустившуюся, сязкую, и когда женщины страдающія оною бывають дородны и твлосложения полнох ровнаго: то пригодиве тогда лекарства отищающия и всякія другія раздёляюція и вь жидкость приводящія мокропы.

ewanie. Ваниы для Horb. Walching. техьныя. Maura. Humbe. ТБДОДВИ-

жenie.

Knomony-

Въ такомъ случав надобно больной отворить кровь изъ ноги, вельшь ей часто ставить ноги въ теплую воду и временемъ давать нёсколько тистительных прохладительных в.

Пищу должно предписать ей легкую и жидкую; а пишь надобно ей сыворотку, воду, слабое полпиво, и имъть довольное деижение. Дважды въ день надлежить давать ей по кофейной ложкъ тинатиры изъ чемеричная. былой темерицы. (tinglura bellebori afbi) вы с паканы шенлой воды. (Вообще остановку масятного отишения, произведенную полнок ровгемв, всего удобные вылычить можно. Ръдко бываеть, чтобы не миновалась она отъ держанія ного еб теплой соді, от в пусканія крови изъ ноги и проч.)

TI 0115-

Пользование сетановки мысятных кровей, происходящей от в пристрастій душевныхв в и прос.

КакЪ скоро остановка сія произошла от в при- важноств стрястий душевныхв, отв песали, страха, гиваа и перемвных проч., то надлежить все употреблять, дабы развесе развесе лишь больную и штыть самымы разбить ся мысли. Сред- мыслей зъ ешво самое надеживишее къ уничтожению причины сей такомь бользни состоить въ томь, чтобы сколько возможно опражить больную ошь того мьста, выконоромы она получила первыя внечашльнія оной. Перемьна мьста, представляя душт новые предметы, часто имтешь вождельнившийя дъйсний кь освойождению еж ошь самой глубокой печали. Выжливыя, ласковыя и ныжныя в' таком случат св женщинами поступки, весьма много къ облегчению ихъ способствующь.

(Способы сій, всегда изящные, не бывають од-обстов. накож в достаточны, когда остановка кровей старо- тель так давняя. Таковые случан показывають часто знаки полно жровія; а тогда и надобно прибъгать къ кровопу-пуснанівсканіямі: но примьчено впрочемь, что полезнье вообще начинать кровопускантемб изъ руки, а по томъ приступить и къ ногъ. Не ръдко даже многіе Врачи принуждены были принускать піницо къ тайноми улу піницы. икв сосу дама потетуйныма; ставить рожки кв лядвеямь Ромии. и пахамъ и проч.

Но самыя употребительнёйшія въ неважныхъ случаяхь средства, посль предписанныхь теперь, супь паръ теплой воды, надъ которымь сажають пары тепбольных в. Теплыя бани и погружение ногь въ теплую кой воды, воду, магчительныя припарки, слабительные клистиры плыя прии проч., производять піакожь действіе весьма хоро-парки, шее; и сти средства пригодны равномърно, хотя бы промываостановка причиною имьла страсти сильныя, хопія бы вельныя

MINTH W RPOY.

произошла она от простуды внезапной, или от какого нибудь инаго случая.)

Пользование остановки месятных кровей, приключивщейся отб какой нибудь бользни.

Не весьма нужно еще примътить въ разсужде. нін встановки місятных в кровей, что онал не рідко бываеть следствиемь другой бользни. Въ такомь случав, вмвсто употребленія лекарство удобовызывающих воныя крови, что моглобы быть крайнъ опасно, надобно стараться единственно о врачевании той бользни, от в которой произошла оная остановка и объ укръплении страждущей; ибо какъ скоро здоровье ея возвращится, то и месятныя кроси по томъ сами собою опять придуть.

Внимание, какое надобно иметь прежде пользования остановки масятных в кровей, ото тего бы оная ни происходила.

W2 добно стовбрно, ме отъ беременно-CIMH AH она промежодишъ.

(Вообще, прежде нежели приступить къ врачеузнать до- ванію остановки місятных в кровей, от чего бы она но видимому ни зависвла, надлежить начать достовърнымъ изслъдованиемъ, не происходить ли она отъ беременности; ибо мы въ семь случав ежедневно бываемь обманушы штыми девками, кошорымь весьма нужно скрывать свое состояние, и на добродътель кошорых в не можно иногда им в шь ни мал в й шаго подозръніл. Надобно даже, когда подозрѣнія сего не льзя обнаружинь, лекарства отложить до техь порь, пока не пройдеть, по малой мъръ, пяти мъсяцевь отъ остановки кровей, дабы въ то время можно было, съ лучины познанјемъ причины судник основательние о самой останоскі кровей; поелику в сте время вообще начинають достовърно оказываться ощутищельмышие знаки беременносии. Холодная рука, положенная тогда на брюхо, можеть произвести и вкоторое лвижение ощущищельное со стороны матки, не упоминая о других в знаках в беременности, о конк в предложено булеть ниже; смотри § 3 сей главы.

Весьма нужно приметить, что самымъ благо- Время, кой пріятивишим в почитается временем для карство, о коих в теперь говорено было во семь чле писывать нь, то, когда бываеть извержение месятных кровей, явнареты или лучше, когда оному бышь надлежало разчи- въ о таносляя самые періоды его по тому времени, какь бо с чныхъ льзнь еще не существовала; особливожь ежели боль кроней. ныя чувствують тогда ть же самыя предвышательные припадки, какте съ ними случались и въ тогдашнее время, как в на примър в тяжкая боль в в поясницв колотье, жаръ лихорадогный и проч.)

YAEHB IV:

© бользии называемой клоросись, то есть блёдный цевтв, иля былая лихорадка и о испортенномв екусв или прихотях веременных женщинд.

(Говорили уже мы, что бользнь называемая какія жена билая ликорадка, то есть оный цветь бледный, а щины быв иногда синеваный, распространившійся по лицу двержены тьх в женщинв, у коих в масятныя крови останови- сей боль лись, бываеть признаком в сей самой остановки тыхь эни, кровей. Но сія бользнь можеть приключиться даже и тогда, когда мвсятныя крови продолжаются течь, хотя въ меньшемъ количествв, нежели какъ во время обыкновенное. Не ръдко шаковая бользны встръчается У аввицъ возмужалыхъ и у молодыхъ вловъ сложенія крыпкаго и здороваго, и которыя желаніямЪ своимъ удовлетворить не могутъ.)

Признаки бёлой лихорадки или болёзни называе пой блёдный цвётб.

(По мъръ того, какъ блъдность и зеленоватость кожи усиливаются, нъкоторая пухлость оказывается на въкахъ и на другихъ частяхъ лица, такъ какъ на голеняхъ, ногахъ и проч. Боль головная увеличивается: больная чувствуетъ жаръ въ ногахъ и стесиете въ груди при самомъ малъйнемъ движенти, бтенте сердца, сильную тоску и обмороки. Сверьхъ того пристаетъ къ ней лихорадка впутреняля, болье чувствительная ночью, нежели въ день; опухоль въ верхней боковой састи живота и такое пученте, что иногда можно полумать, что она беременна; однакожъ ощибка стя сопряжена съ слъдствиями весьма важными, поелику чрезъ то самое можно оскорбить честь дъвицъ невинныхъ, или замужнихъ женъ оставить въ такой безпечности, которая для нихъ бываетъ иногда бъдственною.

Ста пухлость живота, которую должно относить паче кЪ задержантю мѣсленых в кровей, нежели кЪ совершенной остановкѣ оныхЪ, оканчивается часто сильшым к роботетентемв, которое не рѣдко почитали мновие за преждевременные роды: ошибка, какЪ-то всякЪ легко разсудитЪ, могущая весьма несправедливо нанести безславте самой честной дѣвицѣ. Во время сей пухлости живота лодыжки надуваются; но опухоль стя чувствительнѣе бываетъ поутру, нежели ввечеру, и не подается ни мало, когда перстомъ подавить, такъ какъ въ водяной бользни, о котторой предложено Тома ІН въ главъ 32.

Хотя остановка мвсятных кровей и почитается вообще причиною белой лихорадки, однакожь случается иногда, что остановка сія не бываеть совершенною; что мвсятныя крови оть времени до времени теченіе имвють; и вь такомь случав бользнь еїл тъмъ страшнъе, что можно опасаться, не остановлена ли она заваломо внутренности подбрющіл.

Бълая лихорадка бываеть еще препятстві- Следствіе емь загатію. Бользнь сія можеть продолжаться дол- бользни объкновенно она неопасна, особ- корадни. прожь, когда не произойдеть оть причины нами теперь означенной: ибо возвращеніе месятнаго отищенія обыкновенно разбиваеть оную; однакожь естьли ее запустишь и не станешь стараться о употребленіи надлежащихь средствь, то можеть она испортить всю кроез, и вогнать вь бользив водя- мую и проч.)

Признаки испортеннаго вкуса, называемаго притудами или прихотями беременных женщинд.

(Женщины страждущія бользнію, поль именемь былой лихорадки извыстною, имьють часто и безпорядочный позывь на вду, который побуждаеть ихь ысть вещи самыя необыкновенныя, какь-то соль и перецё толый и вы довольномы количествь; зеленые плоды; мясо и рыбу сырую; ящериць, лягушекь, пауковь, гипсь, непережженую известку, золу и уголье, сныть и ледь, бумагу, старую кожу, даже и самый каль и множество другихь вещей весьмя вредныхь и неудобопитательныхь.

Другія же презвычайно радуются, когда нюхають запахь самый смрадный и противный; держать въ рукахь и давять пальцами вещи самыя отвратительныя, опускають руки вы какія нибудь жидкости и проч. Сей испортенный вкусь, который есть совершенная бользны, называется присудами (ріса) у дъвиць, а прихотями (тавсіа) у беременных женщинь, кои такожь оною иногда страдають.)

Пользование вользни клоросиса или вклой ликоралки, и скуса испортеннаго называемаго приту дами и npuxonia nu.

(Пользование клоросиса или былой ликоражки

сходствуеть совершенно съ предписаннымъ на стран. 133 и савачюще сего Тома, противь остановки месятныхб кровей, произмедшей от в ослабления твердыхб; но примътить должно, что какъ скоро испорченный вкусь продолжался долгое время, или хотя оный не долго продолжался, но понуждаль девиць или женщинъ всть вещи зловредныя, как в - то некоторыя из вышества, въ сказанных в нами, то непременно начать надобно дажонжъ потребныбы- вапть прежде всего лекарства мокротожидительныя вающь мореотное и систительное, для очищенія желу дка и периропожидишельныя, вых в путей, кои шакъ сказашь, начинены бывающъ рвотныя и птаковыми спіранными вещеспівами: послів чего должно чиститеприступить къ лекарствама крепительныма, какъ то-Жельныя кв жельзным в опилкамв, кв хинь и другимв горь K 24 M 6-

06cme-Ameab-

*BHBIS

опилки.

RIGH

скія .

жина, горъя ВЪ великомъ такожъ употреблении бываютъ и нія лъводы жельзноватыя, как в - то минеральныя полы Пассійжарства. Минеральскія, де Форжскія, Вальскія, вода нарціальная, и воды Пас- проч. Барбейрака почиталь въ таковых в случаях в и ванны за весьма сильно действующія; но большая часть, сійскія: де Ф.рж-Практиковъ, говоритъ Г. Ялетодо, довольетвуется единственно тъчъ, что велять держать пъсколько Вильскія: вода марці: времени ноги въ шеплой водь, или согръзашь оныя REVERE. чрезъ натирантя. Наконецъ легко примъщинь мож-Виниы для но, что бракъ бываетъ самымъ надежнъпшимь и скожогъ, нарвишимъ лвкарством къ совершенному излечентю от в жиранія. сей бользни.

Чтож в принадлежить до женщить беременных в. ВракЪ. имьющих в вкус в испортенный, то как в опь освобож-Беремен-HEMB MOA Aawm

дающся ощь сего обыкновенно около четвершаго ив- щинамы. сяца беременности, или позже всего при родахв: то имбюи не нужно имъ вообще никакого рода лъкарство, а порченный особливо реотных волье же всего стараться надобно; внусь, не сколько возможно будеть, противиться тому, дабы нужно инне упошребляли онь во зло снизхожденія, какое всякь нарство. вы подобныхы случаяхы кы ихы причудамы обыкновенно чножь же имвешЪ.)

дать надо-6502

члень у.

О сильных в просях в месятных в.

МЕсятныя кроси могуть приходить въ чрезмърно великомъ такъ какъ и въ весьма маломъ количествъ (г.).

П ризнаки сильных в кровей.

ВЪ первомЪ случав больная бываетъ слаба и въ наинкъ бльдиа: теряеть охоту къ вдь; пища варится въ мытехь желудкв худо; волды реватая пухлость ногь, водяная сему бы бользив, и самая тахотка слъдс пвіями оных в бывающь. вающь

Таковымъ припадкамъ обыкновенно подвержены подвержены ны: бывающь женщины около сороконятилятняго и пяшидесящильшняго возраста, и весьма трудно излъчить ихь оть оныхь.

Пригины сильных в кросей.

Избыток в кросей масичных можеть произойти оть жизни сидячей, оть пищи весьма крепкой, со-

⁽¹⁾ чрезъ сіс выряженіе г. Бучань різумветь умечьшеніе мвсячнымь. провей по тому ля, что разопологе ме клу возворотомъ оныхъ бываеть продолжительчье, или по тому; что истечене происходить въ количествъ мечьше обынновечнато, предикужъ состояние сте различеству. еть оть прямаго остоновленія провей единственно тьмь, что оно не: етольно сильнее: то Анноръ и разсудиль токмо заметить сіе; жа и въ самей вещи требуеть оно того же пользования, накого и остановка провей месячнымь, о которой предложено вы члень III сего параграфа; смощри стран. 183 и сава, сего Тома, сообразно однакож В съ облись печь подми и напраженностью припадновъ, какје отъ него проискодышт.

стоящей изъ лство соленыхъ, пряныхъ или острыхо; ошь крепкихо напитково; ошь безмернаго ушомленія, отв ослабънія сосудово, отв жидкости крови, оть сильныхь страстей душевныхь и проч.

Пользование сильных в кровей.

Нахобно начашь опідаленіемЪ приизведшей cito 60атань.

Пользование сей бользни должно быть различное, такъ какъ и самая причина, опую произведшая: когда приключается она от в непорядочнаго наблюдечины про нія діэты, то надлежить сему пособствовать следуя діэтв противной, и присовокупляя къ тому лекарства могущія удержать оное весьма избыточное кровотеченте, и противоборствовать бользненным в принадкам в той женщины, которые кЪ сему поводЪ подали.

Поной. кровопуegauje,

воспрепятствовать слишкомъ великому изобилію кровей, то надобно содержать больную въ совершенном в спокойстви как в тълесном в, так в и душевномь. Ежели изобилие сие будеть чрезмврное. то должна она лежать въ постели на низкомъ згодовьт (и можно ей пустить крост изъ руки, смотря по возрасту, по телосложению больной и по усилію припадковЪ.)

Aisma-Инща.

Декокть " изъ кро-

Mubbi .

BRRKS.

Діэту должна она наблюдать легкую и прохла- в дительную; питаться ей можно похлеоками изв телятины изъ ципленка и съ малымъ количествомъ хляба: а пишь надобно декокт в из в корензев в крописы или лошакова уха (consolida major) или кровавника (millefolium), которой можно делать крепче или слабее, смотря по жав ирова- случаямь.

> Естьли же средства сти будуть недостаточны, приступить надобно къ вязательным сильнейшимъ, какъ-то къ катеху или Японской земль, къ жеасцама, хикв и проч.

Сін лекарства предписываются следующим в обра-

Возьми квасцово - - двъ драхмы; Японской земли - - одну драхму.

Влзательный порошокъ.

По Лашынь:

Recipe aluminis, - - - drachmas duas;

Terræ Japonicæ, - - - drachmam unam;

Разотри все вмѣстѣ; раздѣли на восемь или на девять пріемовЪ равныхЪ, или сдѣлай изЪ нихЪ восемь катышковъ, съ потребнымъ количествомъ розоваго сиропу.

Больная принимать должна по одному таковому пріему три раза въ день.

Женщины нъжнаго сложенія, коих вислудоко не можеть снести квасцово, должны вивето оных принимать следующее лекарство:

Возьми розовой настойки - - - одну унцію; Паудана ликвида Сиденгами - - десять капель. Смъщай вмъстъ.

По Лашынт:

Recipe tincturæ rosurum, - - - unciam unam;

Laudani liquidi Sydenhami, - - guttas decem.

Misce.

Больная можеть принять сей приемь въ три или четыре раза въ сутки.

Естьли от сих лекарство не почувствует жина съ она никакого облегчентя, то надлежить дать ей трит купорос- нымь шесть грановъ порошку изъ хины въ стаканъ непромъ краснаго вина, къ коему прибавить капель десять ку- въ винъ пороснаго эликсиру.

Сей пріємъ должно повторить раза четыре въ

ЧЛЕНЪ

YAEHB VI.

Разсижденія о місятных вровях в, или обо отишеній мвсятномв.

(Мвсятное отищение подвержено многимь перемьнамь, которыя показать весьма нужно, поелику какъ оныя должно почитать за прямыя бользни, то естьли женщины взлумають сами составлять себъ лекарства, что случается очень не релко, лекарства сін бывающь для нихь шемь вреднее, что оныя прошивоборствующь натурь, которая, какь ского шествуеть постоянно, достигаеть всегда до цели ея, хотя и спезями по видимому между собою прошивуположем-HAIMU.

Разноств . у нткоmophixh женщинъ.

ТакимЪ - то образомЪ находятся женщины, имъманая бы южія отищение сіе нісколько разь на одномы місяців; масячномъ другія, кои ждуть онаго по два и по три мъсяца; очищение иныя же, которыя по нёскольку только капель крови извергають каждой мъслув; нъкоторыя же наконець испускающія оной много въ продолженіи осьми, десяпи и пятнатцати дней, не чувствуя какъ тъ, такъ и друтія от в сего никакого себь безпокойства, и наслажлаясь напрошивь того всё здравіемь крыпкийь и постояннымЪ.

Sacmin mib-RIGOMON жногда про-**Межодинъ** ожизиение мисачное,

Истечение місятных провей не токно бываеть да, чрезъ чрезъ части дътородныя; многіе находили еще такихъ женщинъ, кои имъли сте чрезъ всъ другтя части півла; ибо двиствительно некоторыя женщины имели отищение мъсятное носомъ, глазами, ушами и оное кровотегение бывало у нихъ каждой мъсяцъ чрезъ части сти. У другихъже случалось, что кровъ шла ртомъ какъ изъ органовъ слинныхв, такъ и изъ десень. Последнія подвержены бывають харкакію или блеванію кровью періодическому; а первыя кровотеге-#110 a

иго, или ссанго кровію порядочно приходящему: наконець бывали такія женщины, у которыхь крові шла
дяже изь темя, изь щекь, изь грудей, изь пупка,
изь пахово, изь рукь, изь ногь, изь нальцевь и
проч. Вь таковыхь случаяхь дълается на сихь частяхь
нькоего роду опухоль воспалительная сь болью, изь предмекоторой кровь течеть сама собою, и оставляеть раствующіе
му, которая закрывается скоро, но каждой місяць місячному
онять открывается.

въ шанихъ Можно, правда, попышаться на отвращенте мв-случакъ. елтных в кровей и на приведение оных в къ естествен- Когда поному ихъ мъсту, какъ кровопусканаями изъ ноги и мъсячныя кровоносны ни банками или рожками накладываемыми провы безкъ пахама и къ нижнимъ конетностяма, такъ и полу-порядочныя ваннами теплыми, паромъ отъ теплой воды или де-довольно. коктами мягсительными и проч. Но ежели удавалось по не накогда инбудь имънь въ подобномъ случав успъхъ, то добно уже развъ шолько вначалъ и надъ дъвицами еще молоды- о приведеми; ибо когда примъчено будеть, что извержения син ни оныкъ чрез в тв части, чрез в которыл не должно имъ дъ къ чалашься, довольно ушвердящся, и когда подверженная стямъ онымъ женщина находится впрочемъ въ добромъ здо-нымъ. ровьт, то надобно остаться тогда въ покот, и не препятетвовать натурь исполнять ея намеренія, такъ какЪ ей угодно: она всегда дъйствуетъ благоразумнъе насъ.)

ЧЛЕНЪ VII.

О сильномб кровотегении и о теги изб матки.

(Подъ симъ именемъ разумъется всякое истече-что разніе кровавое чрезъ матку и влагалище или ложесна, не умъть доль зависящее ни мало отъ обороту месятнаго осищентя, словомъ и которое можеть случаться во всякое время жизни. кровотече. Ежели таковое истечение будеть велико, то назы-ніе? Томо IV. вается оно сильнымо кросотетениемо матки; а естым бываеть оно посредственное, но непрерывное и упорное, тогда тетью матки именуется.)

Пригины сильного кровотечения и теги изб матки.

(Непосредсывенными причинами провотесентя бывають вереды, раны, садна случающияся иногда внутри матки, вы родахо преждевременныхо и родахо трудныхо; или трещины приключеющияся оты обълей и шприцований чрезтурь вакихо, оты оцарапания ногтемь Акушера или повивальной бабки неискусныхы. Вы числы причины сихы надлежиты почитать и слишкомы великое разширение жило матотныхо, или весьма долгое время продолжавшееся разширение тыхы же самыхы жило, произведенное теслю изы матки.

Всв сїи причины болье еще увеличиваются отв чрезміврнаго жара создуха, жестоких припадково лихорадотных , частых в мощеблій, слишком в сильных в страстей душевных в, неумівреннаго употребленія полуванно, от в внезапнаго дійствія стужи, от излишно великаго употребленія любовных в забав в, от телодешженій утомительных в, от паденій и жестоких в потрясеній, от сильнаго крику, от чтенія громкаго, от растых чиханій, от настуг весьма долго бывающих в в поносі, от жиленія при испражненіи, от преждевременных родово, полипово или бородівоко со ростками в маткі, от в злоупотребленія лікарств весьма часто кровения конеців от в повторна гонять місятное; наконеців от в повторнемых весьма часто кровенуєхний из в ноги.)

Признаки сильнаго кровотегенія и теги изб. матки.

(Во всякомЪ сильном в кровотетени больныя бываютъ блъдны и унылы: пулься бываетъ медленный и слабый; руки и ноги бываютъ колодны. Охота къ

вав пропадаеть и желудоко варить худо. Часто лелаются такожь завалы во внутренности подбрюшіл. Когда больныя несколько постоять, то ноги у нихь начинають пухнуть. Кровь течеть изь матки по мере того, какь вы оной накопляется, или такожь вы ней сседается и запекается кусками. Когда поврежденіе довольно времени продолжится, то кровотесніє бываеть сопровождаемо сильными бёлями, чего не случается, ежели никакого поврежденія не будеть.

Вообще всякое сильное кровотегение из в матки вольни, почитается бользнию важною. Не рыдко сопровождает гуть ся оно худокровностию, содяною бользнию, Яглинскою быть скых какоткою и проч.; застарылыя же или приключающился дет темы женщинать пожилыть бывають весьма опасны; а шь, сильнаго проня зависять от какой нибудь порчи во внуныя. тренности матки, трудные всего выльчить можно.)

Пользование сильнаго кровотехентя и техи изб матки. мость

Когда женщина будеть страдать кровотегением постеми сильнымь и двйствительнымь изь матки, то прежде сильнаго всего надобно вельть ей лечь вы постелю, поколику ировотеченом бываеть тогда совершенно нужень. Лежать ніл. каньнаго покой бываеть тогда совершенно нужень. Лежать ніл. каньнаго покой бываеть тогда совершенно нужень. Лежать ніл. каньнаго покой бываеть тогда совершенно пужень, и постеля ел бою или изь состоять изь простаго тюфяка волосянаго или изь соломенника, потому что всякая перянал и больную в туховая постель, коел дьйствіе бываеть разгорячающее, совершенно противною къ тому почитается состоять одержимой сей бользій женщинь надобно всеьма ста- ел ностель постель, чтобы не дълать никакого движенія; даже на лобно воздержаться и оть того, чтобы не маться ей товорить, ежели токмо сіе возможно.

Тогда надлежить изв руки пустить ей кровь, нія, даже и тако на провопусканія повторять соразмірно дь-и не говотамь, тіжесложенію больныя и напряженности припадковь. Кровону-Т 2 Когла кровотетение матогное будеть сильное и угрожаеть неминуемою опасностью, то налобно лаже повторять сій кровопусканія чрезъ каждые четыре часа въ первые сушки, предполагая, что больная еще не совство пришла въ изнеможение.

ЛБКарешва Визіпіскь-HbIA.

Кровав-

поросной

Между тъмъ надобно давать больной черезъ часъ по при или по чепыре ложки соку раствий вязательных д. или шакожъ кашышекъ или порощокъ, въ предъидущемъ членв предписанный, и каждые полчаса вельшь ей пишь по небольшому стакану декокту изв дикой грети или некъ; кукроваеника (millefolium), въ которой положить канель вликсирь; восемь или десянь купоросного эликсиру, и немножсиронь изъ ко сирону изъ цълительной правы лошакова ука (сопоusameab- lida maior.)

ной правы лошакова ужа.

Обстоя-

требую.

ребленія

Больная не имфетъ нужды въ пищъ первые дни два или при; по крайней мъръ когда не будеть имъпь слабости, тогда надобно давать ей одинь бульюнь mельства, или отварЪ: Всякое питье ея должно быть холодное, нія лот. даже и самый бульюнь. Не нужно уже и сказывать. что вино должно быть совершенно запрещено, равно отверовь. какъ и всяктя пряныя вещи свойства разгорячающаго.

Давать оные должно жожодные . и воякое иишье.

Естьли случится, что больная падеть въ обморокд, какв - то сте довольно обыкновенно, то надобравно накъ но ей давать нюхать уксусв, тереть онымъ виски и проч., такъ какъ мы предписывали сте въ Томъ III, глав. 45 , \$ 9.

Холодная ванна для ногъ.

УкеусЪ.

Иногла сій вспоможенія бывають нелостаточны; и налобно тогда приступать кв лекалствамо наружнымъ. Можно вельть больной ставить ноги въ хололпримочча ную воду; прикладывать полотенца намоченныя вЪ вод компа- колодной водв на подбрюще и на лобковую кость; ной волы, самую матку шприцовать можно сокомо изъ попутиимее шари. ка, кропивы, лошакова уха, или уксусомо и проч.

цование.

Силь

Сильное кровотегение довольно часто сопровождается тегью изъ матки, которая особливо случается тогда, когда бываеть полипо или бородавка со иногими ростками, вередо, желвако или рако въ сей внутренней части. Въ такомъ случат надобно присовокупить предписанныя противу сихъ болт ней лекарства къ тъмъ, кои теперь совтованы; но токмо соразмърно силт теги сей, которая, какъ всякъ разсудить можетъ, требуетъ вязательныхо не столько кръпкихъ, какъ самое кровотегение.

Геть, последующая за сильным кровотечением понарства изъ матки, часто происходить оть ослаблентя се-противу го внупренняго члена. Въ такомъ случав надобно машки. брать прибъжище къ легкимъ крепительнымо, которыя употребляются внутренно и наружно. Между сими послъдними предписывать можно паръ уксуса, паръ ука вливаемаго по немногу на горячую сковородку, и ко сусной. торой пропускается кЪ маткв посредствомЪ воронки: на лобковую же кость прикладывань должно компрессы или пряпочки намоченныя в уксус холодном в, тряпочки и больной предписывать студени говяжьи, похлебку, обмоченкашицу изъ сорочинскаго пшена, яйца въ смятку и ныя въ унсустко. проч.; но не надобно советовань мяса и вина до лодномъ. тьх в поръ, пока стя теть не перестанеть. Нищеупотребленіе.

Когдажъ тех изъ матки случается такъ, что прежде оной не было сильного кровотеснія, и когда она будеть бользнію начальственною, то надлежить сльдовать тому же самому пишеупот ребленію, и предписывать ть же лька рства, какія совътованы противу кровотеснія, наблюцая строго, что кровопусканія должны быть размъряемы по степени сей теги.

Вообще всв кровотегенія почишающея бользнями сін бользвесьма важными и требующими великой осторожности на льчить Т 3 вениною по самому свойству лекарство влательных, какія для осторожно- них в нужны: къ врачеванію оных в потребны позна- нія п прозорливость, кои трудно во всяков человъ- ввать ис- къ найти можно, слъдовательно и должно въ тако- нустаго вых в случаях в имъть прибъжище къ врачать, а при- томъ и искуснымъ.

Средетва, како предупреждать сильных кровотегения и техь изб матки.

(Когда удастся пресёчь кровотегение сильное и тесть изб матки, тогда стараться надобно о воспрепятетвовании тому, дабы крови си опять когда нибудь не пришли: слёдовательно и должно воспретить больной всякое тёло движение сильное; предписать ей лежать въ постели сколько возможно болёе
чрезъ нёсколько времени; умёрять свои страсти, воздерживаться отъ должностей супружескихъ и быть
осторожною въ употреблени вина и кушанья мяснаго.

Минеральо ныя воды желёзновашыя»

Ripma.

Надлежить предписать липеральных воды жельзноватых, какь-то де форжскіх, Провинскіх, Пассінскіх (*) и проч: употребленіе молока можеть
весьма быть пригодно. Давать же надобно поперемынно молоко коззе, ослигзе и коровге, которое мышать
пополамь сь наливкого изъ травь раноцілительных в
(infusum herbarum vulnerciriarum), когда хочешь усладить
к ровь, укрынить сосуды и такь сказать заживить ранки.)

ЧЛЕНЪ VIII.

О полипъ маточномо и о полипъ влагалишномо.

Свойства сихЪ боавзней. (Нодъ именемъ полипа матотнаго разумъется наростъ мясистый или ноздреватый, зараждающійся въ вамомъ существъ матки; а влагалищнымъ поли-

^(*) Описание симъ подамъ сосвязено будень въ Томъ V сего лън. бинка:

помб называется тоть, который делается внутри самаго влагалища.

Признаки полипа матогнаго и влагалищнаго.

(Матогизій полипо садится обыкновенно или на мъсто, на днъ сего внутренняго тлена, или въ шейкъ, или на которомъ краю его устья. Въ обоихъ первыхъ случаяхъ причинает по- нясть онъ всегда сильное к ровотесейс: по сему - то лапъ мань мани нужно весьма щунать женщинъ при всякихъ крово- точный. тесеніяхо упорныхъ, потому что матогий полипо можеть иногда быть оны причиною, и что въ такомъ случав искусный и опытный лъкарь скоро можеть избавить от него страждущихъ. Въ послъднемъ же случав кровотесейя не бываеть, потому что устье матки не столько отверсто, какъ въ обоихъ перъвыхъ.

Не возможно примътить варуть первых усиливаній маточаго полипа, коего основаніе находится на днъ матки или вы шейкы сего тлена внутренняго: потребно, чтобы онь, возросши мало помалу, дошель до устья, и разширивы оное, достигнульбы до самаго влагалища, гдъ находя мысто кы большему распространенію, принимаеть обыкновенно виды груши. Но полипа, который зараждается вы усты матки, гораздо скорые примытить можно; посредствомы ощупыванья тотчась открыть его не трудно; равнымы образомы в полипа влагалищный легко примытить можно.

Сти два последние, а особливо власалищный не венеричеотть чего инаго происходять, какь оть яда венерите еной ядь
скаго. По сей причине весьма нужно распросить боль
бываеть
ную, и заставить ее признаться вы томы, что не причиною
имыла ли она Венеритеской бользни, или какихы нибудь симы полиизы признаково предложенныхы вы главы предындущей.

Полипы матогный и влагалищный, довольное приращенте принявште, могуть легко обмануть нась, какъ то многіе почитали их в за выпаданіе матки навыво рото; да и часто въ этомъ ошибиться мажно. По сей-то самой ошибкъ нъкоторые Авторы сказывали, что многія женщины дегко выльчивались от выпаданія матогсм вшивали наго, и нъкопторыя даже понесли послъ совершеннаго съ выпада- отнятія сего внутренняго члена. Но таковыя мнимыя выпаданія матогныя были, сказываеть Г. Яевретв, большею частію не иное что, как в матотные полипы, сопровождаемые всегда кровотегеніями болбе или менбе сильными, иногда безпрестанными, а иногда въ извъстное время приходящими.

MHORIC ихъ часто ніемЪ мишки.

Признаки DASANYAIO . пріе выпа-Bopomb.

Знаки, по которымъ примътить можно выпадание матки на выворото суть чрезмърная чувствительность паніе маш. в в пухлин выходящей из вуда детороднаго, ичрезвычайни на вы- ная свободность въ выправливании оной, хотя она опять послъ выпадаетъ скоро, естьли не употребляемы бывають средства способныя къудержанію ея на мъстъ; а полипб напрошивъ того бываетъ совершенно нечувствителень, да и вправить его совстмъ не возможно.)

Пользование полипа маточнаго и влагалищнаго.

Перевязка, искоренеwie .

(Великимъ лакарствома прошиву сихъ полипова почитается перевязка, посредством в которой их вовсе искоренить можно. Желали бы мы подробно изъленить и описать способы, по коимъ поступаль славнъйшій Акушерь Г. Левретв при употребленіи оной: но какъ не можно бы было насъ разумъть иначе, какъ съ помощію рисунковь и чершежей, то мы и отсылаемь лекарей къ темъ, которыя старанјемъ сего искуснаго Врача выразаны и помащены при сочиненіяхь изданныхь имь о сей матеріи.

Мы удовольствуемся сказанісмь, относительно къ полипу влагалищиому, что какъ скоро онь дъйствительно приключится отъ Веперитеской бользии, то и надлежить начать съ уполпребленія меркурія, по способу, какой пригоднье будеть для больной, и которой найти можно въ у 7 предъидущей главы. Не ръдко при таковомъ пользованіи не нужно бывало употреблять никакого инаго средства, даже и самой перевязки, которую надобно однакожъ принимать въ помощь, какъ скоро опухоли полиповыя будуть оставаться и при самомъ употребленіи меркурія.)

ЧЛЕНЪ IX.

0 6 в ля х 3.

Месятныя крови могуть равнымь образомь быть безпорядочными по качеству своему, такъ какъ непорядочны бывають и по самому количеству. Бользны, называемая обыкновенно fluor albus, или были, есть весьма общая и слъдствія имветь иногда очень опасныя у женщинь сложенія ньжнаго.

(Зёли, бользыь встрычающаяся единственно вы канія жень больших в городах в, а притом в и очень общая, при- щены имы ключается дывицам в, замужним в женам в и вдовам в. Мстечен с с е начинается обыкновенно на двынадцати и или четырнадцатильтнем возрасть. Однакож в бывали и так примыры, что дывушки осьми и даже четырск выт в чувствовали первые признаки сей немощи. По сему и не льзя сказать всегда, что были суть мысленыя крови различествующія токмо их в качествами; поелику весьма молодыя дывушки, у которых в они примычаются, не токмо чтобы им в имыть мысленыя крови, гораздо позже других в носить их в обыкновенно начинают в. Впрочем в и самая беременность от в них в не свобождает в, так в как в Золо 1V.

во время оной отв мёсятных кровей женщины бывають свободны. Однакожь истечене сте вообще перестаеть тогда, какь мёсятныя крови приходять, и бываеть оно то непрерывное, то пертодитеское или вы извыстныя урочныя времена приходящее. Иногда предшествуеть оно мёсятному отишенто или оное сопровождаеть; и у многихь возвраты его бывають непорядочны такь, что даже мёшають и самымь пертодамо кровей мёсятныхо.)

Признаки бълей.

Истечение, извыстное поды именемы былей, не всегда однакожы имветы цвыты былый; иногда бываеты оно блыдное, желтое, зеленое, черноватое и проч.; иногда бываеты оно прозрачно и свойства вджаго а вы другихы случаяхы гадкое, вонючее и проч. Страждущий ими женщины имыюты цвыты лица блыдный, чуветы у ими боль вы спины и отвращение оты пищи; ноги у нихы пухнуты и проч.

Сверьх в таковых во признаков женщины чувствують еще великую слабость во всемь тель, тагость вы поясниць, ломы вы ногахы, тоску, боль вы
желу дкв, которую большая часть приписываеть груди, и которые признаки, будучи соединены сы сильною болью вы спинь, заставляють их в думать, что
они сахотны. Мны случилось даже видыть таких в лыкарей, а иногда и самых в Медиковы невнимательных в,
которые вы столь опасномы мныти их в утверждали.
Мога их в оставляеть отсёд выпь того же самапо свойства, и проч.)

Пригины бълей.

элоупош- Бользнь сін происходить вообще от в осларебленіе питья водянаго. Бользнь сін происходить вообще от в ослапитья воженова вокросей, от в недъйствия и излишняго употребления гаго, кофи или другаго питья водянаго.

(Надобно прибавишь еще жизнь сидячую, причи сидячая ну главную, которую должно приписывать великому чи-жизнь. слу женщинь, стралающих валями вы городах в; привычку сидьть очень низко, привычку свойственную привычке женщинам в, и которая, дылая застоивающимися влажений ности вы сосудех ватки и сам по влагалища, способно, ствуеть кы продолжентю былей, кои, по наблюдентям в славнаго Гронхина, переставали оты одного внимантя выше.

Еще важная причина, которую знать надобно, Слабость и не редко способствующая сильно къ белямо, есть желудка слабость желудка, которая производя худое варене пищи и соки худо пріуготовленные, причиняеть ослабленіе во всёхь органахо, а наппаче въ маткт.

Трудные и преждевременные роды, огортение годы трускорби душевныя и проч., не рыдко бывають поводомы дные и вы быламо, или кы продолжению оныхы способствують.

Могуть такожь они произойти оть остроты панготная империмой, равно какь и оть бользии Венерисской и Венерикота однакожь и не льзя ихь называть гопорресю, ко ческая бользие.

торая имветь совевый другое начало и другое себы ивсто. А сего-то самаго и не выдають ныкоторым женщины, кои думають всегда, что имыють были, когда страждуть гопорресю. Весьма достовыть, что искаженное повыствование, какое дылають они о своемь состояни и обоюдность, коею прикрывають оное, представляють вообще одни токмо сомнытя и неизповыдимости; и ежели къ таковымь затруднительностямь прибавить еще, что сти двы бользии не рыдко между собою встрычаются, то всякь почувствуеть, сколько трудно вь таковы случаь узнать истинну.

За шастіє однакожь почитать должно, что каждая изъ нихъ имъетъ особенные свои признаки.

Признаки ONIANAJIOщіе бын Den.

ВЪ быляхо истекающая матерія бываеть вакая. и вонючая только тогда, когда бользнь сія булеть оть сонор- стародавняя; а въ гоноррен напротивъ того въ весьма короткое время становится она желта, зеленовата, гнойная и в дкая, но очень редко вонючая. Ввли обыкновенно прерываются во время тегенія місятных д кровей; а гоноррея напротивъ того не перестаетъ и во время сего масятнаго отишенія; только машерія не въ такомъ выходитъ количествъ. Впрочемъ голо ррея сопровождаема бываеть жаромь моги, могерезом в и зудомб, и мъсто свое имъстъ наиначе около уриннаго прохода: были же выходять изв влагалища и матки. Гоноррел, оказывающаяся вскорв послв нечистаго сообщенія, проходить, ежели токно не будеть запущена, въ продолжении дней отъ сорока до пятидесяти, уменьшаясь подъ конецъ весьма ощущитель. нымъ образомъ, какъ то мы показали выше на стран. 10 и 11 сего Тома; а бъли напрошивъ всегда бывающъ упорные и по ныскольку лыть продолжаются.

Of mosпо ноимЪ трудно бываетъ ABRIMB 68. ZH.

Бели, текущія вы маломы количествь, ньскольтельства, ко дней прежде или посль месятных в провей, и несопровождаемыя никакою чувствительною болью, ни мало не онасны; но когда теченте сте бываеть въ довольномъ изобиліи и безперерывно, когда застарветь и станеть причинять раздражения, тогда должно опасаться последствий онаго. Въ семъ последнемъ случав бользнь сія почитается за самую упорную, а особливо въ женщинахъ дородныхъ, которыя отъ нее чаше всего къ дъпорождентю дъляются неспособными. Еще такожь трудиве выльчивается она посль, какь месятное отищение совствы минуется; наконець почитается она неизцилимою и тогда, когда бываеть наслиденная.

Вели ввергають тасто вы сухотку, или произволить вольни, ранки вы маткв, могущія причинить кровопистенія весь нои быть могуть на опасныя и даже смертоносныя.

Наконець, когда истечение сте продолжалось Случаи, весьма долгое время и сделалось какьой обычайнымь, вы немхы то бываеть оно тогда нужнымь для многих женщинь не должно худосогных в, коихы кровь и мокроты симь способомь лей. очищиются оть матерій поврежденных в, которых в истокомь становится матка, служа тогда вмёсто фонтанелла и имёл всё свойства онаго; а таковое истечение, не рёдко и весьма изобильное, можеть предохранять сти внутреннія части, почему и не безь причины должно опасаться остановлентя онаго.

И такъ ради сего обстоятельства надобно быть крайне осторожнымъ въ пользовании сей бользии. Женщинамъ находящимся въ семъ послъднемъ случат не должно никакъ помышлять о лъчении себя отъ бълей, не посовътовавшись прежде съ Врачемъ искуснымъ. Чтожъ касается до прочихъ, то имъ надобно слъдовать въ точности предлагаемымъ теперь наставлениямъ, и естьли будутъ они имъть твердость и постоянство во время пользования, то ръдко случиться можетъ, чтобы они не изцължлись.)

Пользованів былей.

КЪ опраженію сего истеченія надобно больной телоденимѣть столько твло движенія, сколько ея силы мо-женіе.
гутЪ того позволить, не приводя однакожъ себя въ
утомленіе, и не должна она много лежать въ постели; пищу надобно ей употреблять твердую, пита-пита,
тельную, но притомъ и удобоваримую въ желудкъ;
пить можетъ она хорошее вино, какъ Порто или Бор-вино вердо, и проч. пополамъ съ водами Пирмонтскими или
У 3

Бри-

WE'VE WE'VE Masecmino-Bage

Бристольскими пли съ водою известковою; и наконенъ лолжно ей совсемь воздержаться оть каго и кофи.

Robins-ВІСЛЬНЫЯ можлебии. Крвинае ommaphi. MOJOKO.

Многократно случалось мнъ видъть въ сей боавзни превосходныя дыйствія происходящія оть крыпишельных в похлебок в или весьма крыпких в ошваров в. равно как в иногда примъчал в я, что молока, употребляенаго вивето всякой другой ниши, довольно было одного кЪ излачению оной.

EHH2.

BRHRE.

Ипекану-

SHES.

Ревенв.

Какъ же скоро надобно будетъ приняться за лекарства, то я не нахожу изъ нихъ лучшаго кром которую в подобном в случат должно принимать въ самомъ существъ, а именно, въ порошкъ. Въ жаркое время великимъ вспоможентемъ служинъ Жолодиза холодная ванна. (Но почти всегда нужно напередь произвести нъсколько отищений, даже предписать гранъ авънатцать или пятнатцать рвотнаго кореню ипскакцанги, а особливо когда примътно будеть, что причиною болъзни есть слабость желу дка и нева ренте въ ономъ пищи. Для слабительного должно предпочесть ревень. На пріемъ дается его по драхив въ порошкъ или въ катышкв. составленнаго съ сиропомо терносливнымв. Кровопускание в в сей бользни почитается нужным вединственно тогда, когда она произошла от в остав новки кровей масятных в, но сей случай бываеть очень ръдко; а притомъ еще и не можно предписывать кровописканія кромь как женщинам в молодым и сложенія крыпкаго: во всяком в же другом в обещоящельствь енание по оно совершенно противно. Ибо какъ скоро бъли протая быль исходять от яда цинготнаго или венеритескаго, то

не иначе и лечить ихъ можно, какъ теми лекарства-

ми, каковых в требують сін последнія бользин, о коихъ предлагали мы въ § 1, глав. 35, Тома III и въ

§§ 7 и 8, главы 49, сего Тома.

Жровопучин завсеешъ про-

MIMBHO,

Bec-

Весною въ 1776 году выльчиль я одну дът и у аващиатильтнюю, предписывая ей телодвижение: маријальную или посредствомъ железнаго ядра отваренную воду, съ которой она пополамъ мешала и виноза споломь; умовенія колодныя и порошокь эссенціальной соли изъ хины и резеню, которой она принимала по однажды въ день въ первой ложкъ своей похлебки. Целые при месяца продолжала она сте пользованте. Я выльчиль такожь и других водами Пассийскими и симъ же самымъ порошкомъ. Равнымъ образомъ и водъя Вальскія и де Форжскіх в семь случав полезными починга инска

ЧЛЕНЪ Х.

О времени когда женщины перестают имътъ мвсятное отилисние.

Время жизни, въкоторое месятныя крови совсемъ отходять, важно бываеть для женщинь, равно какь и то, когда оныя начинаются; ибо заподлинно примъчено, что перерыв осищения обычайнаго, в каком в бы то маломъ количествъ ни было, легко можетъ перемвнишь все телосложение, и не ръдко даже самую жизнь подвергнуть опасности. Какъ- то видимъ ны. что многія женщины впадають вь бользни приводящія въ измождение или и умирають около сего времени (2);

(2) Страшное сте заключение по прастию выходить несправединю, гда женпо крайней мърт во франции. По метрическимъ книгамъ разныкъ го- щины перодовь, и между прочими Авранша, чио вь Нажней Нормандів, ис. рестають пытано, что возрасть отв сорока до импидесяти явть, о которомь изсить многіе т ердать, бултобы столько бывлеть стрішень для женщинь, мьсячное не менте прашическимъ почесться можеть для нихъ какъ и для муж очищения, чань; посятку съ дестропо до нашидесящильшняго возраста въ для нахъ продол : слін сортко бина то гремени, умерло поимо семь сощ осьмила, не столько цать женщия в прошиву семи соть шестилесяти человань мужескаго бываеть полу: сатдовательно время перерыву месячимих просей не имбеть опасно толикаго вліянія, накъ нъкоторые себъ воображають, въ смертность канъ- то женщанд. Смощря соврание навлюдений о волбанико и твлосложениямь и вкоторые эпидемическихь, Г. Депекка. де ла Клотюрь,

думающь.

но напрошивъ тв, кои переступаютъ за сей кругв времени, не получивъ долговременной бользни, часто пріобративоть здоровье лучшее и крапче того, какое прежде имвли, и доживающь до самой глубокой староспи, наслаждаясь крыностію и силою чрезвычайною.

Пользование, какого требуеть перерыва мысячного отищения, когда оной слугается внезапно.

КакЪ скоро мвсятныя крови пересшаетъ носишь Mumeviloтребленіе внезапно женщина сложеніемо дородная, що налобно убавить ей несколько из пищи обыкновенной и оставить наипаче яства питательныя, как в. по мясо. лица и проч. Она должна имъщь довольное твлолешке. TEXOXBUженіе нте и очищать желудокъ свой, принимая разъ или два въ недълю по немногу ревеню или глеры пикры, п. Ревень и тіері-пик-е. священной тичктуры, настоянной в виноградномв p3, винь или въ солкв.

CAYTIN. въ кошерыхЪ нужно прелдълаемыя прижига-MieM T.

Часто случается, что дородныя женщины имъють около сего времени накотораго роду раны на лодышках в ногв, или на других в частях в тъла. Написывать добно всегда почитать сти раны за весьма важныя, отверетія и удерживать оныя, или замьнять им'в истеченіств некусственнымъ, какъ. то заволокою, ранами дълаемыми прижиганиемой и проч. Но дорого послъ плантянъ женщины, которыя хотять, чтобы высушены были сти искусствомъ дъланныя раны; пбо какъ скоро оныя будуть остановлены, то часто начинають страдать бользнями острыми или хронитескими, т. с. долговременными, от в коих в он в и погибають.

Какія сушь CAMBIA обыкновен--RECKINGER щихь оть

(Большая часть бользней, следствие столь общее перерыва мисятных кровей, зависинь гораздо меныя при нъе от в причинъ естественных в, какв то сте нокачины 60- зано въ предъидущемъ примъчанти, нежели отъ польявыей. зованія, каковому женщины подвергають себя вы семь ne piпериодь жизни. Естьми бы женщина от в сорока пяти того с недо нятидесяти нятильть не стала отворять себь часто гла женкрови, и принимать много славительныхв; естьли бы пестають ложилалась она терпъливо того времени, когда бы са-имътьочина натура начала показывать ей то или другое изъ жение мусихъ средство, то подумала бы, что подвергаетъ слиново себя бездив бъдв, да и самыя пріятельницы ся не преминовали бы кЪ безпокойствіямЪ ся присосдинить выговоровъ жесточайшихъ.

Думаль я, что на всю жизнь поссорюсь съ одною чему пол женщиною, которая въ сихъ летахъ следала себе вергаются планЪ, чтобы каждой мъсяцЪ отворять себъ кровъ и женщины, принимать слебительное. Хотя женщина сія послъдовала щів въ сему обыкновентю своему, не чувствуя от в того ни- такомъ какого припадка, но случилось однажды, что на дру случав по гой день послъ принятия слабительнаго месятныя крови обыновен показались, а притомъ въ весьма маломъ количествъ про-ному ! тиву обыкновеннаго, хотя впрочемь у ней бывали они всегда весьма сильныя. Таковое извержение, продолжавшееся токмо несколько минуть, было сопровождаемо сильною лихорадкого, чрезмърною болью въ головь, въ спинь и въ желудкь, тоского, регтою и сильным в истечентем в бълей. Утолив в всв сти припадки, хотвав было я дать ей возчувствовать всю несоотвътственность и опасность подобнаго поступка; но она столько была увърена о дъйствительности онаго, что не возможно было вдругъ убъдить ее: даже и покинуль я ее, думая совершенно, что съ нею никогда не увижусь. Однакожъ размышлентя, которыя она въроятно следала, побудили ее оставишь на время свои средства; и проводивши мъсяцевЪ шесть въ добромъ здоровь безъ провопусканія и слабительныхв, она стала звать меня однимъ изъ лучших друзей своих В. На моих В руках В нач ходишея шеперь и другая женщина, которая достиг-Jond IV. (c) нувЪ

нувь до той же самой эпохи, имъла подобное намъне. ніе: однакож в была она столько осторожна, что не хошьла дълать ничего безЪ потребованія прежле совъта, и въ течени девяти мъсяцевъ, какъ перестала имъть мъсятное отищение, только и чувствовала она. да и то въ различныя времена, два поноса легкихъ. ошь которыхь и приняла два систительных для украпленія желу дка.

Не налобио давать лъкарствЪ ить нашу-

Естьми то надлежить починать за законь пожикогда черпнутый въ природъ, чтобы никогда не предписывашь лекарешев, кроме какв при ся показаніяхв. кроменакь избавляющих в необходимость оных в то по поназа- чегожь бы женщинамь при отност месятных кровей ры, даже думать, что могуть преступить ее безь наказанія. нириотно Подлинно, находятся такія женщины, которыя имісв мыску ють тогда нужду вы кровопускания и есть другія, жых в кро- коим в надобно давать тистительныя; и есть наконець такія, которымь должно пускать кровь и давать систительное поперемьню: но чтобы всыть безь разбору удосшовърить себя, будто бы сте для нихЪ есть необходимо, то сте противоборствует в разнообразному шествію натуры, а следовательно и самому разсудку.

Опиносъ мъсячныхЪ Кровей самЪ по еебъ не есть бодъзнъ. Одни обстоявъ конкъ онъ требуemb Abжаренавъ.

Относо масятныхо кросей сань по себа не можеть почесться бользнію; онь есть дыйствіе такь же естественное, какъ и линяние волосъ, палание зубовъ и проч. зависящее от возраста. Истинна стя открывается нежду женщинами простонародными и крестьянками, между комми не видно почти совстмъ больныхъ тельства, кромв только твкв, которыя вели жизнь весьма безнорядочную, и которыя чрезъ то испортили крось. потому что перерыев масятных кровей становится для них в перерывом в такого истечентя, посредством в котораго вмокроимы очищающея от встхв тахв началь.

чаль, кои ихъ повреждають Симъ-то женщинамъ прижигапошребны лекарства з и по діэте недавно предписан-ніемь савной, по діэтів, говорю я, которой следовать должны верстіе. всь женщины безъ изъятія, прижиганиемо следанное отверстве есть нервое, а не ръдко единственное средство, какое токмо употреблять должно; но таковымъ женщинамъ надобно блюсти оное чрезъ всю ихъ жизыь.

Обеременности.

Хотя беременность и не бользнь, однакожь бы- веременваеть она часто сопровождаема различными принадка- ность не ми, а пришомъ и бользненными, заслуживающими вниманіе, и требующими иногда некоторых в лекарство. она подвер-Правда, есть такія женшины, кои здоровье бывають, жела быкогда беременны, нежели какъ во всякое другое вре-паднамъ, мя; но женщины сти великаго числа не составляють ком тре-Большая часть из в них в раждает в в бользни, и чув. бують ствуеть некоторые припадки почти во все время иногла жекарешав. ве ременности.

Однакожъ и подвержены бывають онъ въ стеременвремя очень немногимъ бользнямь опаснымъ, естьли ныя жеттолько изключинь изъ того роды преждевременные. вержены Чего для мы и употребимь особенное внимание въ вызають разсуждении сего случая, описанияго въ у слъдую-немнощемь; поколику онь обыкновенно бъдственнымь бы гимь 60ваеть для рабенка, а иногда такожь и для самой ма таккимь. тери,

ЧЛЕНЬ І.

Признаки беременности.

(Прежде показанія бользней, коим в подвержены знаки вебывають женщины беременныя, ны предложимь сперва ременно-CIRH CO.

мнительны бывають даже до четвертасо мъзда. о знаках в самых в несомивиных в, по которым в познается беременность. Показали уже мы вы примъчании 2, Тома III. главы 32, что бывали такія дівки, которыя по важным выставить беременность за водяную больнь ва полбрющии: другія за остановки месятных кровей и проч. в в намерении снисканія лекарства, от в коих в бы могли онв выкижуть, как в - то мы сделали о сем в замечание выше на стран. 136. сего Тома. Многія такожь и женщины за-. мужнія, которым в не чего уже таиться, бывають въ самой величайшей неизвъстности въ разсуждении своего состоянія, и подвергаются часто опасности по елиному неведению: следовашельно весьма важно иногда имъть о семъ надлежащее познание; да и подлинно за нещастве почитать должно, что знаки беременмости столь безвизвъстны св минуты зачатия до четвертаго мъсяца.

м теячных крови останавливаются вообще вовремя беременности, но не всегдаБезъ сомнънга случается обыкновенно, что женщимы, которыя понесуть, перестають имъть мъсятное отищенге; однакожъ встръчаются изъ нихъ такія, кои въ первые мъсяцы оное имъють, хотя въ гораздо меньшемъ количествъ: но нъкоторыя не перестають даже имъть оное и во все время беременности.

Отвращенте от в пици, непорядочный позыв в на вду; прихоти, тошнота, или рвота, бывают в еще признаками, свойственными большей части женщин в беременных в в первые м всяцы. Однакож в много находится и таких в, которыя от в сего бывают в совершенно чужды, и кои все время беременности проводять не чувстуя ни мальйшей перем в почему само благоразумие требует в не объявлять прямо прежде четвертаго м всяца, времени, в в которое знаки беременности становятся гораздо извъстнъе. Надобно до того времени, а особливо с в женщинами подозра-

тельными, удовольствоваться въ случав, когда был онв потребовали лекарство, предписывантемъ имъ токомо легкихъ, и которыя бы не могли причинить врежда ихъ состоянтю.

Но на четвертомъ мѣсяцѣ не трудно уже раз ложные не личить беременность: брюхо начинаеть быть весьма четвертримѣтно: пухлина, какую оно представляеть, от томъ томъ мъз другихъ различествуеть, какъ выдавшеюся онаго часъцъ, стію около пупа и линіи бѣлой, такъ и разными видами, какіе оно принимаеть по движенію рабенка; движенію почти ощутительному въ сіе время: груди разлуваются и начинають больть; сосокъ перемѣнаеть цвѣть, и становится иногда блѣднымъ; молоко подаеть нъкоторые знаки своего существованія, и проч.)

Ч Л Е Н Б III.

Пользование припадково, какимо подвержены: женщины:

Веременныя женщины страждуть часто жгу-каргільчимь жаромь вь желудкь, или такь названною нами гіз, сода, кардіалгісю и содого или жельзомь горятимь, о наи горячемь предложили мы вь главь 44 Тома III, гдь пока-льзо. зань нами и способь, какь укрощать сей припадокь.

Еще подвержены бывающь онв во время беремен-тошнота и и ости а особливо, вначаль, тошноть и реоть. Но гвота, равнымь образомы показали мы вы члень IV, § 6, главы 22, Тома II, смотри стран. 463, какь отражать сти припадки.

Боль головная и боль зубная, много мучать жен- воль голова. щинь беременных в. Вы первомы случай обыкновенно ная и зубыможно имы помочь, содержа брюхо ихы свободнымы; давая имы всть тернослиев, винныя ягоды, петеныя ябло-

яблоки и прот. Но когда боль будеть весьма жестокая, що должно приступинь къ кровопусканию. Чтожь касается до зубной боли, що мы отсылаемъ къ сказанному нами въ главъ 27, Тома III.

(Присовокупимъ токмо, что славный Гелеецій совътоваль вы семь случав беременнымъ женщинамъ временемь отворять себь кровь изъ десень ногтьми, ли или зубочисткою: ибо симъ простымь и легчайшимъ способомъ предохраниль онь зубы у Королесь, коел быль онь тогда врачемъ и у многихъ Дамъ придворныхъ.

Г. ле Руа, Членъ французской Академіи, сообщившій мнъ сей опышь, приписываеть оной госпожь Гелвеціи, вдовь знаменитаго Автора книги о разумь.)

Жашель, вапоръ или недержаийе мочи и рроч.

Могли бы мы упомянуть о многих в припадках в, сопровождающих в беременность, как в то о кашлв, о трудности дыханія, о запорв или недержаніи моги, и проч.; но поелику говорено уже было нами об воных в в члень IV, \$ 2, главы 20, и \$\$ 2 и 3 главы 22, Тома II: то мы и почитаем в за излишнее здысь говорить болье.

(Чтожь принадлежить до женщинь беременныхь, находящихся вы Вене ритеской бользни, то надобно льчить ихь во время беременные роды и смерть самаго младенца, только бы дълано сте было вы первые шесть мысяцовь. Естьми же времени пройдеть болые, то надлежить ожидать родово, и тогда пользовать вывсты мать и рабенка, какы то сте предписано вы главы предындущей; смотри у до член. П, и у в; и такы какы предпишемы ниже вы у 16 слыдующей главы, вы которой предложено о Вене ритеской бользии малолытимов дытей.

ЧЛЕНЪ

члень III.

О томб, какимб образомб вести себя должны беременных женщины даже и тогда, когда не сувстують никакого принадка.

(Беременных женщины, неподверженных никакому припадку, ниже бользнямь, о которыхь теперь говорено было, должны, хотя бы впрочемь были онъ и здоровы, содержать себя съ великою бережностю.

Ивкоторыя изб них имвоть нужду въ крого время, непусканіяхв, да и время, въ которое надлежить от гда долже. ворять имъ кровь, есть трети, седьмой и девятой провы въ мъсяцы; но не льзя никакъ ошворять крови всемь беременноженщинамъ беременнымб. Поелику большая часть крово- сти. жусканій, делаемых в женщинамь, вы семь состояніи предписывается болже по принятому обыкновению, нежели но необходимости. Ежели беременная женщина кровопуне чувствуеть ни боли въ поясниць и въ почкахъ, ни скание не щемоты или давленія вв груди, ниже боли вв гор-нужно ль, или бользии зубной, головной и проч: по не имь щинамь ешр она нужлы вр кровопусканий з да и кровь з кошо-беременрую отворяють ей такимь образомь безь всякой нотре-нымь. бносии, способствуеть единетвенно къ ея ослаблению номорыхъ или къ родама преждевременныма, а особливо есть-должно ли она крепкожильна. Я видья в множество шаких в жен. без в того щинЪ, кои нъсколько разъ родили, не отворяя себъ никогла крови.

Сказанное шеперь нами о провопускантах дол-время, неженешвуеть равным в образом в разумыться и о тисти- гла давать метьных. Гиппок рата запрещаль давать слабингельшья женщинам в беременным в в первые три или че- въ беретыре изсяца их в беременности, так в как в и на спо менюени. сяхь: почему многія и раскаявались весьма часто, когла сте наставленте нарушали.

И такъ естьми примътно будетъ, что жен-Что надобно являть, щина въ первые мъсяцы беременности потеряетъ охокогда ока- ту къ пищъ, или будетъ у нее языкъ нечистъ, отрыжка, поносв и проч: то надобно стараться припризнаки. спойнымь пишьемь, или легкими украпляющими жеmpe6 v10 щіе упот-лудоко лекарствами разбивать сін припадки, и доребленія реоления слабитель ждаться пятаго или нестаго мъсяца, дабы дать слабительное легкое въ случав, естьли бы оно еще первые мъ было нужно. @ H bl's

ипребленіе

MBIR WIL

ТТ ЛОДВИ-

слей и

спокой-

AOAKHDI. онт убы тань печа-

жи и всянихъ сидь-

страстей.

болбе или

вер:нена бываеть

Каждан

ныхъ

emo.

Во все время бе ременности женщины должны удо-Пищеупо влетворять своей охоть къ вдв, но токмо сивальми для бере- удобова римыми вб желудкв, и лучше имъ употребляпь пищу чаще, нежели вдругь навдаться чрезменныхЪ женщив. чурь много; ибо недаренія желу дка, чему онв довольно Сивди легбывають подвержены, могуть навлечь самые бъдственные иія и употебляе- припадки. Надобно имъ имъпъ болье твло движения во все время беременности, а наппаче начиная съ четвертаго мъсяця. Весьма полезно для нихъ шакожъ, чтобы женіе раз. быть веселым и имвть дух спокойной. Всячески •тяніе мы- должны онт избъгать случаев в къ огорченію и печали; поелику нешь ничего для нихь опаснее, какь полобсте ду- ное прискорбие; да и во обще всякия сильныя страсти завсегда бывають для нихь бъдетвенны.

О выкидывании или преждевременных в родах д.

Каждая беременная женщина болье или менье находится въ опасности отъ родово преждевременныхд. Следовательно и должны оне брать все возможных беременная предосторожности къ предупреждению сего опаснаго случая, поелику оный не токмо разслабляеть таломенье под- сложение, но еще содълываеть женщинь подобному злоключенію подверженными и въ послідованіи.

Прежде-

Преждевременные розы могуть случиться вопасноеши всякое время беременности; но обыкновенные полверовы рожены онымъ бываютъ женщины на второмъ или ждеврена прешьемъ месяце: однакожъ выкидывающъ иногдаменныхъ онв въ четвертомъ или и пятомъ месянахъ. BDEMR 6eременно-

прежие»

временные ролы на-

зываюшь заносомЪ

мымъ зарождені-

Когда преждевременные роды случающся въ пер-сти, въ вые два мвсяца, то называють их вообще миимым в которое зарождениемв, или, какъ говорять женщины, зано-вынидысомб; естьми случатся они послъ сельнаго мъсяца, вають. тпо рабенокЪ можешЪ жыть, какЪ скоро о томЪ прило Когда жено будеть надлежащее попечение.

Ч А Е Н Б I.

Присины выкидыванія, или родово преждевремен- или мни-HB6X8: -

Самыми общими преждевременнымъ родамъ при-емъ. чинами почитаются смерть рабенка, слабость матери, ослабъние волоконв, сильныя испражнения, чрезмърное телодвижение, напряжения силь къ полнятию чего нибудь весьма тяжкаго, или къ доставанию вещей очень высокихь; рвота, кашель и стягиванія гленовв судорогого: удары полученные въ брюхо и ушибины; лихорадки, непріятные запахи, слишком великое количество крови; бездействие, снеди слишкомъ сочныя, такъ какъ и очень мало питательныя; сильныя страсти и скорби душевныя, на примеръ страхв, петаль и проч.

(Присовокупимъ ко всъмъ таковымъ причинамъ и самой запорв. от в котораго удивительно какъ страждуть беременныя женщины, и коему однакожь споль прудно пособствовать могуть. Я знаю одну женщину, которая три ряза сряду выкидывала. На. низъ имъла она не чаще какъ чрезъ шесть или восемь дней, и не испражнялась никогда безЪ претер-· Jano IV. . II 5пънія самой ужаснъйшей боли: почему и ръшилась напослъдокъ во время четвертой беременности принимать промывательныя черезъ день, и рабенокъ ея вышелъ въ надлежащую пору.

Злоупотребленте кофи вина, крепкихо напитково, некоторыя прихоти неудовольствованныя, бользни острыя, дурное положенте матки, ядь венеритеской, цинготной и проч. могуть еще быть причинами родово преждевременныхо.

чнень и.

Знаки возвъщающие о родах в преждевременных в.

Близкими знаками родоеб преждееременных почитаются боль в В посках в, или около нижней части чрева; потаенная внутренняя боль в В лядвеях в, чувствованіе колоду или ознобу; обмороки, бісніе или трепетанія сердца, опущеніе титек в и оных в мягкость, и опалость брюха; наконец в истеченіе крови или водяных в мокрот в из в частей двтородных в, приходящее по временам в: признаки сій оказываются за мысящь до родоеб преждееременных в, и продолжаются даже до того времени, когда они придут в.

членъ ш.

Средства, какіх должно употреблять ко предупреж-

Что долж. Къ предупреждению родово преждео ременныхо соны дълать выповаль бы я охошно женщинамь телосложения елаженщины баго употреблять спеди единственно твердыя или сложения густыя; никогда не дозволять себъ великаго колинъжнаго: чества таго, или инаго питья слабаго или водянаго; вставать и ложиться спать рано; убъгать домово сырыхо; имъть весьма часто телодоижение на открытом воздух в, но без в утоленія себя, и не выходить никогда из в покоя, елико возможно им в будетв, во время туманное или дожжевое.

Утожъ принадлежить до женщинь тучных и женщины дородныхь, то всть надобно имь очень не много: тучныя и дородных онь должны оставить напитки крепкие и все то, что можеть разгорячать или умножать количество кроси; пища ихь должна быть свойства уменьшающаго жарь и состоящая наипаче изь растений.

Беременной женщинъ надобно быть веселой и надобно имъть духъ спокойной. Должно удовлетворять ея беременной трихотямъ, какъ сы странны оныя ни были, столь- быть весе- ко, сколько благоразумие дозволить сие можетъ.

жо, сколько благоразумие дозволить сие можетъ.

члень іу.

:О томв, кто делеть надобно, когда знаки преждевременных в родоев предсыщають оприближении оныхв.

Когда знаки преждее ременных водово откры- положение, ваются и возвещають о приближении оных в, тогда вы нано- надобно положить женщину стю на кровати, или на жна нахо- постланном в тюфяк в так в, чтобы изголовые ел бы- диться до очень низкое. Вы таком положени должна она женщина остаться вы ноков и нужно веселить ее и ободрять

ряшь при-Кикшож

Надлежить весьма стараться, чтобы не было тиць ся и ей жарко и дабы не употребляла она ничего разго-питью долрягающаго. Пища ея должна состоять изъ отваровъ, жно быть колодноили молошной каши, изъ студеней или кашицы оссяму.
ной и проч., и все сте должна она кушать всегда холодное.

Ежели она будеть имъть довольно силь къ перене- кровопусенйю, то можно пустить ей по малой мъръ унцій шесть сканіе, к рови изь руки. Плть должна она ятную воду, подкважеть не квашенную лимоннымв сокомь, или приниманть по нъренести. скольку грань селитры въ порошкъ въ стаканъ овсямаго отвару чрез каждые пять или шесть часовь.

что из доб. Естьли же случится у ней сильной поноса, то но аблать, надлежить давати декокто изъ оленьяго рогу перекогда быжженаго и призотовленнаго. Но ежели станеть ей томыть, или инниться, пто надобно давать часто въ день по двъ proma. столовых в ложки питья соленаго.

> Вообще всякія лекарства утолительных могушь быть полезны; но надлежить всегда давать оных съ величайшею предосторожностію.

@бстоятельства, въ котообходимо прибъганъ Elepy.

(Однакож В лакарства ейн не принесут великой пользы, ежели булеть уже истечение крови или рыхв на каких в нибудь мокрот в изв частей дътородных в, добно не. поелику ежедневно опыть научасть, что подобное нстечение, а и того еще болве, сильное кровотичение жь Акну- или тесь кровавая, когда оныя случатся, такь какь и реота, не мотуть перестать прежде нежели мать на не освободится от в зародыма, места и печеньевь или запекшейся крови; что самое бываеть единственнымЪ твореніемЪ натуры, которую должно оставишь, въ ем дъйстви полько бы кровотечние не савхалось безиврным и не было бы сопровождаемо судорогами; каковыя обстоятельства возвъщають обыиновенно смершь близкую.

> Тогда должно имъпъ прибъжище къ Акушеру или искусной бабкь; но надобно, чтобы возрасть зародыша или положение онаго, дозволяли дълать операцію; ибо естьли не будеть ему пяти или шести мъсяцовъ, или ежели онъ прежде сето времени не покажется у устья матки съ своими пленами, отставши самъ собою отъ сего внутренняго тлена, то рука Оператора бываеть уже безсильна.

Послѣ какЪ за родышь выйдеть, родильница должиа слѣдовать по всѣмъ отношентямь діэтѣ, какая будеть предписана въ членѣ III, слѣдующаго нараграфа, гдѣ предлагается о томб, какб поступать об роженицами.

члень у.

О томд, сто должны двлать женщины подверженных родамб преждевременнымв.

Кръпкимъ и многокровнымъ женщинамъ, кои под время, тъ вержены бывають преждевременнымъ родамъ въ извъ- ноторое надле- жить и должно всегда пускать жить имъ кровь за нъсколько дней до наступлентя сего времени створять Принявъ сто предосторожность и наблюдая недавно ировъ нами предписанную дтэту, можно будетъ имъ изъ бъжатъ часто отъ родово преждевременныхо.

жотя и наноминаем мы о предосторожно- Скольно стах в квупреждению выки дывания, по не разумвем в чрез в полезно сте того, чтобы пренятствовать беременным женщиным инфинам пользоваться обыкновенными их в тело движе- женщины нами, поелику от в таковаго лишения всяк в увидьлы телодым от в таковаго лишения всяк увидьлы от вратить нам хот влось. И двиствительно, недостаток в в тело движении не только ослабляет в солокна, но еще при изводить полнокровие, или излишество соков в в сосу дах в, что самое и почитается двумя самыми обыкновенный ими причинами родов в преждевременных в.

Однакожъ есть женщины сложентя столь нёжнаго, что принуждены бывають не имыть никакого тело. жеижентя во время беременности.

\$ 5.

О родах в простых или натуральных, и о родах ненатуральных, тяжких и трудных.

ЧЛЕНЪ

членъ 1.

О родах в простых гили натуральных в.

жулыя женщины подвергаются множеству бользпредосторожности
употребпредосторожностей, какія обыкновенно въродахъ упомяемыя въ
предосторожностей, какія обыкновенно въродахъ упомяемыя въ
пребляются; самыя крыпкія изъ нихъ вообще болье
родахъ,
бывають
всего симъ пренебрегають: въ чемъ особенно и погрышають женщины молодыя.

номъ множества болбаней.

Онь воображають себь, что какь скоро пережваты кончатся, то и вся уже опасность миновалась, но по справедливости сказать можно, что тогда только оная и начинается. На собственное попечение оставленная натура конечно достигнеть всегда до того, что младенца извергнеть, жакь-то мы говорили уже о семь вы Томь II, глав. 7 § 2 примыч. 15. Но то достовырно, что роженица не можеть оправиться безь извыстнаго бережения себя и попечений пристойныхь.

Не должно

однакожь, что можеть быть излишеетво съ

однакожь, сей стороны такь какь и съ другой: ибо примъчательпредосторожности могающихь имь во время родовь, обыкновенно нахопростирались до
излишее

то, что состояте ихь требуеть нъкотораго особеннаго вниманія.

иэлишнія ВпрочемЪ примъчаніе сіе касашельно до опаснопредосторожности
вредны во долженствуєть быть обращено на одно пользованіе
всяной 60- рожениць; оно простирается такожь и на множество
атынь. другихь бользней, въ коихь подобныя попеченія обманывають почти всегда наше вниманіе и наши жела-

нія, и приносять вообще болье вреда, нежели когда бы жы ихь совсымь не прилагали.

Хотя, съ самаго древняго времени искусство въ накомъ помогать женщинамъ мучащимся родами и было по- состояни читаемо за отличное званте; однакожъ надобно принаходите на сама и помогать и поставать и поставать и поставать и поставать и поставать и поставать на поставать и поставать на поставать на поставать на поставать и прежде нежели най- дутся доведенными до такого состоянтя, что нечьть уже имъ будеть и пропитаться; а по сей-то самой причинь большая часть изъ нихъ не имъсть ни воспитантя приличнаго, ниже познанти къ столь важному звантю необходимо нужныхъ.

Правда, чио оставленная на собственное попе-вольшая ченте природа освобождаеть обыкновенно женщину часть пово время муко от ся рабенка; но равнымь обрамывь бальшей не ложно и то, что вы разсуждени большей большей боль мио-части женщины вы такомы состоянии нужно посту-го дыла пать со всякимы тщантемы и искусствомы, и что не во время рыдко посисальныя бабки ничего незнающтя и услужнодовы. Ныя дылають имы много вреда чрезы свои предразасудки суевырные или глупые.

Бъдствій, происходящих в отв сего, бывает в го- польза, нараздо больше, нежели как в мы вообще себ предста- ная бы мовляем в; хотя напротив в того большую часть опых в гла пронзойти
легко бы предупредить было можно, естьли бы недозволялось никакой повивальной бабк в приступать к в естьли бы
вспомоществованію в в родах в, не быв в признанною не дозвов состояніи исправить оное; и употребив в гужное лено было
в не дозволено было
вниманіе к в столь важному закону, можно бы было не пром'в
токмо спасти жизнь многих в существ в невинных в нам ваб-

вианимы В къ сему спос. бимми. но еще и освободишь мужчинь оть сей части столь непріятной для Хирургіи, которая по мистимь причинамь несравненно лучше приличествуеть женщинамь (3).

0

ONERCOND. младенпевъ умираеть въ деревняхЪ оть неи-CKYCHOCMIR повивальиыхъ ба-CORT W повивальжиновЪ. сельсних Б. Сколько женщинъ погибаеть тан остается немощными то сей са. мой причи-RT.

(5) Видно, что въ Англіи, судя по словамъ г. Бухана, погибаетъ множество младенцевь отъ неискусности поспольных вабонь. Однания как нажется, что сей морь бываеть тамь по ветмив вычисленіямь не столь но великь, какъ въ деревнях наших і: (Французскихъ) у насъ не щастіе сіе простирается до такой степени, что заслуживаеть оно самаго величайшаго вниманія со стороны Правительства, танъ что важное бы для государства было учр жленіе, естьли бы мороль въ самоскортишемъ времени издаль указь, запрещающій совершенно всяной женщинь, или всякому льнарю, имъть практику повивальнаго искусства въ деревняхъ, не бывь прежде освидътельствованы и привнаны способными отъ факультета телицинскаго, и не имъвь отъ онаго надлежащихъ на то аттестатовь.

А получиль сведение от ученаго Г. Ле Руа, члена Королевской Академіи наукь, который имбль случай о томь достоверно уз. нать по известнымы наалюденіямы, что вы одномы весьма пространномы убздв Шампаніи умираєть около половины младенцевь от невыжества поскальнымы бакокь, и что вы продолженіи всего времени, какы женщины родять дытей, которое вы шампаніи простираєтися обыкновенно оты двадцати до сорока цяти лють, по самому сему невыжеству умираєть оныхы гораздо больше, нежели мужчинь, котя впрочемы все вы равномы находится положеніи: ибо присовокующить кы сему надобно ть быственные случай, которымы и неумирающіе подвержены бывають по неискусству и чевыжеству оныхы мимыхы ловивальщиковь деревенскихь,

Для чего мужчины вмёнались въ повиваија: ВЬ разсуждении сназаниато Авторомь, что повивальное двяю примичные гораздо женщинамь, нежели мужчинамь, ныпь ни малейшаго сомный, что благопристойность и спыдливость возбраняють равнымь образомь мужчинамь во оное вмышиваться; но пуснай далуть намы ваколь искусныхь, то мужчины не стануть мышаться вы сио часть Хирургии тыть скучный ую и непріятный шую
для нихь, что случаи кы употребленію ихь способностей и познаній
по щастію встрычаются весьма рыдно: ибо самымы опытомь дознано,
что изь сотни родовы находится всегда девяносто, ков
бывають дыстветь самой нашуры; и что изь десяти остальныхь
выходить восемь требующихь опытности обыкновенной: слёдовапельно изь целой сотии родовь остально двое, кои пребують
знанія и искусства,

© томб, сто надобно дёлать, когда женщина родами мусится.

ВЪ то время, какЪ женщина мугится или когда не налобно придутъ къ ней перехваты, не надобно ей давать начего разгорятающаго. Можетъ она употреблять, ко-горячаю гда ей захочется, немного панады или хлъбенной щаго. Для похлебки, и пить воду хлъбную, или отваръ обсяной. чего:

Мы не намбрены описывать эдбсь способностей и знавія Акушера Сколько менуснаго. Дабы дать возчувствовать, сколько превосходствующій віз лорогіз для сей части Хирургіи полезеніз и дорогіз для рода человіческаго, доволь- рода человно будеть для насіз сказать, что сія вітвь Врачебной Науни замы- віческаго каеть двіз крайнія точки, то есть, что ежели нітть ничего столь и нусный простаго, какіз роды натуральные, то є другой сторочім нітть ни- Акушерь. чего втольно труднаго какіз роды тяжкія пли ненатуральныя, и что роды человіческій обязаніз вічною признательності з мужать та-киміз, каковы были Морисо, Ламотты, Левреты, и проч., употребившіє превосходныя дарованія свои кіз возведенію повивальнаго искуства на ту степень, віз каковой оно находится ныні.

Пуснай же представять намь котя одну вазву поэнсальную, нерады жеторая бы отличилась вы родахы ненатуральныхы. Похваляющей ны- нее нее которыя изы нихы за то, будто бы имыли секреты прославиться до- годисть стоинствомы совсымы различнаго рода; но не можно найти ни одной, которая повивальсым сноспышествовала кы приращению сел науки. Негодность ихы, да про- ныхы бастать меня вы семы выражения, есть столь великая, что и общее боны. изыскание леуторовы не могло даже возбудить вы нихы никакого поревнования; и сы того времени какы стати леуторы, и какы начали наперерывы другы преды другомы стараться своими дарованиями и труд мы возвысить сте искусство, не видно, чтобы поставанных вавки котя бы на одины шагы впереды поступили: наконець, по недоститку ли отважности или поревнования, что быть можеть выроятные, вы настоящее время накодится гораздо меньше повизальныхы ваволь, отовщихы по справедливости оныхы названия, нежели сколько прежы сего было.

М такъ пускай на жалуются болье на то, что мужчины Повивальзвание си исправляють; невъжество повивальнымы вавокъ есть первая ныхъ баопому причина. Сами начали онъ призываль мужчинь об случикъ бокъ витрудныхъ; и женщина, которую Анушеръ искусно освободиль отъ нишь въ
бремени, или которую онъ спасъ отъ бъдстий родовъ ненатураль, томъ наныхъ, почитать станеть себъ за неблагодирность, естьди не изъ- дебно, что
явить къ нему своей довъренности, въ предосуждение женщий, кото- мужчины
рая попустила бы ей погибнуть или котирал бы муки ел продолжала. повивакотъ-

Крикие же напитки, вино, воды крительныя и всякія другія лекарства, какія даются ей обыкновенно въ намърении, чтобы укръпить ее и приближить самые роды, способствують, почти завсегда, къ умноженію лихоралки, воспаленію матки и пролодженію nepexsamoso.

СверьхЪ того и самыя последованія родовЪ со-BOATSHW . нанія при- дълывають они опасными, поелику не ръдко произворазгоряча- дять они сильныя кровотегенія смертоносныя и расющая діз полагають роженицу кь лихоралкамо выступнымо, ил въ ma- или другаго свойства, какb-то тетевицеподобной или комъ слувысыпной, о коей предложено въ главъ 10 Тома II. 42 T.

Терминъ всегла бы-Menniaro мтсяца.

(Всякому извъстно, что терминъ разръшенія родамъ не отъ бремени приходить въ концъ девятаго мъсяца: ваеть въ однакожъ бываеть онъ и ранве, а именно, случаетмонць ся, что терминъ сей наступаеть въ осьмомъ, въ селмомь и даже въ пятомъ мъсяцахъ, какъ-то многія наблюденія сіе подпверждають: иноглажь бываеть онъ позже, а именно, приходить на десятомъ, двънапцатомь, и, какь по нъкоторые сказывали, на шестнатцатомъ доже мъсяцъ; почему и весьма нужно имъть предварительное о семъ свъдение.)

что надоб- Когда перехваты булуть долговременны и трулжо далать, ны, тогда надобно пустить провы дая предупрежденогда пере- нія воспаленія: надлежить еще давать и повторять жолгое вре- промывательныя мягтительныя, посадить роженицу мя продол- надъ паромъ теплой воды, потирать слегка влагалище MO WITTE SME мазью болеу полительною, или чухонским в маслом в, м Sygymb. прикладывать на брюхо холстину намоченную въ теплой воль.

Естьли примътно, что натура начинает в осла-Korga Hae тура на- бъвать, и ежели силы роженицы истощатся от утоmemcg ocмленія, то можно тогда, но ни въ какомъ другомъ #36 5B210-CAY-DEFERRO.

елучав, дашь ей рюмку хорошаго вина, или всякаго инаго напишка крвпительнаго.

Предложенных в теперь нами вспомоществованій довольно для родого натуральных д.

O Авйствовании натуры во родахо простыхо или натуральныхо.

(Мы станемь здесь описывать роды натураль простие име; ибо описание сте послужить кь большему утролы бые верждению сказаннаго нами вы последнемы примечании, вершеню что сей роды разрешения от бремени, самый обык аристыновенныйй изы всехы, бываеть действиемы натуствить и что всяки вспоможения, кои силятся многия ры: и что всяки вспоможения, кои силятся многия ры. делать женщинамы вы такомы случать, не токмо не способствують ни малейще кы ускорению родоев, но служать напротивы того кы замедлению оныхы, а иногда даже кы соделанию трудными и тажкими.

Беременная женщина, достигнувь до того вре-время, въмени, когда матка не можеть болье подаваться на которое разширенте, начинаеть чувствовать день, два, а ино-са первых гда и три, прежде нежели откроются муки, нелов-боли, накость или трудность чрезвычайную; но какъ скоро зываемых мерехваты придуть дъйствишельно, то начинаеть у женщинь мужет секо: хотя стя боль въ спинъ и около самых по-хами или теко: хотя стя боль и не долго продолжается; но фальшивычрезь полчаса или менъе перемежки, опять прихо-ми мукачивы она въ несравненно большемъ степени: почемить она въ несравненно большемъ степени: почемить кои раждали уже дътей, столь мало трогаются сими первыми муками, что назвали ихъ мухами или муками, что назвали ихъ мухами или муками фальшивыми, и даже не покидаютъ ви мало обыкновенныхъ своихъ дълъ домашнихъ.

Но молодыя женщины, кои обрюхатьють впер кань бевие, думають, что уже родить имь надобно: по-ли сін не Ц 2 чему еуть, чему ищуть комощи; а повивальные блеми, по незнакань фльнію ди своему, или по тому, чтобы показать свое
шавыя муки, то и
не остает. промывательными удоб раздражающими рестясивасв инчего ніями, намазываніями, масламо деревяннымо или коделать вы
такомы
ничето ніями, намазываніями, масламо деревяннымо или коделать вы
такомы
ничето ніями, намазываніями, масламо деревяннымо или коделать вы
такомы
ничето ніями надобно поберечь себя, потому что
вет сій средства могуть единственно привести ихь
вы разслабленіе, аммы чрезы короткое время нужно будеть собрать вет силы свои кы перенесенію настоящихы мукь, кои вы родахо бывають.

Во время первой боля, называемой фальшивыми умбенся муками, даже и за нъсколько дней прежде выходинь когда гово из влагалища и из в матки густая мокрота, болье ришея, и болье усиливающаяся безпрестанно. Стя мокрота служить къ дълантю слизкими частей дътородных в изеть, или и къ приведентю их въ нужную гибкость, дабы сльды или сльды надлежащим в образом в могли разширяться. Иногда примътны бывають на сей слизени нъкоторые знаки крови, и тогда говорится въ простомъ народъ, что женщина пятнает или кладет слъды.

Причнаки настонщикъ щикъ По мъръ шого, какъ перехеаты приближащься сшанущь, умножающаяся боль сшановишея гораздо сильнье, и просширается кругообразно съ каждой стороны для соединентя въ пупъ, а по томъ около отверсття матки: тогда-то женщина принуждена бываеть противъ воли своей боль стю уважать, и употреблять всъ силы, дабы каждый пережать отвести къ тому мъсту, къ которому онъ простирается, то есть къ самому проходу. Въ подобномъ состоянти и пульст становится весьма кръпкой; лице покраснъеть и все тъло иногда объято бываеть и все тъло иногда объято в предежаеть и все тъло и предежаеть и все тъло и все тъло и предежаеть и все тъло и предежаеть и предежаеть и все тъло и предежаеть и п

Съ сей минуты больная не можетъ болъе стоять на ногахъ; не хороно такожъ сидъть ей и въ креслахъ, а должно ей лежать. Правда, случается иногда, что отъ сей перемъны положентя муки продолжаются вновь нъсколько времени; но немедленно пос лъ того приходяттъ они и бываютъ сильнъе, продолжительнъе и скоропостижнъе.

По многократном возвращении сих в перехватов в приближевст усил напрягающся на перепонки, в которых в находящся младенческия воды: перепонки же си устремляющся наружу, чрез в разширенное отверстве матки, и составляют в меток упругой, кругловатый и правильный: что самое и называется приближением в сод в.

Новыя натуги или муки разрывають сей мь-выходь токь, способствують кь прохождению нькоторой ча-рабенкае сти сихь содо, и кь приближению головы самаго иладенца кь внышимь частямь дытороднымь. Усиливатощияся и всегда продолжающияся муки потрогивають нечувствительно голову, которая наконець понуждает ся сильно и влечеть за собою какь тъло иладенческое, такь и самыя воды.

Иногда мевсто выходить съ рабенкомъ, и часть когда места остается на головь на подобте шапочки; что сто выхосамое и называють родиться об сороске: но чаще сть ев того остается оно еще несколько минуть, а весьма рабенкомъ, много, ежели четверть часа въ маткъ и выгоняется по гово. изъ нее единственно новыми муками, но несравненно рять, что онь редиката женщины называють токмо резомб об животь. рочкъ

Таково - то есть дъйствие природы въ оной ве-всето высликой операции, называемой родами. По образу и кодитъ устроению, каковое долженетвовали имъть части посред.

TMOF MG ваемой равомъ въ SECRETAL ENT. TO. Необходи. MOCHIE мукъ по образу и устроенію _Kogomea NEIKB Maепісй.

атипродныя ў женщинь, чиобы можно было им в вспріянть боли назы- съмя зароды ща, дабы оной тамъ оживотворялся, распроспранялся, и достигнуль бы до такого степени праращенія, которой бы привель его вь состояніе выдерживать безв всякаго вреда впечатавнія воздука, которому бываеть нодвержень, какь скоро на свыть выходить, не возможно было, чтобы отверсте сихъ частей имьло такое пространство, дабы младенень могъ выйши изъ утробы матери своей, не полвергая оную мукамъ неминуемымь онго разлипрентя тымь большаго, чъмъ младенецъ болье величины имъть булеть.

Роды безъ ваюшь вообще сомы опаеными при. вадками.

Сабдовательно женщина не можеть раждать мукъ бы- безъ боли; и таковъ- то въ разсуждении сего есть закопъ всеобщій, что роды скоропостижные и безъ привождае- всякой муки, какЪ-то сте случается иногда отъ разслабленія, почти всегда бывають сопровождаемы бъдственными припадками. Гиппократо о семъ сказаль, Яфор. 238, и сія истинна не мало подтверждается ежедневно. И такъ да перестанутъ женщины устрашаться: премудрый Творецъ надълилъ ихъ множествомь силь потребных для сего действія, какь то нами было показано вЪ Томѣ II, глав. 7, § 2, примъч. 15: почему и весьма редко видеть можно, чтобы женщина умирала во время родова; а случается сте нещаетие развъ такимъ роженицамъ, кои объяты были чрезмърнымъ страхомъ во время родосо, или конхъ муки помъщаны бывали от в людей неосторожных в, несмысленных и проч.; или наконецъ женщинамъ, коих в поврежденное сложение членов в совершенно пренятствовало выходу младенца.

И такъ самый опытантий и искуситий Аку-Самый искусньйшій шерь не можеть вь натуральных вродах визбавить же можеть женщину от в бользней двторождентя. Сомнительно предокра- даже, чинобы могь онь сократинь и самыя муки, какь:

то большая часть оное мечтаеть; и вь семь - то на- кать женмърени повивальныя бабки и нъкоторые молодые Лв. щины онв кари безпрестанно принимаются за щупанье мутащих вольни въ сл женщинь, разширенте, подергиванте частей дето-ниже со. родных в и проч.: каковые безразсудные способы про. кратить изводять осущение вы сихь частяхь, воспаления, синева, ни. и по необходимому слъдствію, продолженіе мукв, а не ръдко даже и весьма шяжкія бользни. По сей-то причинъ разумный Акушеръ остерегается отъ всяких в средствь вы родах в простых в: ежели при оных в и присупствуеть, то не для чего инаго, какъ единственно для удовлетворентя суетности тъхв, кон его призывають; тамь бываеть онь только зрителемь празднымь; и ежели иногда показываеть онъ видь, будтобы двиствуеть очень много: то сте токмо для того, что большая часть женщинъ находишся въ ономъ ложномъ и нелепомъ предразсужденіи, что чъмъ болье имь помогають, тьмь легче релы ихъ бываютъ.

Не значить же сте, чтобы мы котым поки родами нуть роженицу при муках волич; конечно имветь мучищей. она нужду въ томъ, чтобы разсудительныя женщины мо из нужно гли ее ободрять въ сти бурныя, такъ сказать, минуты, имъть од. успоконвань ся духв, развеселянь воображение и самыя му-ну или ки, которыя она чувствуеть, приводить въ забление. персопъ Желали бы мы единственно того, чтобы она прогна-благоразля от себя всвх оных в кумунекв, столько же опа-умных в, еных в по их в страхам в, сколько и по совытам в глу- нои бы монымв, а не редко и бъдственнымв, коими ее отво- болрятьи щають.)

RAILLA

О томб, сколько полезна быть можетв помощь вско. рё по выходё младенца изб утробы матерней.

(Но сетьли натура довольствуется сама со-для чего бою в родах натуральных в, то освородившаяся от в женщив Ope-

мощь вЪ eia Manymar.

родившей; бремени женщина требуеть немедленно попеченій. нужна по- которыя слабое а неръдко и истощенное состояние, въ коемъ она вообще находишся, препятствуеть ей приложить какъ о себъ самой, такъ и о своемь рабенкъ; а по тому-то и нужно, чтобы при раждающей женщинъ была одна персона или двъ благоразумныхъ. или повивальная бабка, или АкушерЪ, для подавантя ей помощи, которая скоро для нее едвлается необ. ходимою.

Первое вниманіе , какое дол-RHBI HM SINE вс помощеетвующіе. TAB AOA MHO 33BE omptsorвашь пуповину . ко-

выйдешь

съ рабена

комЪ.

Прежде всего должны он приготовить нитку ссученую въ четверо и ножницы, для перевязанія и отръзанія пуповины тотчась, какь младенець изъ утробы матерней выйдеть.

Ежели мъсто выйдеть съ рабенкомъ, какъ-то сте иногла случается, то довольно будеть завязять вывать и пупосину въ одномъ месть, а именно, на два или при дюйма от в пипка младенческого, и отръзать оную на дюймъ или два выше нишки: стараться надобно вда место завязать оную нитку очень крепко, пошому что должно тогда воспрепятствовать истеченію крови ила. денческой чрезъ жилы пупошныя, ибо всякъ чувству. еть, что естьли бы пупокь завязань быль слабо, то чрезъ сте самое рабенокъ могъ бы весь истечь кровію.

Когда ыб. emo eemaметея въ выходъ изъ оной

Какъ скоро место булеть оставаться въ маткв по выходь из оной младенца, тогда надобно маткв, по савлать двв перевязки на пуповинв : первую въ вышепоказанномъ нами мъстъ, а Аругую на три или на ченыре дюйма повыше первой, и переръзань пуномагденда. вину между объими перевязками. Двъ сти перевязки нужны: 1) для причины недавно нами показаниной; 2) для удержанія крови, чтобы не могла пойти въ пуповинную жилу.

Налобно перевязывать и отръзывать пуповину въ Время, въ то время, как в младенец в находишся еще между ляд- ноторое веями своей матери; а притомъ всячески надлежить перевязы стараться, дабы не потерять из виду конца сей вать и пуповины, которой срастается съ самымъ местомо отрезынаходящимся в в латкв и висить наружи. Надежные вину. всего держащь его въ рукъ до шъхъ поръ, пока женшина не опростается совершенно, какъ-то мы станемъ говорить о семъ ниже, потому что сжиманія, какія будеть имъть матка, могли бы опять втянуть его внутрь: что самое и принудило бы доставать оной рукою изъ сей внутренности, въ случав естьли бы нужно было дойши до шак в называемой у жен-: щинъ операции, то есть, вынимать мъсто: но таковый случай встрвчается редко; потому что операція сія вообще бываеть дъйствіемь самой натуры.

Однакож в есть один в случай, в в котором в не обстоянадобно ни перевязывать, ниже отръзывать пупо- тельства, вины, только бы мвсто не вышло из в матки виветв не надобно съ рабенкомъ; а именно, когда рабенокъ не подастъни переникакого знака жизни. Случай сей, по щастію не вязывать, очень общій, поколику и встрачается единственно разывать посль родоев тяжкихв, трудиыхв и ненатиральныхв, пуповины постигаеть довольно часто, влеча обыкновенно за собою и погибель младенца и истребление семействъ: почему мы и считаемь себь за долгъ предписать въ разсужденій сего правила слідующія; ласкаясь надеждою, что многе будуть признавать себя тымь обязаниве, что средства, кои употреблять надобно въ полобных в обстоятельствах в, суть столько же просты, какъ и сильны, и что поступаючи по онымъ. можно будеть избъхать ужасных в случаевь в похоронении младенцевъ живыхъ, и снискать себъ несказанное удовольствие доставлениемъ отечеству граж. дань, а семействомь отраслей, могущихь со време-Jonis IV. немъ

немь продлищь навсегда ихь родь, а можеть бышь и въчно прославить.)

О томв, какимв образомв надлежить поступать св младенцемв, кот рый при выхожлении изв утробы материей не подастб. никакого знака жизни.

Тренія суоп и иж подбрю-BHI40.

(И шакъ какъ скоро младенецъ, вышедшій изъ жія погру- ушробы машерней, не подаешь никакого знака жизни, и когда не примътно ни блентя его сердца, ниже самых в жилв, тогда не должно перевязываль пуповины, ежели только место съ оною не выйдеть: ибо въ такомъ случат надобно оставить младенца на нъсколько минуть между мядвеями его матери: наллежишь потирать его слегка шенлою рукою по животу и по груди; и часто бываеть довольно сего ередства: потому что чрезъ короткое посав того время движение сераца возбуждается, и накоторыя легкіл сжиманія сего органа чувствуемы бывають подъ рукою приложенною кЪ груди: Естьхи станешь продолжать сін легкія потиранія, то самые знаки жизни едьлаются болье и болье ощутительными; бление жиль откроется, и томчась члены придуть въ нъкоторое слабое движение. Тогда младенецъ начинаетъ оживляться, и можно во всякой безонасности перевазать и опръзапь пупосину.

рошъ младенца.

Ежели средства сти будуть безуствины, то воздуха въ надлежинъ ввесни воздух въ легкое младенца, наставляючи рошЪ свой на его, или кладя въ его рошокъ чубукЪ, соломенку, и пощипывая носъ младенца пальцами, дабы понудить воздух в проникнуть чрез дыхательное горло въ легкое младенца и проч.; ило въ таком в случат нъть сомнънія, что причина содержащая младенца въ семъ состояни недвижимости, по которой кажется онв мертвымв, зависить отв трулвосши,

ности, какую имъстъ въ шомъ, чтобы дышать. Хотя бы трудность сія происходила отъ мокроты густой, клейкой и вязкой, занирающей пути дыханія, или отъ малой упругости, находящейся вь создухь той комнаты, въ которой лежить родильница; хотя бы зависъла она отъ той или отъ другой изъ причинъ сихъ, однакожъ воздухъ впускаемый въ ротъ съ нъкоторою силою, и легкія потиранія дълаемыя по груди, скоро низпровергають таковое препятствіе. Сіе искусственное сдыханіе побуждаеть грудь къ самому дышанію, а введеніе создуха, повторенное раза шри или четыре, больше или меньше, приводить въ движеніе самую гибкость легкихо, которая составляєть дыханіс.

Вспоможенія сін продолжать надобно до тёх в торь, пока не примечено будеть, что тело младенца станеть нокрываться цветомь, несколько похожимь на жизненный, изы котораго бы можно было заключить обы успёхь. Тогда останавливается на малое время сіе вдыханіе, сы темы, чтобы чрезы несколько минуть послё опять начать оное; однакожы не надобно прерывать легкихы потираній по брюху, по груди, и даже вдоль самаго хребта; а должно еще его трясти, качать и проч.

Ежели, не смотря на постоянное употребление вепрыскивсъхъ таковыхъ способовъ, младенець не подаетъ ни малъйшаго знака жизни, то надобно кръпко вспрыскивать грудь и лице онаго водою весьма холодною, ковпорую брать можно въ горсть и такъ поливать ею.

Когда же въэтомъ самомъ случав, а миенно, кого какъ пода младенець кажется мертвымъ, жесто вышло изъ ступань утробы матерней съ рабенкомъ; и какъ слъдовательно когда нунадлежало непремъдно перевязать и отрезать пупови- жно было Ч 2 и отръзапь пу-позину.

му, то должно тогла начать насычкою ланцетом в пупотной жилы пониже перевязки; пбо кросопискание сте весьма нужно, как в скоро сосуды надуются, и когда лице и тело младенца будуть имыть цвыть втолетовой. Иногда також крось загустветь и ссядется вы пупотных сосудах так в, что не можеть потечь от в одного сычентя ланцетом в; а вы подобномы случаь и надобно отворить оную посредствомы и репера или того рика. По томы употреблять должно ты же самыя вспомоществовантя, кои мы выше сего совытовали, и которыя равнымы образом устых имыть могуть; но по той причины, что кругооб ращенте кроси матерней кы младенцу перерывается, надлежить быть кораздо постоянные, и прежде не покидать, показдахате и теплота не установятся совершенно.)

От томв, какв на длежитв поступать св младенцемв в который перестаеть дышать спустя ньсколько минутв посль рожденія:

ть же езмым всповъ разсуждении младенцевъ, которые, какъ кажется, переможеня,
начін и въ стають дышать спустя нъсколько минуть посль рожслучь денія, или которыхь по недостатку вниманія попредыдучитають сперва живыми, а посль чрезъ пъсколько
щемъ,
минуть находять безъ всякаго движенія. Всякь чувствуеть, что сій посльдніе случай требують еще
большаго вниманія и попеченій: однакожь не льзя еще
въ этомъ и отчаяваться. Воть одно произшествіе,
коего я быль свидътелемь въ продолженій родовь.

Habridges-

Одна худаго телосложения женщина, коея весьма трудные роды обращали на нее все наше вниманіе, подала намы поводы кы нерадыню о младенць,
котораго мы считали за весьма живаго, и такы оному перевязали и отрызали пуповину, и положили его

въ передникъ къ молодой ученицъ, которая и самъ занималась, такъ какъ и мы, одною матерью. Подавъ ей всякія вспоможенія, коихъ требовало ея состояніє, и отразивъ всъ злоключенія, каковымъ она была подъержена, пришли мы къ рабенку, котораго и нашли безъ всякаго движенія такъ, что онъ казался совертенно мертвымъ. Профессоръ нашъ приказалъ немелленно принести теплой воды, въ которую влили мемного уксусу, котя мало нужнаго, но которой можно употреблять, когда легко достать его можно: онъ погрузиль младенца въ стю воду; началъ слегка теретъ ему грудъ, брюшко и вдоль самаго хребта; по томъ нъсколько разъпринимался дуть ему въ ротъ. Тотчасъ грудъ пришла въ дъйствте, и спустя немного времени прокричаль рабенокъ.

Прежде окончанія сего члена мы почитаемь за Сколько нужное напомянуть со всякимь убъжденіемь, чтобы не жужно не давать ничего сосать младенцамь вы подобномы слу нечего глочав. Всякое жидкое, а кольми паче крёпкое питье, тапь реможеть уморить неминуемо.

бенку, на-

Надобно шакожь остерегаться, чтобы не на муся въ крывать младенцевь, кои кажутся мертвыми, платкомъ комъ, салфеткою и проч.; сте есть хотъть морить и не помъ ихъ, когда станеть дълать еще труднъйшею спо-прывать собность дышангя.))

Отома, кака поступать на хобно са рабенкома, з дог ровыма посмы перевязки и отрызания пуповины.

(Какъ скоро окончится перевязка пуповины и гат надоб: отръзана будеть она у рабенка здороваго, то от но иласть дается онь одному изъ участвующихъ въ родахъ, рабенка и который кладеть его подлъ отия на чистыя пелен-положению. ки, пока можно будеть заняться онымъ; но надле: жить всегда класть его на бочокъ, дабы могь онъ Ч. 3;

освободиться от в мокротв, отделяющихся изв всёх в частей рша и горла.)

О томг, какимг образомг олгобож дать роженили отб мяста и како ее одвать или укутывать.

O BPENOR ета нашувальномв.

(Послъ какъ рабенокъ будетъ положенъ такъ. денін мв. какъ мы теперь говорили, наблюдать должно, что дълается съ матерью, которую предположимъ неосвоболившеюся от в места. Тошчась сжиманія матки, которая, облегчившись от в большей части своего бремени, старается опять привести себя въ малое пространство, какое имъла прежде беременности. отавляють масто прильнувшее на див ел; что самое и причиняеть боль довольно сильную, хотя она не столь велика и другаго рода, нежели какъ петехваты. А сін сжиманія, перемежающіяся въ большемъ или меньшем в продолжении времени, способствуют в кв извержентю маста, которое нечувствительно приближается къ отверство жатки, и чаще всего само собою выходить.

ешвомъ ко-

О операців, Однакож в естьли место долго не выходить, що бабка, или Акушеръ, кои должны всегда имъщь въ рукъ торой вы конець пуповины для причинь предложенных на странимають ниць 185 сего Тома, могуть легко подергивать ею, итено у и удобно вынушь самое мъсто. Ежели сте малое роженицы, женте будеть недостаточно, что самое и показываеть, что мвсто не совстмь еще отавлилось, то надобно погодить и совътовать роженицъ потирать себъ брюхо чаще рукою, дабы чрезъ то скоръе произвести сжиманія матки и отлавленіе маста, естьли же оно еще не выходишь, то можно подергивать пуповину, которую держишь в рукв, то св правой, то св левой стороны, но все полегоньку; и место не будеть сопрошивлящьея пому или другому извенхвенособовь. ВелиВеликая важность заключается еще и въ томъ, надобно ттобы мьсто было цвлое; послику части, сколько бы разсматымалы ни были, оставшись въ матъ, удерживають леся бускиманія, которыя двлаєть она къ освобожденію се деть мъсто от от тучное кросотесете. И такъ надобно разсматиривать мъсто, а особливо края онаго; и естьли найдется на оныхъ что нибудь разорвано, то надлежить сличить ихъ, дабы узнать, нътъли тамъ въ накомъ случав недостающая часть будеть велика, то немедленно надобно ощупать оную рукою и вытащить изъ матки; но естьли она мала, то лучше оставить на попеченіе натуры, которая посредствомъ новыхъ сжиманій скоро се извергнетъ.

ВыходЪ мёста бываеть обыкновенно сопровож- необходи. даем в исшечением в роси болье или менье обильным в мость почрезь влагалище; почему и надобно роженицъ наблюдать самый величайшій покой, и ничемь себя ни маавище не превожить: она должна остапься на той постели, на которой родила. Старапься надлежить. чтобы поясница ел лежала нёсколько возвышеннёе, дабы кольна близко сдвинуны были, и по томъ надобно положить, развернувши, между лядвеями ся чъмъ кождовольно проотынекъ сухихъ и теплыхъ, для приня жно потія кровей или отищенія бывающаго посль родовь; и дол- привашь роженицу. жно переменящь сім простыньки, как скоро онт замарающея. Въ такомъ положени останещея она полчаса, часъ, больше или меньше, до тъхъ поръ, пока истечение ивсколько не умърится. Наконецъ всячески стараться должно, чтобы она не захватила стужи,

Есть обыкновение стагивать брюхо роженицы , перезазни которая от бремени разръшится, подбрюшниками, не сеотили приготовленными для сего перевязками. Таковое ють тому

въ которемъ ихъ vnompesassomb.

томврению, нельное льйствие основывается на двухь самых в ложных в мненіях в. Первое, что чем воле стягивается брюхо, тъмъ больше раздается опо въ натуральной своей величинь; а второе, что дълается сте единственно для воспрепятствованія морщинамЪ; но случается всегла тому совстмъ противное.

Припадии проиежодяdmo Rim никовЪ иди перевявокъ.

Стягиваніем в брюха можно сжимать кожу, мыши бользии, ки и всю внут ренность, кося служать они такъ сказать обверткою, и чрезъ то самое препятетвуется таковых оным в мышкамо и кож возвращаться постепенно кв подбрюшь есптественному их в состоянию, по причинв ипригости всъх волокон и силы, какую имвють они къ возвращению въ прежнее свое состояние, когда будуть очень разпинуты. Наконець чрезь еги перевязки перерываенся обращение крови въ самых в частях в, и каждую изЪ нихЪ принуждають оставаться въ томъ состоянии, въ которомъ находились онъ прежде употреблентя оных в; отсюда толщина брюха у большей части женщин в живущих в в тородах в, хотя напротив в того крестьянки онаго совстив не имъютв, даже и родивши множество дътей; отсюда морщины, потому что кожа бываеть какь бы онымылою оть сихь сжатий и болье не имъетъ упругости, чтобы возвратиться къ естественному своему состоянію; отсюда наконець, что несравненно важные, кровотегение у женщинъ послы родовъ, а не ръдко и самая остановка сего нужнаго очищентя, источник в бользней безчисленных в.

Какія же

.И такъ виъсто оныхъ перевязей, полбрюшниперевязки ков в и завязокв, надобно положинь на брюхо роженицы жил брюка; простую салфетку мягкую, сухую и теплую, которою перевазать и поясницу довольно слабко, дабы можно было свободно просунуть пальцы между ею и KOKETO.

Сказанное нами шеперь о перевязках в брюшных в для груди жолжно равнымъ образомъ простираться и до тъхъ, роженицъ. коими завязывающся груди у роженинь, недавно отъ бремени освободившихся.

Когда машь будеть одъта, такъ какъ мы предъ снолько симъ сказывали, и пользуется покоемъ, каковой нами нужно разсовъщовань, що надобно приступить къ рабенку, ко- рабенка его здъсь предполагаемъ здоровымъ и лежащимъ тотчасъ. такъ, какъ мы совътовали выше, смотри стран. нанъ мать 189 сего Тома, и пидательно раземотрыть всь части освободитего шела. Но поисшинне редко случается, чтобы места и раждались младенцы сложенія недостаточнаго: одна-будеть кожь находятся иногда такте, у которых в задмий порядочно проходо и конецъ мотетотного ствола бывають не отверсшы. Сти недостатки въ сложенти членовъ подвертающь опасности жизнь таковых в мламенневь: а слыдоващельно и налобно позвать немедленно искуснаго Лькаря, для учинентя операцти въ подобномъ случав потребныхЪ.

Чаще всего видимъ мы такихъ раждающихся что такое пладенцевь, кои имьють часть мышковатию подб-значить, язытную: чрезъ что разумьется слишкомъ великая рабеныв. крашкость связи перепоногной, посредством в которой у него язые язытекв прицвиляется къ нижней челюсти; сія крат. чекъ прикосшь бываеть иногда столь велика, что могла бы мь-что въ ташать рабенку сосать грудь и говорить погда, когда номъ слупридешь вы надлежащий возрасшь: почему и надле-чав двжить тщательно осмотрыть во рту у младенца; и добно. естьли примътится таковой недостатокЪ, то предоставить онаго на попечение Акарское.

Еще разсмотрыть должно, ньть ли у него синева, вывихнутаго глена, или переломленой кости, и въ такомъ случав надлежить поступать по § 6 главы 52: такожЪ по глав. 53 и § 1 главы 54.

Jomo IV.

Ш

IIa

Karb n 43MD 06-

По таковомЪ осмотрв надобно счистить слиземз, находящуюся на ивкоторых в частях в твла новонадобно ра. рожденнаго младенца, потирая его полегоньку деребення ново- вяннымо масломо; посль того вымыть его вы теплой рождения водь, прибавив в къ ней немножко винограднаго вина; но сте обмовенте должно делать со всякою осторожноетію, дабы не ссадить и не задрать нъжной его кожи. Но лучие бы воздержанься от в сего совершенно, нежели запращь кожу, какъ то случается не ръдко: но шом в класть его надобно всегда боком в в корзинку, въ которой постланы пеленки чистыя, мягкія и сухія, и покрывать слегка, такъ чтобы только предохранить его от холоду: въ такомъ состояни оставить его на десять или на двенадцать часовъ: а по прошестви сего времени полнести его къ грудямъ машери, какъ скоро онъ окажешъ желанте къ сосанію, такъ какъ мы следали о семь замечаніе въ 6 4, глав. г., Тома I.

ЧЛЕНЪ П.

О родах в ненатуральных в, тяжелых в и трудных в.

mo pasym Bemen . чрезв реды пенатураль іме;

Уленату ральными родами называются всв тв. въ которыхъ рабенокъ не можетъ выйти обыкновеннымъ образомъ, отъ того ли, что препятствуетъ сему новрежденное расположение органово во датородных тастях его матери; или по тому, что самь онь худо лежинь въ маткв, или не въ надлежащей соразмфрности относительно кЪ проходамЪ; или наконець по тому, что препятствие зависить оть матери и от в рабенка: ибо статься можеть, что какъ мать бываеть худаго расположенія членовь, то и рабенок в появляется худо; и всяк в чувствуеть, что сей случай почитается самымъ опаснъйшимъ.

Еспть еще роды, называемые просто тажелыми чрезъроды и трудными, не булучи однакож в непатуральными: тажелые таковые роды бывающь тогда, когда при добром в твле- и труд-. сномъ сложении машери и хорошемъ положении рабенка, предваряющся испечентем всъх вод в, и сопровождающся великою слабостью, бользнями шажелыми и проч.

Всв сін виды родова, а наппаче родова ненату- за такіе ральных в, презують опытности и искусства, како-роды единвых в большая часть бабок в не имветь. В в таких в обспоящельсивах в онв по шиеславію своему всякія приниприлагають попечента, дабы чрезь то самое при-маться крышь свое невёжество: лучше всего надлежалобы Акушеры. имъ признапься въ своей неспособности, какъ скоро примътять, что рабенокь находится въ положении. ненату ральномв, или когда встрвчается какое нибудь преплиствие къ выкоду онаго. Ибо чрезъ ете признаніе, которое долженетвовали бы внушить имъ совъсть и человъчество, могли бы онъ предупрединь обыкновенныя опасности от в родов в трудных в, и которыя чаще всего бъдственны бывають, или для матери, или для рабенка единственно по тому, что оными умедлять

Мы не станемъ входить въ подробное вычисленіе знаковь, но которымь познаются роды ненатуральные и роды трудные, поелику сія важная машерія можеть единетвенно предлагаема быть мужемь вь сей части Врачебной науки много упражнявшимся. Впрочемь находится у насъ множество сочинений, въ коихЪ описаны подобные роды. По сочинентяхъ Ягрисовв. Ламоттовв, Смеліевв, Левретовв и Бюртоновв, не остается болье ничего желать въ разсужденти сего предмета: но какъ дъланы они единственно для Акушеровъ, то и превосходять поняте публики, а можеть быть, и многихь бабоко повивальныхо. Воть что и побудило Г. Воделокка, молодаго Якушера изв са-HI 2 мыхЪ

шых в первых в и искуситыших в в семь лель практиковЪ, издать правила о повивальномЪ искусствъ по вопросамЪ и отвътамЪ.

Сте небольшее сочиненте предпріяль было онь слинственно для способетвования учению и успъхамъ мололой бабки повивальной, гонгованейся кв отправленію сей должности въ деревна знатнато господина: но разсулиль онь выпо бышь можеть оно полезно и для другихъ въ семъ искусствъ успъть желающихъ: да и подхинно не мотупъ оны нигды сыскапь наставленій предложенных в яснье, почные и основащельнъе : даже и тъ, которые не готовять себя къ сему званію, а желають единственно имъть надлежащее сведение о родахо, не могуть найти лучше сего сочиненія. Продается оно въ Парижь у Дидота млалшаго, на набережной Авгусшинцовъ; у Рюольта, въ улицы ла Гарпъ, и въ Аміены у Годарма.

Мы удовольствуемся предписантемЪ, что надобно Какъ ском ро роже- призвать Якутера, или искусную бабку, какъ скоро неть при примъчено будеть, что муки приводять въ изнеможодить въжение, или происходять противнымь образомь отъ изнеможет птого, какъ выше сего нами опасано было, а кольми Hie . mo паче, ежели роженица будеть нездорова, горбата. надобно призветь въ Лглинской бользни и проч. Анушера.

TARE H B III.

Пристойное роженицамь пользование.

Aioma.

Когда женщина совећи в опростается и будетв одъта, такъ какъ мы сказывали выше сего на стран. 190 и следующих в сего Тома, то должно предохранять ее от всякаго безпокойства и содержать во всевозможномЪ поков (d). Пишу давать ей надобно Ae-

Спонойствіе дуma.

(d) Мы не можемъ пропустить безъ порицанія того глупаго обынноопасно пу- венія, употребищельнаго въ больщей части деревень, чтобы собирать множескать мно.

легкую и жидкую, как b - то кашицу, клёбную похлеб-пища и ку и проч.; а питье ея должно быть легкое и мокро-питье. Обеспоятия менцины, ко-техьства изключентя. Мнё встрёчались нёкоторыя женщины, ко-требующий силы надобно было подкрёплять послё родово, щія винами пищею твердою и винами крёпкими. Вы такомы случав можно давать имы ципленка и по рюмкі хорошаго вина. Есть такожы иныя женщины, которыя безы всякой нужды просять сина всеусильно, и коимы не льзя вы томы по надлежащему отказывать, дабы, чрезы воспрепятетвованіе ихы желаніямы, не раздразнить болье ихы страстей. Смотри о семы у 5, главы 10 тома II.

\$ 6.

О бользнях роженица, кака-то об осищени послы родова весьма обильнома, о сильных кровотечних, о отрудных припадках, или тяжкой боли, о востальний липпки, о остановкы кровей, о воспалении прещины на сосках, о лихорадий с с сыпью, или высыпной, о горяскы с пятнами, о молошницы и грудниць.

Ч Л Е H Ъ I.

О отищении послы родоеб весыма обильномо и о кревотегенияхо сильныхо.

Случается иногда, что опроставшаяся жен- что надощина подвержена бываеть весьма сильным кровамо : бно аблать а въ такомъ случав и должно, чтобы изголовье ся щеніе по-

множество женщин кв той, ноторая мучится родами; ибо всё сін го людей подруги и не тонмо чиобы могли быть полезными у служать един- вь тоть ешвенно нь загораживанію немваты и мешають особамь нужнымь: поной, где сверькь же того шуможь своимь обезпоноизають больчую и часто на- рожечица нос ть велиной вредь своими советами нелёпыми или подаваемыми мучится, не истати.

сля родовь было низкое, дабы лежала она прохладно и была бы будеть содержана во всемь шакь, какь и во время сильнаго весьма отищентя мысятнаго, о которомь мы говорили выше; смотри члень VII, § 2 сей главы.

Примочни по воль родово будеть чрезчурь изобильное, или шакожь сжели роженица имвешь сильное провотетение, що надлежить намочивши полось виномь шенца вы волу смышанную пополамы сы уксусомы или сы красныны виномы, прикладыващь ей на брюхо, на полсиицу и на лядееи. Сти полотенца надобно перемынать, какы скоро высохнуть, и на мысто ихы прикладывать новыя, пока провотетение не начнеть укрощаться.

Сытсь уни- ВЪ подобновЪ случать я испыталЪ превосходмающая ныя дъйствія следующей смёси:

R daoque.

Возьми перегнатой воды изб полея, По двъ Перегнатой воды коришневой, унціи; Эликсиру купороснаго, -- от в сорока до шестидесяти капель.

Смъшай.

По Лапынь:

Recipe aquæ distillatæ pulegii,
Aquæ distillatæ cinnamomi,
Syrupi diacodii,
Elixivi vitriolici, - - a quadraginta usque ad
sexaginta guttas.

Misce.

трість. Сей сміси давать надобно по дві столовых в ложки чрез важдые два часа, или чаще, ежели только пужно.

(Becs.

(Весьча важно узнать, что безмёрное тегеніе оть чего происходить иногда, такь какь и сильное происходить иногда, такь какь и сильное происходить инодерение матогное, оть некоторой частицы места происходить инодерение ста, или другаго тела задержаннаго вы маткь; что весьма самое искусный Якушеро немедленно вынуть можеть. Спавных:

Впрочемъ крови посль родово могуть быть кон не ксевсьма сильныя у нькоторыхъ женщинь, кот онь не гла тречувствують от того ни мальйшаго безпокойства; пьигрешевь
сльдовательно не всегда по видимому изобилію сего
вещества надлежить судить о тегеніи безмірномь,
но по принадкамь, кои влечеть за собою, какъ-то по
напряженію брюха, помраченію зрынія, обморокамь,
судорогамо, волды реватой опухоли ногь и проч. Въ
сихъ-то случаяхь токмо должно приниматься за
ліжарства здісь предложенныя.)

ЧЛЕНЪ Ц.

Отрудных в припадках в или тяжкой воли, о везсонниць, о жары и прос. в в разных в састях в тыла.

Ежели женщина послё того, как в совсём в опро-что надоблетается, чувствуств великую боль, то должна она но дёлать, пить мок ротожидительной отваро теплый, как в - то женица обслиую води, или тай св небольшим в количеством в шаф чувству рону: надлежить також в давать ей легкіе отвары, в в еть таж кои класть нёсколько сёмяни тминиаго (сатиі) пли немую боль; много корки поме ранцовой. Можно також в давать ей почасту в в день по унціи сладкаго миндальнаго масла в в стакан в котораго нибудь питья преждеупомянутаго. Естьи же роженица будеть мучиться сильною без в зеонняцу сонницею, то надлежить временем в давать ей по сильную; ложк в сиропу макорожетнаго в в стакан в того же самаго питья.

Естьли же будеть у нее жарь, или располо-жарт, расжение кь лихорадкь, то должна принимать чрезь кажкь ликодые радкь. дые пять или шесть часовъ, въ стаканъ обыкновеннаго своего питья, по одному пртему слъдующаго порошку:

Возьми раковых в жерновок в приготовленных в половину унціи;

Отищенной селитры, - - двъ драхмы; Шафрану во порошкъ, - - одну драхму.

Смъщай все вмъстъ, и раздъли на восемь или на девять пртемовъ.

По Лашынь:

Recipe lapidum cancrorum præparatorum, unciam semis;

Nitri depurati. - - - drachmas duas;

Pulveris croci, - - - drachmam unam.

Misce; siantque doses octo vel novem.

Мрипадни Когда роженица будеть чувствовать припадки маточные маточные, то надлежить давать ей почасту въ день по двенадцати капель настойки дурнаго духу (tinctura assa foetida) въ рюмкъ наливки изб полея.

членъ ш.

О воспалении матки.

Воспаление матки есть бользнь опасная и до-

Прихины воспаленія матки.

(Остановление кровей посль родово почитается самою общею причиною сей бользни; однакожь можеть она еще быть слъдствиемь ушибино, сильных страстей, преждевременных родово, задержания места вы маткь, а иногда и остановки месятных кровей у женщинь такихь, кои не беременны и не роженицы.)

II pu-

Признаки воспаления матки.

Сте воспаленте открывается болью въ нижней части чрева, которая обыкновенно бываеть несносиве, когда къ оному мъстъ притронешься; напряжентемъ или пруглосттю дътородныхъ частей, великою слабосттю, внезапною перемъною во всемъ составъ тълесномъ, безпрерыеного лихорадкого, сопровождаемою пульсомо слабымо и нескорымо, легкимъ бредомо, иногда ресмого, безпрестанною икотого, истечентемъ воды рудожелтаго цвъта, вонючей и вакой изъ матки, частыми позывами нанизъ, жаромъ мочи, а иногда и соверешеннымъ запоромо оной.

(Воспаление матки почти всегда бываеть смертельно, и не продолжается никакь далье седьмаго дня, который почитается самымь страшнымь: ръдко оно разбивается само собою; но всего чаще оканчивается насноемиемо и антоновы мо оснемо.

Саный сильнейшій ломы и напряженіе всёхы при-знани кокадковы означають нагносніє; ознобы, обмороки и хо называклодный потів бывають предвещателями антонова огня. щіє нагносніє и анто. Не редко случалось, что воспаленіе матки перерожда новь огонь лось такожь вы желеаки или затверделую опухоль, вы матинь. вы рака и проч.)

Пользование воспаления матки.

Сія бользнь должна бышь пользована шак вкак время кро
и всь прочія воспалительныя, кровопусканіем и мок вопуснаротожидительными лькарствами. (Время, когда должнів.

но пускать кровь, есть первыя трое суток ; и сей
пункть почитается за самоважньйшій. Можно такожь
повторять кровопусканія, смотря по льтамь и силамь
больной и по усилію самых в припадково.)

Больная должна пишь овсянаго ошвару или воды пишье сеовсяной по чайной чашкъ раза шри или четыре в ущ. я пос-Томо IV. промыва. ки, вЪ которомЪ отваръ разпускать вельть по двечатmельныя и цаши гранов'ь селитры. Сверьх'ь того надлежить ей припарии. ставить часто промывательныя изв воды св мо окомв, къ животу прикладывать полотенца намоченныя въ теплой воль, или пузыри наполненные молокомо тепдымъ пополамъ съ водою.

ЧЛЕНЬ IV.

O63 остановки кровотечения или отищения посли родовб.

Сколько времени продола жаенися очищение

(К ровотечение после родово продолжается обыкиовенно от осьми до пяшнатиати супокь: однакожъ случается иногда, что крови сін перезтають течь въдвое или трое сущокъ, или продолжаются до дватроженивъ цати, тритцати и даже до сорока дней, безъ малъйшаго от в того припадка.

ВЪ каномъ жоличесшав оно бываеть.

Количество сихъ кровей столько же не опредъленное, какЪ и самое прододжение: бывали шакия роженицы, кои оных в совствив не имъли; а сте случалось особенно съ штин, которыя не носили мисятнаго; другія же, у конхъ бывали они столько сильны, что непремънно должно бы испугаться, естьли бы впрочемъ не обналеживало доброе состояние больных в, как в- то ны дълали о семъ замъчание на стран. 199 сего Тома

Свойство очищенія. Роженицъ.

ВЪ отименти рожения, в чрезвычанно много находить ся крови въ первыл и на другія суптки: по томъ становишся оно чище и принимаеть видь красноватой жидкости, которая нечувствительно начинаеть бълеть, и стущается наподобіе мутнаго молока, мало помалу убывая. Какое бы ни было количество сего истеченія, всегда относительнаго къ страждущей имъ. но ежели оно остановится, то производить самые величайшіе припадки; не редко и смершь плачевнымъ двиствиемь онаго бываеть.)

Пригины остановившагося посль родово кровотекния.

Бользнь ста из всвх в запоров или остановок в почитается самою страшньишем: да и умирают в отв нее больныя прежде четырнатцатаго дня. Другія же осищентя, как в-то сильный пот и попос бывают в не рыдко причиною сей остановки; но самыми общими причинами наллежить полагать погрышности в в пищеу потребленти, холод в, подбрюшники слишком в тысные; гивов, страх в, грусть и прочія страсти сильныя, припадки матосные, душистыя вещи и проч.)

П ризнаки остановки кровей у роженицв.

Спанова и лихорадка бывають первыми следений остановки остановки рожений, а притомь оказываются непосредственно и всё признаки воспаления, каковые суть: сильный жарь, жажда, тоска, жестокая боль вы головы и поскаха; глаза бывають свержающе, лицо красное и пулься очень крыпкой: мало помалу брюхо подымается, и вы немы чувствуется весьма сильная боль, такы что больная не можеты снести ни самаго малышаго прикосновения. Моча не течеть, или течеты токмо вы весьма маломы количествы: дыхание становится самое трудное; бредя, судороги, удушие и слабости приходящи, бывають предвыщательными знаками сперти.

Видъли уже мы, что стя остановка бываеть обы- вольгии, кновенною причиною воспалентя матки и вовжь тяж- кантя мо- кихь признаков оное сопровож зающихь: и по произво изовти дить она такажь воспаленте во грудяхо, боль вы полоть останий и пахахо, весьма сильное колотье, боль во новки сихь подвядошной кишкв, лихорадку со пятнами, или съ кровей. Сыпью, припадки матосные самые жесточайште, бользи сонливую и самой даже паралить, кровохаркамие и щемоту, холодной пото, обмороки и проч.; она ще и щемоту, холодной пото, обмороки и проч.; она при-

причиняеть еще осадку гнейных в мокротв, которыя становятся бъдственными, естьли гной не найдеть себв пуши къ выходу наружу у.

Пользование остановки кровей и рожения.

Остановка провей носав родовь, такъ какъ и молошная ликорадка, о которой мы станемъ говоришь ниже, въ членъ IX сего параграфа, лолжны пользованы бышь почши шемь же самымь образомь, какь и воспаление матки, о коемъ предложено было нами въ члень предвидущемь. Во всъхъ подобныхъ случаяхъ самымъ надежнийшимъ пособјемъ почитаются питье въ довольномъ количествъ, легкія отищенія и припар. ки прикладываемыя на подбрющие и на кобковию KOC 172 %.

ды, ка- (Первою целію въ пользованіи остановки кровей ную пред-посла родова должно быть вызывание истечения положнив себь надо. Оныхъ, а сего иначе не можно достигнуть, какъ стараясь отвратить причину, произведшую оную остановку и ее поддерживающую.

Mosbsobsmie ocima. maa omb MOIDY:

Естьми же она происходить оть поту, которой великое число помогающих в в родах ватворен. вей, когда ные двери того покоя, въ коемъ лежитъ роженица, она произо- зановъсы и одълла весьма часто возбуждають, то надлежишь начать высыланіемь всехь особь безполезь ныхЪ, вЪ которыхЪ роженицѣ никакой нътъ налобности и возобновлениемъ съ осторожности воздуха въ той комнать, а для сего раскрыть занавьсь у ел кровати и убавить число одвяль. Мы сказываемъ. этобы средства сіи употреблять съ осторожностію: ибо не меньше бы опасно было, когда бы лежала она и въ холодъ излишнемъ; поколику и онъ производишъ равным в образом в остановку таковаго кровотегентя.

Въ семъ послъдненъ случат надобне класть теп- когаз сиз лыя простыньки на брюхо, между лядвеями и на но- зависнтъ ги, перемънять ихъ, какъ скоро начнутъ простывать жоло и одъвать умъренно больную, дабы только зберечь теплоту ей сообщаемую.

Надобно смотрыть, не туго ли стянуты под- от педбрюшники, или перевязки, которыми немилосердо связывають брюхо роженицы: ибо въ такомъ случав надпроч. лежить ихъ вовсе оставить; даи опасности от сего не будеть ни мальйте, ежели только роженица будеть окутана такъ, какъ совътовали мы выше; смотри спраниц. 191 и 192 сего Тома.

Надлежить перемвнить діэту, ежели больная діота. не следовала той, какая предписана на стран. 196 и претожить 197 сего Тома, и ей велеть употреблять одинь прощетьное стой отварь изъ цыпленка, телятины или изъ тра- и легное. вы женскаго волоса (adianthum five capillus veneris), какъ скоро припадки будуть тяжкіе.

Между тъмъ, какъ станеть заниматься всёми паковыми средствами, которыя почитаются за весьма важныя, надлежить врачевать самые тяжкіе и усильные признаки сей лютой бользни. Мы предложить наблюденте Г. Клерка, которое подасть прямое понятте о врачеванти, какого она требуеть. Поспож . . . родила весьма трудно перваго рабенка: "въ первые три дни все шло хорошо; но въ последующую почь всё обстоятельства видъ свой переменили; "крови остановились, лихорадка оказалась, въ подбрюми сделалась боль, животь напучился, и больная мучена была колотьель въ желу дкё: внезапность и вели, кость врипадковъ возвъщали предстоящую опасность.

"Отецъ мой, пользовавшій сію больную, предло-"жиль собращь совыть: Г. Бютетв призвань быль со Щ 3 " мною. Я только возвратился тогда из В Парижа, гл в Г. Ясэ, трюко снаблиль меня наставлениемь, что, какв ско-, ро будеть въ какой нибудь части засорение, восна-, ленте и судорожное стъсненте, издобно весьма осте-,, регапися, дабы не увеличить принадковь отведениема "крови къ оной. Въ такомъ точно случав находилась "Госпож. . . . Будучи вспомоществуем в симв наста-" вленіемь, per largiora vafa, я взяль смылость предло-, жишь свое мивыте, которое топчась удивило онаго "Врача, призвавшаго насъ въ совъшъ.

Tames. Rhills.

крозону- ,, Следешвие происходило не долго: больной пуенаніе изв., стили крова изв руки; а послв чрезв полчаса вельчего? Ван., ли мы ей поставить ноги въ теплую воду съ перены для ,, вязкою повыше каждой лодыжки; на живошь присонарки мяг-,, выповали мы прикладывань мястинельныя принарки. "Въ то же почти самое время больную рвало нъсколь-"ко разъ, и шла изъ нее въ великомъ количествъ ма-" терія на подобіе молока и весьма переработанная въ ., желу дкв: я бы даль ей приняшь въ предосторожность , гранъ или два реотнаго порошку, распущеннаго въ , довольном в количества воды, судя по необходимости ,, онаго, естьли бы двиствующая натура не воспрети-" ла мив всякое иное вспомоществование. Больная чув-. ствовала себя как бы оживотворенною; и нособія .. внашния подвиствовали столько хорошо, что чрезъ при или четыре часа послъ кроебпискания жроей по-, явились и всв припадки миновались.

Bernnag

Однакожь какь судорого играсть знатную роль жолезность въ останоски кровей, не взирая на то, что она очень оудорот. часто приключается от в нечалей, прискороги духа и пристрастій души, то и нужно весьма укропнить естановив двиствие чувствительных в жиль. Следовательно и не мровен но-одвродов. льзя никакъ освободить себя отъ предписанія лькарсшвь промиезсудорожныха; ноелику чаще всего производять они действія удивительныя. Самыми лучши-капактова ин изъ таковых в лекарство почитаются: капли Гоф- мановы, мановы, вода изъ цевту померанцоваго, настойчи вода нав смирненная (tinetura myrrice) и вобровая, сиропо ма мера пове корожетный, масло мин дальное сладкое, смышанное вмь-го, настойств св сиропомо миндальнымо и проч.

менная, ж

Гофмановых в капель и настойки смирненной и воброзая в бобровой предписывается на вртем в от в дватцати до примв. тритцани капель в'ь стакан в обыкновеннаго питья; воды изъ цевту померанцоваго на кажлой пріемъ по столовой ложкв, а макорожетнаго сиропу от в скрупула до двухъ въ томъ же количествъ питья. Чтожъ касается до масла изв сладкаго миндаля и сиропа лимоннаго сившанных вывств, то оных в надлежить давашь по одной столовой ложкъ каждый часъ.

Можно делашь и питья, составляемыя съ си-составъ ии лекарствами, какв- то следующія: mpommao-

Возьми воды салатной, - - шесть унцій; Воды цевту померанцоваго, одну унцію; наго, Капель Гофмановыхв, - - - двъ драхмы; Сиропу гвоз дитных цевтово, одну унцію.

Смашай.

По Лашынт:

Recipe aquæ lactucæ, - - uncias sex; Aquæ aurantiorum florum, - - unciam unam; Liquoris anodyni ninerais Hoffmani, drachmas duas:

Syrupi tunicæ florum, unciam unam.

Misce.

Или возьми воды липовых девтово, - - шесть унцій; Увастойки смириенной, 7 каждой по полу-Бобровой, - - - \ Apaxmt; Сиропу гоздитных цевтово, одну унцію.

Смъшай.

Но Лашынт:

Recipe aqua tilia florum - - - uncias fex: Tincturæ myrrbæ. 3 ana drachmam femis: Syrupi tunica florum, - - - unciam unam: Misce.

Или возьми солы липовых девтова. - - месть унцій: Волы цевту померанцоваго полторы унийи: Сиропу макорожетнаго - половину унцін.

Смъшай.

По Аатынь:

Recipe aque tilia florum, - - - uncias sex; Aquæ aurantiorum florum, unciam unam cum Syrupi diacodii; - - unciam semis.

Mifce.

Heighe's Каждаго изъ сихъ пишья принимать надобно по столовой ложкъ чрезъ часъ.

Вивсто кросопусканія из руки, которое употребиль завсь съ успъхомъ Г. Клеркз, но которое не во всяких в помогает в случаях в, не полезные ли бы было припускать пілвицо къ детородному уду, влоль больших в губб, около задняго прохода, между лядоей, къ пахамв, и наконецъ улепить оными вск жить ихь сім части, какъ то совытуеть Г. Робертв, Докторъ факултета Парижского, въ согинении своемь о главных в предметах В расебной Науки, и проч.? Онъ предлагаеть два наблюдентя къ утверждентю сего совъта, гль онь совершенно имьли успых вы остановка масягнаго отищения; а си объ бользни имъють столько между собою отношентя, что не льзя пренебрегать оным важным в наноминовентем в.

Опасности pBolffнымъ.

Пренму-

Mecma2 пілвицЪ.

припу-

AKSWIB.

Куданадле-

Онъ дълаеть еще разсуждентя весьма разумныя о рестиомв, коего употребление учинилось столько

общимъ въ сей бользни. Тошнота, говоритъ онъ, и позывы, какіе имъють нъкоторыя женщины на рвоту, бывають дъйствіемь судороги сильной, запрещающей реотныя, поколику оныя умножають судорогу; а притомь производя жестокое потрясеніе, могуть ввертнуть больную во гробъ.

,, Когда, продолжаеть Г. Клеркв, оть худаго ,, вниманія запущены были припадки столько, что ,, оны е сдълались шяжчайшими; когда Врачь призванЪ "будентв поздо; когда прилитіе крови млекопо добной , къ головъ причиняетъ сондивость и бреда съ по-,, мышательствомы разсудка, или когда больной меч-,, тается, будтобы она видить искры, стечение при-,, знаково, составляющее подлинный паралить, назван-, ный паралитемв молошнымв: то опасность бы-, ваеть гораздо достовърные въ подобномъ обстоя-, тельствъ, нежели во всяких в бользнях в таковы. , ми признаками сопровождаемых в. Тогда кровопуска- Кровопу-, нія из руки и из ноги бывают в безполезны; а снаніс нов ,, можно отворять кровь шейную, которая иногда снів мужн , пользу приносить. Нарывных лекарства, как в - то лепешни s, пластыри изb шпанских мухв между плечми, изв гора ,, лепешки изъ гортицы къ полошвамъ, а можетъ быть , и рвотное, которое можеть произвести всеобщее ,, потрясение, почитаются единственными наконецЪ ,, средетвами, остающимися для Врача. Находится "несколько примеровь объ успехе оныхъ; но только ,, они ръдки: впрочемЪ шпанскіх мухи и всякія нарыв-, ныя лекарства наружныя требующь довольно вре-"мени къ произведентю дъйствія, такъ что прежде ,, онаго иногія больныя умирають.,, встественная исторія о келовька больномо, Томв І, стран. 396 и сльдующія.

Ъ

члень у.

О воспалении грудей и о трещинь на соскахв.

(Чрезъ сте разумвется здысь единственно воспаленте груди, происходящее от в застоянтя или остаковки молока въ самыхъ титикахъ)

Присины и признаки воспаления грудей.

(Внезапная простуда, сильныя страсти, ушибися, полученные удары и проч., чаще всего подають новодь къ сему засорению соспалительному, сопровожденому все да ликорадкою, а часто и жаждою, головенью болью, трудностию дышания и проч.)

Пользование воспаления грудей.

Когиз изры во красто будеть соспаление въ грудяхъ, сопроры во красто румяностию, твердостю и другими приваеть опасень.

знаками нарыва опаснаго, то самымы надежныйшимы
лекарствомо внышнимы почитается катаплазмо или
припарка припарка изы мякища жлынаго сы молокомо, умятчентак мяныная масломо деревяннымо или сливоснымо собжимо:
таковую припарку надлежить перемыным раза четымолономы, ре или пять вы сутки, и продолжать до тыхы поры,
пока опухоль не разобыется или нарывать не станеть.

Опасность Лекарства отвлетительных или снутрь вгоняющих авизореть вы семы случав почитаются за весьма опасныя: повнутрь елику часто причиняють они лихорадку, а иногда прощихы. изводять даже рака; нагносте же напрошивы того рыд.
ко бываеты сопровождаемо какою либо опасностю, а
чаще всего имветь дыйствуя весьма полезных.

(Воспаление грудей во всякое другое время, кроив только посль родовь, разбивается довольно легко, когда боль сия не усилится: но то, которое происходить оть нагрублаго молока вы груди, такь какь сие ете предполагають, оканчивается почти всегда вередомо, и не можно сего избъгнуть, когда оный жаро
продолжится болье четырехь или пяти дней. Должно
такожь опасаться, чтобы не сдълалось и самой фистулы, естьли гной въ ономъ нарыей будеть оставаться слишкомъ долгое время.

Кромв припароко изб мякиша хлюбного съ моло- Кровонукомо, кои безпрекословно почитаются за весьма хорошія лъкарства, надобно иногда приниматься за кросопусканте изб руки или изб ноги, или лучше за пія- пільици.
сицы, припускаемыя къ самой груди, для воспрепятствованія большему усиливанію соспаленія; а не ръдко
служать онь вмъсто разбисательного средства. Сверыхъ
же того надлежить стараться и объ очищеній желу дка промывательными мястительными и боль утоляю промыващими.

Пользование трещины на соскахо.

Какъ скоро на сосках будуть находиться тре-немазна имины или садна, то надлежить мазать ихь смесью ване деремизь дереваннаго масла съ соском, или распущенного масломь произвести хорошія действія и вода Унгарскал. Есть Арібеною лиже принадки сій делаются упорными, то надобно уперекою дать больной тистительное прохладительное, косту водою, редко они противуборствують.

ЧЛЕНЪ VI.

О высыпной лихорадкв у рожениц3.

(Время, когда оказывается высыпная или тетевищемодобная ликорадка у рожениць, чаще всего бываеть то, въ которое надлежало бы притти молошниць, о коей говорено будеть въ члень IX сего параграфа.)

To 2

пр хладия

M. Abildian

Высыпная ликорадка есть бользнь весьма обыкновенная у роженицЪ; но какЪ мало она различествуетЪ оть той, которая приходить вы другихь случалхь. и о которой уже нами предложено было въ главъ 10 Тома II, то мы и не станем в болье заниматься ею. Должно только савлать примвчание, что тягость въ дурные и головъ съ звънениемъ въ ушахъ, щемота въ грудяхв, и пульев слабый и неравный, въ высыпной лихоражь у режении в почитаются весьма дурными предвыщателями. То же самое разумъть надобно и о поносъ, который можеть помъшать истечению кровей и разстроить самое извержение. Бредв, естьми онъ не смертоносенъ. можеть переродиться вы таких обстоятельствах в въ безумство, продолжающееся долгое время, а иногла и цёлую жизнь.)

Признаки

опасные.

Средства како предупреждать высыпную лихорадку у роженицв.

Славный Гофмана примъчаеть, что можно во-Во время беременно- обще предупредишь стю лихорадку у рожениць, естьли во время беременности предписано будеть имъ наблюдать строгую діэту; ежели она стануть содержать себя въ умъренномъ телодвижении; когда будуть временемь принимать слабительное составленное изъ манны и ревеню, или изъ виннаго камия; ежели не забудуть онъ отворять себъ кровь въ первые мъсяцы, и естьли наконецъ стануть беречь себя отъ создуха холоднаго и сыраго.

> Не менве нужно примишить еще одно обстоятельство, чтобы прежде времени не вызывать пережватова чрезъ лекарства могущтя восналить кроез и мокропы, или доставить онымъ движение и волнение прошиву нашуры.

> > Ho

Но какъ скоро онъ родять, то надлежить ста после рораться, дабы крови у нихъ имъли обыкновенное свое дозъе течение; а естьли пулься будеть сильный, то предписать немного селитры и проч.

Ч Л Е Н Ъ VII.

О горяткъ багровой или съ пятнами у роженицъ.

Самая опаснъйшая для роженицъ бользнь есть вользнь горятка багровая или съ пятиали. Она оказывается самая опасобыкновенно на второй или на третти день послъ родаля рожей иногдажъ приходитъ она и позже; но въ иное ницъ. время, хотя и ръже, не открывается прежде пятаго или шестаго дня.

Признаки горятки сб пятнами у роженицб.

Начинается она, такъ какъ и большая часть другихъ горятеко или ликорадоко, ознобомо, за которымъ последуеть безсонница, боль головная, жестокая тошнота и желтная реота. Больная чувствуеть обыкновенно великую боль въ спинъ, въ лядвіяхъ и въ самой даже маткъ. Внезапная перемъна дълается тогда въ количествъ и качествъ кросей.

Больная мучима бываеть жиленгемо или частыми позывами нанизь. Мога, которая бываеть очень красна, выходить въ маломъ токмо количествъ, да и обыкновенно съ ръзомъ; брюко становится иногда чрезвычайной величины и болить при самомъ мальйшемъ прикосновении.

Когда горятка продолжится нёсколько дней, то она приусиле воспалительных признаково обыкновенно ума-нимаеть ляться станеть, и тогда болёзнь сіл начнеть принимать нёкоторое свойство гиилости. Попосо желтный проили гиилой оказывается часто въ сіе время, а иногда тествій тескольи ранке; и сей упорный и опасный мыть сопровождаеть по томь самую бользны во всехь ея последуюпи-хЪ состояніяхЪ.

Пользование горятки со пятнами у рожениях.

Ньшь бользней, которыя бы требовали пользованія єв большею осторожностію и вниманісмв, какв еїя горягка: следовательно и надобно употреблять помощь какЪ возможно скорую.

⊕бсшод∗ WITE A B CITE E & mpe6 v 10пусканіл.

К росопускание притодно вообще женщинамъ полнок роспымв въ началъ сей бользни; однакожъ должно треоум. никогда не повторять кровопусканія, разві только будуть весьма тяжкіе признаки воспаленія, и въ подобномъ случат надобно еще присовокупить къ тому

Карывный нарывной пластырь, которой прикладывать къ тасти пластырь. матоской.

TIMO Maro--6но дв-. 5 y .

Во время ознобу надлежить употреблять всякія средства къ уменьшению онаго усилий и жестокости: время озно- чего для и должно давать въ великомъ количествъ теплаго питья мокротожидительного; а ежели больная ослабветь и придеть въ изнеможение, то присовокуплять кв оному временемв по стакану сыворотки или по рюмкъ вина. Къ конетностямо прикладывать можно теплыя вещи, как в - то гратые кирпичи, бутылки или пузыри наполненныя шеплою водою, и проч.

MITTEN. пельны я mpoMblE4тельны ж ESDA KAK

Во все время продолжения сей бользни надобно ставить и повторять часто пролывательныя мястительных, составленныя изъ волы съ молокомо или во все вре. изъ отвару телятьяго. Они полезны бывають по томя продол- му, что очищають кишки и служать каквом некоженія сей торыми припарками внутренними маткв и частямь сь оною спежнымь: однакожь тековыя промывательныя налобно употреблять со всяким в искусством в мо торожностью по причина чувствительности, коей полвержены бывають вы то время всы части заключающияся вы маломо подтеревкы.

Для освобожленія желу дка от в желти, коею он в легнія слазобременень бываеть, длешея вообще рвотное; по вышельныя; как в рвотныя весьма способны вы таком в случать кы увеличиванію раздраженія вы желу дкі и безы того уже слишком в немалаго; почему надежніе ночитается всетда, чтобы оставлять оныя, а на місто того давать какое нибу дь легкое слабительное, которое будеть иміть двоякую пользу, то есть прохлаждать спутренность и очищать желть.

Средства, кои я всегда употребляль съ боль преимутимь усивхомь вы сей бользни, суть лекарства сол- ще твалькгл. Естьли ихы надлежащимы образомы повторить, солкихь, то удерживають они ресту, а притомы и самую жестокость горяски утоляють.

Естьми же произведуть они мыть, или ежели обстоябольная страждеть безсонящею, то надлежить да тельства вань, смотря по обстоятельствань, по пъскольку требуюкапель лаудану Сиденгамова или немного сирону мако-карствъ рожеснаго. боле

Когда мыто будеть столько великь, что при тельныхь ведеть вы изнеможение больную, тогда надобно ей по-что выдоставить промывательное изы крахмалу, вы которое бно дылать, прибавить капель тритцать или сорокы лаудану, ваеть пить же давать ей отвары изы соросинского пшена, сильной вы каждомы фунты котораго надобно распускать мыть. по двы унции Ярабской камеди. Естьли же оты сихы промывательных пользы не будеть, то издлежить кореть корибычуть кы корню колумбы, предписанному вы чле-мумбы. нь 3, \$ 8, глав. 25, Тома III, или кы какому нибудь другому влательному крыпкому. Яства и пиньеВсякой пище вообще должно быть легкой, а питью мокротожидительному: однакож в как в скоро болезны довольно длится, то нужно укреплять больную летельными питательными и сильными крепительными.

Пользование горятки св пятнами у роженицв, когда она принимает в свойство енилости.

Уже упомянули мы, что сія бользнь, продолстовили вы жавшись ньсколько времени, часто превращается вы
меновть. лихорадку гнилую; а вы такомы случав и надлежить
давать хину или одну, или вывств сы крыпительными,
смотря по тому, какы обстоятельства требують. Какы
хина сама по себы имветь ныкоторое свойство чистительное, то и должно давать ее вы наливкы или вы
декокты, смышавы сы настоикою розовою (tintura тоблит)
или сы какимы нибудь другимы слательнымы лескимы,
или такожы слыдующимы образомы:

Возьми экстракту хиннаго, - - дватцать гранъ; Водки коритной - - половину унцін; Воды коритной, - - двъ унцін; Лаудана, - - десять капель

Смъщай все на одинЪ пріемЪ, которой можно повторять чрезЪ два, три или четыре часа, или столько, сколько потребно.

По Лашынь:

Recipe extrasti chinæ corticis, - - - grana viginti;
Aquæ cinnamomi spirituosæ, - - - unciam semis;
Aquæ cinnamomi, - - - uncias duas;
Laudani liquidi, - - - guttas decem.

Misce, ut siat dosis una.

Промыва.

мельныя

инт. шель.

ныя.

Но когда желу доко не вы состояни перенести сего лькарства, то надобно пособствовать больной промывательными изы отвару говяжьяго или цып... лачьяго.

Cpe A-

Средства, како предупреждать горятку со пятнами у роженицо.

Аля предупрежденія сей бользни родильница дол-пища, жна быть въ совершенномъ спокойствій; питаться ей свымій надобно летвами легкими и простыми; комната сладукть, надобно летвами легкими и простыми; комната сладукть, чтобы въ оной перемежался создух свыжій. Ибо ныть ничего опасные для женщины въ семъ состояніи, какъ находиться въ излишней теплоть. Не надобно се много кутать, равно какъ и не позволять ей вставать очень поспытно. Болье же всего нужно для нее наблюдать систому; и сте обстоятельство починаблюденіе тается за весьма важное, какъ-то мы показали въ на-чистому, раграфь 5, глав, то Тома II.

YAEHD VIII.

О лихорадки родильница.

(Бользнь, описываемая въ семъ членъ, до сихъ недавних времень столько почти пожирала жертвь, еколько бывало недужных вею одержимых . Приченяемая ею гибель приводила въ отчаяние Врача, который лишаемъ даже былъ и того утъщенія, чтобы надъяться имъть какой либо успъхЪ. ВЪ Парижской богадъльни была она гибельна для всъхъ женщинъ, которыя бывали ей подвержены; да и всв наблюдентя разсвянныя въ Авторахъ, и тв, кои собраны искусными Врачами, елужать елинственно къ утверждению гибельнаго свойства сей лихорадки. И такъ неоцъненною надлежало почитать услугою для человычества изыскание способа врачевания оной, которой бы быль прость, удобоупотребителень и сопровождаемь успъхомъ всегда надежнымъ. Наконецъ таковой способъ открыть, и мы одолжены имъ Г. Дульсету. Врачу Парижской богадъльни, котораго преждевремен-Joma IV. Ы ная

ная смерть похитила недавно къ всеобщему сожаль нію публики. Мы спышимь обнародовать сей способь, по причинь чрезвычайной его простоты, и поколику им удостовьрены, что и при мальйшемь вниканти вы предлагаемое теперь нами описанте сей бользни, легко можно будеть сы пользою употреблять оной. Ибо что касается до сего описантя, то оно есть перечень записки читанной вы одномы собранти Медицинскаго факультета, называемомы Prima mensis, и помышенной вы Медицинскомо Журналь Ноября мысяца. 1782 года.

Пихорадка сіл приключается от молошнаго изліянія на внутренность подбрюшіл въ то время, когда бы молоку должно было пробираться къ грудяль. Истинна сіл подтверждается вскрытіемъ мертвыхъ тъль, представляющихъ вещество молошное, подобное непроциженной сывороткъ. Сіл матерія бываеть весьма вонючая, болье или менье изобильная, простирающаяся не ръдко от четырехъ до шести фунтовъ; и въ ней примъчаются немалыя глыбки творогу, обыкновенно очень бълаго, коихъ довольное число прилипаеть къ поверхности самыхъ кишекъ. Агличане, открывшіе сію бользнь, дали ей названіе лихорадки родильницыной (febris puerperalis), такъ какъ подъ именемъ Fievre puerpérale извъстна она и во Франціи.

Признаки лихорадки родильниць.

(Состоянте женщинъ, прежде нежели бывають онъ одержимы сею бользнтю, не представляеть ничето такого во время ихъ беременности, даже и послъ самыхъ родовъ, чрезъ чтобы можно было подозръвать, что оное будеть сопровождаться толико бъдетвенными послъдствтями. Все бываетъ весьма хорошо до третьяго дня, эпохи роковой, при которой начи-

начинають оказываться признаки самые опаснъйтіе. А дабы описать ихь вы порядкь и ноказать, по чему должно различать сію особенную эпоху, то мы раздълимы ихь на признаки всегда существующіе, то есть общіе всёмы женщинамы, сею бользнію страждущимы, и на признаки, которые примычаются часто, или кои только у немногихы изы нихы оказываются: а изы сето всякы легко чувствуеть, сколь важно не запускать первыхы и тотчасы приступать кы врачеванію бользни.

Сказали мы, что первые знаки сей бользни открываются на третій день; и сіе время есть самое обыкновенное: однакожъ появлялися они гораздо ранье и даже чрезъ ньсколько часовъ посль родовъ.

Какое бы ни было время открытіл оных дола признани кож тот тот веста судно не весьма сильный: пульсо бывает слабь, ств ществующе, или снень и насколько скорь; груди начинають опадать сущемитновенно, вмасто того, чтобы имь болье увеличистваться, как то обыкновенно вы сте время случается; брюхо пучить и далается вы немы чрезмарная боль, безы всякаго уменьшентя кровей, кои безпрестанно продолжаются течь хорошо. Сти-то суть признаки, предшествующе существенному, началу самой бользии, и кои всамы женщинамы бывають общте; но кы онымы можно еще присовокупить и совершенное увлданте силь.

КЪ симЪ признакамо присоединяющся иногда, а признаки пришомЪ и сЪ немалою разнообразностию, вЪ разсу-особенные. ждении разныхЪ больныхЪ, еще и слъдующе: 1, оз-иобо, болье или менье сильный, оказывающийся вЪ началь; 2, рвота материями зелеными или слегка желтоватыми, а чаще всего одна тошнота безЪ рвоты; 3, мыто бълосатый и весьма вонючий; 4, глаза мушять Ы 2

ся; 5, лицо теряет цвъть, и 6 наконецъязык вывает в обыкновенно влажен и покрыть нечистотою бълою, довольно густою, а иногда зеленоватою желтиною в в самом в его корена.

время, но- Прежде-нежели мы окончимъ всю картину сей гла надоб-бользни, нужно предувъдомить, что въ самомъ пермо упо- вомъ началь опой должно быть употреблено пользотреблять ваніе, о которомъ мы шенерь подробно говорить намърены; ибо умедливъ нъсколько часовъ, обыкновенно уже бываетъ поздо приступить къ оному.

СверхЪ описанныхЪ теперь нами признаковЪ, не встрачается иныхъ никакихъ, по крайней же мара въ первые часы бользни. Единственнож в примътить должно то, что они становятся гораздо напряженнъе, пулься болье и болье слабьеть и дълается ствененнье; груди остаются опалыми, обращения молока ни мальние не бываеть, и боль подбрющия, коего напряжение увеличивается, бываеть нестерпимая. Но вскоръ по томъ, а именно, подъ конецъ втораго дня бользии, или въ течении третьяго, припадки си ешолько уменьшающся, что даже можно иногда почесть их в за совершенно прошедшие: но гибельный покой! не ръдко за оным, в послъдуеть небольшой потв холодный и вязкой; испражнения на низв и кровотетенія производять вонь нестерпимую; пулься быстся слабо и съ разетановкою; въ головъ бываетъ дурно, и больныя умирають вы концъ третьяго или въ жачаль четвертаго дня бользни, рыдкоже прежде, а иногда ивсколько и позже.)

Пользование сей лихорадки родильницо.

Успъхъ способа, нами теперь предлагаемаго, зависить от в самой величайшей поспъщности въ упо-

требленти авкарства, какъ то предъ симъ уже говорено было: почему и нужно весьма, дабы всякому, а наиначелюдямъ благотворнымъ, онъ былъ извъстенъ; ибо ръдко случается, чтобы Врачей, даже и въ самыхъ городахъ призывали къ роженицамъ особенно въ первые дни послъ родовъ; а притомъ когда и позовутъ ихъ, то время, которое проходитъ до прибыта оныхъ, уже довольно бываетъ ноздно къ употреблентю въ пользу ихъ помощи.

И такъ съ самаго перваго открыття подобныхъ признаково не надобно терять ни минуты и предписать ипекакуанну: ее давать должно на пртемъ по пят-ипекакуз надцати гранъ въ двухъ рюмкахъ воды, и сей пртемъ на вельть повторять чрезъ каждые полтора часа. По-пртемъ слъжъ, какъ больную перестанетъ рвать, надлежитъ давать ей по ложкъ слъдующаго питья:

Возьми масла миндалю сладкаго - - двъ унціи, маслясное Сиропу проскурнятнаго - - одну унцію; пишье съ Кермесу минеральнаго - - два грана.

Размъщай корошо кермего со масломо и сиропомо:

По Лашынь:

Recipe olei amygdalarum dulcium - - uncias duas;

Syrupi de althæa fernelii, - - unciam unam;

Kermetis mineralis, - - grana duo.

Misce.

Сего питья давать надобно по одной столовой ложкв каждый чась, и чаще, ежели только нужно. На другой день, не смотря на уменьшение признаково, надлежить начать вновь давать ипекакуаниу, а по томь оное питье тъмь же самымь образомь, а особливо, естьли сти признаки остаются еще въ одинаковой напряженности, что самое очень ръдко бываеть, когда лекарство дастся въ надлежащую пору. Случалось иногда, что многте принуждены бывали врать

брать къ оной прибъжище до трехъ и четырехъ разъ, какЪ скоро брюхо оставалось всегда надушымъ и болъло, а пульсю не приходилъ въ прежнее состоянте.

Turnsek

Питье должно быть простое, какЪ-то, на примъръ, оптваръ изъ ланянаев съмяни или вода изъволтьяго кория, полслащенныя сиропомо проску ронятны мо Слабитель (furup. de althaea fernelii). ВЪ сельмой или осьмой день бользии надлежить дань слабительное изъ двухъ унцій манны и одной дражмы соли щелогной вино-каменной (fal. tartari), лекарство весьма легкое, которое можно повторить раза три или четыре, и саблашь кръпче, ежели будешь нужно.

> Нъкоторыми наблюдентями, ръдкими по истиннь и учиненными со времени употребленія означеннаго способа доказано, что надлежитьеще къ оному имъть прибъжище даже и тогда, когда пропущено будеть насколько часовь, и когда настоящее время давать ипекакуанну уже миновалось. Ибо небольшое число удачныхЪ произшествій оправдало употребленіе оной вЪ подобных в обстоятельствах в злополучных в. И так в, ежели по какой бы то причинъ ни было, не можно было дать сего лекарства въ самомъ началъ бользни, не должно опускать предписантя онаго, поелику можно еще возвратить жизнь больной, которая, безЪ сего бываеть жершвою неминуемой смерти.

> Изивление можно получить от сей бользни, хотя бы и не было обращения въ молокв, то есть хотя бы грудь и не надувалась примътнымъ образомъ, какъто сте случается обыкновенно на третти день родинЪ; поелику вся машерія молошная очищается нигомд, истекаеть сь кросями, или выходить испариного или мотего.)

члень іх.

О молошниць или лихорадкь об грудях ..

(Какъ скоро матка освободител отъ рабенка, причина то начинае пъ сжиматься и изгибаться сама собою; провотечено она изгоняетъ по мъръ того, какъ сокращается, всъ нія у росодержащися въ ней мокроты; что самое и подаетъ поводъ къ истечению кровей послъ родовъ. Собиравши молона въ яся во оной прежде для кормления младенца пита-грудажъ тельные соки перемъняютъ путь и простираются къ грудямъ, гдъ и получаютъ скоро видъ и густоту молона.

Мудрая и прозорливая природа, коея намфренте очевидно есть то, дабы женщина раждающая на свът въгрудахъ младенца, онаго питала сама, посылаетъ непрестанно къ грудямъ послъ родова новое количество молока въ замвну того конгорос долженъ высасывать рабенокЪ; но ежели мать столько имветъ жестокосердія, что отрекается от священной должности млекопитанія, то груди ея напрягаются, начинають больть и воспаляются. Молоко вы нихы стущаетпрепященнвуеть приближентю того, которое приходить послъ, принуждаеть оное обратно оттекать часшію, такъ чно и остальное не бывъ от дълено (въ кровяных в сосудах в, производить въ нихъ излишество молошных в соковв. Приступлением в сей чуждой влажности вознущена будучи кровь, обращается съ волнению; и такимъ образомъ въ устройствъ жизненномо далается внутреннее движение лихора дку возбуждающее:

Следовашельно одни только некормящім грудью молошная женщины подвержены бываю пр лихорадка молошной: лихорадка такъ какъ сія самая бользнь и не долженсшвовала бы обынновено находиться въ мночислен помъ собраніи техъ, коими у техъ оскорбляется родь человьческій; поелику и стоить женщинь, нои не нормять.

только открыть глаза, дабы почувствовать необходимость налагаемую на всёх в женщин в, чтобы самим в кормить дётей своих в, как в - то мы показали сте в в глав в Том. I.

Надобно между тъмъ признаться, что есть и такія женщины, которая не кормя сами, не имъютъ молошной лихорадки; но сей случай очень ръдокъ т то развъ въ первый разъ раждающія женщины.)

П ризнаки молошной лихорадки.

Чрезъ шестьдесять или семдесять два часа Время поель родовь, посль разрышенія ошь бремени, роженица въ которое ствуеть сперва некоторое покалывание между кожею Mepable и штомъ, и великое изнеможение: по томъ прихопризнаки оказывалить къ ней головная боль, груди пухнуть; въ нихъ BORRER. авлается задхновение, от чего и становятся они неравными: больная чувствуеть въ нихъ сильный ломь; пульсо увеличивается, и бываеть крепкой, полный и напряженный. Довольно часто случается, что сія лихорадка приходить вивств съ высыпною; а иногда сія послъдняя служить переломомо самой мо-ROZIIHUUB.

> Молошная лихорадка вообще сама по себъ ничего не значить, когда она ограничивается предълами обыкновенными, или бываеть проста; но когда присоединится къ оной и остановленте кровей, то опасность гораздо увеличивается; и тогда по всему опасаться должно смерти близкой, естьли сверьх в того приключится тягость въ головъ, звонъ въ ушахъ, щемота ев груди, слабость, пулься тихой, бредь и проч. Молошная лихорадка простая продолжается обыкновенно двадцать четыре, тридцатьшесть, а иногда сорокъ восемъ часовъ.)

признани

Сколько
времени
продолжается
моложни-

Пользование молошной лихорадки.

(Когда лихорадка сія шествуеть порядкомь довольно обыкновеннымь, то потребна вы оной одна діэта, одного пищеупой требленія; которая должна быть строгая, не только кы воспретребленія; пяшствованію бользни болье усиливаться, но такога бокожь кы предупрежденію слишкомы великому от дылествуєть ніго молока, какы то мы показали сіе вы \$ 5, Тома порядномы П, главы 10.

Единственныя средства, как в скоро оныя нужказать их в льияным маслом грытым или при- ства, кокладывать к в ним в листье красной капусты. Надобно нужные
ную кому нибудь другому.

Ничего ньть способнье къ предупреждению мо- противно мощной лихорадки, какъ брать рабенка благовренатурь не менно къ груди. Ибо обыкновение, какое многия младенцу въ первые три сосать груди, противно самой натурь и здравому разсудку; ди благо а равнымъ образомъ вредно оно какъ для матери, такъ временно и для рабенка.

Каждая женщина, у которой есть молоко въ всяная грудяхь, должна давать сосать оное, или собственному женщина; у которой своему рабенку, или другимь, или такожь щенятамь, бываеть по крайней же мъръ въ первые мъсяцы: ибо сте почи молоко, тается единственнымъ средствомъ къ предупреждентю большей части бользней, столь бъдственныхъ ба сосать. Вать сельна рожениць, непослъдующихъ совъту преподанному въ в 4, Тома I, главы 1, чтобы давать рабенку грудь, какъ скоро онъ показываетъкъ тому желанте.

Средства како предупреждать молошную лихорадку.

Для предупреждентя лихорадки, сопровождающей дометь сеприходь молока въ груди, роженица должна давать 63 солять, Гомд IV. в себя

себя сосать часто: надобно такожь ей употреблять po onaсіе средство съ самаго перваго появленія молока въ жутся n · ps bre грудях в ея, кошя бы даже и не было еще никакого пр злаки молона въ предшествующаго знака лихорадки, дабы воспрепятствовать молоку скисаться, и дабы въ такомъ со-PPYARXE. могло оно смешащься опящь со всею не стояніи K DOBI 10.

Hpenympenopbi. EpombiB2тельиыя.

Еще должна она предупреждать запора; и кЪ жа ть за- отвращентю сего ничего лучшаго савлать не можеть, какЪ употреблять каждый день промывательныя умягтающія, и наблюдать діэту легкую, от в которой бы иогло слабишь.

ЧЛЕНЪУ

О грудниць, или загрубънги молока еб грудяхв.

Ошкуда проискожить наэначіе сей бользни.

(Женщины имъющія много молока, и коего не довольно высасываеть их рабенокь, подвержены бывающь засореніям вы грудяхь, вы которых в молоко скисается и густветь; что самое женщины и называють волосомв, потому что думали онв. что это бывали подлинные волоски затыкающіе труботки млекопосныя, и препятствующёе разлитію желвов грулныхЪ.)

Присины грудницы, или молока загрубълаго ев гру-ARX8.

Сильныя страсти, гивьв, нечаянная радость, страхь, почитаются частыми причинами сей бользни: но дъйствие холоду поражающаго внезапно груди, и опказЪ давать себя сосать, бывають самыми общими обыкновеннъйшими оныя причинами. Случалось еще иногда; что сія бользнь приключалась от в приклады. ванія веществь кислых в и вязательных в кв грудямь.

Я ризнаки грудницы.

(Грудь бываеть тверда въ осязани, а притомъ и перавна; въ ней бываетъ жестокая боль и съ жаромЪ. ромъ. Иногда женщины чувствують еще кусочки затверлълые молока; къчему присоединяется и лихорадка, предваряемая ознобомъ; но обыкновенно продолжается она короткое время.

Когда припадокъ еей не будеть захвачень ско- вольчи ро, то можеть онь сопровождаться следствими опа быть следствими. Не редко видимы мы, что грудница причи стімы нлеть вередо, а иногда онухоль, которая становится грудьецы затверделою на подобіе желвака, и которая перерождаясь вы рака, влечеть обыкновенно во гробь больную.)

Пользование грудницы.

(Строгая діэта въ продолженіи седми или дівта осьми первыхь дней бываеть здесь весьма нужною. строгая. Грудь покрывать надобно теплыми плащками или полотеплым тенцами, которыя переменять должно, какъ скоро моновитенца на груди. Важность ся, чтобы больная не захватила стужи: ибо теплотеплоти въ семъ случав помогаеть превосходные всыхъ пласты рей и припароко, кои обыкновенно прикладываются.

Впутренно давать можно абкарства мотегони точегоние тельныя, дабы оттануть кв поткамв самую матерію, тельныя, отв которой намбреваемся освободить груди. Герпентичв Хійс ой или Кипрскій св порошком в изв мокрицв тергентичва біче відта сеть такое ліжарство, отв кото тинь кій раго видимв мы самыя лучшія двйствія, когда состояніе пулься позволяєть употреблять его; и сіе изд м.к. лікарство, говорить Г. Льето дв., заслуживаеть быть рець. извъстиве.

Больной надобно давать себя сосать одному или давать семногимъ младенцамъ, и даже людямъ взрослымъ, пли ба сосать. имъть прибъжище къ ценятамъ; но когда въ грув 2

дяхь, коихь засорение будеть простираться до извъсшной сшепени, чувствуется жестокая боль, то Cavas : нужно бываеть иногда употреблять кровопускание и MOLES HSсаныя лаже тистительныя. Впрочем в должно посту-ACCHO HYпать такъ какъ и при воспалении грудей, смотри скать cmp. 210 cero Toma.) нровь ж 7.

жавашь чиешишель»

MOE.

О внимании, какое должны имвть женщины, когла оправятся посль родова.

PORCHWпамъ не ZOAKHO вставать съ постежи очень екоро.

Мы кончимъ наблюдентя свои о роженицах всовътованиемъ имъ наиболье предохранять себя отъ холоду. Женщины бъдныя, коихъ нужда заставляетъ покидать постель очень рано, захватывають часто стужу, полвергающую их в бользиям в, ощ в которых в онъ не изцъляющся въ послъдовании: поисшиннъ великое то нещастве, что о бъдных в не прилагают в большаго попечения въ подобных в обстоятельствах в.

Опасносити ошь содержанія се-6g Bb Beжи комЪ теплъ во эремя ро-HOED;

Но богатыя женщины подвергають себя еще большей опасности тъмъ, что держатъ себя слишкомЪ шепло: большею частію находятся онъ какЪ бы вЪ нъкоторой, такЪ сказать, банъ, вЪ продолжении осьми или десяти первых дней послъ родовъ, а по томъ вскоръ являются во всемъ нарядъ для принятія постщеній. ВсякЪ довольно можеть чувствовать опасность таковаго поведенія.

Отъ единетвеннаго вытаду въ Жерновъ

Суевърный обычай, обязывающій женщинъ не выходить изъ покоевъ до техъ поръ, пока не сходять въ церковь, бываеть еще весьма общею для нихъ жолодную причиною къ захвачению простуды. Во всъхъ церьквахъ обыкновенно бываеть сыро, и по большей части холодно; а следовательно и должно почитать их в местом в самым в опаснейшим в, какое только могут в он в выбрать в первому своему вывзду, быв прежде заключеключены въ шеплой комнашь цълый мысяць. (Но жы показали уже въ членъ IV, § 3, глав. 12, Том. I, сколько опасно для женщинъ оправляющихся послъ родовъ выходишь на воздухЪ холодный.)

О безплодности или безявтности.

ВЪ числъ бользней женских в безлытность полагать должно по тому, что большая часть изъ тъхъ, кои находясь въ замужствь, не имьють дытей, не самымь лучшимъ здоровьемъ наслаждашся.

членъ І.

П рисины без двтности.

Бользнь сія можеть произойти оть многихь причинъ: какъ- то отъ пищи слишкомъ кръпкой и сочной или питательной, от в огоргенія, ослабленія (от в распутней жизни, піянства и Вене ритеской бользни, которая последствиемь оных вываеть, отв остроты цинготной; излишняго употребленія вина, крепких випиткого и кори; от в полнокростя, чрезмърной дородности и билей.) Но особенно приключается она отъ остановки месятных кровей, или непорядочного теченія сего місятнаго отишенія.

Весьма извъсшно, что яства слишкомъ сочныя везатыповреждающь мокроты, и преняшетвують деторож-несть сыденію. Ибо ръдко видъть можно безплодивий жен виновенно между бъдными ремесленниками, хотя напротивъ то-случется то ньшр ничего обыкновенные сего межлу людьми бо. межлу бо. гатыми и живущими въ изобиліи. Во всяком в госу- режелимедарсивь видимъ мы, что плодовитость къ лъпорож жду 654денію соразмърна бываеть самой бълности, такв какв ными. для не трудно он было призести многіе примъры женщи-чего:

Ь 3

намь, которыя выбето всей пищи употребляя одно только молоко и растина, понесли и рожали, - хопля прежде того времени никогда дътей на свъть не производили.

Естьми бы богатые мюди питались, такъ какъ и большая часть крестьянь; естьми бы имъли они столько же твлодеижентя, какъ и сти, то ръдко бы случилось имъ завидовать своимъ бъднымъ подданнымъ и служителямъ, въ многочисленныхъ семействахъ, хота сами напротивъ того умираютъ съ печали, что не имъютъ ни одного наслъдника, коему бы могли они оставить неисчетныя свои сокровища.

Богатенво раждаеть обыкновенно недъйствие. которое не только новреждаеть мокроты, но еще и самыя тегрдыя приводить во всеобщее ослабление: состояние совершенно противное дъторождению.

члень и.

Пользование безплодности.

твлоды. КЪ предупреждению таковыхъ случаевъ мы сожение, дівытуемь, і) твлодвижение довольное на открытомъ
растьній, воздухв, и 2) діэту состолщую изъ растьній. 2
молоно. особливо изъ кушанья молошнаео.

Докторъ Шейне свидътельствуеть, что лишеніе дътей чаще происходить от недостатковь мужа, нежели жены: по чему и совътуеть имянно растьчий и молоко первому, равно какъ и послъдней. Онъ присовокупляеть, что пріятель его Докторъ Гайлоръ, коего имянуеть онъ the milk Dostovof Cro don, то есть Докторъ на молоко въ Кроидонъ, привель мно-гихъ особъбогатыхъ, въ ок естностяхъ его живущихъ, которыя женатую жизнь провождали нъсколько льтъ же имъя дътей, въ состояние родить дътей здоро-

выхЪ, совътуя имЪ вЪ пищу употреблять одно только молоко и растънія вЪ продолженіи довольнато времени.

3. Употребление некоторых в лекарство в лза влачиемь тельных какв-то квасцы, железныя опилки, соко зноватыя драконовый (gummi sangvinis draconis), эликсиро ку-воды. поросный, воды Ахенския или Гунбриджския (или де колодная форжския), хина и проч., а наконець, и предпочтинами.

Безплодность бываеть не редко последствиемь бно девгоргения, внезаннаго страха, собользнования и всяких в страстей могущих в остановить месятное отище гда безнее. Как в же скоро имееть причину подозревать, что плодность
сей недугь зависить от пристрастий душевных в, то
дить от и
нужно для больной обеззабочиваться и веселиться снорбей сколько возможно боле: убегать должна она всех в душевных в
для нее неприятных предметовь, и всячески надобно стараться ей провождать время въ забавахъ и
удовлетворять своимъ прихотямъ.

(Мы не станем в говорить завсь о безплодности от бол зависящей от в недостатков в в сложени и худаго от недостатков в в сложени и худаго от недостатков органов в каковые суть ственение влагали статков ща от в рубцов в бывающих в следствием в родов в частрудных в оспы, обжоги, болезней Венеритеских и тородироч.; от в осущения или ославения устья влагалищнаго, ных в или пустоты матотной, и проч., поелику недостать ки таковые требуют в единственно руки Лекарской, ежели токмо не совершенно они неизлечимы.)

\$ 9

О муженеистовствы или бышенствы матки.

(Подъ симъ именемъ разумъется неистовое бъ- Свойство шенство меланхолитеское, сопряженное съ бредомб, воз-

жигающее похоть въ сильной степени и безъ жару. коимъ одержимы бывають иногда девицы, вдовы и даже некоторыя замужнія женщины, по безмерной страсти къ любимому предмету.

Ranig Man-

Молодыя женщины больше подвержены бывають щины сной сей бользни, нежели пожилыя: однакожь случалось видеть некоторых в семидесятилетних в старухв, кои чувствовали оную въ великой степени, и даже повъствують обь одной дъвочкъ трехльтней, которая имьла первые оной признаки. Ньшь сомньнія, что она была наслъдствениая у сего рабенка. Дывицы сухія и темперамента многожелтного, наслаждающияся впрочемъ хорошимъ здоровьемъ и будучи кръпкаго сложенія, болье прочих вей подвержены.)

членъ І.

Причины муженеистовства, или въщенства матки.

(Молодыя женщины могуть почувствовать стю бользнь, какъ скоро онь предающся чшению книгъ соблазнительных в, разговорам в, бестдам в, изображеніямь неистовымь и срамнымь, улещаніямь любимаго предмета и проч.

Но возбуждается она непосредственно раздраженіями матки, влагалища, двіпородных в частей, прикосновеніями, рукоблуденіемв, соитіемв, а иногда поджигающимъ дъйствиемъ какихъ нибудь острыхъ мокроть, коими напосны бывають сти части.

Роскошный столь, праздность, резвость, возрастъ, известныя снеди и лекарственные примесы, почитаемыя способными къ произзедентю сего раздраженія, долженствують быть помещены вь число тако-(.бингидп бхыя

чненъ п.

Признаки муженеистовства, или бъщенства жатки.

Сія бользнь не оказывается внезапно у дьвокь первые и женщинь замужчихь; поелику стыдливость удержи-признани. васть ихь ньсколько времени. Сперва получають онь нравь смушный и задумчивый: становятся молчаливы, печальны и оть времени до времени примъчаются у нихь вздохи, любострастные взоры, а особливо когда передь ними соберется нъсколько мужчинь, или когда говорять какія нибудь ръчи, клонящіяся къ любовнымь забавамь. Тогда лицо ихь и взорь воспламеняется, и ежели пощупаеть у нихь пульсо, то найдеть его въ волненіи.

КакЪ скоро сія бользиь довольно уже усилится, признаим то одержимыя ею дьвицы или женщины теряють существосту къ влы, сонъ и склонность, которую имыли къ упражненіямь обыкновеннымь; болье и болье стамовятся задумсивы. А сія задумсивость перерождается нечувствительно въ такое любовное бытенство, что больныя не наблюдають болье никакой мыры, ни мальйшей воздержности и предаются всякаго рода неблагопристойностямь какъ въ поступкахъ своихъ, такъ и въ словахъ. Иногда доходять даже до такой степени, что вызывають мужчинъ, или принуждають оныхъ погасить жаръ, которымь онъ снъдаемы.

Сія бользнь заключаєть въ себь нькоторое свой несправедство постыдное; да и женщины, претерпьвающія ливоє предопую, ночти всегда бливають опорочиваемы. Однакожь ніе обольпредразсужденіе сіе есть весьма несправедливое, а шей части
особливо когда случится, что страждущая ею жен- женщинь
щина всегда вела жизнь стротую и порядочную. Сльдовательно припадокь сей происходить безь сомивжимыхь,
нія оть нъкоторыхь впечатльній, коими повельвать

Томб 1 V.

трудно, и которыя становятся сильные самаго разсудка.)

ЧЛЕНЬ III.

Пользование муженеистовства, или бъщенства матки.

Обладаніе любимымЪ предме-

(Первымъ лекарствомо въ сей болезни и такимъ, которое безпрекословно превосходитъ всё другія своею действительностію, почитается стажаніе предмета любимаго, да и не льзя лишить себя сего безъ самыхъ важнейшихъ причинъ, какъ то мы показали въ § 4, глав. 11, Том. І.

Нраветвенимя средстава. Когдажъ не можно совершенно упошребить сего средства, то совъты, прозьбы, увъщантя и самыя даже угрозы бывають величайшими пособтями, которыя никакъ не надобно пренебрегать. Нужно такожъ снискивать для больной нъкоторыя увеселентя, кои бы занимали духъ и тъло, или принудить ее къ такому труду, который бы овладълъ всъмъ ея внимантемъ: надлежить отдалить отъ нее всяктя изображентя непристойныя, книги соблазнительныя, людей говорящихъ ръчи безчинныя, а наипаче тъхъ, кои подали поводъ ко всъмъ таковымъ безнорядкамъ.

Дівта прожладительнад. Пишіс.

Надобно предписать больной діэту прохладительную; вывсто питія вельть употреблять ей оршатв, миндальное молоко, сыс ротку, сиропо уксусный или фіалковый или изъ косатнику (путрьжа),
разведенный въ водь; промывательных составляемыя
изъ декокту портулака, салату или изъ воды съ уксусомо. Запретить же должно ей мясо, вино, пряныя
вещи и все могущее произвести жаръ или остроту
въ мокротахъ. Пища ея будетъ состоять изъ растьній, а особливо изъ травъ огородныхъ и плодовъ
прохладительныхо.

Промыва... тельныя.

щища.

Ванны болье холодныя нежели теплыя почи- Ванны ботаются весьма полезными; больная должна сидьть ныя, нежевъ нихъ дважды въ день и продолжать оныя весьма и теплыя. довольно времени.

Когдажъ бользнь усилится до извъстной сте- обетолпени, то не льзя обойтися безъ кровопусканія, потельства
требуювъ такомъ состояніи, что матка, личное гивздо и пусканія;
проч., бывали часто въ воспаленіи. И такъ должно отворять кровь больной соразмърно силамъ, твлосложеиїго и другимъ обстоятельствамъ, въ какихъ она накодиться будетъ.

Естьли же месятное отищение остановится, то изъ ноги. всякъ чувствуеть, что кровопускание изъ ноги бы- піявицы. ваеть необходимо нужно. Весьма не худо такожь припускать піявиць къ заднему проходу или къ большимъ губамъ.

Котда бытенство матки перемынится вы безумество, что случается довольно часто, то весьма трудно тогда лычить его, но не скажу, чтобы оно было неизцылимо. Впрочемы для большихы подробностей о сей матеріи мы отсылаемы кы сочиненію писанному о нимфоманіи или бытенствы матки, Г. Д. Т. де Боенвилль, Медицины Докторомы, вы Аметердамы, 1771.

Есть и другая больянь, которой женщины не мало бывають подвержены, а именно больянь Венеригеская. Но описанное вы предындущей главь пользование приличествуеть и имы равнымы образомы, токмо сы ограничениями, каковыхы требують нежность страда дущей и други обстоятельства, вы коихы она находится. По чему и должно вы такомы случав поступать по предписанному вы главь 49 сего Тома, а особливо по 55 7 и 8 сейже самой главы.

B 2

Mpu-

Тримвтанге. Женщины бывають впрочемь подвержены весьма многимь бользнямь изь тьхь, коими страдають мужчины. И такь, какь скоро кто пожелаеть пользовать больную женщину, и бользни ея не признаеть ни вы одной изы описанныхы нами вы сей главь, то и должно смотрыть вы Картины признаково, и проч. находящейся вы оглавлении Втораго Тома; и тогда, проходя члены, и сличивы признаки сытьми, кои оказываются вы больной, можно будеты видыть, которой главь слыдовать должно.)

ГЛАВА 51.

В детских болезнях в, как в-то о болезнях в приклютающих ся от в задержанія в кишках в младентескаго после родов калу; о запор и о выпаданіи заднепроходной кишки; о молошниць; о резд в в живот и коликах в; о трещинах в, о ссадк в кожи и саднах в на тель; о сгущеніи возгрей в носу и насморкт; о реот в; о лыт в и понос в; о сыпях в; о летутем в огн в или осник в; о ципках в; или опухоли на ногах в или руках в от в великаго холоду; о особливом в род в одышки или перетонотной жаб в; о трудном в прорезываніи зубов в; о Яглинской боль ни; о судорогах в; о во дяной боль яни в в голов в; о путеніи или раздути желудка от в кислоты, и о боле зни Венеритеской.

SI.

О детских вользиях вообще.

Колико жребій человька сожальнія достоинь маделцамь нужна помощь гато животнаго; гораздо больше времени нужны для жкь от него вспомоществованія его отца и матери: еще же ц въ и ма. и самыя, сій полеченія не всегда обо немь прилагажерей. емы бывають; а когла такожь и хотять ему нъкоторую часть уделить оныхв, то терпить онв не рыко болье от самаго образа, коим стю помощь ему оказывають, нежели бы когла быль совершенно осшавлевЪ.

ТакимЪ-то образомЪ неискусныя попеченія от-Таковое ца и матери, кормилицЪ, повивальныхЪ бабокЪ и проч. попечение становятся самыми обильнъйшими источниками больз-бываемъ ней для младенцевь (а).

KIMB ATIM снихъ бо-A \$3 10.1.

ЧЛЕНЪ І.

Причины детских вользней вообще.

Нъшъ ни одного человъка, сколько бы мало первыя бовнимателенъ онъ ни былъ, который бы не примъ- атони млатиль, что первыя детскія бользни имьють место женческія евое въ кишкахв. А сте не должно казапься удиви- имвинътъ тельнымъ, поелику большая часть младенцевъ бы-кишкажъ ваеть оправляема сивдями и лекарствами неу добоваримыми ед желудкв, коини кормять ихъ тотчась, какъ скоро выйдуть на свъть, такъ какъ мы говорили уже о семъ въ § 4. глав. 1, Тома I.

书 3 .

Bcc.

⁽а) Мы приведемь здёсь одинь польно случай, дабы дать поняте о усер- опасный дных в попечентях в удивишельном в запра повизальных вакокв; поступокв почни вездв взошло у нихв въ обычай терепь и пожимать типечки повиваль. детскія, дабы выдавливать изв оныхв, канв сказывають они, мо- ныхв балоко: хотя в действительно находять небольшое количество жидко- бокь въ сти ва грудахъ новорожденныхъ младенцевъ, однакожъ, какъ оныя не нъкотояля сосанія сдівланы бывающь, що и не должно никогда принимащься рыжь указа сіе явиствіс. Мив случалось вильть, что таковая ужасная опера- дахв. Він причиняма твердость, воспаленіе и нарылов въ сяхъ частяхъ. и не находияв я, чинбы происходило накое нибудь неудобство отв опущенія оной, Когда грудь у магденца будеть тверда, то довольно приняалыпань нъ оной мягчительную припарку, или не много пластыря діахильного (emplastrum diachylon), намазавь на поскутокъ мяткой кожи ширипою въ рублеванъ; и сін приклідыванія повторять до міжь порь, пока твердосінь не разобъетел.

Все, чего желу доко сваришь не можеть, долявиерствь, жно быть почищаемо за ядо; и естьли не будеть ноими обременя— оное извергаемо рвотого или низомо, то причиняеть коть желу тощноту, колики, судороги въ кишкахо, или какъ докъ ново- простыя женщины говорять, конвульси или судороги рожденныхъ млавнутреннія, а наконець судороги обыкновенныя и саденцевь. Мую смерть.

ЧЛЕНЪ II.

Пользование детских вользней вообще.

Какъ весьма явственно, что всъ сти явиствтя приновыхъ требують не имъющь другихъ причинъкромъ самыхъ веществъ разпринадии дражающихъ кишки, то нъть сомнънтя, чтобы способъ приняюче врачевантя оныхъ не состоялъ единственно въ выгнающеся от такъ самымъ надежнъпшимъ и дъйствительнъйшимъ каретвъ въ семъ случав лъка ретволю почитается легкое рестивот ное; слъдовательно:

мпекану- И возьми инекакуанны в в порошкв пяшь или шесть анга. гранов в.

Всыпь вы двъ столовых в ложки воды и прибавь ме много сахару: сего реотнасо давать надобно по кофейной ложечкъ чрезы каждую четверть часа, пока не станеть дъйствовать; как в то предписано вы То-иъ II, глав. 20, § 3, член. II; или також в и слъдующее лъкарство еще лучше пособствовать можеть:

Мин соль рвошная, Возьми соли рвотной, - - одинъ гранъ; простой воды, - - три унціи;

Распусти реотное въ семъ количествъ воды и прибавь не иного сиропу.

По Лашынь:

Recipe tartari emetici. - - granum unum;

Aquæ communis. - - uncias tres.

So vas tartarum emeticum in hac quantitate aquæ,

adde etiam parum syrupi.

Cïe

Сте лекарство дается равным образом по кофейной ложечке чрез каждую четверть часа, пока не начнет действовать.

Тъ, кои боятся умотреблять реотную соль, или вние могутъ давать вмъсто оной по шести или по семи рвотносканель вина с ръжянаго (vinum antimoni tum), въ кофейной ложкъ воды или легкаго отвару овсянаго.

Сїн лікарства имбють ту выгоду, что чистять желудоко и облегчають живото. Естьли же не производять они сего послідняго дійствія, и у младенца будеть запорь, тогда надобно дать ему легкое систительное.

ВЪ слъдствие чего и надлежитъ распустить не много манны и катки слабительной дивьлго меду ститель— (рирка саба) въ киняткъ и давать сего состава по нос. малому количеству каждый разъ, пока си тистительное не подъйствуеть; или, что еще лучте, примътивать по нъскольку грановъ бълой магнези въ какую нибудь пищу дътскую, и продолжать употребление оной до тъхъ поръ, пока не станетъ имъть гнезіл. дъйствия.

Ежели сти средства унотребляемы бывають легия потупательно, и естьли прилагается спаранте о томь, тиранія
чтобы потирать брюхо и члены у младенцевь рукою погрытою передь огнемь, нысколько разь вы день, то
всегда почти можно будеть успыть вы излычентя
оныхы оть бользней вы желудки и кишкахы, столь
жестокихы для сего возраста.

членъ III.

Всеобщий способо вратевания двтскихо бользней.

Предложенный нами тенерь способъ служить сей свооснованиемь для всёхь техь, кои должно употреб. собъ слулять

лять къ врачеванию виутреннихъ бользией льтэвичем Б скихъ. Онъ будеть еще способствовать и къ лъ. вевмъ ніямь при- ченію бользней внышнихь: таковыя суть трешиличеству- ны на твлв, красныя пятна, засоренія еб железахв. ющимь вы проч.: бользни, происходящия, какы- то мы уже выския. Авлали о семъ примечание, наппаче от диэты слинкомЪ разгорячающей, а следственно, и долженствующія быть отражаены легкими выпоражниваніями.

Bunopa. жинванія составля-Pon dinor WILL BGG врачебизе жжитское.

Ибо выпоражниванія, какого бы свойства ни были, составляють почти все врачебное искусство для льтей. и оныя почти завсегда будуть иметь успехь въ облегченій ихъ въ большей части бользней, когла буврачесное душь употребляемы съ осторожности (т).

О детских в бользнях в приклютающихся от в за держания • в кишках в мла дентескаго послв родов калу; о запорв и о выпалании заднепроходной кишки.

ЧЛЕНЪ

(в) Весьма достовёрно, что большая часть болёзней дётских в зависишь отв дурнаго употребленая пищи, ноторую дають имь; что оныя существование имбють въ желудив и имшискь, и что сабаственно реотныя и чистительныя легизя, употребляемыя въ количество соразморномо ихъ возрасту и иропости самаго толосложения суть почти единыя явкарства, кои должно имъ предписывать: но не надобне ниногда терять изв виду, что восбще для летей потребно весьма мало локарствь, и что натура, вспомоществуемая возстановленјемъ порядка въ пищеупотревлении, отъ котораго принакачились ихъ болтэни, можеть една преодольны множество оныхъ.

Мадобно весьма ма-ZO ZTмар:паБ для дъпие.

> и такъ весьма нужно читать со внеманіемъ первую главу Тема перваго еего творенія, гдв предлагается о средстважь, канъ предехранять детей въ здеровью и предупреждать ихъ болезни. Мы можемъ увтримельно сназать, что видбин младенцевь, а оссбливо изв манихв. исторые были кормлены грудью своей собственной матери и руковолствованы по каспатленіямъ предложеннымъ въ сей первой главъ, ком наслаждающея здоровьемъ самымъ постояннъйшимъ, и проводять время прорбамеснік ауковь, безь веднаго другаго припадна, промъ елинотеченія сбильнайшаго нежели въ состоянія естественномъ; несбходимаго дъйствія давленія, которое надъ деснами производять проразывающиеся зувы,

членъ-г

О бользиях в приключающихся от в задержанія ев киги-

желудов и кишки новорожденных в младенцев в что шаное нанолнены бывають клейкою черноватою матерією, меновіум в тустоватою на подобіє сиропа, котторой дано названіе сной нося жеконіум или младентескаго послів родов кала. Очище родов ніе онаго ділается обыкновенно в в первые двадцать четы очищаєть ных в силь натуры; и в таком случав младенцу не веню в нужны никакого рода ліжарства.

Ежели однакожъ одинъ или два дни проходять ито надоббезъ очищения сего младенческаго посль родовъ калу, но дълать, или естьли оной станетъ выходить въ весьма маломъ ногда онъ количествъ, то надлежитъ тогда давать младенцу щется зъ немного манны или бълой магнезии, такъ какъ мы предписансовътовали сте выше; а ежели не возможно достать ное время, себъ сихъ лъкарство, то надобно дать ему столовую ложку сыворотки, разведя въ оной немножко меду.

Но самым в лучшим в для очищентя сето перваго самым в младенческаго кала починается молоко матернее на-мучшим вываемое colostrum, которое в в первые дни посл в рослучтя лыдов в имбет в всегда силу систительную, как в тома почитает. Ту и естьли бы давали грудь младенцам в тот час в тома почитает. Самым в давали грудь младенцам в тот час в тем матернее молоко. Как в скоро они показывают в расположенте к в сосанто инобы рыдко имбли нужду в в лыкарствах для очищентя перваго посл в родов в кала. По крайней же мыр в заподлинно извыстно и то, что, когда и не дают в им груди материей, не должно никогда наполнять их в сиртами, маслами и другими столько же чеу добо-

варимы пи лекарствами, которыя токмо желу доков их в обременить могуть (2).

Прич

по мибиіз тьхь, кои думають, чпю не надобно младенцу давать сосашь груди, какъ по прошеспивіи мвашцаши **ЧеннырежЪ** часовЪ посяб рожде-HIS. HAH HOгла ирови пересшанушт. Время, вЪ которое надобно принесши рабенка нЪ груди.

Сколь глу. (2) И чти всякь да и самые даже Врачи совьтують не давать сосать по мивей: младенцу прежде нежели пройдуть цвлых сутки посль его рожденія: некоторые же хотять еще, чтобы ожидали до техь порь, пона думають, что не на голово совсёмь не перестануть. Удивительно, сназываеть переводчикь голово мла- добно мла- жденій сего мивнія разділились дібло віз томь состоить, продоленцу да да жаєть онь, дабы знать, мать ли должна кормить грудью, или вать со-

"ВЪ первомъ случат посовтнуемся съ природою, и мы уви"димъ самое надежнтишее средство, наное избрать должно. Какъ сно"ро мать отдожнеть послт родовъ, то и надобно принести къ ней
"младенца, ноторый не преминеть отворить ротика для взятия гру"ди", и самымъ лучшимъ тогда для него чистительнымъ къ извер"женто перваго кала безпренословно служить весьма разжиденное мо"локо матернее. Надобно быть въ советшенномъ безумствъ, дабы поду"мать, что матернее молоко опасно до тъхъ поръ, пока не пере"стануть кроек.

"Естьми примъчено будеть, что младенець станеть развольно бузать ретикь вы то время, какы спить мать, тогда довольно бузать ретикь вы то время, какы спить мать, тогда довольно бузать ретикь ему, держа его на боку, по немножку теплой воды заподскаетивь оную очень мало сахаромы, ложечною, или на тона, заподскаетивь оную очень мало сахаромы, ложечною, или на тона, заподок, и сте заподокомы промочентя рша и горла. Я не важу, для чего бы матезаподокомы цалымы сушкамы, прежде нежели станеть кормить, трудью. Самая та минута, вы которую младенець разывать будеть заподокомы.

что налобно давать младенцу, когда ввб-ряють его кормила-

, Ежели рабенои должен имы посторонного кормилиду, то издлежить развести капель дващать или около того сиропу ими порейнаго гы исфейной ложент теплой воды; что самое рабеной правимаеть очень корошо: сей премы надобно новторить раза два или три, в наипаче вы первый день, и поднести кы кормилицы тогда, негда его очистить. Межлу тымы надлежнить давать ему временемы, чистительное и по немногу теплой воды очень мало подслащенной, сакаромы. Не льзя впрочемы лучше и благоразумные сего поступить вы такомы случав.

, Естьли же не можно найти кормилицы, у которой бы мо-, локо было сполько жидно, сколько бы желапь должно, то надобно

Примечено такожь, что младенцы, которых в поченарів желенають, повреждены бывають болье нежели про мышлеть чіе неизверженію посль родовь кала вы первыя суп- перваго поки; а сте происходишь единственно от свивальни-слъ родовъ ковЪ, которыми ихЪ опушываютЪ: ибо испражняются кала. они только тогда, когда бывають развязаны и освобождены ошь свивальниковь.

. Новорожденный младенець должень марашься по чему раза по три или по четыре на день в в нервые двое призн ть или трое сутокъ; и по сему-то количеству испражие- можно, мій познается, что первый послі родово кало совер- ленсцъ шенно очистился. По томъ, и такъ какъ младенецъ имъль сіе сосеть грудь, надобно ему имъть наниза раза два въ первое сушки, что однакожь должно быть сразмврно съ ко- въ наком личествомъ молока; которое онъ принимаетъ; ибо соразмърчемь больше онь сосеть, темь болье должень ности долиспражняться. Причиною симъ многокрапнымъ испражненіямь есть то, что желудоко младенческій сь трул-емы очиненостію варить можеть, и что, какь кишки ихь срав- нія низомъ нишельнымь образомь бывають больше нежели у лю- у магдендей взрослых в, а притом в и ища их в оставляет в в в оных волье дурных влажностей, то следственно

э, давать рабенку сей поделащенной сакаромъ воды по нескольку разъ въ , день въ продолжения первыхъ пятнатувти сутокъ. Ибо вообще чемъ ,, болъе разжижено будетъ молоко въ течения сего времени, тъмъ здоровъе ., оно для рабенка,, Traité des maladies des enfants, page 24 nota a; mo есть разсуждение о Автских волвания , стран. 24, примеч. 2.

ВЪ семъ последнемъ случав, а именно, когда младенца надоб. Теплая воно оплать корминицъ наемной, я не употребляю, сколько да полмив возможно, скропу цикорейнаго. Отв теплой волы, въ которой слащеннаяразведень кор-шаго меду Нарбонскаго спольно, скольно попребяо къ прі пно- медомь. му подстащетью оной, и которую станень давать сосать посредствомъ свернутой нисен, чище всего мив удавалось получать успрхв жела. емый: и могу удостоя врчть, что я не быль принуждент никогда предписывать масла поровняго, сала, масла деревяннаго и проч., компорыя всегді причиннють вредь желудку новорожденных мячленцевь.

и самыя ихъ испражнентя должны быть чаще иежели у людей взрослыхъ.

Естьми же не приметно будеть таковых частых в пепражиений у младенцевь, то непременно страждуть они запоромь.)

члень и.

О запоръ у младенцево.

Канте мла.

денды полденды полвермены
заполу.

(Младенець, пинаемый своею машертю и живуденды поль
вермены
заполу.

сти мъсяцовъ, припадку сему ни мало подверженъ не
бываеть; но примъчается оный обыкновенно у тъхъ,
кои сосуть люлоко чужое, особливожъ естьли сему
молоку десять, двенатцать, четырнатцать мъсяцовъ
и болье, какъ то весьма часто случается. Запоръ у
такихъмладенцевъ сопряженъ бываетъ съ болью, и руководствуетъ иногда къдругимъ припадкамъ тяжчайщимъ.

Какъ скоро запорб приключается отъ того, что Что надобно авлать, молоко бываеть очень густю и слишком в давнее, то ногда сія надлежинь предписань кормилиць легкой онварь изъ болтаны корня собаталго зуба, вЪ которомЪ настоять небольэа висить оть т го, шую горсиь свъжей огу регной трасы (borrago) HITO MONO. декоктв, употребляемь будучи вы довольномы колико у кора чествь жидить молоко и двлаеть оное кв течентю милицы способивниямь. Естьми же сте среденню будеть осзбы четь GHEHR TYуспашно, то надобно взять кормилицу, которая бы има-NXH CHIS синикомъ ла молоко моложе, но притомъ дабы оному было оть шести недель до двухь месяцовь. Mablice.

Когда она проискодишт у р бенка, опнашагосыт груди:, опть

Когда запоро бываеть у младенца отнятаго оть грули, то оной зависить оть его пишенпотребленія, которое надобно перемьнить и сльлать мокротожимительные: сверьхь того лолжно потпрать ему каждый день брюхо и тасть желудотную теплою рукою: давать ему по немногу молока съ отваромо его ницеизъ овсяной крупы, прибавляя туда нёсколько меду; употребвыносить его для движентя на открытый воздухо, и лентя. сажать его для испражнентя каждый день въ часъ опредъленный.

Сколько возможно надлежить остерегаться от велинетьем. того, чнобы имыть прибытище кы лыка ретеама; сте ственных лыка ретеама; сте ственных лыка котыть бользны сдылать упорнышею. Един кон нозвое ственное средство, какое только можно себы доз-лить можно воды, когда запора усилител, состоить вы легкой новое воды резенной. Масло деревянное, коровые и проч. всл-кой жира, бывають вредны для желудка, разслабляють кишки и желудка ни мало не облегчають.)

Ч Л Е Н Ъ III.

О выпадании заднепроходной кишки.

жиленье, которое имъють младенцы при причины метражнения, когда бываеть у нихь запора, причинами вето причинами и довольно часто выпадание задней роходной кишки и нли оходника, хотя впрочемь припадокь сей чаще всего происходить от поноса. От какой бы причины онь ни зависьль, но продолжается иногда долгое время, ежели не будеть употреблено скораго средства. "Я припарка пенлымъ перошень долгое время, не нашель лучшаго, говорить Г. Розей, какъ признатывать выходящую часть тонкою губкою намочен-порошень, ною въ хорошемь синь тепломь. Самая чистая сажа, изъ сажния понось порошень, и потольные вы порошокы и прось онуривать, янная на сито, также для сего полезны: ими понія изъ пеннають стю часть, и по томь вправливають. Равимення, ныйь образомь не безполезно ставить младенца, заднинь проходомь надь охурисангель изъ мастики.

"Ежели бользнь бываеть упорна, то конечно что надос-"приносить облегчение младенцу и то, когда сажать его но дълать, "мараться на судно поддерживаемое высокою скамей-2 3 "кою, детъупор-,, кою, такъ чтобы ноги у младенца не лежали на " земли; чрезъ что самое можно воспрепяніствовать H2 E , за днеп рохо дной кишкв выпадывать.

> "ВпрочемЪ не должно слишкомЪ много безпо-, коиться симъ припадкомъ, который довольно обы-, кновенно проходить самь собою, по мъръ того какъ "младенець приходить въ возрасть и укрепляется " силами. ")

> > 3.

О молошниць у младенцовъ.

Свойства

Подъименемъ молошищи разумьются небольшія сей болья ранки былыя, которыя обметывають во рту языка, горло и желу доко у младенцевь. Иногда распространяются но всему каналу кишесному; въ такомъ случав бывають они весьма опасны и не редко приключають рабенку смершь.

> Когда ранки въ молошница будутъ бътдине, лоснящияся, не въ великомъ множесшвъ, мягки, не глубоки и опадають легко, то они не опасны; но естьли будуть они тусклы, желты, темноваты, черны и часты; ежели начнуть гноиться, тогда бользнь сія почитается опасною.

ЧЛЕНЬ І.

Пригины моломиницы у мла дениевв.

Мошница приключается обыкновенно отъ мокроть кислыхв: однако же по всему полагать можно, что разгоряхающее пищеупот ребление матери или млаленца бываеть еще чаще причиною оныя. Рълко найдешь рабенка, которому бы не давали вина, пуншу, коришневых водокв, или и всякаго другаго напишка горятаго и удобовоспламеняющаго, вскорв послв его рожденія. Не без Бизв в стно, что всв таковыя пряныя 882426 вещи могутъ причинять бользии воспалительных же и у людей взрослых ; следовательно не должно удивлящься тому, что онъ разгорячають и военаляють кровь у младенцевь, и все телосложение оныхъ совершенно воспламеняющь.

ЧАЕНЪ Ц.

Признаки молошницы у младенцевб.

(Молошница бываеть сопровождаема несносною опасныя болью, и можеть содълаться смертоносною, какъ то сатденных теперь говорено было, потому что дъти кричать молошнидень и ночь, а притомъ не въ сихахъ находясь болъе сосать грудь, принуждены бывають претерпъвать толодь и жажау.

OBMEUTBO БИБЛІОТЕКА

Когдажь сосуть они будучи въ молошница, то соски у кормилицы отъ оной повреждаются и начинають гнеиться.

Естьми молошница будеть вы горав у младенца, то онъ не можеть болье глотать; естьли же простирается она до самаго желудка, то происходитъ от в сего жестокая рвота и икота опасная; естьли же наконець растространяется она даже до кишекв, то молоко проглоченное рабенком'в не проходить больше во вторые пути, но выходить нанизь мытомв, и сколько бы мало ни продолжилась бользнь сія, однакожъ рабенокъ долженъ умереть, поколику онъ ничъмъ тогла не питается.

Черная молошница есть не иног что, как в пры- молошин. щи принявште ивкоторое свойство антонова огня, ца самав Чемъ болье бывають они часты и глубоки, темь шая. опаснъйшею почитается бользны: равным в образом в опасны и тв, которые пронадають и скоро послъ выступають въ большемъ количествь.

Ловольно легко выльчивать можно ть прыщи, кои показывающся преждевсего на губахъ, на деснахъ, на языкъ, во внутренности щекъ, на небъ во рту, на лэыгкв и на железахв подав язычка; трудные же нахолящіяся вь устав горла, вь желудав и кишкахо; а весьма трудно тв, кои изъ горда кидающея въ легкія, чрезь дыхательной каналь: наконець самою пруднъйшею къ излъчению почишается та молошница, которая начавшись въ кишкахо, или желулкв, пробирастся чрезъ жерло пищеприсличе и принимасть виль кожи поросляьей вЪ горав.

признаки мекошиииы въ усшь 5 гор 22 . Meлудкъ и жишиакъ.

ВЪ гораћ

ж груди.

Легко примъщить можно молошницу, занимающую разныя части рта. Но мало видна бываеть та. которая находится въ устав горла; однакожъ признать еене трудно, равно как и ту, которая бывает в в в желудкв и кишкахв, по икотв и реотв младенца, а особливо когда онъ можеть еще сосать, или по мыту, въ которомъ видны бывають подсохлые струпики молошницы и самое нолоко между каломЪ. Естьми же молошиния находится въ горав и груди, то удостовъриться можно о ея существовании чрезъ кашель сильный, чрезъ хриноту и звукъ голоса у млаленца, похожій на звукъ выходящій какъбы изъ трубы савланной изв металла. Но о той молошнияв. которая изъ желудка или изъ кишеко вступаеть въ горло подъ видомъ поросячьей кожи, догадается всякъ по жестокой ликорадкв, по частымь испражнениямь низомЪ, продолжающимся многіе дни сряду; по внутреннему движенію, по икотів, по чрезвычайно красному цвъту языка, и проч.

Какте мизвержены

Младенцы, коих в ротв не содержать вы чисто. денцы пол- шть, наиболье бывають подвержены молошинай, равно молешни. какъ и шъ, которые сосуть лолоко слишкомъ старое или кислос, или кои засыпають держа сосокь титьки во рту. Множество дътей имъють сей порокь, сооб-опасная щаемый имь оть кормилицы. Я видаль такихь корминория лиць, которыя даже пріучали дътей засыпать не ина-давать че какь у груди. Онъ отнимали ихь оть груди и младенклали вы колыбель не прежде, какь удостовърясь, что сыпать держа отняти ихь оть груди видна была текущая у нихь грудь во изь рта свътлая жидкость, которая не иное что бы рту. ла, какь сыворотка скиснувшагося молока. Хотя мало нездоровь будеть рабенокь, то сія сыворотка вы короткое время становится острою и здкого: оть нее осадниваеть вся внутренность рта и дълается молошница.

Младенцы, страждущие великимъ поносомо во время какой нибудь лихорадки, подвержены бываютъ молошниць: еще случается, что она оказывается и тогда, когда зубы хотятъ проръзываться и проч.)

ЧЛЕНЪ III.

Пользование молошницы у младенцевб.

Пвкарства лучше всего приличествующія въ сей рымныя в бользни, суть реотныя изъ виду тьхъ, кои совыто мегкія славани мы въ в сей главы, и легкія слабительныя, ныя. такъ какъ и сльдующее:

Возьми ревенто, - - - пять гранЪ; Слаби-Бълой магнезіи, - - - тритцать гранЪ. тельный порощекъ. Истолки мълко и смъщай все вмъстъ; по томъ порощекъ. раздъли на шесть равныхъ прісмовъ.

Надлежить давать по одному изъ сихъ пртему примъ младенцу презъ каждые четыре или пять часовъ, пока не станеть дъяствовать.

Сти порошки даюшся или въ пище младенческой, или въ небольшомъ количестве сиропу изб 6.12 д-Гомб IV.

ных в розв; и лекарство сте повторять можно также часто. какЪ нужно очистить его желудокЪ (Особливо порошокЪ сей полезенъ бываетъ тогда, когда рабенокъ мучится різомо во животів; что самое означаеть кислоту или сгустившіяся мокроты, оть которых весьма нужно освоболить первые проходы, как в то мы говоришь станемь въ § 4 сей главы.)

MIRGACHписывать CARAK VIO pmvmb ев предoemo

Многіе имъють обыкновеніе предписывать въ танамь дол. ком в случав сладкую ртуть (calomelas); но какв льжно пред- карство ете часто причиняеть рвзб вб животв, а иногда даже и судороги, то и не иначе можно совътовать употребление онаго какъ съ величайщими предосторожностьми.

рожностьвание.

Многіе совъшують нъкоторые составы для полосканія рша и горла въ сей бользни: но очень полосканіе трудно, чтобы младенцы въ сін первыя времена ихъ для горля, существованія могли употреблять оныя, по безсилію их в полоскать себь горло. И так в кормилицам в надобно совътовать, дабы онъ промывали часто во рту у младенцевъ, взявъ не много буры (borax) съ медомв, или следующей смеси:

Чисти-**Мень**на и CM SCB.

Возьми меду нарбонскаго, - - - одну унцію; Биры, - - - шесть десять грань; Пережженых квасцово - - - трытцать гран в Розовой воды . - - Авь драхны.

Смъщай вивсть.

По Лашынь:

Recipe melis narbonnensis, - - - unciam unam; Boracis, - - - grana fexaginta; Aluminis usti, - - - grana triginta; Aquæ rosarum, - - - drachmas duas.

Mifce.

Собственнольйствующим въ таком в случав по-Распущенный купо- читается лекарствомв диссолюція или воставв из в росъ 61. Te. Ratife.

десяти или двенатцати грань былаго купоросу, вы преместеосьми унціяхь ясменной воды. Сїн лыкарства прикла рожноств,
дывають пальцомь, или небольшимь клочкомь хлоптребуеть
чатой бумаги, навязанной на кончикь тоненькой па-сіе лынарлочки, и весьма нужно наблюдать, чтобы голову мластводенцу наклонять напередь, дабы чрезь то самое могь онь
извергать остатки сего лыкарства, которое глотать
для него было бы весьма опасно.

Ежели внезапный и сильный крикъ младенца обстояподаеть поводь думать, что онь много страждеть тель тва
оть молошницы, то надлежить давать кормилиць при тель бонимать однажды или раза два вы день сиропу мако леуторожетнаго (Гугория diacodion) по двъ драхмы; можно мительныжь.
когда у кормилицы много молока, которое, чрезь сте лъкарство сдълавшись болеутолительнымь, укротить боль
младенца. Естьли же не заблагоразсудить кто давать
мако рожетнаго сиропу кормилиць, то можно дать онато нъсколько капель рабенку вы кофейной ложкы ягменной воды. Ристеро не усомнился дать своему сыну цълый трань ловдану, а притомы и сы величайшимы успъхомы.

Вошь лекарство предложенное Боилемв, и одо. бряемое Г. Розеномв.

Возьми по равной доль соку отитока большаго сокт из (succus sempervivi, vel sedi mojoris) и меду; дай ски оч това пыпь; прибавь довольно квасцово, чтобы смысь стя мель и получила вкусь слегка кисловатый. Ею припаривать на цы. должно райки вь молошниць чрезь каждый чась

Ежели у младенца находятся еще когія нибудький изиболячки во рту посль того, как в струппки молош т вый и ницы спадуть, то падлежить припаривать оныя кле спропьизь емб леитовымо (mucilago feminis cydoniorum), кв коему большаго, 10 2 приприбавить можно, естьли угодно, толикую же часть сиропу изв. отитока, больщаго.

Совъ ръпрозовый.

ковный.

Когда молошии ца: будет в внутренняя, то есть пой, медь въ желудкъ, кишкахо и проч., то надлежить взять соку рапы печеной, къ которому прибавить немного різоваго меду, и давашь онаго рабенку часто по Сонъ мор. дожечкъ. Однакожъ вмъсто репнаго соку можно давань и сокъ морковный, конорой употребляется подобнымъ образомъ. Сверьхъ того, кормилина должна принимать, раза три или четыре въ день по столовой ложкв слабительного порошку, предложенного выше, смотри стран, 249 сего Тома.

Ревенный: епропъ.

КакЪ, скоро струпики молошинцы, начнутъ выходишь низомб, то надлежить дать младенцу легкое тистительное, которое бы и вивств, укрыпляло кишки. ВЪ такомЪ случав годится ревенный сиропб. Каждой разЪ дають его по двъ драхмы, и сти пртемы должно повторять черезъ три часа до тъхъ поръ, пока не примъчено будеть, отвенего нъкотораго дъйствія. Естьли же младенець будеть мараться съ кровью, и показывается у него поносб, или можно по всему опасапься онаго, погда надлежить давать ему по кофейной ложечкъ и часто повторять гладительное питье из В Ярабской камеди фармакопен Эдимбургской.

Сокъ изъ **А**рабской камеди.

ЧЛЕНЬ IV.

Средства какв предупреждать молошницу у младенцевв.

(Молошница во рту чаще всего бываеть, и она предшествуеть обыкновенно той, которая въдругихъ частях в оказывается. Следовательно предупреждая пер: вую, можно шакожь способствовань кь предупрежденію и другой. Почему и надлежить приказать кормилиць осмотрыть каждой день во рту у младенца, и оной держать въ чистоть. Самымь лучшимъ для сего лькармыщые лисшы шалфеи вы водь; а естьли угодно, то изы шалприбавлять не много и еина. Посль того надобно прощъдить и подсластить ньсколько медомо. Кормилица должна обмочить вы сей декокто тряпочку и оною обвернуть конецы перста своего: посль чего она обернутой такимы образомы и напоенной сей смъсью палецы свой полегоньку кладеты вы роты младенцу, и потрогиваеты имы вет ть мъста, вы которыхы примьчаеть пятна бълыя. Сто операцтю должна повторять она черезы часы до тъхы поры, пока оныя пятна не пропадуть совершенно.)

ЧЛЕНЬ У

О молошниц'я у младенцев д симптоматитеской, или с отбодругих вользней зависящей.

(Надлежить въдать что хотя молошница весьма часто бываеть бользнію существенного или первобытного у младенцевь, но зависить также иногда она
и оть другихь бользней; что можеть она произойти оть бользни Венерической, цынготной и проч., и
что въ таковыхъ случаяхъ можно единственно выльчать оную лъкарствами для тъхъ бользней предписанжыми.

Должно подозрѣвать, что молошинда не суще-съойетьо; стенная или первобытная, когда прыщики бывають молошин-черные, глубокте и довольное пространство занима- ны отб другихъ ю пъ; а ежели они простираются до самой кости, по бельзаей не льзя тогда сомнѣваться, чтобы не завистли они зависящей. отб какой нибудь остроты венеритеской; о чемъ можно но послъ и удостовъриться по самому свъдентю о кормилицъ, о матери и отцъ онаго младенца: и тогда надобио поспъщить употреблентемъ меркуртя; или кормилицъ, или самому младенцу, потому что молошница стя можетъ кончиться ситоновымъ оснемъ.

Ю 3:

Но мы за нужное находимъ предварить, что въ таковыхъ случаяхъ не должно ввърять сихъ маленькихъ больныхъ, кромъ какъ Врачамъ весьма благоразумнымъ и искуснымъ, поколику нъжное ихъ сложенте требуетъ самыхъ величайшихъ предосторожностей, относительно къ сему виду лъкарство. Впрочемъ надобно поступать по § 16 сей главы, въ коей предлагается о Венеритеской бользни у мла денцего.)

\$ 4.

 \mathfrak{O} кислостях \mathfrak{F} и бользиях \mathfrak{F} от \mathfrak{F} них \mathfrak{F} происходящих \mathfrak{F} , как \mathfrak{F} то о рьзь в \mathfrak{F} животь и коликах \mathfrak{F} .

женых младенцевь будучи по большей части свойденцевь удобно
кисловатило или удобозакислощія, часто скижиснуть, саются вы желудкі; а особливо у тіхь, которыхы
и большая здоровье находится вы состояній поврежденномы. По
часть ихь
чему и вет почти бользни ихы бывають сопровождаебользней
нодаеть мы явными знаками кислоты; а сій знаки суть: помеивноторые илы зеленые, різ во животь, колики и проч,

но сим в признакам в многіе могли подумать, что но мислости всь бользни дыпскія происходили от в излишества кибывають слоты в в их в желудкв и кишках в. По всяк в, кто стачаще след- нет в разематривать их в со вниманіем в, увидит в, что стейнь, самые признаки кислоты бывают в чаще двйствіем в, менели причиною бользней младенческих в.

ДБЗНей.

Сама нашура, хотьла по видимому, чтобы ихв мства были качества кисловатаго; но только бы младенець не быль болень, и варению бы его желудка не мьшала какая нибудь иная причина, мы не убоимся сказать, что кисловатое качество ихв яство рьдко можеть имь вредить. Однакожь, какь кислости бывають также, а притомь и часто признаками бользыей у младенцевь, и какь они терпять оть того иногда авконорые припадки, що мы и намврены предложить средства къ освобождению ихъ отъ оныхъ:

члень І.

Признаки кислостей и бользней, от в них в присходящих в, как в-то рыза ев животы и коликв.

(Какъ скоро желу доко и кишки у пладенца наполнатея кислыми мокротами, то онь вы великомы бываеть движении и безпокойствь, и кричить по часамь; корчится, дрегаеть ногами, спить жудо, во енъ смъется и проч. Иногда плачетъ по груди, беретъ ее и топчасъ покидаетъ. Марается онъ тогда или зеленью, или пометь его скоро зеленветь. На пеленкахъ его примъчается нъкоторый зеленый цвъть, когда они и сухи. Младенець испускаеть запахь острый, такъ какъ и самыя рыганія, которыя временем у него бывають. Ежели состояние сте продолжается нъсколько времени, то испражненте его походить нъкоторымь образомь на кровавый поносб. Какъ скоро младенецъ испускаетъ моги особенны больше обыкновеннаго, такъ что замочится даже и признанъ подъ мышками, то онъ реза ва животе имбетъ. Сей животъ признак должно почитать за несомивнное двиствие zanopa.

Весьма нужно тогда употреблять скорую помощь, послику рызб можеть окончиться судорогами. Примытно всякому, говорить Г. Розенб, что младенець, ко-торый имыеть рызб еб жисопты и не хочеть сосать, береть грудь охотно и насасывается до сытости, какь скоро кто нибудь держить его прямо передыкорымилицею.)

члень п.

Пользование кислостей желудка и кищеко.

Вивсто молока надлежить давать младенцу не-не давать вного слабаго отвару съ бълымь хльбомь, и мостть совсьмы молока:

Compap's жидной, калачь, движение. Неудобетза отъ кислошу VHIMINщикъ.

его больше, дабы онъ быль въ движении довольномъ а чрезъ то самое можно способствовать вадению жели дка

Многіе имъють обыкновеніе давать дъщямь въ шаковых в обстоятельствах в голепы, или взвары. вв женерень которые входять жемсугв, мёлг, раковыя жерновки и другіе порошки подобные. Могуть, правда, сін лека ретвя, по их в качествам в пожирающим в нетребить кислоту; но не бывають безь неудобствь; а одно изь важныйших в есть то, что останавливаются въ кишкахв, производять въ нихъ запора, всегда опасный для дътей, и завалы вЪ брюхъ, особливожЪ, когда даваемы бываюшьвь великомь количествь: чего ради и не должно никогда упошреблять ихЪ, кромъ только мъщаючи съ кавать какъ кими пибуль систительными, какъ-то съ ревенема. ев чисти- манного и проч.

тельными им вет в. EBARA MAPнезіл.

Mxb He мначе дол-

жно да-

Самым в лучшим в лекарство мв, какое только намъ извъстно, всякой разъ, когда идетъ дъло о кислости, почитается порошок в называемый былая магнезія. Он в тистита выветв, когда и поглощаеть кислоту; а чрезъ таковыя дъйствія онЪ не только прогоняеть самую бользнь, но еще и всю причину оныя истребляеть. Его можно даванть въ яствахо всякаго рода, или въ виль смвси, такъ какъ мы совътовали во всеобщей таблиць, смотри вь Томь V, слово смвсь слабительная унимающая кислопту.

члень ІІІ.

Пользование рыза вб животь и коликв...

Какъ скоро младенецъ мучится ръзоло въ жиес. Опаености разгорача- тв или колотеств, що не шокмо чтобы начащь пользовать его, давая ему водку, корицу и другія лажарешав. капства разгорячающія, падобно папрошивь того очи-I pombibaпельныя стить его желу доко промывательными систительными и -NPTRM смісью, о которой мы теперь упомьнами. тельныя.

MIO

то время должно поширать ему брюко, взявь немно- възая магго водки на ладонь погрытую передь огнемь. Сти незія. ПовЪ коликах в тиранія средства почти всегда мнв удавались авискихЪ.

брюжу.

Естьли бы однакож в случилось, что они будутв обетоянедостаночны, то надлежить спъщать немного вод- тельства ки или другаго напитка крепкаго выветь съ водою, щія нь. взявь оной вдвое больше, котпорую подсластивь немно-скольно наго сахаромв, давать младенцу принимать по кофейной питку ложечкъ до тъхъ норъ, пока не уймется колотъе. тяпная Часто въ такихъ случаяхъ приносила облегчение и во- вода съ жа мятная съ перцомв.

перцомъ.

членъ іу.

Средства, как в предупреждать кислости, рызби колики у младенцевв.

(Кормилица пишаться должна единственно мя- пищеупосомъ и легкими отварами мясными, въ которыхъ над. треблене лежить разболтать несколько желтковь личныхь. На- жал кердобно убъгать ей всего того, что можеть имъть расположение кЪ кислотв. Нужно для нее имвть женщину, которая бы помогала ей въ попечентяхъ, кон должна она прилагать о младенцв, дабы молоко у нее не могло повредишься от весьма великаго движенія и недостатка въ нужномъ потъ. Однакожъ при всемъ томъ не безполезно для нее и некоторое движеніе, для произведенія легкой испарины, столь нужной въ семъ случав, равно какъ и во всякомъ другомъ: ибо примъчено, что сидлчая жизнь повреждаеть молоко въ четырнатцать сутокъ, и что оно опять принимаеть надлежащую доброшу въ то же самое продолжение времени при движени потребномъ.

Естьли же средства будуть безусившны, то со тоянадлежить переменить коринлицу и выбрать такую, тель тва, Jond IV.

рыхв надобне переменишь нормилику. у которой бы молоко не шивло микакой остроты, и было бы моложе прежняго.

РЕЗТ 67 животт весьма часто случается у младенцевь вь деревняхь, а особливо льтомь, когда пища матери или кормилицы состоить наиболье изь
молока кислаго: и множество младенцевь оть сего
погибаеть: а и еще бы большее число оныхь погибало, естьли бы деревенскія женщины не находились
въ безпрестанномь движеніи, и не занимались работами хльбопашественными и сьнокосными, работами
поглощающими нькоторую часть кислостей, коими онь
бывають обремененны.

Естьли однакожь выдытяхь ихы примычено будеть ныкоторое расположение кы заражению оными, то надобно имы перемынить свое пищеупот ребление, отречься совершенно оты кислаго молока и всякаго существа кисловатаго, а питаться мясомы, какы то вы недавно говорили.)

\$ 5.

О трещинах в, саднах в првлости кожи у младенцев в.

мвото сижъ недутовъ.

Трещины, садна и првлость кожи не мало причиняють безпокойства и боли младенцамь, и въ такомь случав говорять обыкновенно, что они себъ натирають: недугь сей бываеть по большей части въ пахахб, въ изгибахъ лядвій и шеи, подъ мышками, за ушми, словомь на всьхъ частяхь, увлажняемыхъ потолого.

членъ 1.

Пользование трещинд, садив и прилости кожи воспалением в несопровож даемых в.

настоте КакЪ недуги сїн по большей части приключаютна опрять ся отъ нечистоты или неопрятности, то самымъ ность къдъйствительнымъ къ предупреждентю оныхъ сред-карствомъ ствомъ почитается, промывать часто всъ части на нихъ почитает больныя холодною водою; перемънять у младенцевъ сл. пеленки и рубатки часто, словомъ, держать ихъ совертемно въ чистотъ и опрятности.

ВЪ случав, когда бы сихъ средствъ не довольно что надоббыло, надлежитъ посыпать оныя части, погръвши прежде, порошками сущительными и удобопожирающими, ной частокакъ то жжены по рогомо оленьимо, туціей, міломо, ты не раковыми жерновками пріуготовленными и проч.

(Пыль источеннаго червями дерева, пепель бумаги или тряпиць жженыхь, и проч, употребляемы
бывають всегда съ успъхомъ равнымъ. Нъкоторые довольствуются для сего даже одною пудрою: естьли
бы была она чиста, и составлена единственно изъ пеулобкорошаго краклалу, то бы и мы равнымъ образомъ поисходящія
чли ее за полезную; но какой бы то ни быль составб, отъ обыксъ которымъ мъщать стали ее со времени, какъ она новенной
вздорожала, однакожъ извъстно заподлинно, какъ- то
я имъль случай видъть самъ, что причиняла она воспаленте и способствовала къ нагноенто садно, кои
прошли бы можетъ быть и сами собою безъ всякой
момощи.)

ЧЛЕНЪ II.

Пользование трещинд, саднд и прилости кожи воспа-

Когда больныя части бывають вы великомы вовпалении и клонятся кы совершенному растравлению,
тогда надобно прибавлять кы симы порошкамы немного свинцоваго сахару, и потирать больных тасти канфорного мазыю, или лучше промывать ихы водого свин- вода свинцового Гулардовой (aqua vegeto-mineralis Gulardi): ибо цовая гулагрдова.

примъчено, что от в свинцоваго сахару приключались иногда судороги).

Распущенмый купорось 6влый, или дою, въ которой прежде распущено будеть немнобълга го купоросу бълго. Но самые лучште въ такомъ слутлинка. чав лъкарство есть глинка бълга, распущенная въ
довольномъ количествъ воды теплой: которому составу надобно дать устояться до тъхъ поръ, пока
не простынетъ, и сею водою промывать слегка больныя мъста разъ или два въ сутки.

§ 6.

О сгущении возгрей во носу и о насморки у младен-

члень І.

О сгущении возгрей в посу.

Ноздри у младенцевъ часто залегають отъ гусего недуствих возгрей, препятствующихь имъ дышать своюдно носомь, и лишающихь при томь ихъ способности сосать грудь и глотать пищу. Почему и нужные всего бываеть пособствовать имъ неукоснительно отъ сего недуга.

Нъкоторые Врачи совътують въ такомъ случав TIONESOB2nie. послѣ пристойнаго слабительнаго, класть временемЪ Вода маіс-в в нось пряпочки намоченныя в в унцік воды маїсранная. Б бранной, въ которой должно распустить два или три жый купограна былаго купоросу, а по томы процылить. Велелий росЪ. сказываеть, что два грана былаго купоросу съ толи-Элатерій ким в же количеством в соку ослинаго огурца (elateriням сонъ ит), распущеннаго въ половинъ унціи майоранной во-OCHHHATO ды, приложенныя такъ какъ мы теперь говорили, проогурца. чищають возгри безь всякаго чиханія.

ВЪ случаяхъ упорныхъ можно испытать сїи ятигретва, абкарства; но прежде нежели приступишь къ онымъ, ном чеще надобно предписать проствишія и такія, кои удобнье достать можно. Мнъ никогда не доходило нужды употреблять другія средства, кромъ сала свътнаго, масла изб миндалю сладкаго, или чухонскаго масла свъжато, коимъ надлежитъ потирать у младенца носъ въ то время, какъ онъ лежитъ въ постели; симъ средствомь разбиваются возгри, и самое дыханге становится отъ того свободнъе.

члень и.

О насморкв.

(Бользнь сіл препятствуеть младенцамь спать, какіе мися и не мало обезпоконваеть ихь вы то время, когда му подони сосуть грудь. Ть, коихь держать вы чрезмырной вержение теплоть, или которыхы колыбели висять подль дверей или на сквозномы вытры, весьма бывають оной подвережены.

Пвкарством для сего почитается держать ила. пользовы денца лицом в нады паромы теплой воды, потирать неему нось свыжимы маслом коровьимы или маслом пой воды, литным. Естьли насморк не проходить, то надле-масло ножить покладывать вы ноздри свернутую тряночку, ровье, янче обмоча оную вы смыси изы половины унцти воды маго-вода маго-ранной теплой, изы одного или изы двухы граны ранная, былаго купоросу сы толикимы количествомы элатертя было нужими соку ослинаго огурца. Младенцы весьма бываюты подвержены ныкоторому роду кашлю называемаго неремыма, пользованте котораго найти можно вы член. ПП. Се, главы 20, Том. П. Тойже самой главы, вы Се, находится и пользованте удушья, или кашля се удушилем больни болье общей младенцамы нежели людямы взрослымы.)

S 7:

\$ 7.

@ peoms у мла денцееб.

Ньжность младенцев и чувствительность их в эвсть 600 органов дълают их подверженными рвоть или помье полвержены мосу, как в скоро они хотя мало примуть веществ в младенцы, раздражающих в нервы желудотных или кишетных. Помежели чему сти немощи и бывают в обыкновенные в в первыя вэрослые. льта жизни, нежели как в в возрасть совершенном в.

не всегда Но как в бы то ни было, однакож в реота редко она опасна. бывает в опасною, и ее не должно никогда почитать жене в бо и станет в продолжаться столько времени, что исматы.

ЧЛЕНЪ І.

Пользование ресты у младенцево.

Реста можеть происходить или оть того, что младенець слишкомы много навлея, или оть того, что принятыя имы яства были свойства удобораздражающаго первы желу достыя, или наконець оть чувствительности сихы перед, сдылавшейся столь великою, что оная приводить ихы вы несостояние переносить ни мальйщаго раздраженія яства, даже и самыхы легчайщихы.

(Рвота можеть еще приключиться оть простуды, оть какого нибудь пару вреднаго, какь на примърь оть дыму или угару; оть коросты неосторожно вогнатой внутрь, оть тереей, удушья, грыжи, оть засалого въ кишкахо, оть страка, испугу, боязливоети, и проч.)

чаень и.

Пользование рвоты произше дшей отд излишества ястеб.

ВЪ семъ первомъ случав не токмо чтобы старатьел остановить рвоту, надобно еще напротивъ мого всячески возбуждать оную, поколику не иначе иненануможно изльчить стю бользнь, как очищентем желид ана или
ка. Тогда надлежить дать младенцам ньсколько гран да и преч
илекакуанны, как то предписано в член II, § 3,
главы 20, Том. II; или довольное количество теплой
воды, или легкаго отвару из двътов ромашковых воды, или легкаго отвару из двътов ромашковых воды, или легкаго отвару из реоту, пощекотывал им в в гора пухом перуика.

Пользование рвоты приклюсающейся отд ястод острыхд и удобораздражающихд.

(Когда реота происходить оть летей свойства перемвия остраго и удобораздражающаго, то надлежить пере-пищеупо-д требленія, менить діэту иладенцевь, и кормить ихь пищею пребленія, легчайшею.

(Младенцы, кои сосуть единственно молоко своихь матерей, ръдко бывають подвержены сему роду рвоты, хотя впрочемь и весьма часто случается съ нами первая. Но дъти, отданныя кормилицъ наемной, очень не ръдко оною страждуть, какъ по тому, что молоко у нее слишкомъ старое, такъ и по тому, что кормять ихъ много похлебками мясными, пирогами, коровьимо масломо, кашею и проч.

Когда предложенными въ предъидущемъ членъ что надобсредствами произведена будетъ реота у младенца, но дълать, то надобно смотръть не кислаго ли свойства у него рота букачество летеб, раздражающихъ желудоко, что легко детъ свойпризнать мужно по примътамъ изъясненнымъ нами въ стя ки- з 4 сей главы, смотри стран. 256 сего Тома, и должно предписать лъкарства тамъ совътованныя.

Ежели острота мокроть желудосных в будеть гнилего; свойства гнилаго, что познается по запаху похожему на гнилое ящо, выходящему изъ рта у младенца, а сте и доказываеть, что онь ваь что нибудь мясное:

то надлежить дать ему пать или шесть грань виннаго камия тищеннаго, нааромаченнаго немного лимоннымо сокомо, вы небольшемы количествы воды. Пртемы сти надобно повторять больше или меньше разы вы день, и продолжать до тяхы поры, пока не примытно будеть болые никакого дурнаго дыханія.

Mabaro.

Естьли же сіл острота будеть свойства ржавато, что не редко случается у детей, которымь дають ветчину, пирожное, коровье масло, жирное мясо и проч., то надобно давать имь то же самое лекарство, какое и противу остроты гнилой; а только прибавляется кь оному немного толченаго сахару. Пользованіе таковое оканчивать должно регенною водою, дабы чрезь то самое очистить слегка и предохранить оть поносу, который вы подобномы случає приходить обыкновенно.

Когда рвота зависить отв клейнихь монроть;

Когда рвота приключается от в мокрото клейких в, собирающихся в в желу дк в у младенцев в, накормленных в излишно молошного кашего и хлъбом в пръсным в, то довольно дать им в нъсколько гран в илекскуанны, чтобы их вырвало, и но том в напоить их в ревенного водого, так в как в выше сего сказано было.

оть вокнатой внутрь коросты; оть чер-

Естьми острота возбуждающая реоту происходить от коросты, вогнатой неосторожно внутрь, то надлежить опять вывести наружу самую коросту и нользовать младенца такь, какь сказывали мы вь § 2, глав. 37, Том. III. Но коль скоро она приключится от тереей, то вы такомы случав надлежить следовать совытамы предписаннымы вы главь 30 того же Тома.)

Пользование реоты происходящей от в раздражаемости неред желу досных в и самой суветвительности стряждущаго.

Когда реота происходить оть чрезмёрной чуветвительности, или оть великой слишкомь раздрадражаемости (ivritabilitas) неред желу догных, то надлежить употреблять лекарства могущія укрыплять сей органд, и чрезь то уменьшать чуветвительность онаго. Первое изь сихь показаній выполняется тымь, настой естьми станеть давать дегкаго настою изь хины, кы изь хины, коему прибавить немного ревеню и померанцовой кор померанцовий. Второе же выполняется систительными солями; вой норни, кы которому лекарству надобно прибавлять нысколько чисти-капель лавдану Сиденгамова, смотря по обстоятель соли.

(Н длежить начать удалентемь оть больныго ила пищеуноденца всего того, что вы состоянии раздражать его требленте
мервы и самую тувствительность. Следовательно вмемизденца;
ето всей пищи надлежить давать ему одно только
молоко его матери, да и сама мать должна убъгать
всяких случаевы кы раздраженто и разгориченто моккормилироть своихы. Вы числе таковыхы поставляются всяцыктя страсти сильныя, летва пряныя и соленыя, и
чрезмёрное утомленте; по чему и должна она всячески стараться о томы, дабы ни коимы образомы не
предаваться онымы.

Съ другой стороны надобно утътать младен весьма да, играть съ нимъ, дабы его развеселить, обращать нужно въ его вииманте на предметы пріятные, оставлять при случать немъ только тъхъ, кого онъ любить; и какъ скоро мазденца онъ начинаетъ понимать, то мать его, родственники и всъ тъ, кои имъють объ немъ попеченте или утътать ники и всъ тъ, кои имъють объ немъ попеченте или утътать его воспитывають, должны обходиться съ нимъ такъ, чтобы онъ почиталь ихъ за самыхъ лучтихъ друзей своихъ. Болъе всего надобно убъгать отъ того, чтобы его не пугать, не внушать ему никакого страха, или робости и проч., какъ то мы предписывали сте въ томъ 1, смотри § 2 главы 11.)

Пользозание рзоты происходящей оть зазалозь вы подбрюшил.

Мо чему можно подозръзать завалы.

(Когда реота не зависить ни оть которой изь сказанныхь нами шеперь причинь, когда причыть но, что младенець чувствуеть великую боль вы животь, когда слышно бываеть вы ономы бурганге и когда оны нанизы совсымы не имыеть, не смотря на всы мястительныя промывательныя и припарки, коихы употребленія никогда не надобно опускать, всякой разы какы маленькой больной сей имыеть запоры и мучится животомы; тогда подозрывать должно у него завалы вы кишкахы, или раздраженіе причиняемое острыми мокротами, оты коихы должно опасаться колики, лютымы запоромы или жестокимы рызомы вы животы сей или жестокимы рызомы вы

ВЪ такихъ случаяхъ надобно немного пустить Кровопуенаніе. крови, ежели будеть жорд. Но при всемь томь на-COMBAN 6yстоять должно на промывательныя мягсительныя, дешь или изв одного масла деревяннаго. Можно шакожЪ жаръ. Промывапредписать осьмую часть или четверть грана опія, RIGH das m дабы по крайней мврв прекратить на ивкоторое -HFTRM время боль. Еще даюшь небольшіе: прісмы. но жекьныя, Авкаретво частоповторяемые, настою изЪ манны или алеунимаю. ксан дрійскаго вы выбавляють Aucmy, Bb Mee 60AB. немного соку лимоннаго Сверьх в того ставять Настой нэв маны младенца въ шеллую полуванну и въ оной держашъ ван алекего сколько можно болье, продолжая всегда поишь сандрійего настоемв тистительнымв. Ежели млаленець не CHATO INету сван-хочеть стоять вы ванив, то надобно приклады-Моннымъ вашь ему на брюхо мягтительныя принарки; послъ сономЪ. чего опять можно возвратиться къ саний, въ кото-Полуванна теплан. рую вновь должно понышаться его ставить; и такимъ Marnuобразом в пролоджающся попеременно ванны, припарки. RIGHTAN настой систительный, опий и проч. до тых порв, помринарки. ка иладенцу не будеть гораздо легче.)

TT0.12-

Пользование ресты происходящей отъ грыжи, простуды удушья и проч.

Ежели реота происходишь ошь грыжи, то поль прежде зовать опую надлежить по предписанию нашему за-унатія ключающемуся ниже сего въ § 3, главы 54. Следова- опъ чего тельно и нужно весьма прежде употребленія лв-бы она им карство прошиву рвоты прямо удостовъришься, не происходизависить ли она оть грыжи, которой младенцы бы- па, надоб. вають впрочемь весьма подвержены. достов пр-

Какъ скоро рвоша приключится отъ внезапной но, нвтъ простуды, захваченной младенцемь оть того, что какь прираз 4 вали его неосторожно, чему наибол ве бывають под энать мовержены ть, которых в пеленають: то сте признать жно рыску можно по шому, что къ сему маленькому больному шую ошъ внезапно приходишь икома; и естьли въ такомъ внезапной случав кормилица дасть ему сосать грудь, то его простуды; непремънно вырветъ. Но сему легко пособить можно; оной поибо довольно поширать впадину желу дохную у ила-собство. денца шеплото рукото, и по шомъ прикладыващь къ оной вать. нагрышия простыныки.

Когда младенцы находяшся въ шакихъ комна-средства тахЪ, гдв курятъ на угольв, то сколько бы слабымъ ни манъ показался запахь для взрослаго, но оный причиняеть вать расчасто реоту младенцу; однакож перестаеть она обы- ть произкновенно, какъ скоро вынесушъ вонъ уголье, и по- шелией прыскають жидкого солью щелоко нашаты рного (alcali от усаvolatile fluor) въ комнать. Естьми же пренебрегуть сте жидкая средство, то младенень можеть погибнуть.

Читожъ касается до реоты, происходящей отъ тырнало улушья или кашля съ удушьемв, то мы отсылаемв кЪ § 3, глав. 20, Тома II.)

Пользование рвоты упорной.

Въ рестах упорных , кром в внупренних в ле-припарка карстев, о которых в мы теперь говорили, надобно эромати. при-ческів

соль щело-Ko - нашаim STERFERS желудоч» ный съ ж проч.

прикладывать на впадину желу догную ароматитескія пластырь припарки теплыя, делаемыя на вине; поелику служашь онв къ солбиствию сихъ самыхъ лекарство: или осріянсьть на тоже самое мъсто можно класть пластырь желудотный (emplastrum stomachicum) и къ оному прибавлять немного осргаку, так в как в сказано было в в член в VIII, 6 4, FAAB. 22, Toma II.

О мытв и понось у младенцевь:

примтчается . THIO Y **Миладенца** нки бини жоносЪ.

внаки, не (Надобно прежде всего знашь, что называть которымъ должно поносомо у младениевъ. Въ в 2 сей главы, на стран. 243 сказано было нами, что младенець долженъ испражняться дважды въ день, и больше, естьли онъ много принимаетъ пищи: почему и не налобно думать, что у него поносб, когда онъ три или четыре раза въ день нанизо имвет в, какъ скоро при томъ онъ хорото сосеть грудь. Впрочемъже материи у младенцевъ выходять всегда жидкія, естьли они питаются однимъ только молокомв, какъ-то сте должно быть въ первые месть мъсяцовъ. Следовательно дабы можно было сказать, что у младенцевь поносб. то надобно ему испражняться от шести до осьми разъ въ сушки, больше или меньше, соразмърно съ количеством в испражнений, которыя онв привыкв имьть, и съ самымъ количествомъ пици, имъ употребляемой: сверьх в того сін опо ражниванія должны бышь другаго совство свойства и цвтту, когда младенецъ показываетъ отвращенте отъ пищи и проч.

Рвано бы-Baem b мышь у **Монорож**денныхъ мизденgenb.

младенцы новорожденные редко стра-Вообще дають поносомо, а ежели сте и случается, то виною оному бываеть мать или кормилица, неимтющая попеченія о рабенкъ, или дающая ему или дурное молоко, или и хорошее, но безпорядочно, какв то мы сдълали о семЪ примъчание въ § 7, глав. г., Тома I.

II on

Попосо должень починанься за полезный у мла чини, по денцевь всякой разь, какь испражнения у них в низом в ком рымъ бывающь острыя, мокрошныя, зеленыя, или которыя чется, выходянів кусками. Пользовань младенца надобно не что мыть для того, что онв имветь поносв, но по тому, что или ноиспражнения его бывають того или другаго свойства; нось поледаже и испражнения свышлыя и водяныя не шребующь остановления слишкомъ скораго, поелику бываютъ оныя не редко крититескія, а наппаче когда случающея они по ветуплении внутрь какой нибуль сыпи, или послъ простуды самаго младенца.

Иногда видимъ мы, что таковые поносы приходять посль погодь влажныхь: а вы подобныхы случаяхь должны они бышь полезны, пошому что влекушь за собою множество мокроть водяныхь, кои иначе могли бы способетвовать кЪ ослаблению телосле-Kenia.)

членъ І.

Причины мыта и поноса.

(Кормилицы подвергають младенцевь поносу всякой разв, когда онъ простужають неосторожно у нихь ноги и желудоко: завсегда, какъ развъшивають онъ въ дъшской комнашъ для сушентя пеленки мокрыя; когда кладуть ихь спать въ местахь влажныхь; когда выносять ихв на сырой и холодной воздуха; когда дають имъ сосатть всякой разъ, какъ скоро они кричать стануть; когда кормять ихь яствами твердыми; а особливо мясомЪ, вешчиною, пирожнымЪ кушаньемЪ, коровьима маслома, жиромЪ и проч., прежде нежели у нахъ выростуть зубы; когда дають имъ слишкомъ много вспів, или дають принимать тистительных очень крыпкія; когда вгоняють внутрь неосторожно коросту или всякую другую сыпь: наконецъ всякой разъ, когда онъ съ своей стороны вдять иного вещей

вещей соленых в, плодов в зеленых в или незрылых в, и пишье употребляют в острое; когда мучатся коликами и продолжают в кормить грудью, не принимая никаких в лака рство и не давая о том в знать.

Другою причиною толоса у дъшей, который кажется не столько зависить от в кормилицы, еже. ли бы она не должна была отвъчать за пищеупотреблине, которому младенець следуеть, пока на рукахъ ея находится, почитается слабость кишоко, изъ которых в устья железистаго или скважино впускающих в и оыпускагощих вы дохновения, ослабывших в, истекають мокроты воданыя вы самой каналь, такь что оныя не могушь бышь вышягиваемы сосудами пожирающими. Таковой поносо не сопровождается ни болью, ниже колотьями. Въ немъ не примъшно бы. ваеть никакого знака сукровицы или зелени. Младенцы, етраждущие онымъ, бывающь слабы, бледны и унылы: и скоро приходать въ изнеможение. Но сей поноса не редко бываеть следствиемь мыта запущенного, или который продолжался слишкомъ долгое время, какъто примъчается сте доводьно часто у людей бъдныхъ, а особливо въ деревняхъ.)

членъ и.

Всеобщее пользование мыта и поноса.

жакъ главное дъло при пользовании поносово совъло, ко- стоитъ въ томь, чтобы очистить матертю испорторое неноднить кому больному легкое реотное изъ ипекакуанны, а по семъ поль- томъ по мебольшому количеству на пртемъ, часто повторяемый, ресенто; употребляя между оными пртемами кактя нибудь лъкарства пожирающия, для унявъзга ма- ття кислоты въ мокротахъ. Не самымъ лучшимъ въ кноза.

семъ случать системненьнымо почитается бълая магнезія : она инбеть силу такую, чно инимаеть кислоти и выветь слабить, а при томь и льиствуеть не причиняя коликв.

Сурьляное вино, действующее шак в как в рвом- вино сурь. ное и как в гистительное, почитается тогда прево мяное. сходнымів лекарстволюв. Но дабы соразміринь его съ слабостію твлосложентя, то разводить оное надле-Спосовь, жишь вы некоторомы комичестве воды; и какь не жань его им вешь оно вкуса непріятнаго, то можно употреблать его столь часто, как в случай сего требуеть. Но и одинъ даже пртемъ сего лекарства весьма часто унималь силу сей бользни и пріугопговляль шьло къ употреблентю лъкарствъ пожирающих (abforbens).

Ежели однакожъ силы малаго больнаго дозволяющь, що можно повторять сте лека ретео чрезъкаждые шеств или восемь часовь, до техь порь, пока испражненія нанизб не примуть свойства надлежащаго; а по томъ давать его не столько часто. Естьлиже обспоятельства пребують того, чтобы повторять сте авкарство очень часто, то всегда приемы должно давашь св небольшею прибавкою, потому что оно вообще, когда къ нему привыкнешь, теряетъ нъсколько своей **д**виствительности.

Млогіе при первых в признаках в поноса при- пожираю. бъгаюнть къ лекарствамъ пожирающимъ кислостъ елзательны иб; но как в скоро дають сти лекарства щін нислопрежде поправленія остроты мокроть, що хотябы ту и вабользнь и казалась укрощеньюю вы продолжении накопюраго: времени, однакож в полваления она оплив быть давскорт съ большимъ усилиемъ, и не ръдко бъдствен ваны, не ною бываеть: а напрошивь того, когда будуть на употрепередь упопреблены отишентя потребныя, можно жае чибудеть давать безь опасентя сти лекаротва, кои все-спательгда у нающея весьма хорошо, так в как в мы сказывали в в ныхв. § 3, глав. 22. Том. П.

Случай Но какЪ скоро по очищенти желудка и кишокъ поназываю остаются еще колики или бъзсонницы, то надлещій боле. житъ давать по нъскольку капель макосяго сиропу
тельныя въ небольтомъ количествъ коришневой воды прекарства стой: и сте болеутолительное лъкарство надобно
повторить раза три или четыре въ день, пока
припадки нъсколько не укротятся.

Пользование главнымъ причинъ мыта и поноса.

(Мы сказывали уже, что не надобно спвшить ніе, когаз остановленість поносова пролеходящих в отв простумладенець ды, сыросии, коросты, или всякой иной сыпи го ъстъ вступившей внутрь. То же самое наблюдать должно и тогда, когда пеносо приключается отъ того, что иляленень всть слишкомь много. Вы таковых случаяхь надлежить ни о чемь столько не помышлять, какв о діэть, а именно, содержать младенна во всякой чистоть и тепль, класть его въ сухомъ ивств и сосать грудь давать ему умвренно, а при томъ и въ часы опредъленные. Однакожъ, ежели поносв сдълается упорный и въ слабость привелеть младенца, тогда надобно давать ему лекарства всеобщія, выше сего предписанныя; а прежде оных в должно употребить немного ипекакуанны, ежели у маленькаго больнаго будеть позывь на рвоту. въ случат какъ то чаще всего случается. Въ случав вступившей внутрь сыпи надобно вызвать оную, или еыпи Bemvuna. замънить сему фонтанелломв, т. е. отверствемв для вшей истеченія мокроть, какь-то мы предписали сіе въ виушрь. главъ 37, Том. III.

нось при мельных слишком вранких в приключится от выстивыстинения тельный слишком вранких в произволящих в переславыстинен бление, сильный раз ва живота, судороги, и могушельных щих в причинить самую смерть, то надобно немедленно

стараться объ остановлении онаго: а въ следстве то-слеть то и должно предписать младенцу следующее пите: комъ крей

Возьии воды коритной - - - шесть унцій; - - тридцать гранЪ; трагаканту сладких в миндалин в - - - тесть.

По Лашынт:

Recipe aque cinnamomi. - - - uncias fex; Gummi tragacantha, - - - grana triginta: Amygdalas dulces, --- fex.

Распусти трагакант вы коригной во дв; облупи миндаль; истолки его въ небольшомъ количествъ простой воды; процеди и смешай сте миндальное молоко въ коритного во дого каме дного.

Давай сего питья по кофейной ложкъ чрезъкаждые полчаса младенцу, поболтавши напередь бушылку.

СверьхЪ того надлежитЪ поставить клистира, промыва какой предписанъ на стран. 53 Тома III; количество тельное енаго расположить надойно сообразно возрасту мла-маку. денца и крвности телосложения его, и повторять можно смотря по обстоящельствамЪ.

Когда испражнения нанизв начиуть уменьшать требуюся, то должно дать каплю или дв ласдана, естьли жія павдай будуть судороги и движение внутреннее. Но впро- на. Съ начем в надлежить быть весьма осторожну въ давани сего осторожь. лвкарства; а повторить его разви тогда, когда не- ностьми обходимо будеть нужно. Все пользование оканчивает. надобно его ся легкою водого ревенного, которой можно давать ему употребвременемЪ по маленькой ложечкъ.

Какъ скоро поносъ происходить от в слабости пользование кишека, то испражнение бываеть весьма изобильное, когда пои самыя мокрошы шёлесныя разбились бы въ корошкое нось пре-Jome IV.

пкихъ, то мемедленно H2 K Ken Kumb остано-BRIMP GLO Z orsy RKA Вазатель-HOE BRIBIE.

писльенная AAMIE. Ревенная

оть слаб жин кишокъ : emu . M EDOY.

пеходить время, ветран сто не остановные носпъшно. Сей попос 3 зависить, какъ мы дали уже знашь, отъ причить дальнъйшихъ. Одна изъ опыхъ и болье общия, пежели Оть резно- как в многіе думающь, есть неудовольствіе, которос чувствують дати от того, что больше оказывають ласки и любви къ ихъ бранцамъ и сестрицамъ, нежели кЪ нимЪ: другая же не менве часто случающаяся есть страх в которой обыкновенно имъ внушають, не говоря о мыть предшествовавшемь, которой быль запущень или пользовань худо.

мрвиивпельныя. Марцізавное вино еЪ коричною водою.

Такого рода поносо требуеть, равно какъ и всъ прочія бользни, дабы немедленно отдалена была причина, от в которой он в произошель; а по том в остается Авиарства полько укрынлять малаго больнаго марціальны и вином в (vinum chalybeatum), котораго давать надобно по ложкъ кофейной въ небольшомъ количествъ воды корисной; и сте лекарство можно повторить раза два или при въ день.

Lioma. Пишье.

Сверьх в того надобно давать иладенцу вивсто питья наливку коритную, или изв. померанцовой корки. Ежели онъ сосеть еще грудь, то кормить его должно однимъ только молоком в матернимъ; естьли же отнятъ онь оть груди, то давать ему поджареной хльбъ съ небольшимъ количествомъ квитоваго варенья, безъ всякой похлебки, безъ масла и проч., кои бы могли больше увеличинь ослабыйе сосудовь пищеприемнаго канала.

Чтожъ касается до поносу, сопровождающаго мелошницу, то о сей послъдней бользни говорено было въ § 3 сей главы, смотри стран. 246 и слъдующ. сего Тома. ВЪ разсуждени же того, который бываетъ послв осны и кори. надлежить справиться св главаии 12 и 13 Тома II.

Младениы полвержены бывающь осищениямв, извветнымь поль именемь селезенотницы и сыраго поноса или техенія несвареных вство, о которых в говорено было вЪ § 8, главы 25, Тома III: то и надлежить поступать по сему параграфу, располагая пріены лекарство сообразно возрасту и телосложению маленькаго больнаго.)

членъ п.

Средства какъ предупреждать мыть и поносъ?

(Предохранительными средствами для сих в бо-предохральзней и великаго числа другихъ, коимъ подвержены нишельные бываюшь младенцы, почишающся усердныя попечентя ствами на и здоровье кормилины. Поступавшая по предписанным в сім бользни въ главъ г, Тома перваго сего сочинентя правиламъ почитают, кормилица, редко увидиш в пишомца своего больным в, ныя поне да и ръже того сама она больна будетъ.

ненія и здой ровье кор.

Однакожъ ежели не смотря на самую подробнъй-милицы. шую точность въ исполнении должностей своихъ кормилица примътитъ, что младенецъ будетъ расположенъ къ мыту, или когда послъ того, какъ онъ уже его имълв, опасается она, чтобы оной опять не пришель, то должна сама принимать слъдующій порошокь:

Возьми былой магнезіи - - • одну унцію; Померанцовой корки - - - (каждаго въ но унимаю-Склени воложского укропу зрошкъ по двъту ивмъ-Вылаго сахару - - - Сдрахны. Смъшай.

ПорошокЪ тей писло стъ крв. пишель-Mbin ARE кормили-Kbl.

По Лашынт:

Recipe magnesiæ albæ, - - - unciam unam; Corticis aurantiorum, --- (ana in pulvere Seminis fæniculi, drachmas duas. Sacchari albi. -

Misce.

Kop-

Кормилица должна принимать сего состава от в десяти до двенатцати гранъ разъ пять или шесть въ день въ ложкъ теплой воды.)

\$ 9.

О различных видах вышей бывающих особенно у грудных младенцевь; о летучемь огнь или огникь, струпь. яхь молошныхь; о шелудяхь и о ципкахь.

Rakas. (Завсь не предлагаемъ мы ни объ оспв, ни жаль преде кори, ниже о горятки съ пятнами или ликоmonaraemes радкв высыпной, и проч.; ни о рожв, лишаяхв, кожараграфь. рость, угряхб, выступлени крови, производящей небольшія красныя шишки, или прыщики и проч., всёхЪ бользияхо сысыпныхв, равномфрно бывающих в у людей взрослых в какв и у младенцевв, о коих в говорено было въ главахъ 10, 12, 13, 14, 15 и 16 Тома II, и въ главахъ 27 и 38 Тома III. Ибо въ первомЪ членъ сего параграфа единственно разсуждать будемъ мы о тъхъ сыпяхв, а особливо случающихся на головъ, которыя особенных именъ не имъють, и которыя женщины не собственно называють шелудами, или паршами, поколику они отъ шелу дей существенно различествують; въ следующихъ же трехь членахь говорить станемь о летутемв огий или осникв, о шелу дях в и ципках б.)

ЧЛЕНЪ I.

О разныхъ сыпнхъ бывающихъ особенно у грудныхъ младенцевъ.

Сыни сін Трудныя дёти рёдко бывають свободны оть довольно сыпей того или другаго рода. (Но не должно смёчаето слушивать сихь сыпей сь трещинами, саднами или предоставления кожи, о которых в товорено было въ 6 5 сей гла-

тлавы, смотри стран. 258 и слёд. сего Тома. Одна но они не кожъ таковыя сыпи обыкновенно бывають не очень очень опасны. Но при всемь томь не должно ыхъ никогда должны засушивать безъ самыхъ величайних предосторожно- быть засетей, потому что они служать къ освобождению мласучиземы денцевъ отъ мокроть острых и мгучихь, которыя, осто- будучи задержаны въ тёль, могли бы произвести бо- рожностей. лёзни самыя опаснёйшія.

Причины сыпямь бывающимь особенно у младенцевъ.

Сыпи у малденцев в прикаючаются наибол в яства неот в летв нездоровых в и от в нечистоты. Ежели здоровых маденца кормят в безпрестанно летвами, коих в желу дох в его варить не может в, то сти самы я яства, не будучи надаежащим в образом в переработаны, вм в сто трубыми мокротами: а сти мокроты, будучи произведены однажды, или выходят в под в видами сы пей на кож в, или остаются в в тел в, и причиняют в лихорадки и другія бользни внутреннія.

Наконець и самая неопрятность или нечисто- нечиетома та бываеть причиною столько всеобщею бользнять или пнеориемсыппымд, что на всякомъ почти рабенкъ примъры сему встръчаются. Дъти людей бъдныхъ и всъхъ
нерадящихъ о тистотъ или опрятности, не токмо
почти всегда бываютъ покрыты всякою гадостто или
ещами; но обыкновенно имъютъ еще шелуди, коросту и другтя болъзни на кожъ.

Пользование сыпей бывающих в особенно у младенцевъ.

Когда сыпи происходять или оть летей не-вь случав эдоровыхь, или оть нечистоты, то отдаление неэлоросихь объихь причинь достаточно обыкновенно кь уве- причинь и рачеванию оныхь. (Величайшаго попечения о томь, нечисточнобы перемьиять у иладенца бълье, какь скоро оное ты.

V 3

къ воепре- замарается; ныть сму голову каждый день полошен-ERECEIEOиемь намоченнымь вы шеплой водь, и вивсто всякой REHIND яствы давать ему одно молоко матернее, довольно momy. дабы они будеть не токмо къ воспреплиствованию, дабы сыне сдела- пи сти не следались опасными, но еще и къ преджись окаупреждению оныхв.) еными и

какъ ихъ Въ другихъже случаяхъ надобно употреблять предупрелекарства сущительныя. Но всегда должно давашь ихв ждашь. въ дру- не иначе какъ съ самою ведичайшею предосторожногихъ елустію, какъ-то мы сделали о семь примечаніе выкон-WAREL TARE нь С7, глав. 1, Том. I. Во время употреблентя maкарсива сущитель ковых в лекарство нужно весьма, чтобы желулок в быль очищень, а притомь беречься, дабы младенець мыя. предосто-Предостокоих в сей коживах в мы не знасм в лекарство надежнейших в кро. мь свры, только бы оная была употребляема св остовидь лькарешвъ требуеть, рожностію. - Надлежить смещать немного цевтова сврныхб (flores fulphuris) съ свъжимъ масломъ коровь-Стрная M235. имЪ, деревянныма и салома свиныма, и оною мазью слегка и часто въ день часть больпоширашь ную.

> Самыми упорнайшими сыпями, которымъ полвержены бывають младенцы, кромъ сказанных в теперь, почитаются летугій огонь или огникв, шелуди или короста на головъ и ципки.

члень ІІ.

О летучемъ огнъ или огникъ у младенцевъ:

Свойство

(Поль именемъ летутаго огня или огника. сей сыпа. (стива вастеа) разумъется сыпь струниками щаяся, которая покрываеть лице, а иногда и друтія части тьла у младенцевь: еще называется она молошною, потому что чаще приходить къ младенцамъ груднимъ, нежели къ шемъ, кои ошъ гружены бывають сей бользни, нежели ть, у которыхь зрасту прорьзались зубы: и о ыкновенно проходить она поды ей подвертивной вонець года, вы которое время большею частю дытей жени. Отнимають оть груди. Однакожь у иныхы оказывает ся она нозже, и продолжается далье совершеннаго выступлентя первыхы зубова. Авторы, котораго мы хотимы привести, видыль, что однакожь бываеть рыдко, младенцевы шестильтнихы, кои огникома страдали, и у одного купеческаго сына пришла стя бользны вторично вы началь пятаго года возраста.

Все, что мы намерены говорить о огнике, взято изЪ превосходнаго разсужденія, заслужившаго награжденіе от Ліонской Академін въ 1776 году. Онымъ одолжены мы ученому Г. Стракку, Майенскому Врачу, который справедливо жалуется на молчание большей части Врачей о сей бользни, даже и таких Врачей, кои писали о младенческих В бользнях В. , Или об В нем В ,, они совсемь не говорили, сказываеть онь, или хо-" тя и говорили, но безъ всякой отъ того пользы., Сте разсужденте означено въ заглавти: Caroli Strack, Med. Dost. & in Univ. Mogunt, instit. Profess, publ. ord. Eminentiff, ac Celsiss. Princip. Liector. Mogunt., etc. De crusta lactea infantum, ejustemque specifico remedio Dissertatio quam Scientiarum, Artium atque Litterarum Academia, que Lugduni in Gallis est, altero duplici præmio coronavit, die 3 Decembr. an. 1776. Francofurti Mænum. Typis Andreaeis, 1779.)

Причины летучаго огня или огника:

(Причина огника составляеть еще поднесь тайну. Стракко объявляеть съ откровенностию, что оныя не въдаеть: а ежели понудять его отвъчать, то онь скажеть, что происходить онь оть за разы, и жотя не можеть онь извленить сему причины, однакожь

кожъ сте мивите основано 1) на шомъ, что младенцы. Bapasa. рожденные ошр машери, которая въ младенчествъ своем в имъла стю бользнь, имъють оснико, хотя бы кормлены были своею машерью или кормилинею постороннею, хотя бы пишали их в молоком в коросьим в или какими другими яствами: 2) на томъ, что кормилица имъвшая огнико, сообщаеть его рабенку, хотябы Кормленіе сей родился опів опіна и машери такихв, которые грудыю оному подвержены не были, такъ что, сказываетъ почишаешавторь, примъчено мною не однократно, что одна и оя елииепревнымъ гла же самая кормилица заражала сею бользнію многихъ дътей, принадлежащих в различным в семействамъ. Но синомъ къ при всемь томь посторонняя кормилица, у которой удобатышему со- въ младенчествъ была стя бользнь, сообщаетъ ее скоовицению рве нежели мать, которая сама не кормить. огнина.

Признаки летучаго огня или огника.

(Чаще всего выступаеть онь на щекахь у младенца. ВЪ шакомъ случав выходящь прыщики, иногда широкіе, а иногда наподобіе остроконечія, наполненные влажностію прозрачною и клейкою. Изъ всякаго прыща, который треснеть, вытекаеть вода рыжеватая и клейкая, которая по вязкости своей останавливается на перепонкъ, ее заключавшей, и какъ та, такъ и другая прилипаютъ къ кожт. А какъ прыщи сти трескаются часто и въ различных в мыстахь, то кожа покрывается струпомь красножелтоватаго цвъту. Но и сей струпв прескается часто, и изъ трещинъ его выходить еще мокрота клейкая, которая, тверявя равнымъ образомъ, увеличиваеть густоту и твердость целаго сливнаго струпа. Самая даже кожа на больномъ мъстъ бываетъ жестка на подобіе сапожной кожи, а находящіяся под в нею часши надуваются. Шейныя железы обыкновенно распухивають, что самое рыдко случается съ железами околочиными.

у иных оснико сей занимает одни только щеки, и на них оканчивается: у других же скорбь сія простирается совокупно и на прочія части; даже распространяется она до передней части ушей, а иногда и на задней их части оказывается. После того выступает она на подбородке, по том на лбу, и наконець все лицо покрывается сю так как век которою личиною. Только и щадить она одни века, которыя, будучи белы и лишены респицо, кажутся издали как бы сквозь отверстія какой нибудь личины.

Редко болезнь сія приступаеть къ яблоку глазному. Но встречается разве случай сей тогда, когда прыщи обмечуть вы разныхы местахы щеки, или котда ихы бываеть очень мало. По чему сей видь глазной болезни и трудно разпознать; да и не иначе до сего можно достигнуть, какы долговременнымы опытомы. Иногда сія огничная острота производить глухоту и изливаеть сукровицу чрезь отверстіє глуховое.

Но огнико не только бываеть на лиць: онь распространяется такожь и на другія части, такь что ньть почти никакого мьста на тьль, которое бы оть него защититься могло. Мнь случилось видьть его около шеи, на груди, на брюхь, вдоль рукь и лядвей, даже по всей задниць и на самой полсниць.

Многія машери, няньки и нъкошорые врачи дунія о помають, что огника не имъеть ничего опаснаго, и сатастічто по излъченій оть него младенцы ту еще имъють, яхьогника. выгоду что лицо оть него бываеть красивъе, и что ежели посль приходить къ нить оспа, то оть нее рябинъ у нихъ не бываеть. Это совершенныя заблужденія. Не токмо чтобы кожт на лиць быть красивъе, напрошивь того остается она бъла, гладка и лоснится; да и оспа какъ ръдкая, такъ и сливиая, остае онъ не влястьня пихъряющим равно какъ и на шъхъ, кои огника не безъ стае Томо IV. имъли. Наконецъ сїя послъдняя бользнь бываеть не безъ опасности, а напротивь того бъдственною бывала она не ръдко или по тому, что прыщи сами по себъ опадали; или по тому, что когда выходили наружу, то часть бользненной матеріи оставалась въ железахъ, или по тому, что противнымъ пользованіемъ вогната была внутрь мокрота, выходившая на ружу. Г. Страккъ приводить сему многіе примъры, кои можно видъть въ его разсужденіи, но которыя мы оставляемъ, дабы чрезъ то излишно не увеличить сего члена.

что двягеть его опаснымь.

Оснико бываеть опасень, ежели долго времени продолжается: но гораздо опасные почитать его должно тогда, когда прыщи не выходять вы надлежащемы количествы; ибо вы такомы случаь часть остающейся мокроты кидается вы железы брыжжейныя: а оттуда опухоль вы животы и водяная бользны сухая или воздушная вы подбрюшии. Вскоры по томы младенецы начинаеть худыть, поелику питательный соко не можеть обращаться вы кровь, и такимы образомы впадаеть оны вы сухотку, его умерщиляющую.

онъ проле- Бользнь сія врачуется какъ сама по себь, такъ жишельи помощію лекарство. Но врачеваніе оставленное на-HEF ULTO требуеть турь медлительные того, которое снискивается эрачеванія, искусствомЪ, поколику случалось иногла, что она продолжалась по шести мъсяцевь и даже по целому гоecmban. егонатурь Лу, когда оставляема была на собственное ся двиоставишь ствіе, хотя напрошив в того проходила она дней в в HEREAR пятналцать, болве или менве, как в скоро пользована жакъ при была лекарствомо, о которомо мы говорить намь. HOMOHEM менуссива. рены.

Свойство мочи при онончаніи сей болъВообще сынь проходить тьмь съ большею скоростію, и струники спадывають тьмь поспышнье, чьмь скорье страждущій шакою бользийю младенець начилаеть испускать моту несноснаго запаху, такь

какъ наполобіе мочи кошечьей. Пользована ли булеть стя бользнь или ньшь, но больной не изпылишся, не испустивши мочи такого запаху, а еще и нъсколько разъ сряду: но чемъ медленнее она показывается, шемь продолжительные бываеть самая бользнь. Слыдовашельно сія бользнь есть одна из техь, въ которых в надобно давать лекарства скорве как возможно.

Пользование летучаго огня или огника.

(КакЪ скоро удостовърншься о существовании Трончная сей бользни, да и нужно дълапь сте как возможно ско- права есть рве в разсуждени последствий, к в каковым в подает в дайствуе она поводъ, то и должно употреблять лекарство ющее на собственно дъйствующее, а именно троитную траву, него льназываемую также веселыми глазками (jacea five herba способъ viola tricoloris): которое лекарство, сказываеть Г. какъ упо-Страккв, пособствуеть къ изцелентю совершенному, требльть скорому и благонадежному. Пригодны же бывають для ся мистья сего одни только листья сего растънія. Ихъ употребляющь свыже или сущеные. Какь скоро хочешь предписывань листья свёжіе, по должно опнять корешки, пвашы и съмечки, оставляя одни только листочки; ихъ берешся цълая горсть, которое количество искроша мълко, надлежитъ варить въ половинъ чайной чашки молока, и дать выпить младенцу поутру, и сей пріемъ повторить также ввечеру. Естьли же лучше сушеныя в хочешь употреблять листочки сущеные в в твии, то въ поротда истереть надобно ихъ въ порошокъ, коего берется по половинъ драхны, и сте количество настанвается часа два въ половинъ чайной чашки молока; по томъ, векипътивши, надлежитъ процъдить. Сей пріемь дается поутру, и повторяется ввечеру, такъ что младенецъ употреблясть по цьлой драхмъ сего порошку въ сушки.

Чтожь касается до того, какимъ образомъ да-КакимЪ. образомъ вашь, принимащь младенцу по оной получашкъ моложькарсиво ка, то можно давать его ложечкой, или сдвлать изъ младенцу. него похлебочку, папада. и проч, пошому что отв травы сей не киснеть молоко и не перемъняеть своего вкуса пріяшнаго; а напрошивъ того оть нее бываеть оно, чище и густо, какь, сливки.

Абиствія. omb cero авкарешва. ZHH :-

ВЪ первые осьмеро сутокЪ употребленія сего лекарства, выходящь прышики въ великомъ множествь въ первые даже и у шехъ дешей, у которых в прежде совсем в не было или было очень мало пятень огника: вскорв по томъ, все лицо, покрывается весьма, густымъ, струпомь; что самое и должны матери предупреждать; и хотя бы моча не имъла еще никакого запаху . однакожь тогда начинаеть принимать запахь самый отвратительный подобный мочь кожечьей, какв - то мы сказывали выше.

Употребление сего лекарства продолжается до На второж нед тан. тъх в поръ, пока станет в наружу выходить мокрота: но когда сыпь уже совство выступить, осника сатьлается сливнымъ наподобте струпа и никакой болбе остроты онаго, не останется, то струпья спалають и, отстають, обыкновенно, большими кусками послъ второй недъли и кожу покидають безъ всякаго оной поврежденія.

Хошябы, струпики спали и лицо совершенно Над бно едълалось чисто, однакожъ не надобно еще вдругъ продола покидать употребленія сего лікарства, а должно нажашь ynompe6. проливъ того продолжать его сущокъ пящнадцать, ленје сегольнар- дабы могло оно выгнать наружу вою мокроту, котопотнацать рая моглабы еще быть, внутри. Ибо Г. Страккв дней посль примъчалЪ часто, что кожа очистившись совершенно ссвершен- от в употребления сего лекарства, и остававшись тамаго спаде-KOBOIO

ковою нъсколько времени, покрывалась по томъ опять нія струстивними струпьями.

Воть знаки, по которыть признать можно, что знаки, по вся мокрота совершенно изь тыла вышла, и что оной коимь можно не осталось ничего во внутренности: лицо у мла знать, что денца остается мягко и безь всякой пухлости; кожа сія бользны на лиць бываеть тонкая; и даже можно сдълать на выльчей морщинки, ежели станешь пожимать ее между нерстами; она не бываеть тогда ни тверда, ни жестка, ни шероховата, ниже лупится; наконець и самая мота у младенца походить на обыкновенную мочу младенцевь здоровыхь.)

Средства какъ предохранять младенцевь отъ летучаго огня: или огника.

(Какъ причиною бользни бываеть зараза, то и не надобно способь къ предохранению отть нее младенцевь со- давать стоить въ томь, чтобы не подвергать ихъ сей за- нормить маденца разъ. Но какъ видъли мы, что средство, чрезъ ко- грудью торое она особенно сообщается, есть кормление трудью: то слъдовательно и должно остерегаться, торая сама давать младенцамъ сосать грудь у матери или унмълг сир кормилицы, которая стю бользнь имъла; ибо особен- бользнь ное свойство осника есть такое, что оставляеть въ для чего женщинь, страдавшей онымъ, нъкоторую такъ сказать опару, пребывающую чрезъ множество льть, и которую она передаеть дътянь своимъ или тъмъ, которыхъ грудью питаеть.

Дъйствие сие изъясняеть, для чего троигная: трока не всегда выльчиваеть оснико. Въ самомь дъль, когда младенець, имъющий сию бользнь, находится на рукахъ у такой кормилицы, которая сама оною страдала во младенчествь, то всякой чувствуеть, что онь выльчиться не можеть, поколику онь безпре-

A a 3

cman-

станно полвергается причинь, могущей опую произвесии. Савдовательно нужное всего было имоть знаки или примъщы, по которымъ бы можно было распознавашь, что мать или кормилина имбла стю бользны: а сими примътпами обязаны мы такожъ Г. Стракку. Не должно удовольствоваться спрашивантемь у кормилицы: она великую имветь выгоду скрывать истинну, когда дъло идеть о нъкоторомь предметь корысти. Впрочемъ можешъ и сама она не знашь сего, потому что бользнь у нее была въ младенчествъ, а при томъ наслаждается она добрымЪ здоровьемЪ, да и самыя примъпы ея мало или и совсъмъ не извъсшны просшымъ людямъ. По чему и надобно осмотрѣть ее со вниманіемь, и тогда будещь удостовърень о томь, что сію бользиь она имъла.

имъла нь-COATSHS.

Приметы, Ежели кожа на лице у сей кормилицы гораздо мо ношо- глаже, нежели какъ у другихъ женщинъ; естьли она знать мо гораздо бълве, нежели на прочихъ частяхъ тъла, то жно, что сія примъта почитаеттся одною из в самых в достовъркормилица ныхъ: и по сему - по состоянию кожи простой намогда сію родь, какв-то мы сделали уже примечаніе, думаеть, что отв летутаго огня двин становятся красивке. Ежели окладь щекъ бываеть весьма равной и лоснить ся: ежели лицо от отня или другой какой причины, производящей краску, не принимаеть цвъту розоваго или карминоваго, но цвыть багровый или кармазинный; наконець естьми и сей густой цвъть покрываеть щеки не единообразно, но широкими пятнами. отделенными между собою местами белыми.

КакЪ скоро у кормилицы примъчены булутъ та-TPEMTмивъ ma- ковые знаки или нъкоторые изъ нихъ, то и надлеэнаки, нада жишь взяшь ошь нее младенца, потому что онъ дежить несомивнио заразится сею бользий: да и не можно взять мла. будеть сомнъваться, чтобы младенець не быль уже OHOM

оною зараженЪ, кошя бы и не оказывалось еще ника корми-

Ежели сей младенецъ лицо будеть имъть чрез зачи, по вычайно толстое; ежели щеки будуть у него надушы, круглы и пухлы; есшьли онв цвыпу нерозоваго, чается, что но весьма густаго краснаго от скуловой кости до младенецъ самой челюсти нижней; ежели при осязаніи кожа ка-сосавній жется такъ жестка, какъ сапожная; естьли ножимая подозриее перстами не можно сдълать на ней морщинокъ тельную, или изгибовъ, признакъ обольщающій матерей, кото одержимъ рыя въ шакомъ случав хвасшающся кръпкимъ шеломъ звію, кои жиромъ дъщей своихъ; естьли первая кожица ка- та бы лежется жесткою при осязании, и какъ бы слегка че тучи шуйчатою, а особливо въ тъхъ мъстахъ лица, гдъ стонь и не оказывалея бываеть краска; ежели младенець сей имветь при-наружувычку тереть у себя лицо по изголовью колыбели, или по одеждъ своей кормилицы; наконецъ, и стя примъта не дозволяетъ болье объ ономъ сомнъваться. естьли мога имветь отвратительный запахь на подобіе моги кошечьей.

И такъ какъ скоро примъчены будуть сіи знаки или нъкоторые изъ нихъ у младенца, то и надобно взять его отъ кормилицы, и давать ему принимать немедленно собственно дъйствующее лъкарство, то есть троиспую траву, какъ выше на страницъ 283 сего Тома предписано. Пъкарство же сіе, выгоняя наружу лдб, не умледлить открыть и самаго огника.

Мы окончаемь члень сей наблюдентемь штмь, троичная тто троичная тто троичная тто троичная трава есть лекарство весьма легкое; шрава есть лекарство весьма легкое; шрава есть лекарство варедно и безь всякаго оть оной неудобства: почему кое немовь случать, когда бы предложенные нами шеперь знаки гущее време не были очень примътны, или бы казались сомништель нами, дътамь нами, дътамь

ными, не должно такожь останавливаему быть опасентемь от предписантя лакарства, котораго показанје не было бы еще очень явственно. Оно не можеть причинить вреда; да и опытомь дознано. что оно выгоняло летусій огонз у таких в млаленцевЪ, кои не давали и повода кЪ подозръванию онаго.)

YAEHB III.

О шелудяхъ на головъ у младенцевъ.

Часто шелуди вылъчивать весьма трудно, а инотла двиенте сте опаснве бываеть нежели самая бользнь. Мнь случалось весьма часто видьть младенцевъ одержимыхъ бользнями внутренними, отъ которых они умирали, потому что льчили ихъ оть желулей употреблениемь лекарство еущительяыхб (b).

¶то надо« упопребженія жьжарсшвЪ.

Не должно никогда начинать льчить стю бользнь вно дългив не очистивъ напередъ головы, не обръзавъ волосъ, не вычесавъ и не очистивъ самыхъ струпьевъ и проч.

Ежели

Musimompi M яствъ здоровых в къ врачеванію сей бользни. Наблю-Kenie.

Вижность (b) Несколько тому времени, канъ въ больнице Воспитательнаго Дому Анворетного гав магденцы сильно страдали шелудьми и другими колбанями высыпными, видъль я поразишельный примърв опасности оть унстребленія лекарствь сушительных вмьето чистоты и пствь эдоровых в: ибо как в скеро нашли по учиненным в о шем в изследованіям в, что совершенно нерадъян о чистот в надъ сими младенцами, и что мало забошились о здоровом в свойствь псовов, конми их в кормили, то и отдаиы были надлежащие приказы, чтобы тому пособствовать. Но какъ повельнія таковых пренебрежены, поколику оныя были тягостны для служителей. Директоровъ и проч., то и опредълено напоследокъ, что надобно пользовать сихв младенцевь ябиарствами: въ следстве чего и стали имъ давать эблюретов, кои учинились бъдственными для всёх в оных в нещаетных в младенцевь: вскоре поленянсь ликорадии и другія бользни внутреннія, а по томъ якилой понось, столь понлипчисой и заразительной, что онв погубиль быльшую часть изв нихв, и подобных опустошения причиния вы знатиой часта домовы опрест-HUX'b.

Ежели сти средства будуть недостаточны, по водамымы мадлежить брить голову однажды вы недылю, или чаще, известно- мыть ее каждый день водою мыльного или извествая. Плакового. Естьми и туть усныха еще не будеть, то стырь изъ надобно положить на голову пластырь изъ терной смолы, дабы исторгнуть самый корень волось. Какы смолы, смолы, оное кусочкомы сиплео купоросу, или присыпають жженые иыми квасцами.

Во время употребленія таковых в средство нужно, чтобы младенець наблюдаль діэту порядочную и діэта. легкую; не надобно отягощать желудка его пищею, и должно беречь его сколько возможно болье оть холоду.

Для предупрежденія же последствій, въ каковыя способы могло бы вовлечь врачеваніе сей сыпи, надобно, а накъ предособливо детямь толстымь и тучнымь, сделать последфонтанело на шев или на рукв, и оной держать от ствія отв крытымь до техо порь, пока младенець не сделается сего врачем крепче и пока его телосложеніе не поправится.

ЧЛЕНЪ VIII.

О цыпкахъ у младенцевь и у взрослыхъ.

Младенцы полвержены бывающь импкамо во вре- кто полежена колодныя. (Онв такожь довольно часто случающеми ся и у взрослыхь людей, а наипаче у техь, кои подвержены бывають переменамь стужи и тепла, и кои кладуть руки то въ воду холодную, то въ теплую, такь какъ повара, стряпухи, прачки и проч., те, кои теплою водою умывають себе руки зимою, и проч.)

Причины цыпокъ.

Всеобщею причиною сей бользни почитается то, что простудивь ноги и руки, или намочивши оныя, тотчась станещь ихь грыпь. Какъ скоро младенцы озябломо IV.

Вб нуть,

нушь, то имь велять всегла садишься польвогия, когла напрошивъ того надлежало бы имъ имъть тълодвиженіе, дабы согравались они постепенно; поелику жарЪ огня производить внезапное разжижение мокроть и мап ряжение сосудово; а естьли станешь повторять часто то же самое дъйствіе, то сіе напряжение сдълается наконецъ чрезмърнымъ, и сосуды принужденными нажолящся разрыващься и ощворящься,

Способы какъ предупреждать и лечить цыпки.

Ocmepe-

внезапной

men somal

TOCATO OSmo6y.

Что надо-

жолодно будетъ рукамЪ и

Horamb:

Когда сти

жинають

MI и вод-

рывашь,

31236 Faxмейная .

ден сеем

mygiu, пластырь

Ma;

Лля предупрежденія цыпока, налобно беречь себя съ одинакимъ попечентемъ и отъ стужи сильной гатьер тв и отъ жару внезапнаго. (Какъ скоро станешь чувствовать весьма великой холодь вы ногажь или рукахь, то наллежишь ихь имьть вы движении, потирать, или вельть другому оныя потпирать лучше, нежели дербно дълать. могда очень жать подль огня, какв-то мы станемь говорить о семь ниже вь концъ члена II, (4, главы 55.)

Но какъ скоро застуженныя части начнутъ краз снъть и пухнуть, то надоби дать слабительное больчасти на. ному, и потирать часто еги части гортицего и водкого. или какимъ нибудь другимъ веществомъ свойства гоны и рас. рясительного. Надлежить покрывать ихь фланелью, и сухо. Иные на импки теплъ И мухнуть: держать вЪ обернувши въ пряницы; елабитель кладупть теплую золу, ное, горин- что самое не ръдко способствуеть къизлъчению оныхъ.

Когдажъ сдълаются на нихъ нарывы, то должно Когда симануть на- льчить ихв вощаного мазыю турнерового, или галмейного (unquentum e lapide calaminari), massio uso muniu unu шпінтурной сажи, пласты ремв былильнымв, или какою нибуль другою мазью сущительного. Сти небольштя ранки причиняють боль несносную, но ръдко бывають опасны: они вылъчиваются обыкновенно, какЪ скоро хо-СБАНАВНЫЙ. рошая погода опять наступить. (Бальзамо Женевіево

или внутренной и наружный, о котором вы станень ваньзамы товорить въ примъчании 2 слъдующей главы, весьма Женевісьь. полезень прошивь цыпока сь ранками; и когла оныя только еще въ воспалении находятся, то нътъ успоновизмичего лучше, какъ поширащь себъ руки или ноги шельный полуфунтом в успокоевательного бальсама Г. Шомеля, бальегы Б. Помеля, описаннаго въ примъчании 3. Тома II, на стран. 353.)

IO.

О особливомъ родъ удушья, называемаго по Аглински стоир, или паче о жабъ перепоночной (3).

Младенцы часто бывають одержимы, а притомъ ж весьма внезапно сей бользнію, которая, как в скоро жотя мало ее запустишь, становится смертоносною. Она извъсина подъ разными именами, въ разныхъ частяхъ Великобританти: въ Восточной сторонъ Шотланаїм называють ее стоир; а въ Западной сибіте ила улушье. Въ нъкоторых в округах в Англіи, гдъ я оную примътиль, простыя женщины дають ей еще другія имена; но кажется по всему, что оча не иное что есть как в роль улушья, сопровождаемаго признаками весьма опасными и усильными.

Сія бользнь водворяется обыкновенно во време Время на холодныя и влажныя: чаще встрвчается она въ мв-она прис тах в низких в, болотистых в и приморских в. Младен наючается цы тучные и имъющіе волокно слабое болье всего ей младенцы, подвержены. Примъчалъ я иногда, что она была и на-ком ей последственная. Приходить она вообще ночью после то-

B 6 2

⁽⁵⁾ Канъ недавно нарочно писано было резсуждение о сей бользии, а при томъ и мы имбемъ объ ней особливое наблюдение: що мы и сообщимъ оное посль тенсту г. Бумана; и помъстимъ подробности доставляеныя другими Авторами и нашимъ наблюдениемъ въ дополнении, которое найти можно ниже, смотри стран. 294 сего Тома. Почему **ж** просимъ читателя не оставить безъ вниманія сего дополненія.

го, какЪ днемЪ походищь на восточномЪ вътръ холодномЪ и влажномЪ.

ЧЛЕНЬ І.

Причины жабы перепоночной.

Сырость домовъ, одежды и ногъ, происходящая отъ башмаковъ очень малыхъ, словомъ, все могущее остановить испарину, въ состоянии произвести спо бользнь.

ЧЛЕНЪ II.

Признаки жабы перепоночной:

Признаки суть пульсо тастый, дышание скоров и трудное, сопровождаемое некоторым родом охрипения, которое слышно бываеть вы довольном разстояни; голось бываеть чисть и визгливь; на щежах выступаеть краска полосами; а иногда все лицо бываеть цвыту синяго.

ЧЛЕНЪ III.

Пользование жабы перепоночной:

Ваним для Какъ скоро примъчены будущь сти признаки въ могь, кровопусканіе и промывопусканіе и промывопусканіе и промыводы и постіавищь промывательное мястительное скомары оть ръс какъ возможно; должно давать сму нюхать паръ теплой воводы теплой съ уксусомо, посредством водыхательуксусомъ; ницы; или прикладывать припарки и примачивать окожатаплазло шей мястительными декоктами.

ж проле працария мыт *

Естьли же оные припадки не утолятся, то надлежить приложить къ той же самой части, или между объими плечами, нарывный пластырь и давать часто иладенцу по ложкъ слъдующаго взвару:

Возьми воды изб травы полія _ - - три унцій; Сиропу проскурнятнаго { каждаго по одной унцій.

Сивщай вивств.

По Лапына:

Recipe aquæ pulegii, - - - uncias tres;

Syrupi de althæa fernelii, ana unciam unam.

Syrupi balfamici. - - - }

Misce.

Многіе испышали хорошее дъйствіе дурнаго ду-Аурных ху (динті аба fatida) въ сей бользии; опъ дается въ духъ промывательно из и внутренно слъдующимъ образомъ:

Возьми дурнаго духу - - двъ драхмы; росолу уксо-нашаты рнаго мин де рерова одну унцію;

еоды изб полея - - три унціи.

По Лашынь:

Recipe gummi asæ sætidæ, - - drachmas duas; Salsilag nis ammoniacalis acetosæ s. spiritus mendereri, - - unciam unam; Aquæ pulegii, - - uncias tres.

Распусти дурной духо вы сихы двухы жидкостяхы, коего состава и надлежить давать по столовой ложкы чрезы каждый часы, или чаще, ежели желу доко младенческой перенести можеть; но ежели рабенокы не вы состоянии принимать сей смеси, то должно распустить двы драхмы дурнаго духу вы промывательномы обыкновенномы, которое и повторить чрезы каждые шесть или восемь часовы, пока не укротится усиле припадково.

ЧЛЕНЪ IV.

Средства какъ предупреждать отрыжку жабы перепо-

Для предупрежденія отрыжки сей бользни, мадобно берочь млаценцевь оть всяких в причинь способствующих в кы порожденію оной, какы-то не держать Б б 3 ногы могъ нокрыми и не выходить на вътеръ колодный и влажный восточный, (а во Франціи на вътеръ западный и съверо-западный.)

мищеуно. Дети подверженныя частым в отрыжкам в сей ботребление. лезни, или которых в телосложение кажется кв тому расположенным в, должны быть содержаны на строгой діэте. Имв не надобно никогда давать ястей влаких в, или трудных в для варенія желудка, никаких в плодов в сырых в, зеленых в или свойства дурнаго.

Надобно содержать вы какой нибудь части те
или фонтанель. или фонтанела. Примычалы я, что и пласты ры изы

кластырь смолы Бургонской иногда имысть удачныя дыствія,
ины смолы и предупреждаеть отрыжку сей бользни жестокой,
бургононы прикладывается между плечьми; но надлежить

его тамы на нысколько лыть оставить.

Дополнение къ члену croup, то есть о особливомъ родъ удущья или о жабъ перепоночной.

(При изданти мною первымъ тиснентемъ сего перевода на Французскомъ языкъ думалъ я, по описантю сей болъзни Г. Буханомъ, что стоир или сей родъ удушъя, есть
бользнь случающаяся токмо въ Шотландти и съверо-восточной части Англи, и я почиталъ ее эндемитескою
или симъ токмо странамъ свойственною. Я не помышлялъ никакъ, чтобы она истреблентя свои могла
распространить между нами или гдъ индъ. Но послъ
спозналъ я, сколько въ томъ ошибался: не токмо
примъчается она во Францти, но такожъ въ Италти,
Германти и Швецти (4); о чемъ я не могу сомнъваться

⁽⁴⁾ Что самое явствуеть изъ наблюдений описанных въ сочинениях многихъ Врачей, изданныхъ въ светь недавно, а особенно въ сочине наяхъ Гг. Ролена и Михаелиса; почему не льзя почти болъе сомивваться нынъ, дабы сего бользнию не были обдержимы младенцы во всей

вашься шеперь по шемь сведентямь, ком я снискаль о сей жестокой бользни, по случаю смерти одного молодаго младенца (5), котораго похитила она здъсъ въ прошломъ году въ двое полько суптокъ.

By4V*

всей почти Европъ. Но спросинъ ито нибудь, для чего не узнали, жанъ столь не задолго предъ симъ временемъ, что она толино вездъ евиринствуеть ? Разви была она новая? По всему думать надобно, что ньть, котя и самые точные авторы въ своихъ описаніяхъ с бользнахь объ ней начего не упоминающь. Въ самомъ дель, хошк эн мененый Бургась подробнымь образомь описываль различныя жавы, но сбъ ней не говорить ни слова; и его достойный Комментаторь, Дань. Сонтень, наблюдаеть равномерное молчание о сей бользии.

Непримътное ел нестве и быстрота самаго усиливания, безъ сомниня всяному подалуть поводь ив ошибит и представять се вывето жаны сопровождаемой антоновымь огнемь, съ конторою, по видимому, часто ее и смешивали. Кажется, что въ познани болезней, накодятся, подобно канъ и во многихъ научакъ, изкоторые виды переломооб или эпохв, глв внезапно новый свёть появляться начи-наеть; нажета, что Г. Гомв, знаменитый Врачь Шотландскій подаль энакъ и возбудиль внимание Врачей ир сей жаго перепомочной чрезъ превоежодное свое сочинение, изданное въ 1765 году, ноего заглавие на Француза еномъ язынъ есть савдующес: Recheches fur la nature, la cause & la guérison de la croup. Ибо съ того времени стали выходить въ свъть многія разсужденія разныхъ Врачей о сей бользии, не мало усугубившія познанія, нои отб него намі преподаны, и между прочимі разсужденія мужей приведенных в нами въ началъ сего примъчанія. Смошри le Traité de la Maladie des enfants, de M. Rosen, инису переведенную съ шведска» то язына на французской; и положение Г. Михаелиса; подъ заплаriemb: Destrutio inauguralis de angina polyposa seu membranacea. Argentorat. 1778.

(5) Младенець сей, имбашій оть роду шесть льть св половиною, быль единородный сынъ ученаго г. ле руа, Члена Королевск й Анадеміи Наукъ, • ноторомъ я упоминаль не однократно въ переводъ сего сочинения и ноему Фдолженъ я не тонмо симъ полезнымъ и нещастимымъ наблюдениемъ, но еще и самыми изследованими и разсуждечими, составляющими све дополнение ив члену о жань перепомочной (стоир). Никогда мла- Наблюдения денень, по видимому, не быль предопретблеть ив течень жизна долгозременивашей, судя по эдоровью, кочмо очь наслаждился. Будучи нрвнокъ и эдоровь, при самомъ прі пломъ вида имвль онъ нравъ любенный, разумъ довольно совершена ий, и наночец в подавалъ всяжую жорошую надежду, илив варуга въ Восиресенье Сентября 6 в т т в года пришал къ нему жрипото съ споль легиою болью въ горав,

Будучи даже побуждаем в думать, что она не очень редка въ здешней земле, решился я присовокупить къ члену Г. Бухана, о сей болезни, все, что

что оная не двязя ему никаной трудности пропуснать пищу. Между тъм быль у него кашель сукой и криповатой, покожій на тоть, о которомь мы станемь говорить ниже, и которой почитали вст за кашель простудной, потому что никто не могь полумать о мов перепоночной. И такь стали пользовать его какь обыкновенно двязють при легкой коли ев горяв: начали держать его вы тепль и дзвать ему пить довольно отвару телячьяго.

Веб обстоятельства назались въ стоя хорошемъ состояни въ тосявдующую субботу, что магденець сназаль самь матери своей очето кольно состоять прошал, и даже вещавши проводияв ень большую часть дня играючи съ служителями. Ио въ слъдующую ночь все видъ съй перембиило. Оноло одиннащатии часовъ вдругъ сдългась у него великая трудность дыханія съ жаромь. А сія трудность болье еще умножалась чрезъ всю ночь, съ великимъ безпонойствомъ отъ кашто. Однаномъ подъ утро сей кашель даль ему нъснольно поноя, но всноръ по томь оноло девяти часовъ впять пришоль къ нему въ 6 льшей силъ. Припадии онаго были столь усильны, что даже въ поть его броегло.

Тогда пустили ему кровь из ноги, и дазали питье реотное! а какь оть сего питья начало его разть, то онь извергнуль вместь оть сильнаго абистви кашлю и реоты матерію, которая имела видь гнойный; и около часа после опать извергнуль онь, оть того же самаго усилія, некотораго роду кожу перепоночную, белизны нечистой, видомь продолговатокруглую, и коей самая малая широта была почти разна поперечнику полуполтинника стараго. Кожа сія вышла, будучи сопровождаема такою же матерією, какь и вы первой реотв. Вы последованій увидить всякь, что сія кожа и матерія суть самые леные признави жабы перепоночной (стощя). Вы ту минуту, какь сноро младенець изрыгнуль сію кожу, которая, вероятно наколяюь при отверстій выше глоти, преплатствовала ему дышать, казалось, что онь вединое получиль облегченіе, такь что всё почитали его спастимся.

Носябобиднее время проводия он весьма спокойно, жотя ев жаром и волью голосною, которая его не понидала: но вы ночи все опять появилось вы жесточайшей степени, дышание учинилось болые и болые труднымы и сы ныкоторымы свистомы. Такимы образомы всю ночь провелы оны очень жудо. Поутру пустили ему кровь изы ноги вторично. Но сы самаго того времени силы его ослабыли, и не взи-

энаках и самом вользовани, дабы чрез то предупрединь или по крайней мёрё уменьшины, сколько возможно, опасныя оной следствия.

Г. Бухано и многіе другіе Врачи почитають стопр за бользнь судорожную, или за нькоторой родь удушья особливаю. Но естьли имьеть она признаки сего вы нькоторыхы случаяхы, то, кажется, довольно доказано нынь, что она не есть удушье, что паче Томо Іх. В в

Легко понять можно все, что должень быль почувствовать чеей отень, лишаясь столь жестокимь и столь скоропостижнымъ образомъ, дишяни, конторое долженствовало быть для него толино жобезнымъ. Поверженный въ самую величайшую печаль, не могъ онъ колгое время занимащься ни чтмъ промъ еего элополучія, презвычайной и болбзии, оное причинившей, Презъ самыя последованія свои и наблюденія узналь, что сія болезнь была стопр или жава перепоночнай, жакъ що всякъ увидинъ ясно изъ послъдующихъ нашихъ замъчаній ти будучи всегда исполнень желавія служить человичеству, онь воз--намбрился собрать и издать въ свъть все, что было написано и отпрыто о сей странной болбани, дабы савлать ее изэвстною вв государешь в нашемь, и чрезь що самое пошланнь других опцевь отв нещастія столь жестокато, каковое съ нимъ последовало. Сін - то ся--мые запасы по благосилонности своей сосбщиль онь мив, кои и способствовами мив къ составлению сего члена, служащаго дополнениемъ нъ тому, что Г. Буханом в предложено было.

Канъ бользнь сія единственно приилючлется младечнімь, то прихичнье было оставить се тамь, так очь ее помъстиль, и присозонупить вы семь мысть то, что мы намыречаемся прибавить къ ней.

Мы не опуснимъ такожъ случая сказань забсь, какъ бы въ дополнение иъ члену о жабъ и пользиять гортанизгъ, что не возможто довольно взять гредоспорожности въ разсужлени сей бользи у маденцевъ, поелику они подвержены ей гораздо больше, нежеля какъ обынновенно предполагантъ. Таков е раз уждение тъмъ важите, что макъ снеро сія бользив нользована бываетъ не надлежащимъ образемъ, или ногда частыя случнотся опрожина оной, то объ желбям лежати подлъ взычка остаются часто распухлыми, а иногда даже дълаются твердыми накъ желбаль. Опсида происходинъ то, что такъ повой человътъ во всю жизнь свою бываетъ подверженъ волбанять гоременьмымъ при самомъ малъйшемъ резгорячени, и что какъ скоро оных котя мало успатися, то въ сестолни печти удущить его.

должно почитать ее жабою особливато и весьма опаснаго рода, которая по нещастію чаще бываеть у младенцевь, нежели какь вообразить себь можно, но которая совсьмь не приходить кь нимь посль двенадцатильтняго возраста (6).

Свойства болбани стопр, мли жабы терепоночной.

ВЪ жабах воспалительных в обыкновенных воспаленте поражаеть части горам пищеп рівмнаго или дыхательнага. Но въ бользни, о которой мы теперь говоримъ, совсъмъ не пю случается: вст припадки производить мнимая перепонка, ихи перепонка бол Езнетворная, на подобіе трубы, и часто весьма тонкая, наполняющая или облежащая оный каналь. А сія мнимая перепочка столь мако кв нему прилипасть, что плавая въ опомъ нъкоторымъ образомъ лержишся, за него не редко одними шолько весьма шонкими съточками. Въ сей жабъ примъчають еще и матертю, имъющую иногда видъ енойный, и не токмо наполняющую пространство находящееся между мнимою перепонкого и дыхательнымо горломо, но еще и разпространяющуюся въ самых в броих захв, то есть раздълентяхъ и канальцахъ онаго въ легкихд. Наконець не меньше примъчантя досптойно и то, что не ръдко дыхательное горло находится подъ сею перепонкого, жевредимо и совершенно свободно ошь всякаго вос-Manenia.

⁽⁶⁾ Авторы, нои разсуждали о сей бользии, утверждають восбще рекунь то мы уже сказали, что она поражаеть однихь тольно младендевь, и редмостью, ноторые переступили двенадцатильный возрасть. Однаножь нужно весьма примышить, какь то изъ многихь маблюденій явствуеть, что находили еще сію перепонку у людей вэрослыхь, кон умирали оть жазы: Г Порталь упоминаеть о двухь тому примырахь вь записнь, чтанной имь вы публичном собраніи Академическомь на Паску 1779 году, одинь о женщинь привезенной въ Анатомической его Театрь, а другой о дывин девятилицати лытий, умершей оть жазаг, и ноторая извергала инспольно куск вы перепоная, и у ноей нашли разнымь образомь по всирытія слынение перепоночное вы дажательномь горлю, которое назалось разорганиямь во многихь мыстала.

паленія. Причина сей бользни довольно ноказываеть, для чего мы назвали ее жабого перепонотного: и подъ симъто именемъ въ послъдованіи объ ней мы говорить станемъ.

Многте Врачи думали, что стя бользыь находитем токмо вы мыстахы низкихы, близь береговы моря, или большихы прудовы; но теперь уже довольно доказано, что не щадить она младенцевы и вы мыстахы, весьма отдаленныхы оты прудовы и другихы собранти воды великихы. Равномырно дознано и то, что она не прилипива, хотя многте авторы противное сему и коворили.)

Признаки жабы перепоночной.

Жаба сія начинается по нещастію непримътным вобразом в. Следы ея весьма сокровенны, а по тому и очень часто не льзя примътить, что младенцы ею одержимы бывают в, кром в как в тогда, когда остается мало или никаких в уже средств в. Ибо когда сія бользнь нъсколько усилится, то всякія вспоможенія сдълаются безполезными, и больные почти всетда бывают в жертвами оныя.

мознаніе о нервых в признаках сей бользни, или о ел знаках в предшествующих в, по которым в было вы благовременно признать ее можно было вы первом в оныя наступленіи. Но какія бы усильныя старанія мы ни ирилагали о том , чтобы о сих в признаках удостов риться и оныя опредълить, но мы не могли дойти до сего: не могли мы открыть тризнаког довольно ясных в тли по встав отношеніям в довольно постоянных в дабы выдавать их в за таковые; что самое и побудило насв, вы дополненіе тому нікоторым в образом в, соединить здівсь вста обстоятельства, могущія подать повод в квонасенію сей зловредной бользни.

Ofemen-CHIBA MO-

КакЪ скоро младененъ станетъ жаловаться больго тущія по во соряв, которая прямо еще не оказалась, по надлежить по- жить піщательно примачать:

водъ къ опасе по

т. Не холодна ли и не сырая ли ногода, или не стоир, или была ли шакова не за долго до шого времени.

вереноноч. жой жабы.

- 2: Не чувствуеть ли онь боли об горля, и какого оная свойсшва.
- 3. Не имъльли младенець нъсколько предъ швив насморка сильно его безпоконвшаго, простулы съ кашлемб, кори или оспы.
- 4. Не былиль у него намочены ноги, или не носиль ли онь одежды мокрой.
- 5. Не кричаль ли онь очень много играючи, или въ иное время.

Когдажь всв еги обстоятельства, или большее число оных внаходятся вывств соединены, тогда надобно будеть усугубить внимание къ осмотрению младенца, и примъчать:

Вризнани первой степени жабы перепонеч-MOH ..

- г. Боль у него въ горяй не сопровождаема ли бы ваеть скрытною болью вь гормани или голоскь горладыхательнаго.
- 2. Ньшьли онуходи снаружи в. в томы мысты. которое оной соотвытствуеть.
- 3. Прижимая сте мъсто пальцомъ, не производищь, ли въ немъ боли, или не увеличиваещь ли оной.
- 4. Не смотря на свою боль об сорль, легко ли принимаеть пишу младенець или св нъкоторою шрудностію. хотя иногда такожь глотание бываеть и трудное.
- 5. Не переивнился ли младенець, не опухь ли .. или не бываеть ли у него жару больше противь обыкжовеннаго.

- 6. При удобномъ глошании не имбешъли однаскожъ онъ прудности дыхания.
- 7. Высыпается ли онъ хорошо, или не бываетъ
- 8. Не имбеть ли онъ голосу совсвив страннаго, хриповатаго и грубаго, которой иные сравнивають съпъніемь молодаго пьтуха, а другіе почитають за средній между онымь пъніемь и лалніемь собаки. Тъ, кои примьчали сей странный голось, утверждають, что когда однажды его услышишь, то уже болье вы мемь не ошибешься.
- 9. Не имветь ли младенець, а особливо ночью, кашлю необычайнаго: кашлю, который быеть гораздом скорве и производить, такь сказать, большее удушье, нежели кашель обыкновенный, и бываеть безь всякой мочти мокроты (7): можно подражать ему некоторымь образомь, ежели, держа языкь во рту близь горала, станешь горломь кашлять.
- то. Не взирая на сїй различные признаки, не примъщно ли хошя мало, или совсьмъ ничего не видно красныхъ пяшенъ или воспаленія въ горль и въ объихъ железахъ подлів язычка: или наконець не находящся ий сїй части въ ихъ состояній естественномъ.

Ежели примъчающея сїй различные признаки созединенные вмъсть съ обстоящельствами нами описанными, що по всему опасаться должно, что не одержимъли младенець перепонотного жабого въ ся первой ещенени.

Но болье еще о семь удостовъришься, когда:
пульсо сдълдется очень кръпокъ и станеть бить отъ.
В в 3

⁽⁽т.)) У емня: Г. Ле Руд быль сей нашелаг-

ета тридцати до ста сорока разъвъ минуту; ежели лицо горить; ежели больной имъсть великую жажду; наконець, ежели дыханге начинаеть быть трудное, и когда мога бываеть безь отсьду и въ маломъ количествъ.

Ежели не будеть употреблено надлежащих вспоможеній, то бользнь скоро переходить от сей первой степени ко второй, де рыдко уже найти можно на оную средства. Нужно такожь примытить, что часто не бываеть никакого почти примычательнаго, судя по признакамо, разстоянія между первою и второю степенями.

Тризнани второй отепени.

Пильев становится еще скорве, такъ что бьеть от полутораста до ста семидесяти разъ въ жаждую минушу. Но чаще всего он в бывает в не столько силенъ и гораздо слабъе. Въ то время перепонка по видимому зараждается. ВЪ мокротока рканги или кашлѣ извергають больные нъсколько той матеріи, о которой сказывали мы, что имветь видь гнойной, а иногда такожъ и кусочки самой перепонки, Дыханге бываеть чрезвычайно трудное и шажкое: оно сопровождается свистомь, который слышень даже издали. Тоска, невозможность оставаться на одномь меств, все возвъщаеть опасность больнаго. Однакожь такое бываеть иногда безпорядочное и бъдственное шестве сей бользни, что младенець умираеть не испышавъ сего последняго состоянія, и почти скоропостижно, въ то время, когда ни мальише сего и не ожидали.

признани, Примъчанте чрезвычайно важное, и на которомъ но ното существенно утверждаться можно, есть и то, что рымъ сей посреди всъхъ сихъ опасныхъ припадково, не примътовы разли. но бываетъ вообще никакого дурдаго запаху происхочествуетъ дящаго у больнаго изъ рта: запахъ у него остается

также пріятный и чистый, как вобыкновенно в в сем воть жабы возрасть его имьють; чьмы самымы сія бользны и отли злой или чается совершению отв жабы злой или свантоновым съ антоновым осле и в осле и в от осле и

Пользозание перспоночной жабы:

(Надлежить начать ставлентемь младенцу пользование могь вы теплую воду: ибо лекарство сте тымы паче первой степолезно, что многте бользны захватывають часто от для ногь. того, что ноги имыли мокрыя:

По том в надобно нустить насколько крови со кровопу; размарно возрасту и силам вольнаго. Посла чего дол-сканія; жно припустить ему пілвица ко так поро, пока сами собою не отнадуть, дабы чрезв то убавить особенно крови в сосудах сих частей: При чем нужно еще держать маленькія оных ранки открытыми, промывая их тряночками обмоченными в теплую возду; а посредством сего кровь станств течь из в них в насколько часов посла; естьли же пілвица достать не льзя, то должио прибыснуть к рожетной крови.

Безполезно почти и говорить о промыватель промываимий, которыя всегда нужны бывають въ бользияхо шельных
воспалительныхо. Но какь во всёхъ припадкахь простудныхо бываеть почти всегда нечистота наподобте
хряща въ первыхо проходахо, що и надобно стараться очистить иладенца, употребляя тистительныя, чиститель
къ коимъ бы не имъль онъ слишкомъ отвращентя, да-нос.
бы чрезъ то не сталь онъ ихъ отвергать или кричать; по чему и должно особливо крикъ въ немъ предупреждать. Въ такомъ случав можно употреблять
былую магнезию съ сахаромо; кашку слабительную (ele-

"Enarium lenitivum), касстю, манну въ мотокѣ, или какое нибудь другое систительное легкое

Самый лучшій способь употребленія таковых вистемительных весть разводить их вы какой нибудь жидкости, и давать но немногу и часто, пока не очистять. Такимы образомы должно давать по кофейной выли исполненым сахаромы. Черезы часы послы повторить сей пріємы, и такы далье черезы часы, нока не прослабить младенца раза три или четыре.

Корка насе. Или також вельть вскипьтить унцію корки сін, шли слабитель кассіи, или половину унціи слабительной кашки, в водна нашна ном в фунть воды, и давать по половинь чайной чашки иладенцу през каждые полчаса.

манна: Или наконецъ растопить двъ унціи манны въ толикомъ же количествъ молока, то есть въ одномъ фунть, и давать сте лъкарство младенцу черезъ каждые полчаса, такъ какъ выше сказано.

Какъ нужно весьма, чтобы произвести от дълевозбуждать ніе моги, то и надобно класть по двадцати пли подвадмочу: пи- цати четыре грана селитры на одинъ фунтъ его пишіл.
тіе селитраное.

А пить можеть онь воду съ сахаромо, или настой изъ
щенту липоваго или изъ ромашки, или лучте легкой
чксомедо.

Нарывное. Послё таковых в опораживаній, а не прежде, надлежить приложить нарысный пластыра кв запылку шен, который бы занималь всю оныя часть заднюю и боковую, и послё того держать маза острую, дабы произвести истечене обильное и непрерывное изберь, ств сей стороны. Надобно, також в давать обонять больноводы св му, посредством в сдыхальницы, парв мя тительный увеусом не виплости противу явиствующій; и как в по часто принечаемо было, парв от воды св улічеств простовно противу воды св улічеств простовность противующий в противом противующий воды св улічеств противом противующий воды св улічеством противующий воды св улічеством противующий воды св улічеством противующий воды св улічеством противом противующий воды св улічеством противующий воды св улічеством противующий в противом противующий воды св улічеством противующий воды св улічеством противующим противующим

изводить весьма хорошія дійствія (8). Наконець должно употреблять всякіе возможные способы, чтобы осадка мокроты дыхательнаго горла не учножалась, а напротивь бы того уменьшалась, дабы чрезь сте отвератить составленте оной перепонки смертоносной.

О реотных в не говорили мы для того, что в в сем в первом в пергод в полезность оных в бывает в очень недостов врна, поколику они, ежели и могут в с в одной стороны очистить желу док в и горло от в слизени в в них в находящейся, то с в другой стороны приводят в кровь в в голову и во вс в части верыхніл; каковыя владствія в в сей жаб в бывают в очень опасны.

Когдажъ всъ сін средства не принесуть никакого облегченія больному, или когда Врачь призвань будеть очень поздо, то бользнь переходить къ ен второй степени; что самое признать можно какъ по признакамъ, нами предложеннымъ, такъ и по свойству матеріи выхаркиваемой.

Надлежить давать по ложке уксомеду морскаго пользование луку (охуте! Sciliticum) вы половинь чайной чашки питья второй сего маленькаго больнаго; держать его нады паромы степенны уксусныма, которой вдыхать вы него посредствомы Тома IV.

⁽⁸⁾ Невъроятно даже, нанъ пренебрегали долекъ средства пропускань В задичме пары нужные въ дымательное горло и въ легкіп. Ибо наное круго- въ грудь обращеніе долженствуеть учинить принятое лькарство, претде не посредст- жели достигнеть оть желудка нь груди, между тъмъ нанъ чрезъ вомъ ваы- дышаніе можно впуснать въ бользинкь, случающинся въ сякъ частикь, кальшицы, абкарство мъстое, онымъ бользины свойственное, ногнорое произвозить прямо то дъйствіе, начое произвести стараются? Въ следстве чего можно найти во Всеовщей Тавлиць, въ Томъ V сего сочиненія, описаніе едыкальницы, ноторую я совьтую всякому вмъть у себя, яко изящное орудіе, стально же простое нанъ и неоціненное въ жабамь, кростудажь, состаленіять въ груди и проч. При чемъ мы сообщимь и способь нань употреблять оную, то есть впуснать разные пары въ грудь, в особливо пары оть воды и уксуст, о ноикъ мы упомя-

анна или numie pss-MHOC.

Ипенану. Едыхаланицы; дашь ему восемь гранЪ ипекакуанны въ чашкъ обыкновеннаго его пишія, или напишка реотнаго предписаннаго въ членъ II, § 2, глав. 20, Тома II. А таковое реотное, даваемое въ сте время бользни, можеть. какЪ то многократно случалось, извергнуть и самую перепонку. Однакож в успъх всъх в таковых способовъ бываеть, такъ какъ мы учинили о семъ примъчаніе, весьма сомнишелень.

> Но мы поспъшаем в предложить здъсь пользование (ч), о которомъ увъряють насъ, что оно было унопребляемо удачно въ Ливерпуль, въ Англіи, однимъ искусным Врачем в сего города. Послъ отищении нужныхЪ, учиненныхЪ посредствомЪ кровопусканий, слабительных в и нарывных в, смотря по усили признаковб. надлежить напирать шею половиною драхмы мази меркургальной, и давашь принимать внутрь катышекв (bolus), составленный изв одного грана сладкой ртити, св небольшинь количествомь мякиша хлыснаго и сахату. А еїс пользованіе употребляемое такъ, чтобы оно выдержало действие меркурия, безъ прсизведения однакожь слинотечения, благоприятствуеть отаблению оной смертоносной перепонки: она извергаема бываеть потомь или кусками, или въ видъ пальна у рукавицы. Не безполезно присовокупить, что всф тв, которых врачь, нами теперь упомянутый, имвль шастіе избавить от сей жестокой бользни, полізованы были меркургемб.

Мернуриальная мазь. Сиадная ршушь,

HE-

^() Пользование сте есть Г. Добсона, Вряча больницы Ливерпульской. Оне прислано было въ Г. Де руа, Г. Гулстонемь, отличнымъ Врачемъ сего города, и сомсварищемъ Г. Довсоно въ сей больнецт, коморый увъряль его, что онь самь вильяь оть того весьма хорошее явистые. Но накъ всобще меркурій вли ртуть устремляется къ частьюю вержнимъ, а при томъ раздъянть обращан шуюся въ нижь пасоку, и къ извержению очыл способсиву пъ, но успъкъ лекаретва сего, кажется, и въ самомъ дълъ основаннымъ на сходствъ могущемъ придать оному великое въронтіе.

Нъкоторые предлагали бускотомию или нал- надръзмразывание дыхательной трубы для избавления от в сей па- ванедыка. губной перепонки. Но, кромъ трудности таковой оне трубы. раціи, поколику не всё лёкари в в состояніи оную учинишь, успъхъ ошъ нее весьма еще сомнишеленъ, по причинъ неудобетва вынуть всю перепонку, а притомъ и по невозможности освободить броихи или канальцы дыхательной трубы отв сего вещества гнойнаго, коимъ они столь часто наполняемы бывають, и котораго одного довольно кЪ нанесению смерши болящему.)

TI.

О трудномь проръзывании зубовь у младенцевь.

Докторь Ярбитнотв примъчаеть, что болье де- десятая сятой части младенцевь умираеть во время раствитя часть мязили прорезыванія зубова, поколику припадки оное со-умираеть провождающе, происходя отв раздраженія кастей во время нъжных в и жилавых в десенв, причиняють воспаления, прорывывагорятки, кудороги, антоново огонь и проч.

Принадки сти происходять по большей части причины от великой нажности и чрезмарной чувствительно- таковаго спи, весьма часто увеличиваемой чрезъ воспишание нещасти. ивжное. Какъ то всякъ и соглашается въ томъ, что авши, воспишываемыя слишком в нъжно, спрадають всегда болье отв прорезыванія зубово, и часто умираюшь ошь сильных судорогд.

Зубы начинають показываться у младенцевь обы- въ накомъ кновенно около шестаго или седьмаго мъсяца; сперва возраств передніе, по шом в глазные или песіи, щак в названные по шоказываю тому, что походять на зубы собачьи; а наконець перядокь, корениме. Но вев сти зубы выпадають на сельмомь голу, ноторымъ или около щого времени, и на мѣсто оных выхо- они проръдять друге; а на двадилильтнемь возрасть высту-

пають и два последніе зуба, называемые зубами муa poemu (dentes sapientiæ).

Бремя провін винейя 3 V 608 b опредвлен-

(Изъ сказаннаго шенерь явствуеть, что не возможно опредълить въ точности времени прорезывания ве вма не- зубово и выхождения каждаго виду оныхъ; ибо въ сымомь деле мы видимь довольно часто младенцевь раждающихся съ зубами: а у другихъ не бываетъ ихъ еще на десятомъ, двенадцатомъ и пятнадцатомъ мвсяць. Я знаю одну дввочку, правда очень нъжную, которой уже минуло шестнадцать мъсяцевъ, но не примышно у нее ни малышаго знака зубоев.

Hevac6-HOCABACHIизвёстно-OFR M.

Сія безвизвъсщность есть подлинно нещастіе; етья быва потому что, какъ скоро младенецъ четырехъ, ияпи или шести ивсяцевь, почувствуеть какой нибуль привівми та- палокь, оной приписывающь прорізыванію зубово, и ковой безъ- такъ его оставляють. Однакожь весьма часто подобные припадки причиною имъють какую нибудь бользнь, которой дають усиливанься такь, что иладенцы немедленно сшановящся жершвами оной.

Скольно важно, чтобы разематривашь со припадки больныхъ мизден-Menb,

Посликужъ не возможно определить положительно весмени проразывания зубово, какого бы виду они ни были, то слъдовательно и надобно не скоропостижно полагать свое суждение, а разсматривать съ приэниманіемъ мъчаніемъ и осторожностію недуги младенческіе, дабы узнать въ точности, должно ли оные приписывашь прорезыванию зубова, или неть. Но въ шакомъ случав можно будеть наденться, что не отпосться. когда станешь судить основательно по признакама бользней описанных въ сей главь, такъ какъ и въ объхъ предвидущихъ, въ коихъ предложено о бользняхь общихь младенцамь и людямь взрослымь, и по признакаль предвишношим в сопровождающим в самое проръзывание зубовб.)

ЧЛЕНЪ І.

Признаки труднаго проръзыванія зубовь.

(Первый знакъ, по мнвнію Ванд-Свитена, есть моть, что верьхній край селюсти начинаеть разширяться, между твыб какъ оба слоя, составляющіе сію кость, отдвляются несколько одинь отв другаго, дабы дать проходь зубу. Тогда младенець кладеть часто вів роть персты и все, что ни держить вів рукві, или крепко сжимаеть соски у кормилицы. Десна начинаеть больть, пухнуть, или приходить вів воспаленіе; что самое можно видьть и даже чувствовать: поелику у младенца бываеть жарь во рту, и онів плачеть, какъ скоро хочеть брать грудь: обь желізы подлів ляытка, щеки, глаза кажутся красными и начухлыми.)

Младенцы испускають такожь много слины вы то время, когда зубы хотять прорызываться, и обыкноснию мыто кь нимь приходить. Какь скоро прорызыватие зубово бываеть трудное, и особливо, когда зубы елазные начинають показываться, то младенцы вздрогивають во время сна; десны у нихь пухнуть; мучатся они тоского, безсонищего, рызомо во животь; помето ихь бываеть зеленый; приходить кь нимь молошница, лихорадка; дышать они трудно и имьють судороги.

(Всяк в чувствуеть, что признаки проръзыванія зубово столь тяжки бывають единственно тогда, когда многіе зубы хотять выходить вдругь, как в то сіе довольно часто случается; что ежели напротивъ того показывается один в только зубо, то примъчаются единственно ть, ком сперва нами были описаны. Впрочем в не надобно никогда терять из виду того, что подобные припадки, весьма часто и смерто-

Tr 3

носные, очень редко бывають у младенцевь, комув кормять ихь матери, и воспитывають по правиламь, предложенным в в глав в первой, Тома І.)

ЧАЕНЪ П.

Пользование труднаго прообамення зубовь.

Трудное проразывание зубова требуеть почти того же самаго пользованія, какого и бользив воспалительная. Ежели у младенца булеть запорь, то надобно облегчить ему желудокъ или промывательными мягительными, или легкими тистительными, какъто манного, былого маснечего, ревенемо, александрийскимб листомб и проч. Яства должны быть легкія и въ маломъ количеснивъ, а пиште въ довольномъ изобилій, но легкое и мокротожидительное, какъ - що настой изв мяты или изв цевту липоваго, въ которой можно прибавлянь тренью или ченвертую долю молока.

Случай. Когда жарб будеть сильный, то должно пукогда наетить крось; но малымь дытамь надобно всегда очень добно пумало отворять крови; поелику сей родь выпоражниировь, или епигл переносять они хуже вслкаго другаго. Систилучше тельныя же, реотныя и пото приличесникують имъ нать пія- болье, и вообще для них в бывают в полезнье. Однаприпускожь Гаррисг примечаеть, что какь скоро находится вицъ. какой нибуль признакъ воспаления, то тщетно станешь трудиться Врачь, ежели не начнешь пользованія припущеніемь пілвиці пониже каждаго ука.

Когда младенецъ полверженъ бываеть судорогамо. Нарывиыя. то надобно приложить ему нарывной пласты ра между плечами, или позади каждаго ука.

> Сименеамо объявляеть, что въ горягкахо, приключающихся от в прорызывания зубова, не находиль d'HO.

Промывательныя: легија чисипитель-Hbis.

Ясшва и

пишіе.

онъ никогда дъйствительнъйшаго лекарства, какъ двъ, три или четыре канли спирту олекьяго рогу Спиртъ давасмыя чрезъ каждые четыре часа въ одной ложкъ оленьяго простой воды, или въ какой нибуль другой жилкости рогу. пристойной. Таковой пртемъ можно повторить до четырехъ, пяти или и тести разъ.

Я и самъ употребляль часто сте лекаретео съ хорошимъ успехомъ; но завсегда находиль я, что пртемъ онаго потребно было давать гораздо сильнее, нежели предписываемый Сиденгамомъ. Можно упе-пртемъ, треблять его отъ пяти капель до пятнадцати, и даже до двадцати, смотря по возрасту и кръпости младенца; и какъ скоро у него нътъ запора, то можно прибавлять къ каждому пртему по три или по че-манданъ тыре капли лавдана Сиденгамова.

— Сиденгамовъ

(Спирта оленалео рогу равныть образомь унотребляль вивсто лекарства съ пользою и Г. Бургава. Многіе делають нады нимь опыты и вы нашемь государстве; но, отзывается Г. Лістода, не приметиль я, чтобы онь имель такой же успехь вы климатахы нашихь.)

въ Шошландіи вошло въ великое употребленіе, пластырь чтобы прикладывать во время проръзыванія зубово положи бургонпластырь изъ смолы бургонской между плечьми у сной.

Младенца: сей пластырь утоляєть особенно катель, сопровождающій сію эпоху натуры, и есть такое лікарство, которымь пренебрегать не должно. Какъ скоро зубы выходять съ трудностію, то младенцу надобно имьть сей пластырь во все время прорізываміл оныхь. Делають его болье или менье широкой, смотря по тому, какъ требують обстоятельства; и перемьняють его по крайней мірь однажды сутокь въ пятнадцать; какъ то мы предписали въ члень І и примьчаніи 6, у. 2, главы 20, Тома ІІ.

Многје похваляють не мало средствь для тере-Нія весно у младенцевь, какь- то масла, врагебные ечетые соки (mucalagines) и проч.; но налъяпься на них в должно не много. Одно шакого роду лекарство, которое мы совытовань можемы, есть весьжель при- ма хорошій ледв, коимь должно поширашь десны, жладываевзявь его на палець, три или четыре раза въ лень. мый въ (лаже и одного конца пальца, без в прибавления всяка-MECH'E. го другаго декарства, довольно, когда припадки булушь очень легкие.) Вы семь возрасшь младениы имьють обыкновенно великую склонность жевать все, что у нихъ въ рукахъ ни находится: а по тому и на-Кориз жат. добно давать имъ что нибудь, дабы могли они всебная, ку- гда сжимать деснами, какв-то корку кльба, восковиза сокъ солод- севтку, кусокъ соло дкисаго кория, и проч.; такъ какъ HOB2TO говорено было въ § 4, главы г, Тома I. RODHA

ч проч. Чтожь касается до провопусканий изы десно, то кровопу.

снанія изы рыдко находили мы оты нихы великую пользу; одналесны, или кожь можно испытывать и ихы вы случаяхы труднасьчки из ныхы: дылають оныя погтыми, серебреныны пятикопые-шникомы, или какимы нибудь другимы орудіемы острымы, которое бы можно было безы всякой опасности класть вы роты младенцу, какы то мы предписывали уже вы члены IV и примычаній 6, 5 2, главы 20, Тома II.

тто надобно двдобно двдопакда опасаешься антонова огня. (Когда воспаление будеть столь сильное, что цвыпь фиолетовой или черноватой десны подаеть поводь опасаться антонова огня, то надлежить оную тереть розовымо медомо, къ которому прибавить пысколько капель спирту морской соли, или бальсамо по желиейся.

Белеущо... житель... ныя. Можно пособсивоващь шакож уменьшению усилія самой боли, давая младенцу по немногу сиройу макорожетного, как Б- то по осьми или десяти канель каждый каждый чась, и коего увеличивается пріемь до твхв порь, пока не увидишь отв него желаемаго двиствія. Однакожь при всемь томь надлежить давать и лікарства мокротожидительных и прохладительных выше сего предписанныя.)

ЧЛЕНЪШ.

Средства какъ облегчать проръзывание зубовъ.

Средства къ учиненію прорізменія зубово не хорошее столько труднымь, суть, давать младепцамь летва лег-кія и здоровыя; укрыплять ихь первы, доставляя имь пристойное тілодвиженіе на вольномь воздухі; сажая тілодвижхь вь холодиую ванну, и проч. Ежели бы отцы и мо-женіе. холодная тери употребляли надлежащее вниманіе ко всёмь паковымь предметамь, то бы всякь увидьль, что програмьний зубово было бы несказанно менье опасно для дітей, какь то мы сділали о семь наблюденіе вы примінаніи первомь сей главы.

§ 12.

О Аглинской бользни:

Яслинская бользиь (rachitis) примодить обы канахь кновенно кы младенцамы оты девяти мьсяцовы до льты младенцамы оты девяти мьсяцовы до льты младенцамы обользиь почти около того времени, вы которое ма-бывають инфактуры и всякія рукодьлія процвытать начали; сей бльзы но до того времени она была тамы совсьмы не извыши. и продолжается всегда болье усиливаться вы городахы, гдь жители будучи заняты работами сидячими, совершенно не радяты какы о собственномы мьлоденжени, такы и о доставленіи онаго своимы дынямы.

члепъ І.

Причины Аглинской бользни.

Одна из в причин в Яглинской бользии есть худое куме элездоровье опщов в и матерей. Машери, будучи тевлосложения ровь и мадов имакола и. слабаго и нездороваго, не имъл довольнаго движения, и употребляя яства водяныя и очень мало питательныя, не могуть надъяться, чтобы раждали дътей кръпкихь и здоровыхь, и были въ состоянии кормить ихь по произведени на свъть. Какъ то и видимъ мы, что дъпи подобныхъ матерей умирають вообще оть Лелинской бользни, золотухи, тахотки и проч. Равнымъ образомъ сей бользни весьма подвержены бывають и ит дъти, коихъ отцы лъть довольно пожилыхъ и страдають подагрого, каменного бользниго и другими недугами долговременными, или которые много-кратно заражались венеритескими бользнями въ своей молодости.

Венеричеекая боавзиь.

(Венеритеская бользив по видимому есть олна изъ самыхъ общихъ причинъ бользни Яглинской; ибо, говорить Г. Лорри, de Morbis Cutaneis, "хотя "бы, можеть быть, значило говорить слишкомь прост-, ранно, ежели бы стю бользиь выводить всегда от в , остроты вене ритеской; однакожь ныть ни одного учеловъка кот я мало искусившагося въ семъ дъ-"ль, который бы не согласился въ томъ, что стра-" давшие Венеритескою бользино имьють по большей ча-"сти дъней Яглинской бользни подверженныхв: а сти " 4 в ти столько упитаны бывають мокротого кислого . и обильною, что костоватый соко не можеть нижакЪ достигнуть у нихъ до густоты твердой м жакь бы известной; а напрошивь того пріобретаеть "онъ связь мягковатую и селенитную. Оттуда пром исходить, что кости прибавившись въ величину, , лишаются крепости, высовываются везде и составляють подпоры весьма слабыя, немогущія пол-, держивать шяжести швла: что самое и бываеть , причиною безобразнаго вида, которой они "нимаютъ.,

Другая бользык, которая по видимому еще бываеть весьма общею причиною Яглинской бользыи, есть та, которая столь часто приключается женщинамь силячимы и живущимы вы изобили, а особливо вы большихы городахы, а именне были. "Льти, говориты выми. "Ванб - Сеитенб, зачатыя матерію подверженною были, лямб упорнымы и вакимы, страдають Яглинскою лобользый весьма злою, и которую очень рыдко еще лосель выльчивали.»)

Всякая, бользнь равслабляющая півлосложеніе у другіл бомладенцевь, какъ-то оспа, корз, трудное прорызы- прон. каніе зубово, кашель со удушьемо, и прон. располагаеть нкъ къ Яглипской бользни. Она можеть еще кудое пиприключиться отъ непорядочной дізты, отъ ястой щеупотсчень мало питательных в, слишком водяных в, ил которыя столь клейки, что желудоко сварить ихъ не можеть.

Но худое кормление грудью почитается одною худое кормзъ главнъй шихъ причинъ сея бользии. Когда кормимление лица больна, или когда не имъетъ она довольно молока, чтобы напитать рабенка, то онъ не можетъ быть здоровъ.

Однакожъ должно еще присовокупить, что младенцы страдають гораздо чаще от недостатка въ попечени кормилицъ, нежели какъ от недостатка пищи. Ибо оставлять младенца лежать слишкомъ дол-недостат гое время на постели, или сидъть очень много; не токъто содержать его совершенно чистымъ въ его пеленкахъ нія. и платьв, значитъ подвергать онаго послъдствіямъ нечисто самымъ бъдственнъйшимъ.

Недостатокъ въ чистомъ создухѣ бываетъ та-дурной кожъ очень вреденъ младенцакъ въ разсужденти сего воздухъ. предмета. Когда кормилица живетъ слишкомъ за-

A A 2

KARO-

ключившись въ весьма маломъ домикъ, въ которомъ воздухо сыръ, а притомъ и застоялся; и когда столько
нерадива она, что рабенка своего не выпосить на
отперытой создухо, то ръдко избъжить онь оть Лелинской бользии: ибо всетда должно носить и держать
въ движении рабенка здороваго, какъ скоро онъ не
спить. Естьми же принуждать его лежать или сидъть, вмъсто того, чтобы онъ гулялъ, находился
въ движени, и проч, то онъ никогда здоровъ не будеть; какъ- то сте доказано было въ главъ и, Тома
въ сообливо въ у з и 6 тойже самой главы.

YNEHB II.

"Признаки Аглинской бользни.

При началь сей бользни тьло у младенца ставовится мятко и слабо; силы его уменьшаются; онъ птеряеть обыкновенную свою веселость; кажется укрюмье, нежели какь дозволяеть его возрасть; вскорь начинаеть имьть отвращение от возрасть; вскорь полова и брюхо получають величину несоразмърную прочимь частямь тьла; лице бываеть полное, и прочимь онаго кажется краснымь.

жости начинають по томы больть, в особливо вы ихы частяхы ньжныйшихы и самыхы ноздреватыхы: оты чего мыста, гды рука сы кистью соединяется, и лодыжки у ногы становятся толще, нежели какы вы ихы состоянии естественномы; хребеты изгибается и различнымы образомы корчится. Груды бываеты какы бы вдавшеюся кы ребрамы; (грудинист косты подымается вверыхы, и самое строеніе оной представиленся иногда выше сы одного боку нежели сы дружаго, или советы опускается на одну сторону. Реста разширяются; на нихы дылаются наросты, я особливо при соединеніи хрящей, смыкающихы ть груд-

ныя кости. Клюгики или костотки на плетв спереди искривляющея довольно не мало. Другія же кости двлающей плоскими и вкругь изгибающей, какь - що лядвія, берцо, а когда бользнь будеть очень шяжкая, що и объ кости передней части руки.

Кости подсеревка представляющся на полобіе впадины выходять съ мъста и пространство онаго сокращають. Другія же не получають естественнаго своего прираціентя, и, какъ то иногда случается, дълающей мягче: и теряющь твердость костоватую, долженствовали: оптуда происхоконорую имѣшь дишь оное укорочение ощущительное, которое у нъкоторых в младенцев в примвчаемо было. Не ръдко такожъ кости тончають или бывають не иное что, какъ нъкоторой родъ хряща очень слабаго и весьма хрупкаго: откуда происходить, что младенцы, въ коихъ не подозръвають ида Яглинской бользии, переламывають себь ногу или лядвею при самомъ мальйшемъ наденти, что однакожъ ръдко случается съ дътьми эдоровыми: или кости бывающь гибки въ одномъ мы сть, а хрупки въ другомъ и проча

Мышки ослабъвають мало помаху до того, что маленькой больной не вы состояни больше бываеть вставать сы постели, ниже пошевелиться. Непрестанно сныдаеть его небольшая лихорадки сухотимах, а особливо по ночамь, и которая довершаеть пожирать всю малость жира, остающагося на кожы. Ныкоторые же сей бользый страждуще младенцы имы которые же сей бользый страждуще младенцы имы которую выхаркивають: у другихы же кашель бываеть токмо сухой.

При всёхъ таковыхъ припадкахо приходить и трудность дыханія умножающаяся до того, что болящихъ почни удушинь можеть, ежели ихъ не посадишь порядочно на постели. Иногда пухнуть они внезапно, подобно естьли бы воздухъ взошель между кожею и шъмъ. Пото выходишъ по капли, или изъ глазЪ шекушъ слезы и лицо опадаешъ. Наконенъ приключаются судороги и паралить, оканчивающія сте жалосшное состояние.)

Однакожъ всв таковые признаки переменяются нарочино, смотря по усилію бользни: пульсо бываеть обыкновенно скорый, но слабый; охота къ вдв и сареніе желудка большую часть времени продолжаются жудыя: зубы выходять медленно и съ трудностію; часто даже начинають гнать и посль падають.

Достойно примъчания то, что младениы, полверженные Яглинской бользни, имьють обыкновенно великую проницательность ума, и вообще разумные бывають, нежели какь ижь сверстники. Но происходить ди сте от того, что подобные младенцы живушь больше сь людьми взрослыми, нежели прочие, или от увеличения противь натуры их в мозгу им изъяснять того не беремся.

Внани, по

(Многими примъчено еще, что зубы выходять номорымъ ранве у шехъ младенцевъ, которые должны бышь подончесаться вержены Яглинской болёзни. И такъ, когда у младенсей больз. ца от в мести до десяти мысяцевь, здороваго, веселаго, показывающаго уже, что онъ ходить хочеть, кожа во время выступлентя зубово опустится, когда желу док в распучить и грудь вынятится, то должно опасаться Яглинской болвзии. Слъдовательно и надобно наблюдать тщательно за дётьми около сего времени, а наипаче от девятаго мьсяца до двукъ

> Сельмой или пятнадцатой годъ страшенъ бываеть для полверженных в Яглинской бользии: ибо въ СІИ

сти два пертода они свобождаются от в нее, или стя бользнь бывает в для ниж в совершенно пагубною.

Всякое кросотечей опасно въ сей бользии, даже признани и кросотечей изб посу, впрочемъ толико нестрашное опасные. у младенцевъ. Худымъ еще знакомъ почитастся и то, когда пухлость переходить отъ одной стороны на другую; когда изъ глазу течетъ слеза со стороны оной пухлости, и когда лихорадка, котя и малая, къ тому присоединяется; когда лице опадаетъ и морщится; когда испражнентя низомб умножаются, и судорожные признаки оказываются.

Подверженные Яглинской бользии приближаются еще къ предълу плачевнаго ихъ бытія, какъ скоро дълаются у нихъ знатныя перемьны. Ежели, на примьрь, брюхо у нихъ стянется, бывши прежде свободнымъ; естьли мога не станетъ больте течь свободно. Когда лице сжимается ощутительнымъ образомъ, сказываетъ Г. Розенб, то не больте имъ остается жить какъ недъли двъ. Етьли же въ лице вступитъ темной цвътъ, а ноги отнимутся, то потибаютъ они въ трое или четверо сутокъ: равнымъ образомъ сте случается и тогда, когда духъ изъ рта будетъ весьма вонючтй.

ЧЛЕНЬ III.

Діэта, какую надобно предписывать младенцамъ страждущимъ Аглинскою бользнію.

Какъ бользнь сія завсегда бываеть сопровож- цьль, нодаема явными знаками славосни и ослабьнія членовь, торую сето мы и должны главною цьлію имьть въ пользованіи ея, дабь укрыплять частить вердыя, и помогать варенію должно въ желу дка и пріуготовленію жидкостей. Но столь важ- пользоганіи ныхь показаній выполнить иначе мы не можемь, кромь какь летвали здоровыми и нишательными, со-

образ-

образными возрасту и силамъ младенца; чрезъ наслажденіе воздухомо вольнымъ и сухимъ; гистотого нам опрящностію, и тъло деиженіемо довольнымъ. Ежели младенецъ находится на рукахъ у дурной кормилицы, которая не радитъ о своихъ должностяхъ, или оныхъ совсъмъ не въдаетъ, то надлежитъ оную перемънить.

вы жаркую пору надобно стараться прохлаждать его, потому что мото можеть привести вы разслабление; а вы колодное время должно держать его тепло, поелику великой колоды столько же для него вредены, какы и самый жары неумвренный. Однакожы льто есть для нихы время самое лучшее, а особливо ежели оно сухое. Надлежить такожь по часту тереть члены у младенца теплою рукою (или лоскуточкомы фланели, окуривши его вимьямомо (ы гыс троч. Надобно при томы развышивать платье, простыньки и одъяла больнаго младенца на сиже самые пары,) и держать его какы можно веселье.

戶cmma.

Яства должны быть сухія и питашельныя, как в то хорошій хльбь, жареное мясо, и проч. Морской сухарх в в сем в случав почитается вообще лучше самаго хльба голуби, цыплята, телятина, кролик в пли баранина, жареныя и мвлко изкрошеныя суть такія мяса, кои лучше всего приличествують. Естьли же младенец в будет в очень маль и не может в еще всть мяса, то надлежить давать ему сорогинское пшено, просо, или перловую крупу, вареныя св изюмомо, кв коим можно привавить немного былаго вина и пряных кореньсев.

Mumie.

Пить должно давать вино Бордо, мешал пополамъ съ водою; но те, кои не въ состояни достать сего вина, могутъ вместо онаго давать хорошее вино Бургонское, или какое нибудь другое, только бы было оно чистое и старое: а те наконецъ, кои не вы силахы будуты имёть никакого вина, должны девать ему временемы по рюмке полпива или хорошато пива легкаго, или сидору, то есть лблошнаго напитку, или грушовки, и проч.

члень іу.

Авкарства, кои надобно предписывать младенцамъ, страждущимъ Аглинскою бользнію.

Мекарства завсь мало пользы приносять. Піз. Ленарства том можеть часто выльчить стю бользнь, но редко полезим. лекарства. Для дородных в младенцев в можно употребить несколько пртемов ревеню, и оные повторить, но редко сте лекарство бользнь разбиваеть.

Существенное пользование состоить вы укры-коложнах плении: чего для кромы діэты, о которой мы недавно го-ванна. ворили, совышуемы еще и санну холодную, а особливо вы жаркое время. Однакожы употреблять оную должно сы осторожностію, потому что бывають иные младенцы Аглинскою бользийю страждущіе, ко-торые перенести ее не могуть. Утро почитается самымы лучшимы временемы кы принятію оной; и непосредственно послы того, какы младенецы изы нее выйдеть, надлежить тереть его сухимы по-лотенцомы: впротемы не нужно и напоминать, что естьли бы по нечаянности холодная санна стала приводить его вы ослабленіе, то надлежало бы оную по-кинуть.

Многіє немалую пользу получали в сей бо- отверстів лавни от в отверстія трезв примисокіє, или фонта-чрезв примисокії из в жины в таков из в жины в таков из в жины в таков из в кины в таков из в кины в таков из в таков и пригодень; но ред. жины в возможно бываєть заставить младенцевь пить оного

Кам эссен (Когда не льзя никакь успьть вы томь, чтобы цальная заставить их в принимать хину вы винь, то надлежить соль кины. Давать им в эссенціальную соль сей коры, полагая на пріемь оть пяти до десяти грань, вы сиропы полыппомы и покрывши облатами. Вмёсто питья должно магнізаві: давать им в марціальную воду и тымь болье надовы водабно настоять на хину и воду марціальную, пли вся-

Пріуготовленія меркуріальныя.

Но самыми лучшими лвкарствами, от в которых в чаще всего бываль успъх в в в сей бользии, почитаются пртуготовлентя меркургамзныя, по той причинь, что Венеритеская бользна бываеть одною изв причинь оныя самых в общих в. Но о Венеритеской бользии у младенцевь мы станем в говорить ниже въ

кое другое пріугошовленіе желізноватов, чёмь болье подозріваень быть білямі у матери того младенца

Могли бы мы упомянуть здась о многих других в лакарствах д, кои столько выхваляемы были для сей бользни; но как в большей подвергаешься опасности: употребляючи оныя; нежели как в совсам в их в оставляя, то мы говорить об в них в и не намарены:

дівта есть а единетвенно удовольствуемся совытованіем в дівты, одинствень как в самаго лучшаго способа кв врачеванію Лелинской ный спо-

врачеванію. Аглинской бользии. Надобно имбіть постоянное терпъніе въ употдебления.

(Впрочемъ нътъ ни одного лъчентя, которос бы подавало меньшую надежду въ продолженти довольнаго времени. Почему и надобно имъть постоянное терпънте въ употребленти оной: посредствомъ ея можно надъяться върно остановить силу яда, естьли приступить къ сему заблаговременно. Одинъ младенець, коего Врачь пользовалъ тридцать мъсяцовъ безъ успъховъ очевидныхъ, былъ совсъмъ оставленъ; мо онь излъчился отъ постояннаго попечентя матери.

Многіе вопіяли прошиву машинЪ, предлагаемыхЪ жля выправленія кривизнЪ и горбовЪ на хребть и кости лядвен, берца, и проч., а въ такомъ случав винишь ихъ не должно: ибо жельзныя шела особливо, могли болве способствовать кЪ искривлению, нежели оное выпрямить, не говоря о жесточайшей боли, которую причиняли они нещастнымъ младенцамъ, коимъ давали ихъ носить. Но мы много обязаны искусству Г. Лифена, Парижскаго Лъкаря, который за нъ- машины сколько предъ симъ льтъ посвятилъ себя сего рода из выпрапользованію, за машины, коих в самое мальйшее преиму-влечію жещество есть то, что избавляють больных в отвесякой спер. боли. Нъсколько разъ дълаль онъ опышы, о коихъ не льзя никак в слышать безвудивлентя; и я самв былв свидьтелемв двухъ излъченій, которыя почитали за невозможныя и Самые искусньйшие Врачи. Простота способовъ имъ упопребляемых в, основанная на непременных в законах в ме. ханики, самым в успъхам в соотвътствуеть. Королевская Академія Наукъ, коей онъ уже извъсшенъ, скоро будешъ блюстительницею подробностей его теоріи и практики.)

\$ 43

О судорогахъ у младенцевъ.

Хотя некоторые и говорять, что больше умираеть младенцевь оть судорого, нежели оть всякой
другой бользни, однакожь заподлинно извъстно, что
оныя по большей части бывають токмо признаками
прочихь бользней. (По чему мы и станемь предлагать
о судорогахо, такь какь о бользни симптоматитеской
или оть другихь бользней происходящей, и какь о
бользни существенной.

членъ І.

О судорогахъ симптоматическихъ.

Причины.

Вообще все могущее сильно раздражать нервы, можеть причинить судороги. Отпуда происходить, Ее 2 что младенцы, у коих в нервы удобораздражаемы, етраждуть часто судорогами, или оть вещей раздражающих в канало пищеприемной, или оть прорезывания зубово, оть одежды слишком в стянутой, или оть приближентя осны, кори и других в бользней высыпных в.

(Запорд, рёзы ед животё, сильныя страсти кормилицы, какв-то енвед, досада, презмёрная радость, и проч.; входь внутрь какой нибудь сыпи, гереи, приступы перемежающихся лихорадокд, камень вы пузырё; лёкарства разгорячающія, какв-то веріяхд, діаскордій, опій и проч., которыя не рёдко во зло употребляють дурныя кормилицы, и вообще всё служащія изв найму; Венеритеская бользив, поносд, реогта и проч., суть толико же причинь, оть коихь мо-туть приключиться судороги младенцамь.

Изъ сего всякъ видить, что судороги обыкновеннье всего бывають бользнію симптоматитескою, или ощь
другихъ бользней зависящею, и что пригодное для
оныхъ пользованіе вообще есть то же самое, какого
требуеть и та бользнь, коея бывають они припадкомд. Почему мы и отсылаемь къ тьмъ главамь сето сочиненія, въ которыхъ предложено о бользняхъ
нами теперь упомянутыхъ; а здъсь удовольствуемся
единственно говорить о пользованіи причинъ самыхъ
общихъ.)

Пользование судорогь симптоматическимь, происходящимь оть веществь раздражающимь желудокь и кишки.

Когда судороги приходять оть раздражентя желудка и кишоко, то льчать ихь обыкновенно лькарствами могущими очистить сти органы оть веществь
острыхо, вы нихы заключающихся, или кои могуть
оныя вещества усладить и сдълать неспособными кы
наносентю вреда. Чего ради, какы скоро у младенца
бу-

будеть запора, самымь лучшимь средствомь почи-промыва: тается давать ему сперва промывательное, по томъ тельное. жегкое рвотное, которое должно повторящь, смотря рвотное. по случаю, так в как в предписанобыло в в член II, 63, главы 20. Тома II.

Сверьхъ того налобно очистить и желудоко умвренными првемами былой магнезии или небольшим вымая макколичествомъ ревенго, смъщаниято съ порошкомъ изънезія. раковых в жерновок в пріугоповленных в, как в що сов в- Ревень. туется выше, смотри у 4 сей главы.

Пользование судорогь симптоматическихь, происходящихъ оть высыпанія оспы или кори:

Судороги, предшествующія высыпанію осны или. кори, перестають обыкновенно, какъ скоро сія сыпь выступить. Самая большая опасность в такомъ случав раждается от в стража и боязни твхв, кои ходять замладенцемъ. Какъ судороги приводятъ въ весьма великую превоту всякаго, тои надобно, для угожденія отцамь, матерямь и кормилицамь испугавшимся, и дляуспокоентя оныхв, употреблять кактя нибудь средства, дабы разбить сти судороги. Въ слъдствте чего, какъ скоро они придушъ къ младенцу, пускаютъ ему провь, прикладывають нарывные пластыри, и употребляють многія другія. лекарства, приводящія жизнь младенца въ великую опасность, между тъмъ как в санна для ного и промывательное мягтительное взина для могли бы въ корошкое время все привесни дъ надле-ногъ, прожащее состояние, как в то мы сказали уже в в членв мызатель: III и примъчании а, § 1, главы 12, Тома II.

тельноес.

Пользование сулорогь симптоматическихь, происходящихь оть труднаго проръзыванія зубовъ.

Какъ скоро сулороги происходять отв прорезы-легное чисванія з бовв, що сверькъ легких в слабительных в, мы стипаль-COBE- PPLL AGE. E e. 3

настойна совъщуемъ еще нарывныя и упощребление противосующью сими, дорожных в, какъ-то настойки изв сажи, дурнаго дупаку, 606-ха, бобровой струи и проч. Какой нибудь изъ сихъ ровой настоекв кладуть по нъскольку капель въ сыворотку струи и св легкимв виномв, которой дають по ложкъ, какъ сыворотнъ скоро случай потребуеть: впрочемь надобно будеть съ легкимъ поступать, такъ какъ сказали мы выше въ членъ П

Пользование судорогь симитоматическихь, зависящихь отъ

Судороги, происходящія от внішних причинь, как то от давленія причиненнаго оділнієм слишком узким до свивальниками и проч. требуют того, чтобы младенец в освобожден выль немедленно от узвесвоих в. Хотя в сем случа тот пимая причину, не отнимают всегда діпствія, однакож в не должно никогда опускать того, чтобы не раздіть его; ибо піщетно бы стали мы покушаться укротить судороги, естьли бы причина, от которой они происходят в продолжала діпствовать; что самое доказали мы в 3, глав, в том. І.

членъ п.

О судорогахъ существенныхъ или первобытныхъ у младен-

Признани оудорогъ оущеешвен-

Надобно раздѣть

мааденца.

Когда младенець страждеть судорогами, не чувствуя при томь боли вы животь, безь всякихь признаково прорезыванія зубово, безь всякой внезапной остановки сыпи или другаго отищенія, наконець котда ни которая изы вышеобывленныхы причины не подаеть кы тому повода, то должно заключить, что онь составляють бользны первобытную или существенную, и зависять непосредственно оты мозгу. Но по щастію для человыческаго рода случай сей встрво

жетрвчается весьма редко, потому что нечего уже птогла дълапь къ облегчению нещаспиаго млаленца.

Пользозание судорогь существенныхъ.

Когда су до роги завися ть оль первоначальной порчи когда эзвъ составъ или сложени мозгу, то не льзя лестить себя, онь отъ чтобы можно было вылёчить их в лёкарствами. Но как в перчи въ судороги, происходящія даже и непосредственно оть мозгу. люзгу, не зависять всегда оть сихъ причинь, то ельдоващельно и надобно попытаться давать какія нибудь лекарства: Главный предметь, которой должно себъ предположить, состоить въ томъ, чтобы отвести мокроты от в мозгу. Въ савдетвие чего и надлежить употреблять нарывный, тистительный и проч.; Нарывный, а какъ скоро лекарства сін успеха не имеють, то шельныя, саблашь фонтансяв или заволоку на шев, или между фонтансяв. плечьми:

заволока ж

(Младенцы бываю пъ еще подвержены падугей болвани и ственению груди во время сна. Для сего надобно посовъщоващься съ § 4 и 8, глав. 45, Тома III, въ коихъ предлагается о сихъ бользняхъ.)

6 14.

О водяной бользни вы головы.

Хошя вода въ головъ, или водяная её мозгу и ссть такая бользнь, которая может вприходинь кв людямы взрослымЪ, равно какЪ и кЪ младенцамЪ; однакожЪ какъ сти последние вообще оной более бывають подвержены, то мы и заблагоразсудили помыстить ее: вы число бользней младенческихы.

(Хотябы кто сталь смешивать здесь во дяную Свойстве болвана въ мозгу съ содяного головного, или оного опу бользни хомью содяною въ оболотках всей головы, Авлающею водяной въ се иногда безобразною, шяжелье прочаго шьла, и водяней то полу. мозгу.

нолупрозрачною; однакожь онв суть двв бользни весьма различныя, потому что вы содяной бользии гологной не всегда находится вода вы мозгу, а водяная во мозгу величины головной не умножаеть.

Младенцы больше подвержены бывають содяной бользии въ обологках головных , а взрослые содяной об мозгу.)

членъ 1.

Причины водяной бользни въ головъ.

Водяная бользив головная можеть приключиться оть всего, могущаго повредить мозго, как в то оть паденій, ударовь, рань и проч.: можеть еще произойти она оть ослабленія и слабости естественной мозгу, или оть опухолей скир роватыхо, или дижаго млса въ существь терева; оть крови жидкой и водяной, оть остановки или уменьшенія моги; и наконець оть бользней томных и упорных и изнуряющих и совершенно снъдающих больнаго.

ушибина, причиненная родами трудными, по какому нибудь дурному обороту повивальной бабки, или по всякой другой причинь, бываеть самымь обыкновеннымь источникомь водяной бользии головной, хотя можеть такожь она зависьть оть прорызыванія зубово, хервей, сулорого и проч.

членъ ІІ.

Признаки водяной бользни въ головъ.

Стя бользнь вначаль походишь на лихорадку мереную (febris lenta). Больной жалуется болью вы маковкь головы, или нады глазами; убытаеть свыта; чувствуеть тошноту, а временемы у него бываеты и рвота, пулься непорядосный, и обыкновенно томный; а хотя и кажется онь о тягощеннымы и изнуреннымы, одна-

однакожъ спашь не можеть; иногда бываеть у него бредо, и всв предмены въ глазах вего двоянся. Подъконець сей бользни, вообще смертоносный, пулься наминаеть бить каще; зрагоко разширяется; въ щеки вступаеть слабая краска; на больнаго находить сильный сонд, и судороги и смерть оканчивають бользнь.

(Младенцы, спраждущие воданого болвзнию голов. ного въ чревъ машернемъ, погибають обыкновенно при самых в родах д. Не возможно почти и пособить сей бользни, когда въ мозгу бываетъ наводнение: но тогда можно еще надъяться, как вся вода соберется под в кожу головную, и совершенно внъ терепа.)

Ч Л Е Н Ъ III.

Пользование водяной бользни въ головъ.

По нещастію неизвъстны еще лікарства способныя къ излъчентю водяной бользни во мозгу. Однакожъ требуеть человечество, чтобы кто нибудь сделаль понышку, поелику время или нечаянный случай могушЪ способствовать намъ къ открытію того, о чемъ, судя по настоящему времени, мы и понятія не имъемъ. Всь лекарства, какія обыкновенно употребляють, Ревень няк сушь тистительныя изв ревеню или ялаппы, св слад-ямяны ев кого ртутью; нарыеныя, прикладываемыя на шею или ртутью. на нижнюю часть головы.

КЪ симЪ лекарствамо мы совъщуемЪ присовоку- мочегони. пипь и метегонительныя, или лекарства способствую- техьныя. щія кЪ от деленію моги, какЪ то советовали мы вЪ со дяной болвзни обыкновенной, смотри член. III и IV \$ л, гл. 32, Тома III. Надобно еще попытаться возбудишь и от двленія мокрото в в носу; что самое легко сдълать можно, давая нюхать больному порошокЪ копетия или дикаго перцу (pulvis afai), бълой темери- чижательым проч.

ный порошокЪ.

Joma IV.

X X

Hi-

Некоторые практики утверждали, въ сти недавктя времена, что выльчивали стю бользнь чрезъ употребленте меркуртя. Я не быль столько еще щастливъ, чтобы видьть совершенное излыченте водяной бользни головной усилившенся. Но въ столь отчаянной бользни позволено на все покущаться.

(Весьма бы простое средство было, совокупно съ лъкарствали способными къ поправлению порчи крови и мокротъ, и къ укръплению твердых тастей, прокалывать оболотку головную, или дълать на ней насътии; но по нещастию опыты, учиненные какъ надътью, такъ и надъ другимъ средствомъ, не были удачны; а напротивъ того хороштя дъйствия имъли нс-

\$ 15.

О пученін и раздутін желудка отъ кислоты.

(Младенцы бывають весьма подвержены путентю брюха и онаго твердости. Первая бользнь, происходящая оть вытрово спершихся вы кишкахо, не очень опасна: но можеть она однакожь иногда подать поводы кы грыжамо, какывы пахахо, такы и вы пупкы. Но раздуте желудка сы твердостью, происходящее оть засорентя брыжжейки и другихы терево, почитается всегда бользные весьма тяжкою, которой, какы то многими примычено, болые подвержены бывають дывочки, нежели мальчики.)

члень І.

Причины пученія и раздутія желудка отъ кислоты.

(Сїн бользни приключаются чаще всего от в дурных в леть, от в сереей, или вступленія впутрь какой пибудь сыпи, и сія причина есть одна из в самых в общих в; инхъ; отъ золотики; иногда отъ бользни илиготной. сенеритеской и проч.)

ЧЛЕНЪ П.

Признаки пученія и раздутія желудка отъ кислоты.

(Младенцы въ такомъ состоями имъють лицо бледное, а шело волды реватов: печаль, досада, трудность ходить, безсонница, внутренняя лихорадка увеличивающаяся по вечерамъ, боль въ пупкв и проч., бываюнь еще несомивиными признаками раздута желу дка отб кислоты. Нъкоторые наконецъ младенцы впадающь и въ аглинскую бользиз. Но самымъ опаснъйшимъ въподобномъ случав припадкомъпочитается мытв.

Какъ кормление грудью бываетъ самою обыкновенною причиною сей бользни, то и нужно освъдомиться, какимъ образомъ младенецъ былъ вскормленъ; какого телокложения кормилица, и какого шакожь ошень н машь; поелику извъсшно, что раздути желудка можеть зависьть оть яда сенеритеского, золотухи или цынготной бользни, такъ какъ и отъ всякой другой причины, и что въ сихъ последнихъ случаяхъ не иначе вылъчить можно раздутие желудка, какъ употребленіемь лікарство, свойственных для техь бользней, коихъ оно бываеть дъйствиемъ.)

Ч Л Е Н Ъ IIL

Пользование пучения и раздутия желудка отъ кислоты.

(Когда удостовъришься, что оно зависить отъ когда оне дурных в яства, то и надобно начать переменою пище- произошле употребленія, и давать младенцу вивсто веей пищи отв курхорошее молоко; надлежить запретить ему отвары яствь. жирные, нохлебки и мясо; прикладывать на брюко хорошее припарки мягсительныя; употреблять пролывательныя молоне, мягсительныя: а пишь давашь ему сыворошку поно-промываламъ съ настоемо изъ брункреса (nasturtium aquaticum), тельныя, Жж 2

240- сыворошка

идавелю и проч.; и содержать его какъ возможно въ тоно жамъ еъ настобольшемЪ движеніи.

емъ изъ ппавелю , бруниреса и проч. Penens. ПріемЪ

Временем в же надобно очищать его порошком в ревенны мв. который кажется лучше всего въ этой бользни приличествуеть. На пртемь онаго берется отв шести до двенатцати грановъ, которой должно давашь вы какомы нибудь ягодникь. Впрочемы предписывающь и другіл лікарстви, предлагаемыя нами прошиву завалова, смотри членъ IV, « I, главы 47, Тома

Сольмарці- III, между которыми соль марціальная Ривів рова найальная Ри- дена свойственные для младенцевь. Втерова.

Волы мар-

Какъ скоро бользнъ приходишь къ излъчентю, цвальным то маленькому больному надобно предписать употребленіе во 28 марціальных в, и давать яства крыштельныя. Естьми же твердость брюха будеть нарочито ведикая, то должно прикладывать на брюхо во вре-

пластыри мя пользованія пласты рь діаботанумі, пласты рь мумъ, 60- болиголовиний (emplastrum de cicuta) или пластырь Вигоанголовный новб, и прос.)

жии Виго» ROBE.

© 16.

О Венерической бользни у младенцезы:

(Сказали мы вЪ № 1, главы 40 сего Тома, что венеритеским в домв не токмо заражающея виновные, но что такожь и невинные часто жертвами онаго бывающь. Между сими последними напиаче мы видимъ младенцевъ, поелику ядо, полученный ими съ жизнію, или которой они сосуть съ молокома кормилицы, обращаясь въ нежныхъ ихь сосудахв, повреждаеть, точить и истребляеть терева, часто не обнаруживая никакого изъ шъхъ припадково, по которымь примъчается онь у людей варослыхъ, Впротемъ не всегда легко, а иногда даже и совсъмъ не возможно имвив, о поведении опщовь и манерен, всв нужных примъны, дабы по онымъ заключать о свойсшвв и признаках бользней, естьли онв хошя малобудушЪ непорядочны. Самыя такожЪ кормилицы мотуть быть заражены сею бользий, подв видомв совершеннаго здоровья; послику, как в то нами сказано было на страниць бі сего Тома, ядо венеритеской можеть оставаться скрытымь выпродолжени многихь лыть, не подавая ни мальишаго знака своего сущестівованія.

Сувдовательно всяк в чувствовать может в, еколько важчо то, чтобы имъть ясное и точное поняште о знакахв, поль какими Венеритеская бользиз можеть оказываться у младенцевь; ибо какь она принимаеть у сихъ махыхъ твореній образь всякихъ почти их в бользней, то по сему и не льзя не обознапься не только вв Венеритеской бользни существу ющей, но еще и въ другихъ болбзияхъ, которыхъ птеченте она разепроинть, или исказить признаки. Для всъхъ паковыхъ причинъ мы и разсудили -заблаго прибавить сей параграфЪ кЪ тъмЪ, изЪ коихЪ составлена еїя глава о бользнях дътских в.).

ЧЛЕНЪ І.

Признаки Венерической бользни у младенцевь.

Двпи, раждающіяся от в такой матери, кото- важдаюрая булучи заражена Венеритеского болвзийго, не ста-шижен отть ралась от в оной дъчиться, и не наблюдала жикакой которая предосторожности въ пищеупотреблении, для укро-заражена щенія жестокости своего состоянія, выходять обы- Венеричекновенно на светь покрыты прыщами, шелудями и знію з ранами на разных в частях в твла. Случалось даже иногда видъть и такихъ, кои имъли незалупу и шанкеры въ частяхъ депородныхъ, въ горле и проч. Въ подобномь случат стю бользны легко распознать можно; и естьми кота мако признаки бывають опасные,

K x 3

то она въ короткое время сихъ нещастныхъ мла. денцевъ умершвляетъ.

Par 7210щихся от В Mameon. кошорая несовершенно выжъчилаев omb во время беременио-OWN.

ВЪ иное время младенецъ не подаетъ никакого признака венеритескаго; а сте случается, когла мать въ продолжени беременности слъдовала диэтъ болеутолительной, могущей припупить свирьпость яда, или когда она принимала какія нибудь лекарства, которыми припадки сей бользни выльчены бысей бользин ли по одной только наружности. Въ такомъ случаъ весьма достовърно, что младенецъ бываетъ зараженъ лдомв, поелику мы предполагаемв, что мать не выльчилась совершенно; почему оный и производить въ послъдовании бъдетвия тъмъ опаснъйшия, чъмъ болъе мы причины имъ не подозръваемъ: впрочемъ таковой млаленець съ трудносттю вырастаеть; да и бываеть всегла слабъ и нездоровъ.

Олнакожъ необходимо должно исхишить его отъ жещастій ему предлежащихь. Но многіе не хотять отважиться на меркурій, не имья по крайней мъръ нъкоторой въроятности, а сте дълающь довольно основащельно. КЪ щастію еще служить то, что младенець, въ которомъ не видно бываетъ никакихъ припадково венеритескихо, не видно шакожъ и признани, по знаковъ здоровья. Пвить лица имветь онь блидножелшый; глаза у него бываюшь впалые и окружены кружкомъ синеващымъ и вздувшимся: онъ бываетъ худощавъ, да и примътно всякому, что со дня на день жно о Вене- болье жудьеть. Носомь извергаеть онь мокроту свътлую, такъ какъ въ насморкъ, и по мъръ того рабенка сей как в онв подростаеть, примьчается вы немь некоторая синоващость. Сосеть и глотаеть онь съ трудностію, да и молоко часто выходить опять въ ноздри. Ногами не качаеть онь такь какь другие млаленцы, когла его распеленають. Жалуется и кричить

ноторымъ логадыmambея долричесной болъзни у мосятдней женщины.

الهم

часто, а особливо ночью, когда лежить на постели, время, въ которое онъ страждеть болье, какъ то мы показали сте въ члень I, § 7, главы 49 сего Тома.

Ежели въ младенцъ оказывающея всь таковые знаки, непризнаки, що очень догадыващься можно, что онъ ременяюзаражень Венеритескою бользнію. Но сія догадка пере- догадку мвняется въ достовърность, когда мало помалу вы- въ самую ступають пятна желтоватыя, и красноватыя на шев, достовърна груди, на брюхь; трещины, разсълины на ногахъ и на рукахЪ; прыщи вЪ гордъ, превращающиеся вЪ небольшія ранки быловатыя; прыщи енойные вы волосахы и на лбу; дикое мясо, боро даски ноздреватыя, шанкеры на детородных в частях в и на заднице: а сти шанкеры бывають болье или менье толсты, плоски или глубоки; но чаще всего свътлокрасноваты по краямь, и больше или меньше шверды: во внушренноещи бывающь они былы, и дылающся синими и черновашыми, когда уже несколько времени тв части они точили: иногда походять они на бородаски извергающіе гной бъловатый, но которой на бъльъ оставляеть патна желтыя. Наконець не льзя будеть болве сомнъваться о существовании сей бользни, ежели соски у кормилицы покрасньють и будуть больть, естьли грудь и железы подъ мышками следаются твердыми, и проч.

Но и иладенецъ принадлежащій родителямь весьма здоровымь, и которые Венеритеской бользии никогда не имъли, можеть захватить ее оть кормилицы;
какь-то самый опыть очень часто доказываеть, что
сте не ръдко случается съ дътьми, вскормленными
по близости большихъ городовъ, или въ самыхъ городахъ тъхъ. Сколько сте нещасте, коего примъры
довольно умножились, долженствуетъ учинить внимательные въ выборъ кормилицъ? или паче, не должно

ан оно заставить навседа отказаться от подобных в жаемнинь, коихь первая выгода состоить въ томъ, чтобы умалчивать о бользнях в своих в прошедших в, ж которых бользни, даже и при тщательном в изследованти, не всегда примътить можно, хотя оная существуеть и можеть заразить младенца?

жнаки, по конмъ примъшипь можно . ражаенся MODMH-HUHBI : Или отъ moro, umo озэ икрки епать съ

раражен-

.MMIdM.

ВпрочемЪ, какЪ признаки Венеритеской бользни ошкрывающся вообще на часшях в подверженных в прикосновенію яда вене ритескаго, надлежинть всегда начинать что млг. осмотрентем во рту у шладенца. Ежели кормилица денецъ 32- не чиста, то примъчаются прыщики, а особливо въ сею боль торав и на объих в железахо подав язычка, кои пухзнію от нушь и твердьють.

Ежели младенецъ захващить стю бользнь отъ того, что кладуть его спать св человъкомь зараженнымЪ, то ядо венеритеской оказывается на кожф пузырьками, шелу дями, прыщиками, опухолью, верелюдьми ею дами и проч.; однакож в не так в он в обнаруживается скоро, когда симъ образомъ бываетъ сообщаемъ, нежели какЪ чрезъ сосанте. Примъчено такожъ, что остававшись долгое время скрышымь, отказывался онь единспвенно ядовипыми ранками, или шанкерами въгорав.

> Но каким в бы образом в Венерическая бользив ни была сообщаема иладенцамь, однакожь они легче заразишься ею могушь, нежели взрослые люди, поколику хожа их в по связи своей бывает в слабъе, тонъе, да и скважинки оныя отверстве. По сей причинв и надобно крайнъ наблюдать, дабы младенцы не пили и не вли того, что употребляють взрослые, кои подозришельны.

> Венеритеская бользна удобные вылычивается у младенцевъ грудныхъ, нежели какъ у тъхъ, кои отъ груди опиняты. Жесточае бываеть она тогда, когда

наслыдственная, нежели когда приходинъ отъ корийлицы; и чемъ ранее оказывается бользиь, темъ легже изцылить отъ оной можно.)

члень п.

Пользование Венерической бользии у младенцевы:

(Какъ скоро беременная женщина объявить, что надобие у нее Венеритеская бользив, то и надобно немедленно поспышть приступить къ врачевантю оной, ежели хочешь предженщины упредать роды преждевременные, или самую смерть беременной, младенца. Однакожъ благоразумте требуеть не преднебымой мъсяцъ; въ такомъ случав дождаться должно, същовъ пока она родитъ.

СпособЪ пользованія, который кажется приличествуеть лучие всего беременнымь женщинамь. есть способь промывательных противувене рисских в. Часто повторенным в опытом в, сказывает в Г. Гориг, превму въ сочинении приведенномъ въ примъчании 2, главы жества 49 сего Тома, доказано, что промывательныя протиеузенеритескій не вредять беременности, и не причи- тельныхъ няють родова преждевременныха; чего не льзя ни- для какъ сказать о какихъ нибудь другихъ способахъ. Въ беременследстве того, во иножестве наблюдений своих в щинв. приводить онь въ примъръ многихъ женщинъ беременных вылъченных в совершенно посредством в сего способа. Между прочимижь упоминаеть объ одной молодой женщинь, коея бользиь была страшная, и которая употребила до ста нятидесяти осьми промываний противувенеритеских въ течени двухъ мъсяцовъ съ половиною, не чувствуя от в того чрезъ все оное время пикакого припадка, кромъ трудности мотеисп скангя, происходящей, отв ся гонорреи венерисеской, и которую укропими свыянныма молокома съ селит-Juma IV. 3 . / 7010 V

рого; и сін промывательныя предписываны ей были. такъ какъ мы сказали въ способъ, какъ ипотреблять меркурій попредствомо промывательных в противувенеритескихв, смотри стран. 30 сего Тома.

СпособЪ машираній. CVACMBY . меркурія нераспушеннаго. ногда не треблять промывательных Б.

Однакожъ способъ сей не есть изключительный. Ежелневно льчать беременных женщинь посредствомъ натираній меркуріальных, сулены, меркурія не распущеннаго и проч. И такъ какъ скоро не льзя достать жидкости входящей въ составь промывательможно упо- ных в противнеенеритеских в, или когла больная не можешь наблюдать таковых в промывательных вы продолженіи потпребнаго времени, или естьли какое нибудь другое обстоятельство препятствуеть употреблению оныхъ, тогда приступить должно къ предписанію того или другаго способа, или простаго или сложеннаго, кои предложены нами въ 5 7, главы 49 сего Тома, съ предосторожностьми и ограничиваніями, каковых в требують больная и самыя обстоятельства, въ которыхъ она находится.

въ какое Когда по причинъ беременности давней непремън-BDEMS HOств редевь но надлежало дожидаться, для пользованія больной, нока она родишь, то можно приступинь къ лъченію предпринять може по прошестви шести недель от родовь ея, и лаже но почьранъе, а именно какъ скоро крови перестанутъ, ежеэова ть ли принадки будуть жестокіе. Для сего избрать долмашь, зажно способь, самым в обстоятельствам в соотвътственражениую Венериченвишій, и молоко машернее почши завсегда довольно бы**сною бо**ваеть растворено частицами меркуріальными такь. лъзнію. что при авчении матери можеть совокупно вылв-**Р**абенскЪ выльтичишься и рабенокъ, естьли и не станеть давать ему ваенися въ лекарство особенных в. Хотя бы младенець быль и camne mo же время, спиаръе, но равнымъ образомъ изцъляется онъ отъ еспьяи и одного молока материяго. Г. Горяг упоминаеть о на-Me cmaмешь ему блюдении объ одномъ младенив шестимвсячномъ, который

рый вылёчился совершенно от одного кормленія его давать из-

Сказанное нами здёсь о машери должно равным во но забоморазом разумёть и о кормплицё, которую надлетитьслоб жить пользовать, какы скоро примётить какіе нибудь отнятія
признаки венеритескіе или на ней, или на младенцё.
Не должно варугь помышлять о перемёненій кормилищы: оны нездоровы, такы слёдовательно и надобно нездоровой;
стараться о излёченій его; а самымы надежнёйшимы, а должно
тользовань ему молоко кормилицы, которая щогда щу,
пользована бываеты. Впрочемы же младенецы сею бользнію уже заразившійся, сообщить оную несомнительно
кормилицё новой; а таковой виновный поступокы какы
честности, такы и человёколюбію равномёрно противень будеть.

Но ежели Венеритеская бользив окажется у ила Когда младенца тогда, как в онв будеть отнять отв груди, денець когда ему исполнится два, три, четыре или пять ди отльть, тогда должно льчить его по какому нибудьнять, то изъ вышепредложенных в способовь. Сулема, говоришь налобно его тоть же Горнд, есть видь самый удачныйший и всых вать припрочих в надеживиший кв принятию меркурия младен-личествуцамь: поелику она соединяется хорошо и удобно съющій споих в пиштемъ и яствами, и употреблять ее можно такъ приемъсукак в пожелаешь. Но начинать должно весьма малыми прі- лемы для емами, какъ то осьмою частію грана, и еще меньше младенца для младенцевъ двухъ или прехлъпнихъ. С й Врачь двухъ или даваль ее по шестой части грана въ день пятилът няго; пяней дъвочкъ. Она принимала въ полуфунтъ молока, тильтия. смъщаннаго съ поликимъже количествомъ ягменной го. Наблюводы. Спустя осьмеро сутокъ, стали давать ей по четверти грана, и не примътно увеличивали сей пріемЪ до половины грана вЪ томъ самомъ количествъ

3 3 2

ПИ-

ништя, коего принимала она по двъ треши поутру а остальное послъ полудни. Рабенокъ сей быль выль. ченъ совершенно, и оное пользование не причинимо ему ни мальишаго безпокойства.

Tipienth At. жа решвЪ ZAR MAZденцевъ долженЪ бышь чепвершью жели для варослымТ.

Но сколько бы ни учаченъ быль сей способъ; однакожь случиться можеть, что необходимо налобно будеть его оставить для техьже самых в причинь. кои принуждають имьть прибъжище къ другимъ способамъ у людей взрослыхъ Въ такомъ случато надлежитъ слабте, не избрать тоть способь изв всъхв прочихв, одинвам или еложенный съ другимъ, который покажется свойственные для мляденца, наблюдая при томь, чтобы предписываны были лекарства избранныя, въ пртемахъ четвертою частію слабьйших в, нежеликакі е показаны для взрослыхь. Впрочемь должно поступать такь, какь предписано въ 6 7, главы 49 сего Тома, и прочить вать всеобщія разсужденія содержащіяся в в в той. же самой главы.

> Приметсийе. Кром в бользней предложенных в в в сей главъ, иладенцы бывають еще подвержены большей части и изъ тъхъ, коими страдають люди взрослые; но нъкоторыя даже изъ оныхъ находятся и такія, кои весьма часто младенцамЪ приключаются. Изчислены они во Всеобщей Габлиць Тома V; при словь A1.10 78421,36.

> КакЪ мы старались означить подробно при каждомъ изъяснении бользни обстоятельства, которыми та бользнь сопровождаема бываеть у младенцевь, и самое количество, въ какомъ должно предписываемыя имъ давать лекарства, то мы безъ повторенія пред видущаго не можем в завсь взойти в в больщую подробность. Почему и отсылаемь читателя къ той главь, нараграфу или члену, въ коихъ предла

гается о бользии, которою одержимъ бываетъ маяденець, однакожъ не прежде какъ тогда, когда онъ въ Картинъ Признакова, помъщенной въ заглавіи втораго Тома, найдеть признаки сходствующіє съ тъми, какіе представляєть больной: яко единственный, въ самомъ дъль, способъ, какъ удостовъриться о настоящемъ имени той бользии.)

Г Л А В А 52.

О Жирусгій или Лъкарской Наукъ вообще; о крозопусканій принятомь въ видь врачеванія и въ видь операцій; о пъкарскихь бользияхь самыхь общихь, какь то воспалительных опухоляхь вившнихь; о чирьяхь, ногтовдахь и антоновомь огит; о ранахь; о обжогахь; о убояхь и багрозыхь пятнах на тъль оть уши-бу; о нарывныхь ранахь там вередахь и о фистулахь.

\$ 1.

О Хирургін или Авкарской Наукв вообще.

Естьли бы мы предприняли описывать всв опера- плань Аватии или работы лекарская, и всякая бользни, вы которыхы сии операции бывають нужны, то бы мы распространо кы сей нались сверьхы предвловы себы предписанныхы. Вы слыд-главы и стве чего мы и должны говорить единственно о случаяхы самыхы общихы, а наипаче о тыхы, вы коихы льзя праны.

обойтиться безы вспомоществованая лыкарскаго; но мы упомятемы такожы нысколько и о тыхы, вы которыхы хотя и нужно такожое вспомоществованае, однакожы не всегда получить оное можно, (по тому ли, что не льзя скоро наити лыкара, или по тому, что совсымы иная причина препятствуеть сму прибыть на помощь кы больному.

И шакъ не должно надъяшься найши въ сей: главъ и въ двукъ послъдующихъ, кои продолжениемъ. З з з

оной служать, полнаго изъяснения всей лекарской науки: ибо наша цель не въ этомъ заключается. Мы пишемъ здёсь не для Лекарей, которыхъ предполагаем В свъдущими в В той части Врачебной науки, къ которой они себя опредълили; и поелику они весьма умножились такЪ, что нътъ почти прихода, при которомЪ бы не находилось по крайней мърводного, то и не возможно, чтобы мы лишены были вспоможений ихъ зъ бользняхъ лекарскихъ. По малой мере заподлинно извъсшно, что найти Лъкаря можно, какъ скоро жто имветь на сте произволенте и некоторой достатокъ. Наша же цъль единственно клонится къ тому, читобы обранины мысли человъческия вообще на главныя операціи лікарской науки, дабы в случаях в самых в нужных в можно бышь полезным нещасшному человъку, которому приключится какой нибуль припадокЪ, и не имъть причины укорять себя вЪ томЪ, что далЪ ему погибнуть, отЪ недостатка вЪ свъдении, какъ поступить должно было.)

Хошя познание о тель человъческомъ и есть непремънно нужно къ усовершенствованию Лъкаря, однакожъ можно въ случаяхъ пребующихъ скораго вспомоществованія употреблять всякія средства, дабы спасти жизнь ближнему, и не упражнявшись довольно въ Анатомии. Ибо нъть ничего удивительные, какЪ видъть операціи, которыя дълають ежелневно крестьяне надъ живопными; операціи, которыя часто удаются очень хорошо, и которыя однакожъ не меньше бывають трудны, какь и тв, кои надъ твломъ человъческимъ дълаются.

принуждаетъ .

Надобно признаться, что каждый человъкъ бытельность ваеть некоторымь образомь Авкаремь, въ известныхъ случаяхь, хотябы онь желаль того или бы не жел такъ ска. лалъ. Въ самомъ дълъ, мы от природы склонны всъ

къ тому, чтобы помогать намъ подобнымъ въ нещасти возме, када и бывають иногда такте случаи, кои возбуждають жавто ченасъ изъявлять стю чувствительность.

Однакожъ естьям оче же бужаеть направляюще каремъ при

Однакожь, естьли она не бываеть направляема случать. пристойнымь образомь, то можеть ввести нась вы заблуждентя весьма бъдственныя. Слъдовательно тоть, кто хочеть спасти жизнь своему другу, можеть причинить ему смерть чрезь покушенте безразсудное; а другой, который опасается того, чтобы не поступить неосторожно, остается спокойно и даеть ему погибнуть, не отваживаясь помогать ему даже и тогда, когда руку помощи подать можеть.

КакЪ всякой чувствительный человъкЪ желаетъ подлинно избъгнуть сихъ двухъ преткновений, то я не могу преминуть, чтобы не поставить себъ за долгъ показать ему, какимъ образомъ поступать онъ долженъ въ случаяхъ, когда вспоможение его бываетъ необходимо нужно, и чрезъ то ласкаю себя надеждою сдълать ему нъкоторое удовольствие (1).

C 2.

⁽¹⁾ Хирургія и Медицина суть двъ сестры, ноикъ матерью почитается человънолюбіє: объ онъ имъють одну пружину, и илонятся нъ цъли одинак вой, а именио нъ сохраненію эдоровья и ив врачеванію бельзней Одна всспрінла на себя п печеніе о бельзняхь внъщнихъ и операціяхь, нужныхъ по многимъ бъдственнымъ припадкамъ, наимъ мы непрестанно педвержены бываемъ: другая же, предоставила себъ бельзни внутренийя и средства, каиъ оныя врачевать; а объ онъ соединастися и дъйствують согласно и единедушно, накъ екоро бельзнь одного или другаго вида тр буеть совокупно вспомоществованія руки и лъкарететь енутреннихъ.

Когда разсудишь о шаковом' единодуший необходимом', о семь неминуемом' соединения вы пользовании самаго величайшаго числа бользкей, то не льзя не оскорбиться, видя распри и негогласіе, водно-ришшися между двума шталами, долженствующими имыть одну душу, одинь умь, одни и ть же самыл намыренія и желація, то есть земомоществованіе человыхамь.

О кросопускания, принятомь вы видь врачивания и съ виды опеоаніи.

onepatia жирургии ша попорую меньше всего благевременно

whompe-

30 m 3.

блять зна-

Нъть ни одной операціи хирургитеской чаще енаніе есть нужной, как в кровопусканте: а по сей причинь и должно оную лучше других разумыть и знать употреческая са-блять лучие. Однакожь хотя повивальных бабки, им. мая общая рюльники, садовники, кузнецы и проч., унотребляють оную

> Весьма бы жела тельно было, говорить одинь Врачь-Философь. И. З. Платнерь, смотри Institutiones Chirurgiæ rationalis etc. pag 3 п. ХХ, чтобы гнусныя ссоры и вражды, родившілся от ненависти, которую другь къ другу взаимно являють врачи и Лънгри во Францін, прекращены были.

Дабы наждый изв нихв, продолжиеть онв, упражникся съ екромностію въ томъ званіи къ ноторому себя предуготоваль; дабы Врачь прилагаль стараніе свое обь узнаніи правиль Хирургіи и практики сел науки, безъ которыхъ онъ не можетъ судить о трудакъ Абкаря, когда призыванъ бываеть для того, чтобы быть свидъ-- телемъ оныжъ; ниже руководствовать его, когда обстоящельства сего потребующь: ниже щакожь познать прачины множества бользыей внутреннихв: а Ленарь св своей стороны должень отстать отвонаго права безумнаго и гордаго, побуждающаго его приниматься безразсудно за пользование бользней самых в опасный ших в и даже шанихв. кои совершенно бывають внутрения. Ибо безъ таковаго пожертвования какъ съ той, такъ и съ другой стороны, труды Абкаря и Врача могутъ быть вредными и пагубными для больныхъ.

Влагоразумный же и искусный Врачь, скромный и знающий Авкарь, всегда будуть имъть между собою согласіе, какъ относительно нь совъщамь, такь и вь разсуждени самаго пользования. Но Врачь, который есть другь человвчества, не можеть взирать безь негодованія на безразсудную дерзость ніжоторых в Лікарей, и всегда самыжь совершенныхь невъждь; на безумное пицеславіе, сь накимъ товорять они о своей наукь: наконець, на несносное ижь жвастовство въ момъ, что жомять они заниматься и врачеваниемъ внутреннимъ, въ которомъ ни малбище несвъдущи, и которому обучаться не мотян, поколику все время свое и учене должны были посвящить на Хирургію и враченаніе бользней наружныхь: равнымь образомь и Лькарь искусный можешь всегда оскорбищься, какъ скоро найдешся съ некоторыми Врачами, много о себя мечтающями и неучтивыми. кои отрекаться стануть от того, чнобы кв наблюденамь его окаэывашь надлежащее внимание.

оную ежедневно, но мы по всему заключать можемь, что мало изы нихы находится такихы, кои бы могли разсудительно положить, когда кросопускание нужно, или когда безы онаго обойтися можно. Саные даже Врачи столько обманываемы бывали обыкновениемы вы разсуждени сего введеннымы, что чрезы оное не малой подавали поводы кы посмычно своему и осуждению. Однакожы операция сия часто бываеты самой величайшей важности, и которая, какы скоро учинена будеты надлежащимы образомы и благовременно, должна приносить величайщую пользу во многихы бользняхы.

члень і.

Показанія кровопусканія.

Жровопусканте пригодно въ началъ всякой боль вствона эни воспалительной, какъ-то въ колоть во бокахо, пери-лительной, какъ-то въ колоть во бокахо, пери-лительный пневлюнии или воспаленти легкихо, и проч. равнымъ об-и всяние разомъ оно полезно и въ воспалентихо частныхъ; а признани именно въ воспаленти кишохо, матки, пузыря, желуд-воспаленти кишохо, матки, пузыря, желуд-воспалента, ка, потеко, горла, глазо, и проч.; въ удушъв, боли во бедрахо, въ кашляхо, въ бользияхо головныхо и прочисходящихо ото простуды (тештатібті), въ паралитъ кровяномо, падутей бользии, во всякомо кровотечнии и проч.

Послъ всяких в ударово, ушибово и побой, или других в каких в поражений сильных в, полученных в как в наружно, так в и внутренно, кровопускание бывает в нужно. Равный образом в за необходимое средство почитается оно и тогда, когда кто нибудь по несчастью будет в удавлен в, утоплено, или задожнется от дурнаго и зловреднаго стоячаго воздуха, или от в паров в металитеских и проч. Словом в, надобно отворять крова всякой разв, как в скоро движение жизненное чъм в нибудь внезапно остановлено будет в. Томо IV.

(Но сте правило имветь изъяття, какъ - то ин ниже въ глав. 55 и 56 сего Тома покажемъ.)

ЧЛЕНЬ II.

Слукан нет ребующие кровопускания.

Слобость о экитность ирови, воданыя болъзни и троч.

Надобно изключить такте случаи, когда жизненное движенте остановлено бывает в внезапно обморокомо, произшедшим от слабости, или припадково истеритеских от Равный образом кровопускание опасно и во всяких в бользнях в, приключающихся от ослаблентя волокно или твердых састей; от крови разжидивителя, повредившейся и оскудъвшей, как в то в в бользни цинготной, водяной, худосотности, и проч.

ЧЛЕНБ Ш.

• части тъла, изъ которой должно отзорять крозы, ж какимъ инструментомъ дълать сіг надобно.

Въ гастных воспалентах провопусканте должно быть учичено изъ части какъ возможно быте къ больному мъсту находящейся. Впрочемъ же всекой разъ, когла отворяють кробь единственно для уменишента количества оной, рука почитается часттю самою удобнъйшею для сето дъйствтя. Ежели можно исправить оное посредствомъ ланцета, то должно его предпочесть всякому другому орудно, по когда не льзя, то надлежить брать прибъжище къ піленцамъ, или къ рожкамъ.

Опасно было бы на- никогда накалывать кровяной жилы (vena), проходящей калывать но жиль біющейся (arteria) или сухой, когда могуть изщуюся или брать другую; и всякь легко празнать может, что сухую. кровяная жила лежить на жиль біющейся, но бленію на выбыть приньчается, и которос внака, по пренетанію, какое вы ней приньчается, и которос внака, по иногда даже глазомы ощущиць не трудно. Сухия же

жилы распознаются по твердости и упругости, по- се примъжожей на ремень сученой, естьли оной пальцомъ ося-чается.

ЧЛЕНЬ IV.

О мъстъ, на которомъ перевязку дълать должно.

Изъ какой бы части тела ни отворяли крось; но перевязку делать должно между часто назначенною для кросопускания и сердцемо, то есть, повыше того места, которое прорезать хочешь, ежели это будеть рука или нога, и ниже, когда горло, виски, и проч. А какъ часто бываеть нужно, до ткрытія жилы, стягивать перевязку несколько крепче, то и надобно въ такомъ случав, какъ скоро крось начнеть течь, ослабить немного перевязку: впрочемъже перевязку делать должно по крайней мере на палець или пальца на полтора отъ самаго мере на килы, которое вскрывать намереваещься.

членъ у.

О количеств в крови, какое выпускать надобно

Количество крови выпускаемой долженствуеть всегда располагаемо быть по силамь, возрасту, оно должно твлосложенто, образу жизни и проч. больнаго. Ибо носительно менье бы омьтно было, какь и вредно, ссть но ив ли бы захотьть кто нустить то же самое количе- трлосло- ство крови младенцу, какое и человьку взрослому, возрасту, женщинь пъжноп, равно какь п мущинь крыкому, и проч. образу

Поставлялось прежде сего за законъ, даже и проч. между швил, кои славились особеннымъ искусствомъ какъ долзво врачебной наукъ, поставлялось, товорю я, за за-жно мы-конъ, чтобы въ нъкоторыхъ больнымъ до техъ поръ, нока не придетъ обморокъ снанижъ но нодлинно не льзя предложить ничего глупъе сего даже обыкновения; одинъ человъкъ надетъ въ обморокъ при изъ

первомъ вскрыти жилы, когда напротивъ того друтой лишится всей своей крови прежде, нежели почувствуеть самую мальйшую слабость. Ибо лвиствительно обморок в зависить болье оть состоянія души, нежели тівла, и не різдко произвести его можно однимъ только способомъ, какъ отворящь кровь станешь.

Вользии ч въ конхъ они бы-

(Не значить же сте того, чтобы не было извъстиых в бользней, в которых в кросопискания до вають ну обморока почитаются весьма полезными; как в на примврв въ бышенствы и помышательствы ума, происходящемъ отъ сжатія сосудово мозговыхо; сжатія, которое бываеть столь велико, что надобно ослабъніе довести даже до обморока, дабы оное разбилось, и проч. Но мы должны весьма остерегаться от в щото, чтобы совътовать, кому бы то ни было, употреблять подобных кровопусканія: естьли же объ них в и упоминаем в завсь, то сте единственно для того, дабы кто по невъдению своему не сталь сопротивляться намърентямъ искуснаго Врача, ихъ предписывающаго, когда оныя покажутся ему нужными,

ЧЛЕНЪ VI.

О томъ, какимъ образомъ надлежить пускать кровь младенцамъ.

Кровопусканія младенцамЪ производятся вообще пілвицами: но сін кровопусканія, хотя и необходимо нужныя во многих в случаях в, бывают весьма крититескими, и сопровождаются успъхомъ очень сомнительнымЪ; поелику не льзя никакЪ определить количества кроси, которая можеть высасываема быть пілвицами. Самую же провы остановить весьма трудно, да и раны, делаемыя сими живошными, не легко зальчивающся. Надобно, чтобы ть, кои принимающся за кровопускание, потрудились и всколько побольше и приобыкли бы къ пусканию крови и ладенцамъ; тогда бы двиствие сте не стали находить столько труднымъ сколько себъ воображаютъ.

(Мы должны ощдать ту справедливость нашимъ лъкарямъ, что они искусство сте довели до такого совершенства, что очень мало изъ нихъ находится между признанными за таковыхъ, коимъ бы не удавалось меправлять кровописканий самыхъ трудныхъ, даже и надъ младенцами: такъ какъ пілвицы и употребляемы бываютъ токмо тогда, когда пускать кровъ надобно изъ висковъ; почему и употребленте оныхъ случается ръдко. Однакожъ смотри еще во всеобщей Таблицъ Тома V, слово Пілвица.)

ЧЛЕНЬ VII.

Предразсудки простаго народа о кросопускании.

Между поселянами находятся еще многіе досад-о той жи ные предразсудки о кровопусканіи. На примър в слышнию о кругой ты отв нихв о жиль головной, о жиль сердетной, о жиль сердетной, о жиль грудной, и сказывають они тебь, что кровопусканіе изв сихв жило долженствуёть навърно выльчивать всякія бользни на техв частяхв, отв которых оных жилы ведуть свое начало, поколику не выдають они, что всы кровоносные сосуды выходять изв сердца и кв сердцу опять возвращаются; каквото показали мы сіе вы примычаніи іб, главы і, Тома І. Слыдовательно изв таковаго расположенія тылеснато заключить можно, что, только бы не было воспаленія частнаго, мало вы томы важности, изв какого мыста кровь ни пускають.

Но сколько бы глупо ни было сте предразсужде-о мнинте, однакожъ оно не столько еще вредно, какъ то мыхъ предурное мнънте, по нещасттю слишкомъ общее, что ществажъ и з

Websare EPOBOHYсканія :

первое прозомускание должно произвести чудсся. По самому разсуждению таковому многіс откладываючь часто стю операцтю, когда она бываеть нужна, дабы предоставить ее на случай, которой почитають важнъйшимъ; и когда больные находятся въ крайней опасности, то и просять усерано о кровопускании, не разбирая того, пригодно ли оно или не пригодно; сверьх в же того кровопускание, в в извъстном в периода бользни, равно какъ и въ извъстное время года, имлеть еще последствия очень вредныя.

• итовану-

Еще думають многіе, что кровопусканіе изб носизнія кат ен оппинтиваеть мопроты въ низь, и чито сабдовашельно оно врячуснь бользии головных и других в частей верхнихо. Но мы савлали уже замвчание, что въ бользняхъ частных надлежитъ отворять крось какъ возможно ближе подлъ больнаго мъста.

что нала лежинъ ABARM'S прежде провопуноги или ручной:

Однакожъ при всемъ шомъ когда нужно отворить кровь, изъ ноги ди или изъ киети ручной, то такъ какъ жилы сихъ частей лежатъ глубоко, да и самая кровь скоро останавливается, надобно вельть снанія пов погружань сін части въ теплую воду, и въ оной деризь инсти жащь до техь порь, нока не выпустичьколичества криец нужнаго.

> (Не безполезно такожь предварить, что иногда надлежить держать ноги или руки очень долгое время вЪ тенлой водъ, прежде нежели станешь пускапь кровь из сих в частей; поколику многіе часто покидали таковыя кровопусканія, кои не трудно бы учинить было, естьлибы стю предосторожность BBBAAH.

Даже и изъ руки Zi 1 160

Есть такте люди, у коихъ жилы ручныя бывау накото тот равномарно тонки и глубоки; а тогда и надобно выяв на употреблять сейже самый способь, или просто губ-Ey

ку грецкую или компрессы, намоченных въ теплой водъ, которые и держать на той жиль, изъ коей хочешь отворять провз, больше или меньше времени, или до тъхъ поръ, пока она довольно не разширится.

Безиолезно почти тъмъ, для кого мы питемъ, и сказывать, что жила ручная, которую чаще всего отворяють, называется посредственница (vena mediama), а двъ другія именуются базиликою и цефаликою или головною; что жила въ кисти ручной называется сальвателлою, а у ноги сафеною; понеже тъмъ, ком не изъ числа лъкарей, но принимаются за кробот слажие, или по склонности или по человъколюбію, единетьенно нужно знать ихъ по признакамъ наружнымъ; и воззръне на руку и на ногу при руководствъ хорошаго лъкаря, наставитъ больте въ одну минуту, нежели онисантя самыя пространцыщий, кахілом осемъ сдълать было можно.)

Мы не сшанем занимащься описаніем того, можче каким образом в исправлянь операцію кровопусканія научань ся опестораздо легче научиться сену из примъра, нежели рать провень подасть понятія о кровопусканіи столь в рнаго, как в но ственовоз в оззрвніе на одно кровопусканіи, учиненное искусною гда станець прив

Равным в образон в безполезно описывать разныя ври усмани тела, из в которых в можит отверать криза, выше. как в то руки, ноги, доб в виски и проч.; ибо всякому еги части извъстны; и по предвидущим в разсуждентям в благоразумныя особы могут в в каких в нибудь случаях в опредвлить ту из в сих в различных в частей, из в которой пристоптье лустить, предв.

(Хоша кровопускание есть операция маловажная и жемя прошахая, конторая многда сопровождаема бываеть при-вопускание или реділ важ-ключеніями опасными; однакожь страхь сей не останая, одна- навливаеть людей благотворительных в. Я не слыхаль дерка, по- никогда, чтобы простые цирульники, челов жолюбимонахини (во Франціи) и проч. кои всв елику дъ выя моетом она совершенно не знакть Янатомии, прорезали я одьми са- хуго или бігогиугося жилу; но всякому извъстно, что мыми про- они пускають кровь самой большой части людей бълныхь. H NMIGHT невъждами.

Мнъ разсказывали, что одна сельская госножа, руководствуемая однимъ человъколюбіемъ, научилась отворять кровз сама собою, и что она операцію сію исправляла съ толикимъ успехомъ и искусствомъ, что не только жители ея деревни, но и вст окрестные поселяне, даже и люди достаточные, къ ней единственно приходили для кровопусканія

Пе должно никогда **ПУСКАНІБ** крови. показывается dwom de камъ 60льзни.

Все, что должны мы совытовать таковымь челов вколюбивым в особам в, заключается в в том в, чтобы никогда не пускать крови по одному требованію ожели не къ нимъ приходящихъ, или по нихъ присылающихъ: но единственно по показанію призніково той бользни. надобности коею они бывають одержимы: ибо много есть такихь людей, которые пускають себь чровь по одному толь. по призна- ко своенравію, и рідко случается, чтобы кровопискание не было тогда вредно. Вообще же одна бользнь и признаки, сопровождающие оную, могуть и долженствують определить, когда надобно пускать кроез, изЪ какого мъста надобно ее пустить и сколько разЪ пустить потребно. Сладовательно не по чтенію сего параграфа решишься должно на шаковую операцію; но по прочтении той главы, въ которой говорено было о бользни, какую пользовать должно, какъ то мы савлали о семь наблюдение въ примъчании 6, главы 2, Toma II.)

\$ 3.

О воспалительных вопухоляхь внышних, или о жигучих опухоляхь; о чирьяхь, нарывахь, ногтовдахь и ан-

Отъ какой бы причины ни происходило воспале-вествие нее, или воспалительная опухоль наружная, но оканчивае опухоль вается она или разбитемо, или насносниемо, или внешная внешная опухоль внешная опухоль опу

Воспаленія легкія, или произшедшіх просто от в знани простуды и безь предшествованія какой либо больз-предвіща ни, подають надежду, что кончатся разбиского. ющіє разбиту:

Воспаленія, слёдующія непосредственно за ли-нагновнів хорадкого, или оказывающіяся у людей тучных и дородных в, нагнаиваются обыкновенно.

А ть наконець, кои приключаются старикамь, Антоновь или людямь водяного бользий угрожаемымь, должен-вгоры или ствують заставить опасаться, чтобы не кончились жельгить антоновымо огнемо, (или чтобы, твердьючи, не превращились въ желвако.

но часто подъ мышками; ногтовды, приключающівся единственно на перстахъ и проч. суть воспалительных опухоли вившигх, называемыя отъ Врачей общимъ именемъ жигутей опухоли (phlegmon.)

Воепа ли
тельная
опухоль
принимаеть имя
тирья,
нанъ слоро она
венроется
или всирыта будеть.

Каждая изъ сихъ опухолей можеть выльчена быть разбивкою, то есть, не скрываючись сама собою, или не требуя, чтобы оную вскрывали ланцетомь или прижигательным кампемв; но съ того времени, какъ она вскроется, или когда принужденно должно будеть ее вскрыть, называется она сирьем (abscessus)

нли венры. Пользование для приведения въ разбивку воспалительныхъ та будеть.

опухолей вившнихъ, какъ то чирьезъ, нарывныхъ вередозъ и ногтовлъ.

Когда воспаление будеть легкое, а телосложение больнаго крепкое, то надобно всегда испытывать разбитие онаго.

легное Самыми лучшими средствами къ сему способшицеупс- ствующими почитается предписать больному пищепребление, употребление легкое и мокротожи лительное; пустить снанія, чи- ему кровь (ежели кровопускание нужно), и нъсколько етитель- разъ очистить его (когда разбитие сдълано будеть.)

Припарни, напаніе масломъ.

Должно також в дълать припарки на части больной: естьли же кожа будет в очень напряжена, то надобно накапать на оную состава из в трех в частей масла миндальнаго сладкаго и из в одной уксусу, и воспаленную часть покрыть зеленым в пласты рем в.

Всякъ чувствуеть, что таковое пользование не занія на можеть простираться на вет роды опухолен воспалиой пользо- тельных ва на примърь сирги и погтов ды простыя, ръдкакь дол. ко требують лекарство; и часто заживають они такь, что и примътить сего не можно: однакож в когда они чить бывають довольно общирны и умножатся, тогда діэта, крокопускание и тистительных за нужное почитаются. Но въ полобных в случаях в юни превращаются обыкновенно въ нарывы, кои оптворяются сами собою, или которые нужно бываеть отворять, какъ ню мы сте покажемь вы следующемь члень.

Вообще кровапускание, и по обстоятельствамъ повторенное, необходимо нужно бываеть, равно какъ припарки, накапыванія масломі и проч. въ опухоляхв воспалительныхв большихв, такв на примърв въ шъхъ, кои случающся на лядвеяхъ, задницъ и другихъ частяхъ мясистыхъ.)

членъ І.

парывахъ, или воспалительныхъ опухоляхъ вившнихъ, которыя не можно было привести въ разбитіз.

Должно дождаться, чтобы воспалительная опухоль Знаки понарижная кончилась нарывомв, или превращилась бы казыва. наружная кончилась нарывомо, или превращимаев об ющіе, что въ тирей, окончаніе впрочем весьма обыкновенное се- опухоль го рода опухолей, ежели боль, жаръ и біеніе пульса превращапродолжающся увеличиваясь до чешвершаго дня.

нарывъ

(СверьхЪ того не позволено будетъ объ опомъ сомнъваться, естьли примътинь, что кожа опускается, средоточіе опухоли бълветь и въ ней окутительно бываеть волнение влажности. Однакожь знаки сін не столько примъщны, как в в вирьях в наружных в; ибо какъ скоро они бывають глубоки, то кожа не переменяеть ничего или очень мало цвету, и самое волнение влажности не столько ощутительно: въ такомъ случав нарыей делается медленнее. Но эрв потребия лость гноя всегда возвъщаема бываетъ перерывомъ изоъстива боли, воспаленія и уменьшеніем в жару, котораго все-степень тда нотпребна извъстная степень къ произведению гноя. произведе-Ибо какъ скоро не будеть болье совсыть жару, или нію гноя; когда оный бываеть очень слабь, то нарыва дълает но не дол-

ел несовершенный, и должно опасапься, чтобы опухоль не приняла свойства желеака: естьли же напроочень силь-Month. тивь бываеть онь весьма силень, то остановляеть нагносние, и антоново огона иногла произволить.)

> Пользование для приведения жь нагноснию или нарызу воспалительных опухолей наружных , которых не можно было разбить, или пользование нарывовъ.

> Ежели, не взирая на лакаретва, предписанныя на страницахь 354 и 355 сего Тома, жарб воспаленія умножается, естьми впухоль увеличивается и сопровождаема бываеть сильною болью и жестокимь бленгема пульса, то надлежить стараться о способствованій нагнаскію.

СамымЪ лучнимЪ вЪ такихЪ случаяхЪ сред-Припарки болеутоли ством в почитается болеутолительная припарка мясти-**Мельныя**; тельная, которую надобно перемънять дважды въ день. Естьми же нагновние происходить медленно, то надлежить взять сыраго луку, изрезать въ мелкие ку-Maongpenсочки, истолочь и наназать на катаплазму пли прижыя сырымъ луna pky. шомъ з

> (Сколько бы ни просты были совыты, подаваеные вабсь кВ вспомоществованию нагноскию или нарыеу, однакожъ могутъ они равняться со всеми теми. какте въ таковыхъ случаяхъ многте обыкновенно употребляють.

А все, что только можно прибавить кЪ сему, когда опухоль будеть очень велика, состоить въ томв, чтобы перемвнять катаплазмы чрезв каждые четыре часа; и какъ скоро боль будетъ весьма жестоках, то прибавлять къ онымъ по тритцати или по сороку капель ласдана Сиденгамова, или ощъ чевомь опів пырехь до шести грань опід; но сін последнія ліsea por

Man ande BEHBBIEF YIROAM-MICABHATAMA жосредст.

наретва надлежить употреблять съ величайшею осторожностію, дабы не навлечь антонова огня.

Ть, кои слушаются лькарокь и невьжаь, снабденных всегда катаплазмами, мазями и пласты рями безь числа, совершенно чудотворными, по словамь ихь, для вспомоществованія насноснію, найдуть весьма чрезвычайнымь, что мы довольствуемся для сего столь простыми средствами.

Но естьли захотять они приметить, что на нагновніе ж гносние, такъ какъ и врачевание тиркево, бываетъ врачевание единственным действием натуры и собственных сущь лай ея силь, и все, что должно делать въ подобных в ствіе наслучаяхь къ вспомоществованію оной, заключается въ туры: нетомЪ, чтобы или содержать вЪ легкой теплотв мо вепочасть располагающуюся кЪ нарыеу; или ослаблять со мощество суды, когда бываеть сильное напряжение; или сооб-вать ейщать некоторой родь движения целебного темь частямь, когда онв ослабьють и остаются безь лыйствія; или наконець утолять боль, какь скоро онав будеть очень жестока: то удостовърятся, что поередствомъ теплыхъ припароко и катаплазмы мястительной, можно удовлетворить первымъ и вторымъ показаніямі; что чрезъ пріобщеніе луку къ катаплазмі удовлетворять они третьему; и что болеутолительныя средства, какія совытовали им присовокуплять къ симъ припаркамо, выполнять и четвертое показаніе.

Когда опухоль назрвешь или готова прорваться, знаки, по что легко примвчается по тонкости кожи, на части ноторымы примв-самой возвышенной опухоли, по солнению материи, типь можно поды пальцомы, и обы-жио, что кновенно по утолению боли, то надлежить оную чирей совекрыть или ланцетомы, или прижигательныма камичества.

Kakb

Какъ скоро нарыей прорвется самъ собою, что во являть, довольно часто случается въ сирьяхо, бубонахо въ накогда нарыть самъ хахо и подъ мышками, въ ногтов дахо, и проч. то рыть самъ довольно прибавлять къ припаркв, какую до того рвется. времени употребляли, не много серной мази или черная бальсаму Женевіево, что самое и продолжать до тъхъ поръ, пока опухоль не пропадетъ совершенно, женевіевъ такъ чтобы не примътно было въ ней никакого солненія матеріи, и пока отверстіс, которое всегда бываетъ очень малое, не закроется, и тогда нарыей выльчивается совершенно.

Когдажъ верело самъ собою не прорывается, а семъ собою при томъ совершенно созрветь, что познается по признакамъ, выше сего изъясненнымъ, то надобно вскрывать его или острымъ инструментомъ, или прижигательнымо камнемо: предпочтенте котораго нибудь изъ сихъ средствъ долженствуетъ быть взято отъ нознантя частей, которое принадлежитъ совершенно Лъкарю, коего надлежитъ призвать и въ томъ на него положиться: мбо долженъ онъ направлять и самое надръзате относительно къ обстоятельствамъ.

Нужно весьма внимашельно примъчашь минуту Надобно зрълости нарыва; ибо естьли вскрыть его очень раумъщь не mponyмропу. ли же, напрошивъ того, оставишь долго въ немъ минушы. **Когда со**⇔ гной, то заразишь и части смежныя. Внимание сте, aptem b завсегда нужное, наипаче важно бываеть въ разсуждежной. Для нін нарывово вы воряв, вы пахахо и всёхы тёхы, кои mero ? находятся на хрящахв, надкостной плеве, на швахв, на груди, на подбрюшии, и проч., поехику во всехъ шаковых в случаях в сной могь бы вступить въ части емежныя, или накопляться во впадинкахЪ, или пустотахь оныхь частей.

Когда нарыей вскроешся, то лечить его должно что издебприпаркого предписанною, къ которой прибавить мож- но д влату, но мази базильной, или серной мази или бальсаму вывъ Женевиево, и проч., и оную держать до тъх в порв, вскрыть нока опухоль не разобъешся, и изъ краевъ оныя будеть не выйдень весь гной: вы семь случав мало забошинь- ментомь: ся должно о высушении и заживлени; понеже, как в черная то мы уже сказали, дъйствие таковое совершается мазь, паче натурою, нежели искусствомъ.

Вев сін нарывы, какъ що всякому разсудить не трудно, не могуть выльчиваемы быть св одинаковою улобностію: ибо они весьма упорны бывають у людей худосотныхв, страждущих в золотухого, бользиль щинготного и венеритеского: савдоващельно въ таковых в случаях в не можно никак выльчить их в, не издечивь напередь самой бользни, отв которой они зависять, или которая ихъ поддерживаеть.)

Предложенное нами шеперь пользование заключаеть пользовавъ себъ пользованте всъхъ бользней наружных в, извъст ніе крова. ных в подвименемв нарывова, сирвева, ногопов да, и проч. рывовъ съ Как в скоро он в не оканчиваются разбитиемв, которое все- болью и св гда стараться надобно произвести и оному пособство-жаромъ, вать, средствами описанными выше сего на страницах в ногтобав 354 и 355 сего Тома, по онъ бывающъ не иное что, какъ и прочсирьи, обыкновенныя послыдствія воспаленій наружныхв: следовательно и надобно облегчать нагносние оныхЪ, и вскрывать ихЪ, естьли только сте нужно. (Вообще нужно бываеть вскрывать ногтов ду, находя-надобно щуюся подъ ногшемъ, поелику въ прошивномъ слу. всирывать чав должнобы было опасаться, чтобы гной чрезвизходявесьма долговременное пребывание не повредился, не щуюся распространился внутрь и не произвель бы гнилости подъ нога вь пруст костей составляющих в персты. Посль шого чего: льчинь должно базильного мазыю желтого, бальсемом визильная

Жене- мазь.

Женевтев, или какою нибуль мазыю раздаллющею вяз-Жаменевь, кость.)

членъ п.

O ROTMOSAGNE.

ТакарисЪ да не иное что есть. товда. Misemo naмарисовЪ MAM Hore motab.

(Ногтовда, называемая Лекарями панарисв пермерыто ви- ваго вида, выльчивается легко, потому что она бываеть наружная и садится на верхней кожв. Но не нанъ ного такъ разуметь должно о ногтов дахв или панарисахв втораго, третьяго и четвертаго вида, а именно о швхв, которыя пребывание имъють въ мякоти, въ оболочкъ сухих жилв, или между на якостною плесою и костію, и въ самой такожь кости.

> ВЪ такомъ случат бользнь бываетъ самой вели чайшей важности и требуеть всего знанія Лъкаря искуснаго. Почему и надобно онаго призвать, коль скоро примътишь, что когтовда не токмо не вылъчивается средствами предложенными на страницахЪ 352 и слъдующ. сего Тома, но напрошивъ того причиняеть боль чувствительную и признаки представляеть важнейшие. Здесь мы намерены предложить о свойствахь отличительныхь каждаго изь сихь видовь и о пользовании всеобщемь, какого они требують.)

> > Признаки панариса или ногтобды втораго вида.

С Бользнечных биения пульса бывають острые и глубже, нежели какъ въ панарисв перваго вида, или въ ногтов дв собетвенно такъ называемой. Перстъ находится въ величайшемъ напряжении; и очень часто къ больному жара приходитъ.)

Пользование панариса или погтовды втораго вида.

RPOBORY-

(Сей видъ не льзя никакъ льчить безъ кровопусканій, кои часто повторять надобно по мере усилія припадковЪ. При всемЪ томъ больной долженЪ бышь бышь на діэті. Ему прикладывашь нужно припарки припарки. болеутолительныя, мястительныя и разбивающія, каковыя предписаны віз члені І сего параграфа. Есшьли же увидищь, что сій вспоможенія не подаютіз облегченія, то должно приложить пластырь изб мази те- мазь черрной, или немного бальсаму Женевіеві, и на нихіз ная сіз припарку изіз мякища хлібпасо сіз молокомі. Вскоріз припарново. посліз того примітить волненіе мокроты; и тогда надлежить вскрыть опухоль, и лічить такіз какіз выше сего на страниці 358 сего Тома сказано было.

Одинъ Кавалеръ Святаго Лудовика, достойный листья уважентя по своимъ лътамъ, честности и непорочно- починика и правовъ, увърялъ меня, что ему не случилось или па- никогда видъть неудачи отъ листьевъ травы моще- стушьяте потника или пастушъяго глазу (burfa paftoris). истол- принлады- прикладываемыхъ сырыми вмъсто ката- вземыя плазмы или припарки на опухоль; что онъ самъ вы- вмъсто лъчивался, симъ простымъ лъкарстволъ, отъ ногто- припарки, фаы, причинявшей ему боль самую неспоснъйшую, и что совътовавши послъ того оное многимъ знаком- цамъ, видълъ всегда отъ него успъхъ желаемый.)

Признажи панариса или ногтовды третьяго вида.

(Не взирая на всь предложенныя нами шеперь мъсто ного средства, боль вы поетовля трешьяго вида, имъющей повам сепребывание свое вы оболочкы сухихо жило, упорно продолжается, и становится завсегда болье и болье нестерпимою. Она чувствуется вы кисти ручной, вы запястью, и даже во всей рукь до самаго плеча: кисть и вся рука пухнуть, такы какы и персты при составахо: жаро, безсонница и судорога кы тому присосединяются. Опухоль не всегда примыта бываеты вы семы видь поетовды, и не всегда чувствуется вы оной солнение материи: но свойство признаково долженетвуеть воспреняющень тому, чтобы ощи-

бишься въ семъ весьма опасномъ видъ, поститу не ръдко антоново огонъ присоединяется къ прочимъ призпадкамъ и больнаго умерщвляетъ.)

Пользование панариса или ногтовды третьяго вида.

Мадръзы-

(Важнымъ лѣкарствомо противу поетоѣды сей почитается падрѣзываніе, послику не можно надѣяться выльчить сію бользнь и отвратить опасность, не давъ выходу самой матеріи, яко причинъ всъхъ тъхъ припадковъ; почему и надобно призвать искуснаго Лькаря, и на его знаніе положиться.

Мы предваримъ единственно, что матерія, которая выходить чрезь сіт операцію, не есть гной, но жидкость сукровитная, острая и вдкая, и что Лвкарь искусный не ожидаеть для операціи, дабы чув. ствуемо было волненіе, котораго вы семь случав не льзя никогда примътить, потому что матерія чрезвычайно ственяется вы оболочкв сухихо жило, состоящей изь перевязокь волокиистыхо весьма кръпкихь.

Всирышее ириключающихся вередовь.

Еще предварить мы должны, что часто одного разръза не довольно, что часто надлежить опять къ оному приступить и продолжить иногда его даже до кисти, въ которой дълается вередъ: что такожъ въ иныхъ случаяхъ приключающеся вереды не оканчиваются на кисти ручной, что появляются на передней части руки, на самой рукъ и даже подъ мышками, и что вскрывать ихъ надобно.

Сти примъчантя дълаемъ мы для того, чтобы больной и предстоящте не препятствовали Лъкарю, исправляющему званте свое и должность. Миъ случалось видъть такихъ людей, которые не могли удостовъриться, чтобы боль въ перстъ могла навести толико неустройствъ и трудовъ со стороны оператора, и кои несправедливымь образомъ обвиняли Лъ

каря въ незнаніи нли въ шомъ, что хоть то продолжить бользнь, для умноженія своихъ операцій. Но при всемь томъ заподлинно извъстно, что кромъ всъхъ таковыхъ вскрытій, кои суть величайтей важности, еще принуждены бывають иногда Лъкари переръзывать сухую жилу, хотя и знають, что больной должень оть того, остаться изувъченнымь; поелику часто сіе бываеть единственнымь средствомь къ сохраненію той части, и даже самой жизни больнаго. Коль же скоро къ сему присоединитея антоново огонь, то надлежить употреблять бальсамо женевісво въ немаломь количе- бальсамъ ствъ, какъ то мы скажемь ниже, въ примъчаніи 2 женевісвъсей главы.

Хотя операція служить здъсь средствомв сущеетвеннымь и самымь важнымь, однакожь не надобно пренебрегать предписанія кровопусканій, промывательиыхв, и внутренно питія прохладительнаго, словомь пользованія предписаннаго нами вы началь сего параграфа противу воспаленія, на страницахь 353 и сльдующь сего Тома.)

Признаки панариса или ногтовам четвертаго вида:

(Сей видь ноетовдо, не меньше опасный, какъ и мъсто нототь, о которомь мы теперь говорили, имветь пре-гтоваь бывание свое между околокостного оболоткого и костьго, сего вида. и не ръдко въ самой кости.

Сія ногтовда познается по боли глубокой и сильной, которую больной чувствуеть выперств. Напряженіе, опухоль и воспаленіе вначаль бывають не очень
велики, и оканчиваются почти всегда на одномы пальць. Но вскорь по томы приходять припадки опасные, жара, судороги, безсониццы, волненія, и не ръдко даже бреда сы помышательствомы ума, подвергающія немалой опасности жизнь больнаго.

Сіл ногтов да отличается, отв предвидущих в тъмъ, что боль простирается токмо до локтя. Призчиною же сей боли бываеть небольшее количество матеріи гнойной, острой и вакой, находящейся пониже околокостной оболотки, и которая не ръдко повреждаетъ самую костъ. Снаружи примъчаются иногла не большіе пузыри; персіпъ кажется синевать, и даже весь омертвето и заразитея антоновымо огнемо, естьли не употреблено будеть вскорт надлежащаго пособія. Ибо ежели пренебрежешь пользовать его заблаговременно, то боль по всей рукт распространится.)

Пользование танариса или ногтовлы четвертаго вида.

Разръзв.

(Слъдовательно и надобно немедленно призвать Лъкаря, который сдълаетъ разръзъ, долженетвующий простираться даже до кости. Потребно ему примъчать, не гиствли кость, дабы въ следствие сего и лъчение свое направлять могЪ; и ежели, не взирая на таковое по правиламъ Врачебной науки расположенное пользование, персыв заразится антоновымо огнемо, то должень онь делать насвканга даже до живаго мяса; нужно притомъ, чтобы онъ повторилъ нъсколько разЪ сіи насъканія или рожетную крова, смотря по усилію припадковь, и употребляль бальсамв Женевіевв и женевісьв, химу въ большихъ прісмахъ внутренно или наружно, или селитру, какъ то мы въ член. III сего § говоришь станемь. Словомь, онъ должень поступать по правиламъ разумнаго и ученаго Булгера, предложеннымъ въ его диссертаціи или разсужденіи о безполезности отнятія тленовв, диссертаціи, которую Г. Лиссота перевель на французской языкъ и обогатилъ примъчаніями. Собраніе сочиненій Г. Juccoma, Том'ь IV.)

AHIRP2.

Средства какъ предупреждать ногтобды.

(Уогтовам подвержены бывають возврату или опрыжкамь: ибо не редко видимь мы, что къ пемъ, KOM

кои ими страдали, онять онъ приходять, а иногда презъ весьма короткое время. Мнъ случилось видъть постовду втораго вида такую, которая обходила понеремьнно всъ персты на объихъ рукахъ.

Одно средство къ предупреждению оныхъ, и ко-погруженорое многократно мнъ удавалось, есть то, чтобы ніе пероблакивать персть больнаго въ воду столь горячую, ста въ вожакъ торько перенести возможно. Но сей простой спочую, собъ надлежить употреблять тогда, какъ скоро почувствуеть онъ первую боль; ибо естьли матерія уже назръеть, то тогда бываеть онъ безполезенъ. Персть держать надобно въ сей почти кипящей водъ чась, два и три сряду: векоръ потомъ вновь начать должно, въ продолжении того же самаго времени, и не прежде переставать, какъ уже боль совершенно разбита будеть. Не кудо такожъ, когда кто подвержень частымъ отрыжкамъ сего роду бользней въ перстъ, временемъ принимать и слабительныя.)

ЧЛЕНЪ III.

О Антоновомъ огнъ.

Янтоново огона, который есть третій образь, коимъ оканчивается воспаленів, оказывается признаками следующими.

Признаки Антонова огня.

Жожа на части воспаленной теряеть свой цвёть красный. Она становится темновата и синя, мягка и слаба: покрывается не большими пузырями, наполненными влажности сукровитной различных цвётовь. Опухоль опадаеть, и изъ темноватой, какова она была, дёлается черною. Пульсё бываеть скорый, слабый и безнорядочный. На больномъ примёчается поть холодный, предвёщающій смерть неминуемую.

K x 3

· TIOAZO

Пользование антонова отня:

При первом'в появлении таковых в признакоев на-ВеріянЪ наружно, добно лъчить опухоль верглкомб, или покрывать оную плазма изъ катаплазлого слъланною изъ щелоку и отрубей. Естьщелоку и ли признаки становятся напряженные, то надобно отрубей. проръзать опухоль и лечить оную базильного мазые Проразыванія, 6а. размягченною масломв терпентиннымв: но вев сін Авкарства должны быть прикладываемы теплыми. REHAKNE

мазь, терпентинное DESCRO. WICHARDS. Хина въ

(Превосходною въ такомъ случав почитается припаркою гуща крвикаго декокта изв хины, которую смачивають часто симь самымь декоктомы теплымь. Стя припарка дъляется следующимъ образомъ:

жатаплаз-MB. Способъ . жанЪ ее ATRAMB.

Возьми самой лучшей хины въ порошкъ, четыре унціи.

Вари въ одномъ фунть воды до техъ поръ, пока останется половина: слей чистой декоктв, и приложи стю гущу теплую на подобте катаплазмы (2). Чша

ЖеневіевЪ.

БальсамЪ (2) БальсамЬ ЖеневіевЬ особенно похваляется протяву антонова огня. Воть одно наблюдение довольно стоющее того, чтобы здесь помв. ещить оное. Имъ обязаны мы Г. Дювернею младшему, который внесъ оное въ записки Королевской Академіи Наукь, на 1702 голь-

Ma6 Amae-Mic.

у Одинъ человъкъ лътами отъ 40 до 42, кръпкаго сложения. , быль ранень, на канунь праздника Св. Оомы въ 1701 шпагою въ е середнюю часть нижнюю и внутреннюю правой руки. Ударъ прое спирался, илучи вверьх в накось, отв четырех в до пяти пальнов в въ ширину: провъ потекла съ великимъ стремлениять, и раненый екоро пришель въ слабоств. Въ семъ состояни быль онъ принесенъ , къ первому Лънарю, накой шолько попалед. Прежде всего приложи-, ли компрессъ къ жилъ и оную перевязали кръпко повыше локтя. , Раненый оправясь от слабости, быль отведень въ свой домъ: , шогда открыли края раны и внутрь оной положили корпію намоза ченную въ жидностяхъ сязательныхь, и нотомъ все корошо и э, кртпко перевязали. Больному пустили кровь и предписали употре-, блять весьма легиія пожлебии и ложарственные отвары. Вь предол. з жени цълыкъ сушокъ рану ему перевязывали шолько дважды. Сни-, мали даже и самую корпію, чтобы смачивань перевязни и пряночз ни: и въ разсуждени перевязки наблюдаема была такая же предо-., CHO-

Что касается до лекарство внутреннихв, то явкар. оныя должны бышь взяшы из вкласса крвпительных в, ства внуть и жины давать надобно въ столь великомъ пртемъ, ка-пительныя кон шолько можеть перенести желудока больнаго. и жина.

(ОлинЪ

э, сткорожность накъ и въ первомъ случай; после чего продолжали поэ, чин равномърно поступать до навечерія дня святой Женевісвы. », А какъ тогда показалась въ великомъ изобилія, но еще сдъ-, лали небольшую насвчиу, и перевязали рану почти шанже, какъ ж у, прежде, со всякою предосторожностію, котя было уже ибсколько з, дней, какъ больной примътилъ, что передняя часть руки перемъняэ, лась цвътомъ, однакожъ безъ всякой боли.

», Горячка продолжалась иепрерывная, безпонойство и кезсоним-3, 4a были въ сильной ешепечи. Напослъдонъ въ день свящыя Женевіевы э, нашин не только переднюю часть руки зараженною антоновымы э огнемъ, но что еще гивлость распространилась и внутрь самыя руээ ни. Канъ больной и вст предсмолщие не мало испутались, то поэ, пребовани собрать совъть, и на оной избрани прехъ Линарей, пріза обыкших в управляться в в случаях важных в. Они осмотрым боль-, наго и бользив. Передняя часть руки была совершенно трупная и э, пожожая на мершвечину, равно какъ и внушренняя часть плеча до за подмышень, и кость ручная сбиаружилась от в гнилости до преквили , четырехь пальцовь широты оть подмышекь. Усиливающаяся тин-, лость, жарь св давленіемь, щени синів, пульсь обдвой и слабой , побудяли занлючимь, чтобы положинься на натуру, и употреблять , локарства могущія вспомоществовать оной, какъ внутренно, такъ в и наружно.

,, Въ тотъ же самый день сыскалась женщина по имени же-,, невісва, которая сбінцалась вылічнть больнаго. Оба Лінари, пользоэ, вазыне его, отдани ей на руки. женевівва начала тереть всю руку 25 онаго и передиюю часть оной, не смотря на то, что она была трупная, нв-,, ношорою мазаю. По томъ покрыла все полошенцами, кои приколола , булавнами до вечера, и послъ такимъ же образомъ поступала съ больэ, нымъ. Ему предписала яство сочныя и самое хорошее вино. Въ двадцать ,, четыре часа нагносніе начало поназываться: она продолжала тв же , самыя операція, и наждой разв рана была чище, потому чио гикэ, лость отделялась удобно, и оставалась на полотенцах в или на пропуэ, синой бумагв, номорую она часто употребляла. Многе совътовали ,, женевіев , чтобы отданть переднюю часть руки въ сустава, , накъ по причинъ дурнаго запажу, такъ и потому, что оная была э, почни опедвлена гнилостію. Но оча не согласилась, говоря, что не э, надобно сего прогать, а что локарство ея едблаеть все, что поль 19 КО было нужно.

(Одинъ знаменитый Химикъ сказываль инв, что въ антоновомо оснё въ ногахъ, приключившемся отъ хлъба испеченнаго изъ съмянъ повредившихся, испысимира въ паль онь удивительныя действія селитры, принявелиномъ пой

, Наконецъ вся передняя часть руки отдълилась совершенно сама собою въ суставъ, спустя шесть недъль, считая съ того дня, какъ женевіева начала пользовать больнаго. Она продолжала прикладывать на кость открытую, такъ какъ и на всю руку, свою мазъ, не смотря на сукровицу, которая казалось, текла меже, ду костью и мясомъ, ниже на какое либо другое обстоятельство. Пое съдствія отъ сего не меньше были благополучны: ибо чрезъ мъсяцъ по отпаденіи передней части руки, кость ручная, которая была открывата, выпала и отдълилась совершенно отъ остатка костя здоровой.

, Прежде сего отабленія не зналь никто, что воспослядуеть , съ оною большею частью кости, или съ кускомъ кожи задней , части руки: многіе опасались также кровотеченія сильнаго; но все , это ни мало не назалось затруднительнымь для женевіввы. Она про- , должала свои перевязки: соки текли питательные изъ каждаго во- , локна остающатося; каждая трубочна сдълалась длинтве. Напослъ- , докъ рука получила свою длину естественную; конечность представ- , ляется въ такомъ видъ, въ накомъ ей быть натурально должно, , и край куска кожи опрокинулся на нижнюю часть кости, и до по- , ловины оную покрываеть. Остается единственно вдоль части внутренней рубець безобразный, на подобіе корки итснолько чещуйчатой: , чего также бы легко избътнуть было можно, естьли бы воспрепяте, ствовали крамъ кожи опрокидываться внутрь; а сіе произошло отъ , того, что она не могла пристать къ кости, и что не старались , сближивать краевь по етпаденіи самой кости.

, Все сіе происходило въ продолженіи четырехъ мъсяцовъ , такъ, что больной не имълъ нинакого припадна лихорадочнаго и , нинакого безпонойства не чувствовалъ. Нанонецъ принималъ онъ , дважды славительное, и теперь наслаждается совершеннымъ здравіемъ.,

Сіе важное произшествіе было зарыто въ сокровищъ Академическомъ, и совершенно незнаемо или пренебрежено Врачами, канъ Донъ периетти, Библіотекарь Короля Прусскато, вывезь бальсамь женевіссю изъ южной Америки, гдв оный подаренъ ему быль настоятелемъ Францисканскато монастыря въ Монтевидео. Онъ напечаталь рецепть его въ концъ Исторіи о странетвіяхъ своихъ на острова Малуинскіе, въ 1765 и 1764 годахъ. Похвалы, приписываемыя Дономъ Периетти сему бальсаму, канъ по собственнымъ его наблюденіямъ, такъ и по той въ великомъ количеснивъ. Желудоко его, который не могъ привыкиуть къ хинъ, въ приемъ для сего случая нужномъ, и которую онъ бросилъ съ самыхъ перъхъ дней, переносилъ оченъ изрядно селитру, по Томо IV.

наблюденіям в настоятеля францисканскаго, поразнай почтеннаго сочение теля журнала церкоенаго. Г. Аббать Динуарть, Каненикъ церкви Сень - Бенуа, памятул наблюденіе Г. Дюбернея, увидьль, что рецепть онаго францисканца быль тоть же самый, какъ и сего Академика, и что мнимый вальсамы Американскій быль весьма французской, и совершение тоть самый, которой добродьтельная женевіе за употребляла къ содълнію онаго удивительнаго изцыленія, о новеть мы теперь говорили.

Сей человъколюбавый священнослужитель немедленно постарался составить оный бальсамъ, дабы давать его несчастнымъ, ноимъ онъ судилъ сго быть полезнымъ, и всегда видълъ отъ него успъжъ желаемый»

, тик не возможно, писаль онь но мит недавно, пересказать замь всекь врачеваній, которымь я свидетель. Изв оныхв привелу , я въ примъръ токмо четыре. Одинъ бедный работникъ носилъ. , въ продолжени четыремъ льть, четыре раны ядовитыя на ногь. э, которая раздулась вдвее : вст Аткари сказывали ему завсегда что , не оставалось мнаго средетва крем' отрвасти всей ноги: он' со-, вершенно быль выльчень вы шесть недьль. Одинь молодой человынь э имбав три глубонія раны на пашь, кон были последешнем в запу-, щенных выпокв; онв принужаень быль лежани въ постели: я », выабчиль его въ при недъли. Порпной мой получиль, иззадь тому , двенадцать дней, на улиць, ударь копытомь лошадинымь, причинив-, шей ему очень тяжелую рану: онь выльчень быль въ три дня. , Ногтовда, которая три месяца почила большой переть на рукь у , однаго рабочаго человъка, и которому только и совътовали его , отоблать, выявчень быль вы шри недвян, и оть вальсаму сего э, выпакь отколокь кости изъ большаго нальца, которой сильнымъ уже образомъ страдаль отв ногтоблы.

"Скольно морошикь ленорошов, продолжаеть онь, етольно же эмилиныхь, накь и сіе, существуєть елинственно въ сочиненіяхь эмевникь; я читаль оны записки лидемическія, глё содержится перечень о врачеваніи женевівою учиненномь. Потомь читаль я страно, ствіл дона перистич, и быль поражень дъйствілми онаго. Сам'в я оставь составлять сей вальсамь. Ибноторые бълые люди подали за случай къ употребленію его; и оный всегда сопровождаемь быль уепъ-

драхмв на день, разпущенной вы полуштоф воды, кы коей прибавлялы оны по ныскольку ложекы уксусу сы сахаромы, для подправления остраго вкуса оной. Янтоновы огонь совершенно оты нее разбивался, безывсякаго другаго лыкарства. Оны присовокупилы, что сте лыкарство было присовытовано ему однимы весыма знающимы Врачемы, который всегда пользовался, оты онаго дыйствими толико спасительными противу антонова огня.)

КакЪ скоро заразившаяся антоновым догнем давть от ставится от в частей здоровых в, то рана етя ставиов новится нарывною раною обыкновенною, и оную пользовать надобно такъ какъ мы скажем в ниже в в доровых в главы, в в котором в о нарывных дранах или всередах дородатается.

(Чтожъ

у жом в желаемым в. По прозвот моей, вы жотите дань ему новое 3) быте. Но всяк в ли онажеть и в сему нужное внименте? Я св моей 3) стороны желаю того для пользы челов в челов в сомивита надле- 3) жало бы ему занимать свое месте в в лавиаж в Аптенарских в, пред- 3) почтишельно пред в столь многими мазлии, кои в в оных в находите- 3) ся, и проч. 13

ВБ то время вкакъ мною получено было сте письмо, я велвяв толькочто приложить шпанскія мужи одному больному, одержимому весьма тижкою нереною линорадною. При первом в перевязывании примечена была воры заражения антоновымо огнемь, величиною вы рублевинь; при второмы перевязывании усмощрены были двб други, изб коик в одна пристиралясь на три персия въ широту и на чет пре дюйма въ длину: я попроснав тотачасъ Г. Авбаща Динуарта, прислать по мий вальсаму женевіевы и вельяв употреблять его Лънгрю по примъру. женевиевы, которой я ему изъ: яенияв. Вв двадцать четыре часа, двв коры зараженныя антоновымь отнемь пропали; а на шрешій день и послёдняя, нопорая была больше другикъ, опетака выветь съ пропускною бумагою, оную покрывавшею. Отъ сего вальсема произошла еще и та польза, что раны, кои, какъ то веякъ легно разсудища можетъ, были суки и синеваты, мало по малу начали увлажняться, и принали патть благопрівтный, жань чно на прешій день доставили онь нагносніе обильнос. Во всеовщей таклий тома V, при словь Едльсамь женестебь видыть можно Рецеять, способь кань употреблать сто, и различныя больэни, выноижь онь поиззань.

(Чтожь касается до четвертаго образа, коимь оканчивается соспаление наружное, а именно, до желеака, коему наиболье подвержены бывають люди мокротные, цынготные, худосотные, страждуще золотухого и проч., то надлежить совытоваться сь § и глав. 47 Тома III.)

\$ 4.

О Ранахъ.

Подъ именемъ раны разумвется раздвление Свойстве недавно савланное на частяхъ мягкихъ, твломъ колю-чимъ, острымъ или пробивающимъ, съ изліяниемъ кро-гл. Свойство раны есть то, чтобы была она кровавая и педавняя или сввжая; иначе же не будетъ то рана, но еередъ, о которомъ мы говорить станемъ въ у 7, сей главы. И такъ, раздиръ, разрвзъ, уязвление и всякое наконецъ отверстве, учиненное на кожъ, въ какой бы то части тъла и какимъ бы то инструментомъ ни было, есть рана.

Элны больше или меньше опасны бывають отно- что дъсительно к' в инструменту, которымь онь сделаны, на больше
къ самой силъ, съ какою оный инструменть быль заны больше
пущень или направлень; къ величинъ, твердости, опасными.
мягкости, и проч., пораненой части; наконецъ къ качеству и количеству истекающей влаги. И такъ есть
раны, коихъ послъдствиемъ неминуемымъ бываетъ
смерть, когда напротивъ того находятся други изъ
нихъ, кои никакото пользования не требуютъ.

Раны необходимо смершельныя сущь тв, кон раны смер. Авлающся вь мозжетку (cerebellum), вь мозгу кост- шельныя? помо пр долговатомо и раны вь сердив, есшьли оныя кошя мало глубоки будуть: поелику бывали шакте случаи, что сердце получало нъкоторое легкое пораженте, но больные оть оных принадковьеще не умирали.

A 1 2

Tay-

Man nound beeraa emepnicabubia.

Глубоків раны на легких, петени, желудкі, кишкахі, селезенкі, железі пригожемненой (рапстеаз), брыжжейкі, ві маткі, пузырі, жилі біющейся натальственной, и вообще на всіхі больших в сосудахі, бывають наще всего, не говоря однакожь чтобы всегда смертельны.

Очень опа-

Раны въ еосудах жильных легкія бывають не опасны, какъ скоро они не очень велики; но могуть слыпыся опасными, ежели их в запустишь. Какъ то сще глубокія раны въ груди или подтеревкь; въ толстых жилах тувствительных и въ сухих жилах наподобіе плевы распяленых (аропечто ес.)

Рана, которая сама по себь не опасна, можеть следаться смертельною по ея следствимь: какъ то по боли болье или менье чувствительной, по жару болье или менье сильному, по судорогамо, икоть и проч.

Изъ всего пеперь сказаннаго явствуеть, что пользование рано требуеть часто искусства и познаний, каковых в не должно надълться найти кромъ какъ въ Лъкаръ довольно опытномъ. Почему мы и намърены въ семъ параграфъ предложить единственно о тъхъ вспоможениях в, какия прилично употреблять противу рано легких в, или не очень важных в, и ограничимъ себя показанием того, что надлежить дълать въ ранах в тяжелых в, во ожидании пособия отъ Лъкаря, безъ котораго обойтиться тогда не можно.

Пользованте ранъ.

Нътъ ни одного пользованія во врачебной наукъ, въ которомъ бы ошибались болье, какъ въ пользованіи ранъ. Вст вообще думають, что извъстныя растийя, извъстныя мази и пластыри содержать въ себъ чудотворную силу къ врачеванію и закрытію ранъ. Многіє воображають себъ, что не льзя никакъ и выльчить ранъ безъ прикладыванія оныхъ.

Однакож в заподлинно извъстно, что всякое на- кв чему ружное лъкарство, какое бы оно ни было, способ мази и етвует къ залъчентю раны не иначе, какъ содержа- пластыри ніем в большых в частей в чистоть и предохранент- въ лъченіа ем в оных в отв внъшняго воздуха; равным в образом въ сем в случат успъх в имъть можно от прикладыватия сухой корпіи не хуже, какъ и от других в составов в самых в пышных в: что самое впрочем в предостерегает в от большей части послъдствій, каковым в нодвергают в обыкновенно лъкарства. (Слъдовательно вст похвалы, приносимыя оному ужасному множеству мазей, коими пренаполнена матерія лъкарственная, суть совершенное шарлатанство.)

Сте разсужденте можеть равномърно обращено лънарства быть и на лъкарства внутренитя. Въ лъченти ранб внутренитя полезны они тогда, когда способствують къ предусемъ сапреждентю жара и къ отдаленто всъхъ причинъ, мо-момъ слутущихъ умедлить или помъщать дъйствтю натуры: чать поелику она одна врачуетъ раны. Искусство же не тура врвиное что сдълать можеть, какъ токмо отдалить пре-чуетъ нятетвтя, могущта сопротивляться излъченто, и при-раны, весть оныя части въ положенте самое благопртятнъй шее для усилти натуры.

Послѣ таковых в кратких в разсужденій, мы наифрены взойти в в подробность пользованія ранд, и станем в стараться показать истинный путь, по которому слѣдовать надобно, дабы способствовать к в удобныйшему излѣченію оных в.

члень І.

Наружным вспоможенія противу рань.

Первое вниманіе, какое должно имѣть, когда кто первоевнинибудь будеть ранень, есть то, чтобы разсмотрѣть, маніе, каше находится ли вь ранв какого нибудь тыла ностожно имѣть

въ семъ педваова-RIN.

ронняго, какъ то занозы, камня, сеинцу, стекла, грязи, лоскуточков в какой матеріи и проч. По чему и надобно, ежели возможно, вынущь оныя, и вымышь рану прежде нежели се перевяжень. Но какъ скоро слабость больнаго, сильное кровотехение, и проч. препятствують вытащению сихь тель, и могуть сопровождаться опасными следствіями, то надлежить оставишь их въ ранв, и для извлечения оных дождашься, пока онъ не будеть въ состояни перенести онерацію въ семь случав нужную, но которая однимъ шолько Авкарем в двлана бышь можеш в.

Когда рана бываешь на какой нибудь впадинъ тъла, какъ- то на груди, на брюхв и проч., или когда большой сосудь кровяной разорвань будешь, то надлежить тотчась призвать искуснаго Лькаря; а иначе больной останется въ опасности лишентя жизни.

Канъ подолжно, дабы ocmanoкогда оно бываетЪ

Hoe.

Однакожъ иногда кровотестие бываеть столь сильступать ное, что естьли его не остановить немедленно, то больной можеть умереть, даже и прежде прибытія Авкаря, как В бы близко оный ни находился. В в таком в вить кро- случат всякой изъ предстоящих вышь можеть полезветечение, нымь. Ежели рана будеть на рукв, на ногв или на лядвев, шо можно остановить кровь савланјем в крепочень силь. каго перевязанія не много повыше раны.

Самый лучшій способ в есть взять широкую пол-Перевязка. вязку, и обвишь оную около шой часши, но не очень туго синягивах, дабы можно было пропустыть посля, между оною часшію и подвязкою, небольшую скалочку деревянную, которую должно расположить почти также какЪ и тв, которыми утверждають товары на возахв: тогда поворачивать ее надобно. до техв поръ. пока не уймется кровь; однакожь надлежить имъщь осторожность, чтобы не держать очень долгое время оной части стянутою, поколику слишком в сильное

давление могло бы тамъ причинить воспаление, а сте нереродиться въ антоново огонь.

Когда раненая часть будеть такая, что на ней не можно сделать перевязки, нами теперь упомянутой, то надлежить испытать другіе способы квунятью крови, какв то лекарства стягивающія, вязательныя и проч. Должно намочить полотенцо вв раз- Распущентущенно мов купорось синемо, вв водь стягивающей ный нупорось синемо, вв водь стягивающей рось синій. Вода стягивающих, но употреблять крыпкой спирто.

Иные совытують употреблять дубовую губку губка дуили на дубовомь пны растущій грибо предпочтительно бовія.
всымь прочимь стягивающимо лекарствамо, да и подлинно заслуживаеть она великую похвалу. Достать
стю губку легко можно, и вы каждомы бы домы для
случаю хранить ее надлежало. Кусочикы ея кладуты
на рану, покрывають оной довольнымы количествомы
корпіи и поверыхы того дылають перевязку, такы
чтобы все оное было не очень крыко стянуто.

(Г. Juccomo, въ своемъ напоминовенти или увъщанти ко народу (avis au peuple) совътуетъ набирать, приготовлять и прикладывать губку стю слъдующимъ образомъ.

эт Снимай дубовую губку осенью, котда корошая спосовъ погода приближается къ копцу. Она есть нъкоторой накъ ее набирать, родъ гриба или нароста находящагося на коръ дубо-приготовъ приготовъ накъ ее набирать, приготовъ накъ на предста-лять и принядать валяющихся одна за другою. 1. Корка или кожа, котора не на принядать вать.

эт рую глазомъ видъть можно. 2. Часть слъдующая не на принядать на просредственно за коркою, и которая есть самая у лучшая изъ всъхъ: ее быють кръпко молотомъ до на требуеть. Ее приготовлентя, коихъ она требуеть. Ее приготовлентя, коихъ она требуеть. Ее

"взять надобно кусочикъ потребной величины и при-,, ложить прямо на то отверстве, изъ котораго те-.. четь кровь: она стягиваеть сосуды вывств когда .. ихъ и запираетъ; одерживаетъ крива, и спадываетъ "обыкновенно по прошествии двухь сутокъ. Третия , часть, прикосновенная кЪ сей второй, можетъ та-, кож в служить к в унятію крови сосудово малыхв. Чтож в принадлежить до четвертой, то оная истолчена "будучи въ порошокъ, служитъ для сего же самаго "употребленія.,,

мореная губка.

Ежели не льзя достать дубовой губки, то на мъсто оной можно употребить кусочикъ морской губки: она прикладывается тъмъ же самымъ образомъ и явиствие имветь почти такое же.)

спиршовъ. настиоенъ M HPOY.

Хошя кръпкие спирты, настойки, бальсамы разотъ крви-горятающие и могуть употребляемы быть къ унятию кровотегений, когда они бывають чрезмырно сильныя; однакожъ существа сін ни мало не годятся въ иное бальеамовъ время; ибо, не токмо чтобы способствовать зальченію, напрошивъ того оное останавливають и неръдко превращають рану простую въ вередо или рану нарывную. Многіе воображають себъ, что натуральные бальсамы, поколику стущають они крось, и какъ кажешся заживляють чрезъ що раны, должны ихъ выльчивать; но сте есть прямое заблужденте. Правда, унимають они кровь текущую, запягивая отверстія сосудова; но при всемъ томъ пренятетвують скорому залвченію, делая больныя части мозольными.

> (Другое неулобство бальсамов натуральных в и аругих в раноцвлительных в лекарств в толико похвалами превозносимыхЪ, есть то, что внутреннее употребление оных в придаеть жаго, которой очень нужно разбивать въ ранах визвъстной обширности.

СамымЪ лучшимЪ лекарствомв противу ран 3 ле что накихв, не простирающихся далве кожи, почитается 4.610 двклейкій пластырь обыкновенный; поедику онъ содер-рачы легжа оба края раны сближенными другь къ другу, пре-кой; пятствуеть воздуху проникать туда; воть все то, что въ такомъ случав потребно.

Какъ скоро рана будетъ глубокая, то не по Для раны лезно держащь края оной совершенно сближенными; глубоков. потому что отв задерживанія крови во внутренности, самая рана располагается къ нагноснію. Въ семъ нослыднемь случав благоразумные всего положить вы рану немного корпіи; но не должно оной быть въ великомъ количествъ, ниже составлять комокъ жесткой; ибо тогда бы она могла быть вредною. Корпио покрывать надобно компрессами обмоченными въ деревянном в маслв, или на которыя намазань будеть пластырь зеленый или бальсамо Женевгево, и послв все порядочно перевязками упвердить должно.

Мы не станемь заниматься описантемь разныхь перевязока пригодных для рана различных частей тьла: зараваго сиысла довольно къпридуманію той, которая лучше других в приличествуеть, вы томы или въ другомъ случав. Сверьхъже того описантя сего рода не легко можно понимать или поступать по ОнымЪ

Первую перевязку оставить должно по малой мъ- Снолько ръ на двое су поль. После того оная переменяется, оставань и корпія кладешся опяшь шакв какв и вв первомв ся доль случав. Ежели часть по пребностей первой перевязки жна перпристанеть такь, что не можно ее отнять безь вая переупрудненія или причиненія вреда больному, то надлежить оную оставить, и на нее положить новую корпію, обмочивши въ масль изв сладкаго миндалю: иоо сте масло напишаешь часть корпти оставшуюся,

Jone IV.

MM

и савлаеть оную удобною къ отнятию, въ перевязываніи посльдующемь. Посль того рану должно перевязывать дважды в сутки таким же точно образомъ до тъхъ поръ, пока оная не будетъ выльчена (3).

TIMO HRAZE гда рана тлубоно внушрь HPOXOzamb.

(Ежели рана глубоко проходить въ какую нижить дъ будь пустоту тъла, то надобно при каждомъ перевязываніи впускать в оную не большое количество бальсаму Женевгевв, потирать имъ части смежныя, и дать принять его больному около двух в драхм в въ отваръ телячьемъ или цыплячьемъ.)

Вачильная мазь желman.

Ть, кои имъють чрезвычайную страсть къ мазямб или пласты рямб, могуть, когда рана будеть легкая, пользовать ее базильною мазыю желтою.

Среденва сгонящь 60.

Когда она будеть ноздревата, то есть, когда нарадикое мя- стаеть дикое мясо, то оное сгонять должно жжеными квасцами, или ртутью осадотною красною в в порошкь (mercurius pracipitatus ruber), посыпая концомЪ ножевымь, или смъщавши съ мазаю.

КоглажЪ рана бываетъ очень соспаленного, то Tmo Haдобно ат- самым в лучшим в лекарством в почитается катаплазма из в мякиша клібнаго и молока, размягченная свіжим в гда рана будеть вы деревянным в маслом в или сливотным в: она прикладысильномЪ эоспаленіи-

Сколько разЪ перевязыва шь должно въ · YEHH

(в) Не часто ян будеть дълать стольно перевязываній : мало трогать надобно раны свъжів или недавнія, сказываеть Г. Лістодь, и самый опышь довольно научиль, что перевязыванія рань частыя, такь какь корпів и внопівки, внутрь ранд вкладываемых, ногворых Лонари еще понынв употреблякть, должны токмо предолжать самое зальчение оной. Précis de Medecine pratique, Tome II, page и 11. Сей снаряя в оставляють на целыя сутки, говорить господин? Тиссомь, ногда раны темь скорбе вылачивающся, чемь реже ихв перевязыванть. Avis ам peuple Tone II, раде 128. Наставленіямь сихь двухь Авторовь строго сабдующь самые лучшіе Абкари.

Надобно однакож в согласишься въ томв, что ногда рана очень гисится, и погда летние жары бывають очень сильные, то нужне неревазывань два раза въ сущин для предупреждения антонова огна:

вается вивото пластыря, и перемвнять ее долиновия и раза два или при въ супки.

(Таковыя катаплазмы налобно перемёнять не прикасаясь до раны. Ибо часто находятся такте больные; у которых в кожа бывает в столь нежна, что отъ катаплазмо, дълаемыхъ изъ деревяннаго масла, даже и съ молокомо, приключается имъ рожа (егу/зpelas); вЪ подобныхЪ случаяхЪ надобно ограничить себя одними котаплазмами изъ мякиша хлёбнаго сб водого. Катаплазмы жирныя и масляныя бывають та-катапазы кожь вредны во всяких в ранах в съ воспалением в по-мы изъ колику онв запворяють поры или скважинки, удержи- жазбыто ж вають испарину и увеличивають задхновение. Многие воды. весьма искусные Лекари не употребляють никогда Случан, въ Аругих в катаплазмв, кром в как в из в мяки ша хлавного они заслусъ волою; но ихъ надобно или перемънять чаше, или жизають что еще лучше, покрывать тафтою, или весьма тон. предпочкимъ полошномъ навощеннымъ, которое служитъ къ теніе сохранентю чрезъ долгое время влажности въ подоб-ми, кои ных в катаплазмах ?

ЧЛЕНЪ Ц.

Внутреннія вспоможенія противу ранк.

Когда рана будеть велика такь, что имбешь строгая случай опасапься воспаленія, то больному надобно со- дізта въ держать діэту строгую, и не позволять ему ни мясь, большихь. ни напишковъ кръпкихъ, словомъ ничего могущаго разгорячинь.

Ежели онъ сложения многокровного, и чрезъ ра-случай кому потеряеть крови очень мало, то надобно ему гда надоботворить кровь; а когда припадки будуть усильные, то но пуи повторить кровопускание. Но въ такомъ случав, когда провь. больной весьма ослабветь по вричинь великаго множества прови, коей лишится онъ чрезъ рану, опасно

M M 2

01280-

предъ тва

дълаютися нэЪ маки-

ша сЪ мо= лономЪ.

отворять кровь, хотябы и жаръ къ тому присоединился. Ибо не должно никогла слишком в истошевать натуры: а благонадежные всегда дать ей опражать бользнь по собственному ея произволентю, нежели ошнимащь у нее силу, изнуряя больнаго выпоражниваніями срезмвриыми.

Важность спокойemais mr-

Потребно, чтобы раненые содержаны были совершенно спокойными и ничьмъ неотягощеными; ибо все могущее возмушить духв, возбудить страсти, какв що людушевнаго бовз, гивев, страхв, чрезмврная радость, и проч., для них весьма опасно. Болье же всего должны они воздерживаться от забавъ любовныхъ.

Слабитель Надлежить содержать желудокь их в в чистоть помощёю промывании слабительных, или раствний прохладительныхв, какв то петеныхв яблокв, терносливу, спинату и проч.

\$ 5.

О обжогах Б.

членъ І.

Наружныя вспоможенія противу обжогь:

Легкія обжоги, бывающія на поверыхности ко-Korza of ж га быжи, требують обыкновенно того, чтобы держать Baemb no верых во- больную часть передь огнемь довольное время, терешь оную солью, или приложить кЪ ней компрессъ M.H. обмоченной въ спиртв или въ водкв.

Когда отъ жается ра M2 H2 H0-水古。

Но когда обжога булеть столько велика, что оной саво савлаеть рану на кожв, то должно лвчить ее бальсамом в Женевіевв, или мазью мястительною, и слегка сущительного, называемою обыкновенно мазьго вогцаного Ту рие рового. Можно шакожъ прибавить къ ней равное количество свѣжаго оливковаго масла: мазъ сїя намазывается на тонь кой пряночь и прикладывается на обожженое изсто.

Ежели не льзя скоро достать сей мази вощаной, то можно употреблять и личный белок в избитый съ равным в количеством в свъжаго масла оливковаео; стя емьсь весьма изрядно пользуеть до тьх порь, пока не сыщень Јурчерогой мази.

(Яичный бълокЪ избишый ев двумя ложками хо-япчий рошаго оливноваго масла есть одно изв самых в луч-бишый съ ших в лекарство, какія только можно употреблять деревянпрошиву облогд. Я видель оть него столь хорошія ньыв мадъйствія въ продолженіи многихь льть, что почти слемь. оное одно употребляю нынь. Оно имъетъ то преимущество, что находится вездъ, и тотчасъ приготовлено быть можеть; а сте самое весьма важно вь обжогахд, кои тъмъ меньше бывають упорны, чъмъ скорве прикладывается лекарство.

Аругое лекарство не меньше важное, и коего Соль щеуспъхи ежедневно умножающся, есшь жидкая солз шаныриа до щелоко - нашаты рная (sal alcali volatile fluor), коея прикладыванием в обязаны мы знаменитому Г. Сажу, Члену Королевской Академіи наукЪ. НъшЪ ничего легче, какЪ употребление сего лекаретва.

Когда обжога не сопровождаема бываетъ волдырями, то довольно обмочить компрессы вЪкръпкой соли щелоко - нашаты рной, и прикладывать их в на часть обожженую. Спустя восемь или десять минуть не бываеть болье ни боли, ниже следовь обжоги.

Но какъ скоро она сопровождается пузырями или волдырями, то надобно прежде всего проръзать еїн пузыри, и обмочивъ компрессы въсмъси изъ воды н сели щелоко - нашаты рной, полагая по дв в драхмы сей жидкости на одинъ фунтъ воды, прикладывать ихъ на часть обожженую: паковая перевязка перемъняется три раза въ сутки.)

Когда обжога будеть глубока, послё двужь или Чито надоба но дълать, трехъ первыхъ дней, то надлежить оную льчить жегиа обжога глу. бальсамомо Женевтево, или желтого мазыю вазильного и мазью вощаною Турнеровою, смещавши их в вывств по бока: равной долв.

Очень ве-AMK2.

Когда обжога будеть очень велика и такъ воспалена, что можно опасаться антонова огня или ометтвенія той части, то для предупрежденія столь былственных в припадков в, надобно употреблять тв же самыя средства, какія совъщовали мы противу прочих в воспаленій сильных В. Смотри стран. 354 и следующ. сего Тома.

ЧЛЕНЪ П

Внутреннія вспоможенія противу обжогь.

Когда обmora 6yжеть опасemporas. Кровопусканіе, слабитель-·BIdW

ВЪ нарочито великихъ обжогахо, сопровожлаемых в жаромо и другими припадками, не довольно дерная. Діэта жаться одних в токмо лікарство наружных в, нами теперь предписанных в: а надобно въ таком в случат вельть наблюдать діэту строгую, и приказать больнему пишь въ довольномъ количествъ декокты легкіе и мок ротожидительные. Надлежить пустить ему кровь, и очистинь его слабительны ив.

Когда угрожаетъ она антоновымЪ огнемЪ.

Но какЪ скоро обожженая часть посинветъ, сдвлается черною и представляеть всв признаки антонова огня, то надлежить очень часто припаривать оную канфарнымв спиртомв теплымв, настойкою смирненного (tinetura myriba) и другими лекарствами гнилости противу дайствующими, мышая ихв св крыпкимъ декоктомв изъ хины. Въ семъ случав дають еще и хину внутренно, а притомъ и поить должно больнаго пишіями крыпишельными, каковыя предписаны въ член. III, § 3 сей главы.

Жина.

КакЪ примърЪ научаетъ лучше нежели правила, то я намъренъ теперь описать пользование обжоги са-MOM

мой опаснъйшей изъ всъхъ, какіх токмо когда либо встрвчались мнъ въ моей практикъ.

Одинъ человъкъ среднихъ лътъ, здъроваго тъло наблюдевложенія, упаль въ большой чанъ наполненной кипаткомъ, и обварилъ себъ ужаснымъ образомъ половину
тъла. Какъ былъ онъ въ одеждъ, то обжога надълала
глубокія раны въ нъкоторыхъ частяхъ, прежде нежели успъли снять съ него одежду. Первые два дни
принаривали, и очень часто, обожженыя части смъсью смъсь нъъ
изб известной воды съ деревлинымъ масломъ, которая воды измлегительная мазъ весьма пригодна противу обжого недавнихъ.

На третій день, въ которой я быль призвань, сломь, имъль онь сильный жарб и страдаль запоромб; в вельльему пустить кровь; предписаль промывательное млесительное, и на вев обожженыя части вельль прикладывать катаплазму изъ мякиша хльбнаев сб молокомб, услажденную свъжимь коровьимб масломб, дабы чрезь то самое уменьшить безмърный жарь и самое воспаление. А какъ жарб пребываль въ своей силь, то пустили ему кровь вторично, и я присовътоваль ему пищеупот реблене строгое и прохладительное. Сверьхъ того предписаль в смвсь солкую, по малому приему селитры, и каж-смъсь солдой день ставили ему промывание млегительное.

Какъ скоро соспаление опало, то перевязали обожженыя мъста лека ретволо разбивающи мо вязкость, составленным в извесиней мази съ мазыю базильного желтого; но какъ на олых в оказалось нъсколько патенъ черных в, то я вельлы слегка их в сръзывать; послъ чего покапали на сръзывать сти части настойки смириенной, и для воспрепят ніс. ствованія тому, чтобы они не разпространились, больной принималь хину. Посредствомы такого поль-хине зованія сей человькы такъ оправился чрезь три недь-

ли, что въ состояни быль отправлять свою должность.

(Пользование сте новторяль я съ успёхомъ равномерно скорымъ надъ однимъ человекомъ, коему на объ ноги попала водка во время двоентя оной, и которая загорелась.)

\$ 6.

б убояхъ или багровыхъ пятнахъ на тълъ отъ ушибу:

убои или багровых пятия от ушибу, имъють обыкновенно послъдствія важньйшія, нежели раны; ибо какь опасность оныхь не вдругь открывается, то и случается часто, что ихь запускають. Впрочемь безполезное бы было дъло, описывать припадокь столько общій; по чему мы и намърены приступить тотчаєв кь способу, какь его пользовать.

членъ І.

Пользование убоевь простыхъ.

ВЪ убоях в легких в, довольно бывает в припари Moras вать ушибенную часть теплым уксусомв, кв коему y604 6y gemb gerприбавлять по немногу водки или руму, что слу-MON. чится, и держать постоянно на той части компресприпария сы намоченные въ сей смъси. Одна доля уксусу, польгая на шесть или на восемь частей настою изъ коннаЪ на ст йни скаго щевемю (scerdium vulgare) и зверобою, почитает-Монскаго ся самою пригоднейшею въ семъ случат принаркою. чесноку. выв эв тро Сей способъ приличествуеть лучше, нежели тереть убитую тасть водкого, или Аругими спиртами горябою и уксусу. гими, кои въ подобномъ случав многте обыкновенно употребляющъ.

Коровій на
крестьяне в в н в которых в увздах в им в ю п в обывозв вмтсто на па.

я часто видаль употребленіе сей латам на за противу больших в збосов, причиненных в ушибами, па те-

вінии, толчками, и проч., и всегда примъчаль отъ нее хорошія лійствія.

Внутреннія вспоможенія противу убоевь простыхь.

Когда удара будеть жестокой, то сихв однихъ средствъ не довольно; а надлежитъ немедленно удоръ бупусшить кровь больному, и предписать ему діэту леть силь пристойную: яства его должны быть легкія и про-ный, то хла лительныя.

Пишье употреблять онъ можеть легкое и свойетва отворяющаго, какъ-то сыворотку подслащенную медомв, или отварг изв тамару Яндвискаго (tamarindi) или ятменю; сыворотку съвинымо камнемо, и проч.; но ньшь лучшаго пишья прошиву убоевд, как в уксомедв. уксомедь.

Ушибенную часть надобно припаривать припаркого уксусного, такъ какъ сказывали мы на страницъ предвидущей. Сверьх в того положить должно ката. Катаназа плазму изъ мякиша хлебнаго, изъ цвътовъ самбуко- ма изъмя. еых и ромашки, въ равной части воды съ уксусомо. наго съ Стя катаплазма пригодна бываеть особенно тогла, цвттемъ когда убой сопровождается раного. Ее должно перемь- самбунонять раза три или четыре въ сутки.

вымъ , ромашисю .

(Часто послъ удару сильнаго, произшедшаго унсуссыв от в надентя, или всякаго инаго случая, больной край-что надобне ственень бываеть и лишается чувствь; но над-но двлять лежить весьма остерегаться оть того, чтобы его ногла боль. трясти или раскачивать вЪ намъренти привести вЪ ной поме. чувство. Ибо какъ въ семъ случав всегда опасаться ства отъ должно изліянія в в голови, в в грудь или подтеревол в, яви ты то оное потрясение могло бы умертвить его, увели-убою. Тивая самое изліяніе.

И такъ слъдовательно не теряя терпънія стноже ежели онъ бываетъ безъ смысла и чувствъ, не на ст. іс. добно ни двигать его, ниже давать ему вина, крвпких в спиртоев, и ничего могущаго оживлять его; но-Jomo IV. HH СЛИ-

елику вст таковыя средства были бы для него гибелье скагія, ны. Повторяемыя по усилію припадковь кровопусканія, припарки, припарки, катаплазмы, и питья легкія и удобоот- мы и проч. воряющія, недавно предписанныя, въ такомъ случать достаточны бывають.)

членъ п.

Пользование убоевь сопряженных в съ переломлением в костей и съ потерянием или безъ потеряния вещества.

КакЪ строенте сосудово совершенно повреждаемо бываетъ въ сильныхъ уболхо, то и следуетъ изъ сето знатное потерянте вещества, производящее сное вую рану весьма трудную къ залечентю. Какъ скоро кость бываетъ разбита, то раны залечить не льзя, пока не сделается раздроблентя кости (exfoliatio), то есть пока часть поврежденной кости не отдежитея и не выйдетъ чрезъ рану.

Сте дъйствте натуры бываеть часто очень меделенное, и можеть даже требовать многихь льть, прежде нежели совершится. Откуда происходингь, что глоссых раны принимають нерыдко за признаки жиебы, и слыдственно такимь точно образомы ихь вользують, хотя вы самомы дыль не имыють они другой причины кромы толчка, которой претерпыла косты оть удара.

ВЪ такомЪ соетояни всякЪ приступаетъ къ больнымЪ съ своими совъщами: каждый человъкъ предлагаетъ лекаретво новое до тъхъ поръ, пока наконецъ рана растравленная, такъ сказать, кучею лекаретво противныхъ, не сдълается иногда совершению неизлъчимою.

рать кЪ врачеванию сего рода бользыей, состоить въ

воспренятетвовании тому, чтобы телосложение больнаго не пострадало или от жизни заключенной, которую онь ведеть, или оть лькарство противныхь, кои употребляеть.

(Следовашельно, ежели контузіл пли ударь перешибеть какую нибудь кость, не пробивши тела, или не причинивъ потерянтя вещества, то надлежишъ позвать немедленно Лькаря, который весьма остерегаться будеть отв того, чтобы делать разрезы, но постарается, напротивъ того, сближить концы разбитой кости, и привести их в в в естественное положение, въ коемъ содержать ихъ станетъкомпрессами и перевязками, какъ въ обыкновенныхъ переломленіях в простых в на весь оный снаря до припаривать принарик. станеть безпрестанно смысью изв уксуса и настойки конскаго тесноку и зевробого, предписанной выше на спраницъ 384 сего Тома.

Но какъ скоро убой произведеть проломо, на ко- въ случав тором в окажутся нъкоторые признаки антонова огня, пролома съ и при томъ раздробить кость, то Лекарь имветь на-вымь огчать опдъленіем в мьста зараженнаго антоновым в оснем в немь. оть частей здоровых в; онь должень будеть савлать надрязынадръзыванія глубокія, и не пренебречь ни единаго вспоможенія способствующаго къ разбитію опухоли или къ насновнію. Переломленія же или раздробленія пользовать имветь онь такь, какь мы станемь говорить ниже въ главь 54 сего Тома.)

Надобно ему имъть то вниманте, чтобы ничего не прикладывать на рану, кромв мазей простыхв, или бальсаму Женевгевд, намазавши на мягкое полотно и покрывии катаплазмами изб мякища кливано и молока, въ которомъ велитъ вскипятить цвъты ромашки. Сія катаплазма питаетъ больную часть, умягчаеть опую и содержить въ теплоть. Вспомощество-HH 2 BaH

ванная такимъ образомъ натура совершитъ изцъленте въ надлежащее время, извергая часть кости разбитой; послъ чего рана сама собою залъчится скоро.

\$ 7.

О нарывныхъ или гноевыхъ ранахъ.

Свойство таковых Б ран Бо

(Подъ именемь нарывной или гноевой раны (ulcerus) разумвется всякой разрывь связи вы частяхы мягкихь, сы истреблениемь вещества и истечениемь гноя. И такь всякой сирей, вскрытый самы по себв, или рукою Лъкаря, или кампемь прижигательнымо, всяки раны и язвы, всяки убои или ушибы сы потеряниемы вещества, принимають название гноевой или нарывной раны, какы скоро бываеть истечение материи снойной.)

членъ І.

Причины таковыхъ рань.

Упосвыл раны могуть происходить не токмо оть рань, убоево или ушибово, оть тирьево худо пользованныхь, но еще оть худаго состоянія мокроть, или оть такь называемаго телосложенія поврежденного; и вы семы послыднемы случат надобно весьма беречься оть того, чтобы лычить ихы поспышно: поелику лыченіе таковое могло бы сдылаться быдственнымы для больнаго.

Кто онымЪ подвержешы, Старики болье всего подвержены бывають гноесымо ранамо, равно какь и ть, кои не имьють тьлодвижения и питаются яствами грубыми.

чосто бы можно было ихъ предупреждать убавлежо бы ихъ ніемъ у себя нікоторых в яство, или произведеніемъ предупреждать.

чостеченія искусственнаго посредствомь фонтанелла, заволоки и проч.

Ути рача Гиосвая рана различествуеть отв простой раны въ томь, что она испускаеть влажность то свытлую и водяниеству-

ную, то возгривую и клейкую, а иногда блкую до такой еть оть степени, что разъблаеть и воспаляеть кожу: края оной простой бывають твердые и отвъсные къ основанию. Еще отличается она и тъмъ временемъ, сколько пребываеть.

ЧЛЕНЪ Ц.

Пользование гноевыхъ рань.

Потребно не мало знанія и опытности кЪ тому, трудно чтобы опредълить, когда гноевую рану можно лечить, и опредвкогда надобно ее оставить без врачеванія. Всякой гда сію рас вообще вередв, зависящий отв телосложения поврежну дол. деннаго, долженъ бышь содержанъ, по крайней мъръ жно залъ-A) твхъ поръ, пока оное телосложение не поправишся чивать, н чрезъ пищенпотребление, и пока не будеть казаться добно ее расположенным в къ излъчению самимъ собою.

Гносомя раны, кои бывають последствимь замх канія ралихоралокв, или других в бользней острых в или опасных в, ны квможно льчинь со всякою безопасностію, когда пройлеть нъсколько времени оть выздоровления больнаго: ибо не должно приступать кЪ таковому леченію очень рано, ниже прежде нежели приготовинь къ тому больного систительными и пищеупот реблением пристойнымь. Вереды, приключающиеся оть ранд или ушивова худо пользованных в, могуть вообще быть выльчиваемы, тполько бы твлосложение было крыпкое. Надобно непременно лечить ихв, и стараться объ избавлении от в нихъ больнато какъ можно скорве, когла они разслабляють телосложение и оное изнуряють лихорадкого внутреннего.

Когда гноевыя раны сопровождають бользни хроните-которыя скіл или продолжительныя, или приключаются во вре- должно квмя оных в бользней, то не льзя их в затворять или предостольчить иначе, как в съ величаншею осторожности. рожно-

cmile.

жени рана способствуеть къ здоровью больвстив ат- наго, то от в чего бы оная ни происходила, льчить не должие. чить ее не надобно.)

Желательно, дабы всякЪ, кто по нещастію будетЪ имѣть подобныя раны, а особливо старые люди, размыслили строго о совѣтахЪ, отъ насъ имъ теперь преподаваемыхЪ. Ибо я имѣлъ нещастіе видѣть очень много такихъ людей, которые, потому что оставляли сіе безъ всякаго вниманія, губили самихъ себя, котя они старались выхвалять и награждали щедро тѣхъ, коихъ бы паче долженствовали почитать своими убійцами.

Внутреннія вспоможенія противу тноевых рань.

Afoma.

Самая пристойнъйшая къ ускорентю излъчентя сихъ ранд діэта состоить въ томъ, чтобы лишить себя яство пряныхо, соленыхъ, очень вкусно приправленныхъ, кръпкихо напитково и убавить количество мяса, какое кто употребляль обыкновенно.

Потребно, чтобы больной очистиль себь желудокъ растьниями прохладительными и слабительными и сывороткого посль пахтанья, подслащенного медомб и проч.; сверьхъ того долженъ онъ быть весель и имъть столько телодвижения, сколько его силы могутъ ему дозволить.

Лажность понод для рань на могажь.

(Когда гноевыя раны бывають на ногахь, что весьма обыкновенно случается, то очень нужно, говорить Г. Јиссоть, равно какь и для всякихь рань на техь же самыхь частяхь, чтобы ходить мало, и не стоять никогда вы то время, какь не ходить. Вы семь-то случаь желаю я, дабы всякы имыщий ныкоторую силу нады умомы простаго народа, не пренебрегалы ничего кы удостовырению онато вы необходимости, чтобы взять совершень ной

ной покой на несколько дней, и доказать ему, что не токмо сте время не пропадшее, а напрошивь того время вы жизни его есть наилучте употребленное. Неральне вы такомы случаь перемыняеть раны самыя легчайта вы еноесыя, а гноесыя раны не самыя опасных вы вереды неизлычтые. Мны случалось видыть раны на ногахы очень застарылыя, кои вылычша лись чрезы то единое средство, что больной лежалы вы постели, что прикладывали ему просто нысколько клочковы корпи, и покрывали рану и смежных сы нею части катаплазмою изб мяхиша ключаго сы павтами самбукосыми и водою.)

Вившній вспоможеній противу гносвых в рань.

(Какъ скоро гноевыя раны будуть недавнія, то есть, наявня когда онь возпосльдують посль какого нибудь гирья изъ цвъ тли ранд продлившихся, или худо пользованных , то новаго, довольно будеть промывать ихъ водого изъ цвътовъ бальсамъ самбуковых д, помазывать бальсамом д Женевіев д, и при женевіев кладывать къ нимъ компрессы или пропускную бумагу, напоенную симъ самымъ бальсамом д, какъ то мы предъ симъ говорили въ примъч. 2 на страницъ 366 сего Тома.)

Какъ скоро внутренность и края раны кажут- ртуть ся жесткими и мозольными, то надлежить посыпать осадочная туб дважды въ день ртутью осадочною красною прасная, базнявная (тегсития ртесірітатия тибет) и перевязать потомъ съ мазы, нады мазыю блильною желтою. Иногда такожъ нужно бы- ръзыванія. ваеть дълать надризыванія надь краями оныхъ помощію ланцета.

Не рыдко многіє испытывали превосходных дій- вода изо ствіх отб известковой воды ві пользованій гносвых вестновахо ранд упорных в. Надлежить оную употреблять такв, какі мы совытовали проттву песка и камия, смотри § 14, главы 24, Тома II. CVXema.

Hphemb.

Ученый Г. Ягытта, приятель мой, весьма совъ туеть сулему распущенную вь водкв противу гноевых в ранд упорных в и свойства дурнаго. Я не ръдко испыталь хорошія двиствія оть того, когда она бываеть употребляема по предписантю сего ученаго Врача. Пріемь лакарства сего полагается въ обыкновенную столовую ложку поутру и ввечеру, и промывають имъ рану дважды и прижды на день. Въ одномъ письмв, которое онв писаль ко мнв не за лолго предв смершію своею, уведомляль меня, что онь следаль наблюдение, буднобы, естьли промывать станешь гноевыя раны диссолюціею втрое сплыныйшею, лакарство сте становится от того гораздо двиствительные.

Те можно апирак. **Т**ИОЕ ВОЙ раны ета рой не замвнивъ оной стверстіемЪ muranie учиненжымЪ.

f Когла гноевая рана продолжалась долгое время, що весьма опасно засушивань ее; да и не иначе сте дъдань должно, как в замъняя таковому выпоражниванию, учинившемуся почти натуральнымъ, слъланіемъ фонтанелла на плечъ или на ногъ. Ибо ежедневно видимъ мы внезапныя смерши, или бользни жестокія, а часто и нечрезъ при- излъчимыя, приключающінся посль того, когда вдругъ остановлены будуть сти истечентя, продолжавшияся съ давняго времени; и когда какой нибудь площадной лькарь объщаеть выльчинь вы малое число дней резастарълую, то доказываеть, что онь есть невъжда опасный, который, естьли бы имвав успъхв. то оказалъ бы услугу смертоносную.

BOXESHW .. нои были бы несявдempiama. оныхъ безъ таосторож-Mocmu.

Улушье, облороки, паралить бывають обыкновенно последствіями лекарство внут рь вгоняющихо и кренких в прикладываемых в на гносвыя раны. сущительных в Самый опыть доказаль, что раны обычайныя, кои высыхали сами собою, а наипаче у стариковъ, прелковой пред- выщали смершь скорую. Но как в не возможно предупредить всегда таковаго осущенія, и что, когда оно приприключится однажды, больной бываеть почти всегда безь всякой надежды, то следовательно весьма нужно бы было присовытовать фонтанело, или отверстве с резо прижиганте, какъ скоро приметишь укореняющуюся рану у больнаго, а особливо у старика. Тогда становится оно предохранительнымъ средствомъ противу бользней нами теперь упомянутыхъ, и не редко противу смерти скоропостижной.

Как В скоро рана гноевая продолжается от в остроты цинготной, лишаевой, золотухи, рака или венеритеской, то всегда начинать должно съпредписан я лекарство свойственных в сим в бользням в, и кои предложены в в в главы 35; в в глав в 36; в в в главы 38; в в в главы 47. Тома III, и в в параграфах в 7 и 8, главы 49, сего IV Тома.

\$ 3.

О вередахъ или гноевыхъ ранахъ на подобле фистулы, и о различныхъ видахъ фистулъ.

(Подъименемъ фистулы разумъется всякая гноевая свойстве рана, какъ скоро оная едълается глубока и назушиста фистуль. (finuosus), когда отверстве имъетъ она узкое, а нутръ шпрокой: сверьхъ же того часто бываетъ она сопровожлаема мозолями и затвердълоетьми. Какъ всякая часть тъла можетъ служить мъстомъ пребыванія для ранб гноевых во можетъ служить мъстомъ пребыванія для ранб гноевых во можетъ служить могутъ также находиться во всъхъ частяхъ тъла. Но собственно фистулого называется гноевая рана или нарывб на за дниць, которая бользны извъстна подъ именемъ фистулы или нарыва въ нижней крайности за днепроходной кишки, и гноевая рана слезнаго мъха, извъстная подъ именемъ слезоточной фистулы, мли слезоточного протока. На аругихъ же частяхъ тъла фистулы называются просто ранами фистульными.

Сперва мы намърены говорить о ранах фиступъных, а потомъ перейдемъ къ обоимъ другимъ видамъ фистуло.)

Joma IV.

ЧЛЕНЪ

ЧЛЕНЪ Т.

О вередамы или гноевымы ранамы фистульнымы.

Сперація. Рідко можно бываеть вылічить гноевую рапу фистульную не доходя до операціи, которая состоить вы истребленіи всіжь частей мозольных в, посредствомы какого нибудь камня прижигательного, или срізывая оных совершенно бистуріємо, но какь операція сія можеть ділана быть единственно Лікаремь искуснымь, то и не нужно оную описывать.

діята. (Кромѣ таковых в средств в внѣшних в, надобно еще предписать больному діяту и лѣка рства внутренній, о коих в предложено в в членѣ П параграфа предвидущаго. Находятся також из в сих в послъдних в лѣка рства такія, коих в дъйствительность бывонсній во вает в несомнительна в в лѣченій гноевых валь фистульных в. Беарнѣ, однѣ вылѣчивали многоразличныя фистулы, даже и самыя непорядочныя.

Фонтанель. Еще случалось многимъ видъть, что фонтанель, нель. сдъланный на части противоположенной, когда гноевая рана фистульная не была растравляема гнилостию, имъль весьма хорошій уснъхъ. Правда, въ такомъ случат перемъняють одну гноевую рану на другую, но преимущество находится со стороны той, которую помъщають такь угодно, и коей назначаемы бывають извъстные предълы.)

члень ІІ.

О фистуль вы заднепромодной кишкь.

причины. Одисту на об нижней крайности за днепроходной кишки чаще всего бываеть послёдствемь тиркя, случающагося на сей части. Она начинается небольшою твердостию, которая неприметнымь образомь увежичивается, назраваеть и превращается вы тирей;

но хирей, производящій фистулу, обыкновенно теетвуеть медленно. Фистула вы заднемо проходь можеть еще происходить оть нарывово потегуйныхо, и частей смежныхь сы оходникомо (честит); а маконець оть горяхей опухоли, наполненной кровью, коея причины сходствують сы причинами всёхы прочихь воспаленій.)

Пользование фистулы въ заднепроходной кишкъ.

Тиосовій раны во заднепроходной кишко суть то, кон чаще всего делаютья на подобіє фистулы; и лочить мко весьма трудно. Некоторые утверждають, что Вар-постила лова постила противу фистулы, врачуеть сей родь вардова. Знаю я, что локорство сіе не имбеть ничето опаснаго; а поелику доставать и пріуготовлять его не трудно, то и употреблять оное можно. Но како на рывы таковые происходять вообще от поврежденія въ телосложеній, то и родко уствть можно вы излоченій ихь, по крайней же морь естьли не заставить больнаго наблюдать долгое время надлежащую діэту, употребивь ко оной вы помощь и локарства діэта. Удобныя кы исправленію того поврежденія, коимь заразилось телосложеніе, и кы произведенію совершенной перемены во всемы расположеній телесномь.

(Рымко случается, чтобы выльчить было операція. можно фистулу во заднепроходной кишкь безь способь операціи. Она двлается посредствомь приживательна- какв оную двлать. во камня, бистурія, или помощію проволеки свинцовой, серебряной или золотой. Я видаль очень хорошіе успыхи оть сей послыдней операціи, дыланной Г. Гапо, весьма искуснымь Лыкареть Парижскить. Одинь мой пріятель, нады которыть безплодно дылаема была операція бистурієть и приживательнымо кампемо, обязань ему своимь исцыленіемь, и онь вылычиль такожь не давно сына одной знакомой мны Госпожи.

002

Не всякую ARCIN YAY въ заднепроходной **денина** возмыкно.

Но не всё фистулы в заднепроходной кишки выльчивать возможно. Тв, ком оными страдають, говоришь Г. де Бордо, отень, бывають по большей чакишев вы- сти сложенія меланхолитескаго, которые имвли потегий, или оной еще имъють: фистила ихъ есть истокЪ, дающій проходЪ нечистоть, которая не могла бы пробращься сквозь кожу, обыкновенно сжащую и сухую у таковых в больных в; петень у них в бывает в не здорова; желу доко худо исправляеть свою должность, словом в живуш в они часто одною токмо фистулого. Ты принимаешь ее за бользнь, когда токмо она служить единственнымъ безпокойствомъ; натура и имветъ сте только спасительное средство, а ты лишаеть се бнаго чрезъ врачеванте. Ибо какъ скоро рана стя заживлена будеть, то куда стануть дъваться соки, выхоливше прежде чрезъ фистулу? Сколько есть больныхъ, ком, живши долгое время св фистулого вв заднепроходной кишкв, дають напоследокь себя лечить, и погибають при операціи или оть последствій оныя.

ynompe6жипъ жъелучив гноевых:Б искуснаго Лакарл.

не должно По праковым в благоразумным в разсуждентям в, кон пранаровлены быть могуть къгноевымо ранамо, какого каретав въ бы свойства оныя ни были, всякъ чувствуеть, сколько важно то, чтобы не употреблять никаких в лафистуль и карства въ подобномъ случав, и во всякихъ случаяхъ ранд вообще, развъ по совъту Врача или Лъкаря променань опыпнаго. Никто понять себе не можеть онаго мноне совтту жества людей, коихъ ежедневно умершваяють пло-Врача или щади не лъкари своими помадами, мазями и пласты рями, которыя раздають они невозбранно въ небольших в городках в и деревнях в. Таковая продерзость заслуживаеть подлинно строгаго вниманія правительства, которое лишается болье гражданъ отъ сего разбойничества, межели какъ отъ меча непріятельckaro.

Почему мы и совътуемъ тъмъ, кои по нещистю страдають фистулами, взять прибъжище, прежде нежели стануть что нибудь дълать, къ Врачу или Лъкарю искусному, кои одни въ состоянти разсудить, можетъ ли лъчена быть бользнь, и какими вредствами вылъчить ее можно.

Излишнее будеть сказывать здёсь, что, ежели фистула вь заднепроходной киткв происходить отв бользни венеритеской, не льзя надъяться выльчить оную, кромь какь пользованіемь той бользни: что самое разумьть должно и о всякой другой остроть, которая когла бы подать кь оной поводь, какь то острота цинготная, происходящая оть рака, й проч. Поступай по тьмь главамь, вы коихь предложено стихь бользняхь.)

членъ III.

О фистуль слезоточной или о протожь слезоточномы

Подь имянемь слезототной фистулы разумьется Свойство вноевая рана или нарыеб пазушистый, бывающій при вну-фистулы преннемь углы глаза вы слезномо міхь. Вы такомы ной. слезоточью слезы не текуть болье вы нось; часть оныхы задерживается вы слезномо міхь, разширяеть сей каналь, потомы производить вы немь напряженіе, вос палене, разрывь, и наконець фистулу; другая же часть слезы, а вскоры и всь слезы начинають течь на щеку.

Очевидно, что ближайшая причина всём втако-причиные вым в действиям всеть заваль вы слезном меху; а следовательно и лекарство главное состоить вы прочищени онаго канала, дабы слезы могли имъть те-чение вы нось.)

Пользованёе слезоточной фистулы.

(ВсякЪ видишЪ, что пользованіе сіе состоить операціи.

слинспівенно вь операціи; но таковал операція есть

Оо 3

весьма нъжная, и не может в дълана быть кромъ как в рукою искусною, и довольно упражнявшеюся в в сей части Хируртін. Почему мы и совътуем' всякому страждущему сезо бользнію, ввърящь себя единешвенно Операшору искусному; и ежели онаго найти тамъ не можно, то съвздить въ городь, въ которомь обретается Лекарь славящися припадии сего рода операцією. Мы настоимь на сей совынь бывающ је елинственно для шого, что самое мальйшее неудоб-MACATAство, произходящее от в худой операціи какого нибудь стеїями жуло сле невъжды, есшь безпрестанное слезопичение, коего не возможно бываеть въ последовании унять иначе, манной операціи. какЪ новою операцією, которая не всегда удается, хошя бы дълана была и со всякимъ искусствомъ.

Вирочем в слезоточная фистула не всегда бывает в бользнію простою: весьма часто составляет в она признако бользни венеритеской, золотухи, скорбута, порчи от рака, а иногда бывает в последствіем коросты, оспы, и проч. Во всех в таковых в случаях в требует в она пользованія совокупнаго, которое долженствует в быть предоставлено врачу искустному.)

ГЛАВА 53.

Продолжение о бользняхь Авкарскихь. О вывихиванияхь разныхь частей твла.

то вспомоществованія, и как то то вспомоществованія, и как то то то вспомоществованія употребленія вывихнуться члена, а иногда даже и самой жизни, то мы и хо-

тимъ предложить средства, какъ еправлять вывихиванія самыя общія и требующія вспоможеній самыхъ посившньйшихъ.

Человъкъ разсудительный и смёлый, находящій-человъкъ ся при томь случав, когда кіпо нибудь вывихнето се-разумный бъ члень, можеть часто полезнье быть для больна-можеть го, нежели Лькарь самый искусньйшій, ко порый при-быть весьбудеть посль того, какь опухоль и воспаленіе уже ма полеокажутся. Ибо когда дело дойдеть до сего степени, случавыстю весьма трудно тогда узнать состояніе состава, вихиванія, и опасно бываеть покушаться на вправленіе онаго: а ежели станешь дожидаться, пока сій припадки минуются, то мускулы такь опустяться и пустота такь наполнится, что кость не можеть больше удержана быть на своемь мьсть.

Всеобщее понятіе о операціи и пользованіи, каковыхъ требуеть вывихнутый члень.

Вывихнуте недавнее можеть вообще вправлено когла выбыть чрезь одно вытливание, то есть, подергивантемь вывихнутаго члена; а сте вытливание долженствуеть быть болье или менье сильное, смотря по
крыности лускуль, на коихь движется тоть члень;
по возрасту, силамы и другимы обстоятельствамы,
вы каковыхы можеть находиться больной.

Когда прошло уже нёсколько времени, как в кость когда провышла из в мёсна своего, и когда сдёлается воспаленёсколько ніе и опухоль, що надлежить начать св кровопусканія, времени, потомъ распаривать больную часть и прикладывать как вость, кв ней катаплазлы из хлёба и уксуса в продолженій нёкотораго времени, прежде нежели приступить ста.

Когда уже оное сдвласшь, то и нужно бываеть что надобтогда прикладывать на виравленную часть компрессы но двлать, жать оную спокойно; ибо небрежение въ таковомъ слудеть.

жать оную спокойно; ибо небрежение въ таковомъ случав сопровождаемо бываетъ последствими самыми
опаснейшими. Редко сысихивание остается безъ напряжения въ хрящахв, въ сухихв жилахв близь самаго состава находящихся, а иногда и безъ раздражения техъ
частей: естьли же станень держать си части свободно до техъ поръ, пока оне не придутъ въ прежнюю свою твердость и силу, то после все пойдетъ
изрядно; но какъ скоро будеть увеличивать болезнь,
стягивая ихъ крепко и повторяя часто таковыя стягивания, то не удивительно, когда они навсегда
останутся слабыми и будутъ ныть.

(Операція, посредством'в которой виравдяють вывихиванія, или яснье сказать, чрезъ которую на мвсто свое возвращаема бываеть головка костей вывихнупыхъ, пъмъ паче заслуживаетъ быть извъетною. деревни изобилують невъждами, что города и кои не токмо принимаются ежедневно за стю операщію, но еще предполагають оную нужною и тогда, когда совствь ничего не вывихнуть, и даже когда едва ди бываеть одинь токмо зашибв. По сей причинъ и нужно было описать оную в книг народной, дабы благоразумныя особы, желающія имъть познаніе, приведены были въ такое состояние, чтобы ихъ не могли обманывать оные безсовъстные люди, кои находять, или хотять находить вывихнутыя кости тамь, гдв оныхъ совсемь не бываеть, и которые чрезь усилие, съ каковым в ворочают в члены предполагаемые вывихнутыми, или чрезъ пластыри, коими ихъ покрывають, привлекають къ онымъ воспаление онасное, и превращають не ръдко въ боль весьма шяжкую одно опасение боли самой легчайшей.)

S I.

О вывихиванти челюсти.

ЧЛЕНЪ І.

Нижняя телюсть можеть вывихнута быть оть зъвоты, ударовь, паденій; оть жеванія существь твердыхь, и проч.

ЧЛЕНЪ П.

Признаки вывихиванія челюсти.

Сей припадокъ легко познается потому, что больной не можеть ни сомкнуть рта, ниже веть, поелику тогда зубы веръхней телюсти не соотвътствують болье зубамь телюсти нижней; сверьхы же того, подебородокъ наклоняется въ низъ, или находится свернуть на сторону, и больной не можетъ говорить ясно, ниже глотать безъ самой величайтей трудности.

членъ III.

Способъ какъ вправлизать вывихнутую челюсть.

селюсти состоить вы томы, чтобы посадить человыха, коему оной принадокы приключился, на стульнизкой, такы чтобы одины изы предстоящихы могыему держать голову крыпко, упирая ее противы грудиться нады вправленемы, кладеть вы роты сему человыху и сколько можно далые, оба свои больше перста, обернувши ихы тонкимы полотномы, дабы не могли они поскользнуться, а проче персты держить снаружи на телюсти: держа такимы образомы телюсть твердо, должены ее пожимать крыпко вы низы и назады; посредствомы чего легко удастся ему вправить вы ями ихы вы давшился части сей телюсти.

Кресшьяне нъкоторых в завшних в увздов в авлают в опасный таковое справление особенным в образом в. Один в изв них в спесоб в у врает в нъкоторой род в набородинка больному изв плат-

JOMB IV.

ка; потомъ отворотясь спина спиною къ больному, тянетъ вверьжь такъ, что поднимаеть его съземли. Сей способъ удавался часто; но какъ мы почитаемъ его опаснымъ, то и совътуемъ предпочитать оному первой.

По чему признать можно, что че- люсть вправлена.

(ВсякЪ признать можетЪ, что телюсть вправлена, по небольшому звуку, которой производятЪ вы давшіяся тасти, попадая опять въ ихъ ямки, и по-тому, что телюсть опять приметъ натуральное свое положеніе.

что лълать надобно, ногдв челюсть вправлена буденть.

Но когда пройдеть нъсколько времени, или оть покущений безплодныхь, или оть того, что ни одинь изь предстоящихь не похочеть приняться за справление, и когда надлежало дождаться прибытия Лъкарскаго, то покой нами предписываемый, становится необходимо нужень, по причинъ подергивания, какое претерпъли хрящи. Не безполезно також будеть припаривать объ конечности телюсти, крепкитать спиртами предписанными выше на страниць 399 и слъд. сего Тома, когда подергивание сте продолжалось до-

вольное время такъ, что причинило ослабленте въ частияхъ тъхъ.)

\$ 2.

О вывикиваніи шен. Ч. Л. Е. Н. Б. І.

Причины вывиживанія шен.

Шел можеть вывихнута быть, или оть паденій, или оть ударовь сильныхь, и проч. Вы такомы случав ежели больному не будеть оказано скорой помощи, то онь вы короткое время умираеть; а по сей - то причинь простой народы и воображаеть себь, что оны сломиль себь шею: между тымы какы шел бываеть обыкновенно выбихнута частію, и тогда можеть оную впривить всякой человыкь, который чувествуеть вы себь довольно смылости, чтобы на сте отважиться. Чтожь касается до совершеннаго выбих- Каньскоре нутья шеи, то оное міновенно умерщвляеть.

членъ ІІ.

Признаки вывихиванія шен.

КакЪ скоро шея бываеть вывихнута, що боль немелленно ной тотась лишается всякаго чувства и всякаго дви уменцаментя. Шея пухнеть; все лице кажется надупымь; полбородокь повиснеть на грудь, и лице свернуто бываеть обыкновенно на ту или на другую спорону.

ЧЛЕНЪ III.

Способъ какъ вправливать вызихнутую шею.

Для вправленія сего вывихиванія надлежинів тотчась положить больнаго на поль спиною внизь. Операторь должень стать позади его такь, чтобы могь держань голову объими руками, упирая объими кольнами вы плеча больнаго, дабы не дать ему шевелить. сл. Вы такомы положеніи оны должень тянуть за го-

- Какъ скоре
вывихнушіе бываешь совершенное
то оное
немелленно

лову больнаго изъ всей своей силы, между какъ станешь слегка оную поворачиванть, ежели лицо бываеть свернуто на ту или другую сторону до техъ поръ, пока не примътитъ, что еправление сдълано; а сте узнаеть онь по извъстному звуку, какой произчто вправ- водять обыкновенно кости, когда входять опять въ свои ямки. Еще признать сіе можно потому, что больлечіе сдбной начинаеть дышать, и что голова остается въ естественномЪ своемЪ положении.

Оно не такъ прудно, какъ сіе tomb.

почему примъ-

чается .

жано»

Сія операція есть одна из тъхв, ком легче исполнить на самомъ дълв, нежели какъ описывать. Мив случалось видеть, что оную удачно исправляли вообража- женщины, и не ръдко такте люди, кои не имъли ни мальйшаго поняшія о врачебной наукъ.

что надоб-

По окончании вправления надобно пустить кроек но дъхоть больному. Потребно такожъ, дабы онъ оставался въ нін онаго. поков нісколько дней, пока части сій не придуть опять въ естественную твердость: (а таковому дъйствію способствовать можно прикладываніем в на шею компрессовЪ намоченныхЪ вЪ крапкихо спиртахо, какЪ то предписано было выше на страницъ ro Toma.)

£ 3.

О вывихиваніи реберъ.

Какъ соединение реберв съхребтомв весьма кръпкое бываеть, то и редко случается, чтобы оныя были вывихнуты. Однакожъ какъ припадокъ сей иногда еще встрвчается, то сія причина и побуждаеть нась, дабы заниматься онымЪ.

членъ т.

Способъ какъ вправлять вывихнутыя ребра, когда головка костей находится наружи.

Когда ребро вывихнуто бываеть, внутрь ли или наружу, вверых в ли или внизв, то надлежить

для вправлентя онаго, класть больнаго ничком ва столь, и Оператор волжен всв силы свои напрягать, дабы вправить головку кости в ея ямку. Ежели сей способь будеть безуспытень, то потребно, чтобы рука съ больной стороны привязана была повыте за дверь или за лыстницу, и между тыть как вребра будуть чрезь такое положение отдалены другь от друга, надлежить вправлять вы ямки головки тых, кои из в оных выступили.

ЧЛЕНЬ II.

Способъ жакъ вправлять вызихнутыя ребра, когда голозка костей находитея внутри.

Когда головки реберв чрезъ вывихнуте подадутся внутрь, то они бывають опаснье, да и труднье ихъ вправлять, поколику не можно употреблять въ помощь на руки, ниже какого либо инструмента, къ направленію внутренно головки ребра вывихнутаго. Единымъ способомъ въ такомъ случав остается то, чтобы положить больнаго брюхомъ на бочку, или на какое нибудь выпуклое твло, и двигать ребро въ передъ и назадъ, потрясывая оное временемъ. Чрезъ сте средство вывихнутыя ребра вступають иногда опять въ свое мъсто.

(Весьма ощущительно, что сего рода вывихива- сіс выниміє есть одно изъ самыхъ труднвишихъ къ вправле- живаніе
нію; щастіє еще то, что оно весьма ръдко бываеть. есть одно
нзъ сано естьли бы случилось, чтобы кто нибудь по немыхъ
щастію оное испыталь, то мы совётуемъ призвать трудныхъ
искуснаго Лекаря, и не отведывать средствъ нами
теперь предложенныхъ, кроме какъ въ такихъ случаяхъ, въ коихъ бы трудно или невозможно было воспользоваться вспоможеніемъ Лекаря искуснаго.)

О вывиживаній плеча.

Cie Burnживаніе Tame ADV чается.

Плето или плетная кость (humerus) можеть емешкиута быть многоразличными образами. Однакожъ тикь слу- болье всего сывихивание дълается внизъ, а весьма ръдко вверьхъ. Рука, по свойству связи ед костяха ея, и потому что она очень подвержена содъйствию тълъ постороннихЪ, почитается такою частью тьла, которая болье всьх в подвержена вывихиванию.

ЧЛЕПЪТ.

Признаки выбихнутаго плеча.

Можно признать вывихивание плетной кости, по нагнешентю или пустотв на вершинъ плеча, и по невозможности шевелить рукою.

КакЪ скоро вывихивание бываетъ внизъ и наперель, то рука становится длиниве, и всякъ чувствовать можеть нъкоторой кусокь на подобіе пули или шарика подъ мышками; но когда вывихив не бываеть назадь, то шарикь оный чувствуется позади плеча. а рука падаеть вдоль груди.

члень п.

Способь жакъ вправлять вывижнутое плечо.

Обыкновенный способъ какъ вправлять вывихну-Надобно тое плечо, состоить въ томь, чтобы посалить ABS MOмещиина больнаго на низкой стуль. Одинь изъ помощниковъ кромъ пото, ното- держить ему тьло крыко, такь чтобы онь не могь рый атй- пошевелипься, а другой между птыв держипъруку не ствуеть, много пониже локтя, и оную постепенно вытягиваеть. Стый Операторь продергиваеть самфенку подъ руку вправленія. больнаго, и завязывает в оную себь позади шен; потом в дергаеть кръпко руку больнаго и приподымаеть головку KOCMIU,

кости, которую рукани своими направляеть въ

Много есть машинъ, кои изобрътены къ облегчение сей операции; но рука опытнаго Лъкаря всего благонадежные и вырные. У больныхъ молодыхъ и сложения
нымило, мны случалось всегда видыть, что самый легчайший способъ къ еправлению сего вывихнутия состоаль вы томь, чтобы вытягивать руку больнаго одною
рукою, а другою прижимать головку кости. Когда дылается вытягивате, то всегда нужно, чтобы рука
была нысколько погнута.

(Какъже скоро еправление окончится, или когда головка плетной кости опять попадеть вы свою ямку, то надобно перевязать плечо и руку такъ, какъ предтисано прежде на страницъ 399 сего Тома.

\$ 5.

О вывихивании локтя, запястья и перстовъ.

ЧЛЕНЪ І.

О вызихизаніи ложтя.

Кости передней гасти руки могуть вывихнуты быть токмо одинакимь образомь.

Признаки вывихиваній локти.

Когда сін кости бывають вывихнуты, то примвчается возвышеніе на той сторонь руки, къ которой кость подвинуща. Сей признако и невозможность, какую чувствуеть больной, чтобы двигать переднюю састь руки, легко доказывають таковое вывихнутіе.

Способъ какъ впразлять вызихнутый локоть.

Потребны обыкновенно три человька кв вправле- Три человый вправленые при человый держить за выше повым пребыть при человый держить за выше повым пребыть преб

сего выви- по ниже, и тянет вес сильно, а Оператор в между шъм кинута.

поворачивает в костъ, и вправляет в оную в в состав в; потом в надобно погнуть руку, и держать нъсколько времени на перевязи завязанной позади шеи. (Когда костъ будет в приведена на свое мъсто, то перевязать должно так в, как в совътовано было выше; смотри стран. 399 и слъд. сего Тома.)

членъ п.

О вывихивании запястья и перстовъ.

Сін вывихиванія вправляются также какЪ и лов коть. Вытягиванія дълаются въ направленіяхъ различныхъ, и головку костей впихиваютъ въ составы, такъ какъ сказано въ членъ предыдущемъ.

\$ 6.

О вывихиваніяхь лядвен, кольна, лодышки и перстовь у ноги.

членъ II.

О эывихиваній лядвей: Признаки вывихнутой лядвей.

Какъ скоро лядвея будеть вывихнута напередь или внизъ, то кольно и стопа выворачиваются на ружу, и на сей сторонь часть ноги оть кольна до ступни становится длинные нежели другая; но когда вывихнется она назадь то натурально поднимается вверыхы, и тогда часть ноги оть кольна до ступни бываеть короче, а стопа заворачивается внутрь.

Способъ какъ вправлять вывихнутую лядвею.

Когда она вывижнута на передъ. Когда кость лядвен вывихнута будеть нервымь образомь, то для вправления оной нужно, чтобы больной лежаль на спинь; дабы онь быль связань или держань крыко предстоящими, между тыбы какь другие, посредствомы пояса привязаннаго кы нижней частия

ени лядвен подъ самымъ почти кольномъ должны тя-

Какъ скоро вышянуть такимъ образомъ ногу, то Операторъ долженъ поколачивать головку кости до тъхъ поръ, пока не вступитъ она въ составъ свой.

По когда кость вывихнута на задь, то надлежить когда класть больнаго на брюхо, и во время вытлачвантя вывихнупопихивать головку кости внутрь. (Какъ скоро вывихнутая кость будеть вправлена, то и надобно поступать такъ, какъ предписано было выше на страниць 399 и слъд. сего Тома.)

членъ и.

О вывихиваніяхь кольна, лодышки и перстовь у ноги.

Сти вывихиванія вправливаются также как и кометности верьхнія, а именно, дёлая вытягиваніе в в направленіи противоположенном в, а Оператор в между тём в на мёсто свое вкладывает в кость, так в как в предписано выше в в член в I и II, § 5, сей главы. Однакож в в в большей части случаев в довольно бывает в и одного вытягиванія, и кость сама собою вправливается в в свое мёсто, ежели учинить оное в в довольною силою.

Изъ сего всякъ видъть можеть, что сила одна для вправнедостаточна къ произведентю вправлентя костей вывих ленія вымутых вот одна одна одна выстинуть и проворство успъють часто ности ности проворство человъкъ вправила вывихнутую лядвею послъ того, нужнъе, какъ шестеро истощили вотще всъ силы свои къ достя сила.

ГЛАВА 54.

Продолжение о Еользняхь Авкарскихь!

О Переломленіяхь, Зашивахь и Килахь или Грыжахь.

§ I.

О Переломленіяхъ.

Нѣтъ почти деревни, въ которой бы не находилось такихъ людей, кои мечтають о себъ, что
стяжають они искусство вправлентя переломленти. Хотя вообще люди сти и весьма великте бывають невъжды, однакожъ случается иногда, что нѣкоторые изъ
нихъ успѣхъ имѣють; а сте и доказываеть ясно,
что и малое свѣденте, вспомоществуемое нѣсколько
здравымъ смысломъ и головою разсудительною, достаточно уже къ тому, дабы человъкъ могъ въ разсужденти сего быть полезнымъ.

Но при всемъ томъ мы совътуемъ не полагаться никакъ на подобныхъ операторовъ, когда возможно найти Лъкаря искуснаго и опытнаго. А какъ по недостатку въ ономъ и сти люди становятся нужными, такъ что ихъ употреблять надобно, то мы и намърены для нихъ вступить въ нъкоторую подробность о сей матерти.

(КакЪ познаніе переломленій и оныхЪ пользованіе почитаются отраслію Лькарской науки, взятой въ смысль пространномъ и одною изъ самыхъ трудныхъ, по многосложностямъ и припадкамъ, весьма часто оныя сопровождающимъ: то всякому сій подробности безъ сомньнія покажутся очень сокращенными. Но естьли кто приведетъ себъ на память, что мы пишемъ не для Лькарей, какъ то мы сдълали о семъ примъчаніе выше на страницъ 341 сего Тома, то совъты сій, сколько бы оные малочисленны ни были, покажутся достаточными, поколику употреблять ихъ должно токмо во ожиданти Авкаря, коего призывать мы всеусильно напоминаемЪ, естьли кота мало припадокЪ будетъ тяжкой.)

ЧЛЕНЪ І.

Раздъление Переломлений и онымъ свойства.

(Переломленія раздівляются на простыя, сложенныя и миогосложныя; на полныя и неполныя; на поперечныя, косвенныя и продолговатыя или простирающіяся вдоль.

Переломленія простыя сушь ть, въ которых в что разуодна только кость переломлена бываеть.

мьется
чрезь пере-

Сложенны ми называющся щь, въ коихъ двъ, щри ломление кости и проч. на шой же самой части переломлены простое; сложенное;

Переломленія многосложныя суть тё, кои сопро-многосложь вождаются раного, гнильго, нарывомб, Янтоновы мб ное;, огнемб и другими припадками, требующими пользованій частных в.

Поль именемь переломлений полных разумьются полное; ть, вы которых в кость совершенно разбита бываеть.

Неполными называющся тв, вр коих остается неполное; некоторая часть костоватая совсыть еще неповрежденною.

Чрезъ поперетное переломление разумъется то, поперето когда костъ перебита бываетъ поперегъ, или по ное; склонению горизонтальному къ долготъ онаго.

Жосеенное переломление бываеть тогда, когда косвенное; коста раздъляется по склонению удаляющемуся больше или меньше оть черты отвъсной: а сте переломление простирается въ длину болье предъидущаго, и трудиве бываеть содержать раздробленныя части послътого, какъ оныя будуть вправлены на свое мъсто.

P p 2

The pe-

Мродолго»

Переломление же продолговатое есть то, чрезъкоторое кость разщепляется въдлину; да и лучше назвать его можно трещиною, нежели переломлениемо, поелику части кости не бывають отдълены совершенно.

Конечности переломленной кости могуть оставаться вы своемы положении естественномы, а особливо вы переломлентах поперетных. Оны могуть такожы удаляться нысколько одна оты другой, но однакожы такимы образомы, чтобы оставались всегда почти одно насупротивы другаго. Переломленныя части могуть еще перестать и касаться между собою, и прилычуть одна подлы другой: что самое ежедневно случается вы переломлении коссенномо, и даже вы поперетномо;

Наконець ежели переломленных части будуть остроконетны, то могуть онв вонзиться такь какь бы иглы вы тьло; по чему сей родь переломления и бываеть самый тяжкій и больные всыхы прочихы.

Переломленія всегда сопровождаются двиствіями болве или менве опасными; но двиствія сій различествують между собою, по свойству кости переломленія, по положенію, виду, числу и толщинв частей переломленія, но положенію, виду, числу и толщинв частей переломлені ныхв; наконець по части, въ которой приключилось переломленіе, и даже по частямь смежнымь.)

членъ ІІ.

Признаки Переломленій.

(Какъ скоро переломление бываеть въ части нижней, то больной находится въ невозможности держать себя на ногахъ; и во всякихъ переломленияхо происходить у него сжатие и разстройство мускулово въ ихъ положение естественномъ; сведение или корчение, обезображение и протяжение самаго члена; раздрание, ушибъ или повреждение внъшней плевы надкостной, такъ какъ и сосудово лежащихъ въ маленьких вынешочках востои, внутренней плевы надкостной, перепонки мозговой и самаго мозга.

Другія же действія суть опухолі и безобраз. ность переломленнаго члена; подергивание, раздрание, раздражение и проч. перепонока, сухиха и сувствитель. ных в жилв; воспаление сосудово смежных в, св болью, синево, нарысв, Янтоновв огонь одной части, а не редко и целаго члена.

Переломленія не всегда легко открыть можно. первое па-Первое вниманіе, какое имять надобно, есть то, что-печеніе, бы осмотръть, не короче ли пораненая часть той, кото- накое рая здорова, и можеть ли или не можеть больной оперешься на оную.

По томъ ощупывая оную примъчать должно, ніжть. нъть ли какой неглалкости противь натуры, или не гнешся ли кость; естьли шевелишь кость станешь; то не хрустить ли она, или не производить ли какого нибудь шуму.

Въ переломленіяхв, а особливо попересныхв, переломленныя части вправляются часто сами собою, и о существовании таковаго переломления не можно удостовъриться иначе, кромъ когда видишь, что больной съ величайшею трудностію можеть дъйствовать частію уязвленною, и что не можеть оною шевелишь или къ ней прикоснушься, не чувсшвуя великой боли. Но самый надежнёйшій способь кь удо. Отличи. стовърению объ ономъ состоить въ томъ, чтобы ве знаки пере лъть держать нездоровую часть кому нибудь, кото- комжения. рый слегка пошевеливать ее станеть, между тъмъкакъ Аругой будеть примъчать, не слышно ли какого нибудь шуму въ кости, и нашьли какой нибудь пустопы или негладкоспіи.

Истинна, о которой весьма нужно имъть свъденте натура всякому человъку, есть та, что натура одна про-одна про-Мышлиевъ Pp 3

e coexxненія или срастенія раздробженных Ъ костей.

мышляеть о соединении костей переломленных вили раздробленных в, и что дъйствие - Хирурги ограничивается единственно вправлентемь оных въ надлежащее ихъ положение, и утверждениемъ въ ономъ; что кости средственной величины, а итъмъ паче малыя, могуть срастися по прошестви оть пятнадцати до тридцати дней; но что принадлежить до большихъ, то о срастени оныхъ не можно полагать какъ по прошестви сорока, пящидесяти и даже шестидесяпи лней.

Наллежить примътить, что переломление врачуется твыв скорве, чвыв оно простве, чвыв страждущій имъ моложе и телосложенія лучшаго. Раздробленія костей, происходящія от в причинь внутренних в, как в то отв скорбута, болвани Венерической и проч. и сопровождаемыя гнилью, не могуть выльчены быть. пока не уничтожатся сій причины, и въ лучшее состояние не приведено будеть телосложение больmaro.)

Ч Л Е Н Ъ III.

Пользование Переломлений. Вспоможенія наружныя.

Когда разность бываетъ велика.

Когда раздробленная кость будеть велика, то дробленная больной должень во всехь отношентахь наблюдать пищечнот ребление, какое совытовали мы въ ликора дкв безпрерывной острой или воспалительной, смотри § 3, главы 4, Тома II.

промывательныя,

mia acinaa.

Надлежить держать его спокойно и прохладно; желудоко очистить промывательными мягтительными: естьки же переломление приводить его въ невозножность, чтобы быть переворачиваемымЪ, а слъдственио и к в приняшию промывательных в, то надобно давать Послабляю ему, въ томъже самомъ намврении, летва послабляющаго свойства, какъ то тернослией, яблоки вареныя въ молокъ, шпинато вареный, и проч.

При всемъ томъ мы должны сдълать здъсь замъчаніе, что особы привыкшія къ роскошному столу, не должны вдругъ посажены быть на пищу слишкомъ строгую, которая можеть навлечь послъдствія весьма опасныя. По неволь надобно неръдко угождать и нъкоторымъ образомъ привычкамъ дурнымъ, и хотя бы такожъ свойство бользни требовало пользованія совсьмъ противнаго.

Вообще нужно бываеть пускать кровь больному обстоянепосредственно посль переломленія; а особливо, ко- тельства гда онь молодь, дородень; и естьли онь при томь поназываполучить какіе нибудь утибы и блеровыя пятна: дол- вопуснажно такожь на другой день повторить крокопусканіе, ніссжели у больнаго будеть довольно жару. Особливожь нужнымь почитается кровопусканіе, когда ребра переломлены бывають.

Когда переломлены будуть какія нибудь кости поной въ большія, поддерживающія шьло, каків то кость ноги постели. или лядвей, то больной должень лежать вы постели, вы продолженій ныскольких ведыль. Однакожы не нужно, каків то обыкновенно думають, чтобы оны во все сіе время лежаль на спины. Ибо таковое положеніе истощеваеть силы, тяготить больнаго, можеть осаднить у него кожу и проч.

ВЪ началѣ третьей недѣли можно подымать боль-когда монаго на нѣсколько часовЪ во дни, переносить его на жно подниа. лавку, канапе и проч. Таковая перемѣна положенія покажется для него весьма пріятною и великое сдѣлаетъ облегченіе. Однакожъ поднимаючи его надобно имѣть величайтую осторожность, чтобы онЪ не сдѣлалъ нижакого движенія, поелику двиствіе мышеко вообще можеть сдвинуть частицы кости сь ихь мъста (а).

Потребно, чтобы больной быль содержань сухо и чи-

Болье всего нужно держать больнаго чисто и сухо, пока онь будеть находиться вы семы положении; ибо безы таковаго попечения кожа его раздражается и осадниваеть такы, что оны принуждеть бываеть перемынать мысто всякую минуту, дабы найти облегчение, а всегда подвергаясь великой опасности повреждениемы костей раздробленных в. Мый случилось видыть кость лядвей разбитую, коея части довольно было сраслись, и которая была совсыть пряма вы продолжении двухы недыль, столько поврежденною оты сей одной причины, что она осталась погнутою и скривленною во все время, пока живы былы человыкы сей, не взирая на все то, что ни дылали кы выпрямленію оной.

вь какомы положении должно держаны раздроб-ленный члень.

Долгое время было въ обычав держать раздробленный или разбитый членъ вытянутымъ въ продолженіи пяти или шести недвль; но таковое положеніе есть весьма несносное и совершенно отяготительное для больнаго, и противное изльченію онаго. Самымъ

⁽а) Много изобрътено машинъ къ остановленю дъйствія мускуль, и удержанію отломновъ кости разбишой. Но канъ описаніе таковыхь машинъ безъ фигуръ малую бы принесло пользу читателю, то мы и отсылаемь его къ сочиненію недорого стоющему и весьма полезному, о свойствъ и врачеваніи переломленій, изданному недавно Г. Латпеномь, Элимбургенимъ лънаремъ, монмъ пріятелемъ, (къ разсукденію о пользиняю въ костинкъ, покойнаго Г. Пети, къ сочиненіямъ г. Луи, ла фаіе, и проч., къ записнамъ и награжденіямъ Академіи Хируртичесной.)

Г. Антиень не токмо предложиль вы семь сочинени историю о ссыть машинать пожваляемых для персломлений Авторами ему пред шествовавшими, но еще описаль оны многія и собственнаго своего изо брытенія, презвычайно выгодныя нь содержанію развитыть костей в весьма полезныя вы случаять, ногда надобно бываеть переносить больчых (у коихы какіе нибудь члены раздровлены) изы одного мыста вы другого

же лучшимъ положеніемъ почитается то, въ какомъ члень нівсколько погнуть бываеть. Ибо въ семъ то положеніи всякое животное держить свои члены, ко-гла снить или отдыхаеть, и въ коемъ самое мальйшее число мышекъ находится напряженнымъ; а таковое положеніе легко дать можно переломленюму члену, какъ кладя больнаго немного на бокъ, такъ и постилая постель способствующимъ къ сему образомъ.

Наружныя вспоможенія въ пользованіи переломленій.

Операторъ долженъ тщательно осмотръть, не обстоя перебита ли кость и не разщепилась ли на многе требую- куски. Въ такомъ случат надобно иногда отръзать щія отиль членъ, а иначе должно опасаться антонова огня. тія члена. Ужасъ, въ которой приводить обыкновенно одно по- мышленіе объ отняти члена, сопровождается не ръдко въ подобныхъ обстоятельствахъ такими отлатательствами, кои столь далеко заводять больнаго, что не время бываеть болье употреблять операцію.

(Надобно весьма остерегаться от в произведе- съ каною нія вЪ действо слишкомЪ посившнаго таковаго отия- предостотія члена. Есть Лъкари, сказываеть Г. Билеерв, кои рожностію простерли поспешность въ разсуждени сего даже оное долже до того, что отръзывали немедленно члены сильно но. ушибенные, прежде нежели испышали какое нибузь Аругое вспоможение: жестокое безчеловачие, которато я никоимъ образомъ одобрить не могу, и которое заслуживаеть осуждение оть всъхъ Врачей. Ибо кажется гораздо сходственные съ человыколюбіемь, не токмо не отръзывать члена здороваго, но паче стараться о соблюдении и разбитаго, предупреждаючи, какЪ пользованіемЪ всеобщимЪ, такЪ и помощію перевязываній, припадки могущіє приключиться, а чрезЪ то пощадить человъка уже жестоко раненаго, отъ язвы гораздо жесточайшей. Разсуждение о безполезно-J'OMB IV. c mu

сти отнатая тленово, приведенное выше сего на страна 364 сего Тома. Смотри такожъ собранте награжденти: no Xupyprin (Recueil des prix de Chirurgie.)

Какъ скоро перепомление или раздробление кости сопровождаемо бываеть раного, то оное по всемь отношентямъ надлежитъ пользовать такъ, какъ и рану обыкновенную, о которой предложено выше сего въ € 4, главы 52.

Физсности: отъ перемушыхъ.

Все, что токмо искусство Авкарское может в слълать кЪ врачеванію переломленія, заключается въ томъ, жизоко стя. Дабы вправливать кость совершенно прямо, и содержать оную совершенио спокойно. Всякая же перевязка сшянушая: туго бывает в вредна, или противна; да и лучте бы было совстыв оной не унотреблять; поелику большая часть быдетвенных послыдетвий, сопровождающихъ переломленія, происходить оть перевязокь очень туго стянутыхъ. Сте: обстоятельство есть одно изъ. нтвхъ, въ коихъ излишество искусства или паче: злоупотребление, больше двлаеть вреда, нежели когда бы совсвыть онаго не употребляли. Всв. почти скорыя лвченія костей переломпенных в , какія только бывали, происходили безъ употреблентя всякой перевязки. Надобно однакожъ больной членъ держать на мъстъ; но сте едълащь можно другими. способами, кромъ свя-зыванія онаго перевязками.

Оредство ,, жашь. реломлен. MALLE .

СамымЪ дучшимЪ средствомЪ кЪ содержанію вЪ манъ сомер- надлежащемъ положении члена раздробленнаго почитается то, чтобы класть его между двумя или члень не- многими плахами изъ кожи, пли картузной бумаги: ежели таковыя: плахи или дощетки будуть намочены: прежде употребленія ихъ, то скоро принимають онъ видь того члена, къ коему приложатся, и достаточны: бывають, съ перевязкою обернутою вокругь, но при томь не очень туго станутою, къ VILLE P

утвержденію онаго въ какомь бы то случав ни было. Самою лучшею перевязкою находимь мы ту, которах изъ многихъ концовъ состоить; потому что оною легче можно увязывать и опять ее онимать, нежели такую, которая навертывается, а при томь она и самый членъ содержить твердо. Плашки или дощески должны быть столько же длины, какъ и членъ. Когда кость переломленияя находится на ногъ, то на дощесках таковыхъ дълаются скважины, дабы въ оныя могли входить лодышки.

ВЪ переломлентах ребро, въ коих в не льзя спо- переломесобно савлать перевязки, употребляють клейкій пла-ленных ребра. Въ таком случав больной должен в и сам ребра. Аержать себя спокойно: избътать ему надобно всего того, от в чего бы он в мог в чихать, смъяться, кашлять и проч.: потребно, чтобы все тъло его находилось въ положен и прямом в, и старался бы он в желудоко свой содержать в в непрестанном в напряжен и. А для сего и должно ему принимать весьма часто яства легкія, и пить в в довольном в количеств в жидости слабы и водяныя.

Самымъ лучшимъ наружнымъ лекарстволо про-вола съ тиву перелолилений почитается уксусо смъщанный съ уксусомъ, со дого. Имъ намачиваются перевязки всякой разъ, ко-тда надобно перевязывать больнаго.

J .2.

О Зашивахъ или Ударахъ сильныхъ.

Защибы сопровождающея не радко приподками зашибы чаонаснайшими, нежели как в самыя переломлентя: причина сто сопросему есть та, что вообще оставляють их в в небреженти. Как в скоро кость будет в перетибена, то причад
больной принужден в бывает в держать себя спокойно, и ми опатотому что он в не может в болье дайствовать тою
Сс 2

рекомлентя. Частію, кое я кости переломлены; но когда зашибен в для чего: будеть единственно сустаєв, то человькь сей, видя, что онь можеть еще имыть движеніе, ходить и проч. за несносное бы почель для себя терять время для такой бездылицы. Но онь ошибается; поелику припадокь сей перемыняется вы бользны неизцылимую, котя и можно было его выльчить нысколькими днями покож и оны дохновенія.

члень в.

Признажи Зашибовъ:

Это такое:

пряженіе сухих жил или хрящей какого нибуль сустава без всякаго ощутительнаго свихнутія с ивста частей костоватых. Сте напряженте причиняеть болье или менье принадков , соразмърно степени усилія, которое было причиною онаго. Боль и опуколь суть главные сего признаки: воспаленіе же всегда:
сразмъряется чувствительности частей, кои пораженте претерпьли. Пасока или клейкой около костей соко изливается в самый сустав, когда связи или сумки разорвутся, и бъдственными сего послъдствіями бывають водяная в сустав или связи и гнилость, самой кости.

Когда напряженте было столько сильное, что сдвинуло съ мъста кости, но когда кости сти вправляются вскоръ на свое мъсто то бользны должно пользовать такъ, какъ простой убой или ушибъ, о которомъ предлагаемо было выше въ 56 главы 52. Естьли же они сами не вправляются, то сте будетъ сывихнутте, о космъ говорено было въ главъ 53 сего Тома.)

члень п.

Пользование Зашибовъ

женком немедление». въ деревняхъ крестьяне погружаютъ обыкновенно зашибенную часть въ холодную воду. Средство,

ете очень хорошо, только бы употреблено было немедленно, и въ водъ бы не оставалась оная часть весьма долгое время; но обыкновенте ихъ держать очень долго сто часть въ холодной водъ, подлинно бываетъ весьма опасно. Ибо вода въ такомъ случаъ вижсто укръплентя только ослабляетъ, и способнъе можетъ причинить бользнь, нежели вылъчеть самый зашибъ.

Сте погруженте въ холодную воду, которое премсетобезпрекословно почитать должно за самое надежный рожности, съ каковышее средство къ предупреждентю изліянтя пасоки и ми надобво всяких случаях защибое в Непростительная бы треблять, на примыр сдылана была ошибка, естьли бы предписали сте женщины во время месятнаго отищентя, равно какы и людямы страждущимы простудою, или чрезвычайно ныжнымы. Вы таких случаях надлежить удовольствоваться покрытемы больной части компрессами, намоченными вы какомы нибудь крыпкомо спиртв, кои предписаны будуть ниже; пускантемы кроси больному и предписантемы покою.)

Еще есть обыкновенте завязывать крытко подвяз-перевязкаку или всякую другую тесьму около той части, которая претерпыла зашибо. Чрезы сте средство возвращается напряженте сосудамо; и препятствуя той части дыствовать, воспрепятствуеть ей и самую боль увеличивать. Однакожы таковыя перевязки не должны быть очень туго стянуты.

Мнв случалось весьма часто примвчать, чиго частиое кровопускание, учиненное близь зашибенной части, имв провопуло самые удачнышие усныхи. Но болье всего мы со- кой и ответуемь покой и отдохновение: ибо они вы такомы дохновение. случав полезные лыкарство, и завсегда боль утолить могуть.

G a 3

Черная грязь въ большихЪ городажь.

(Самыми лучшими лекаретвами прошивъ зашибов в или жестоких в ударов в починаются совершенный покой, холодная вода, по при первомъ началь, черная грязь, находящаяся подъ мостовою наль ручьями больших в гороловь, как в то Парижа: поколику сіл грязь содержить вы себъ много частиць жельзистыха, а следовательно и бываеть раноцелительная и крепительная, какъ то многле опышы стю истинну полтвердили.

Вода сЪ жин вода еоленал.

Многіе употребляють еще компрессь намоченунсусомъ, ный въ уксуст съ водою, или въ водъ, въ которой распущено столько соли, сколько она развести можеть, и ете продолжають до тыхь порь, пока боль не будеть совершенно разбита, и не удостовъришься, что нечего уже болье опасаться воспаленія. Тогла, а не прежде, надлежить употреблять лекарства выше сего предписанныя.

долгое вре-M.H.

Но должно такожъ примьтить, чтобы, ежели заместь дер- шибб будеть на ногв, которая часть и въ самомъ дъмую честь ль болье прочих сему подвержена, держать оную жеревязан- перевязанною очень долгое время, даже и посль как в мою очень больной чувствуеть себя совершенно выльченнымь; потому что, естьми опъ не въ равномъ движении станеть выступать, то можеть опать получить зашибы, отв которых в твыв большее будетв претерпъвать безпокойство и боль, чъм в менъе нога утверлилась. Какъ то и случается, что ежели кто пренебрежеть эло сте вы началь, то тверлость никогла совершенно не возвращается, и что часто на оной оказывается легкая опухоль, которая целую жизнь продолжается.)

Маружныя

Многія выхваляются лікарства наружныя проязкарення. тивъ зашибоев, изъ коихъ есть и хорошія и дурныя. Но съ большею безопасностию употреблять можно Kama

натаплазны изъ кислаго писа, или изъ уксусу съ ос сомб з канфарный спиртв, росолв уксо - нашаты рный Munge peposo (spiritus Mindereri), semytyw mast, semyгій спирто ароматическій, развеленный въ количеещев воды вавое въсомъ взящой; и припарки обыкновенныя, къ коимъ надлежить прибавлять нъсколько: во дки или спирту.

6 3.

О Килахъ или: Гоыжахъ:

(Поль именень килы или грыжи разумвется опу-что разхоль, сдълавшаяся от повреждения съ мъста части умъется. .. NONTEM

Грыжа приключается всегда, или почти всегда на частях в содержащихся в в пространств в подтеревка; ибо находящем некоторые примеры грыжб и въ саномЪ, мозгу.

Мы не станемь входить вы подробность имень различных в, какія дають грыжь, относительно къ той части или частямь, кои служать къ образованію оной и къ самому мъсту и какое она занимаетъ. Ибо названія шаковыя могушь полезны бышь однимь токмо: Лекарямь, но каждому извисихв последнихв оныя довольно известны.)

Младенцы: и старики: болье: всего сей: бользни: кт оной: подвержены бывають подвержемы быва 10 m Ъ.

YNEHBI.

Причины. Киль или Грыжь.

У младенцевъ приключается грыжа обыкновенно отъ крику, кашаю, ресты, и проч. У стариковъ вообще бываеть она послъдствиемь какихь нибудь ударовъ, какого нибудь усилія, какъ то въ перепрыгиванти, ношенти слишкомъ тяжелаго бремени, и проч; (удары, наденія, усильные крики, жестокой жашель, реота, напряженія силь, каковымь подверга ють духовые инструменты, могуть такожь оную причинить.)

Ослабъвшее телосложение, летва масляныя или содяныя какъ техъ, такъ и другихъ къ сей бользни располагаютъ.

(Всякая грыжа происходить отвумножентя силь выгоняющихь, или отв ослаблентя и слабости частей, служащихь къ содержантю кишокъ. Сти два вида причинь долженствують, какъ то сте легко чувствовать можно, представлять признаки различные, и требовать пользовантя, которое бы каждому изъ оныхъ было свойственно.)

члень и.

Признаки Киль или Гоыжь.

въ енучат (Грыжа происходищая от усили, какого бы напряжето то роду ни было, сопровождаема бываеть напряжения; на раздражениемо, жаромы и болью.

ослабвий. Когдажъ напрошивъ шого ослабвите подаешъ къ оной поводъ, що не бываешъ шогда ни боли, ни раздражента, или оныя чувствующся въ гораздо меньшей сшенени.

> ВЪ первомЪ случат очень трудно вправить вышедшую часть на ея мъсто, и легче гораздо удержать ее вЪ ономЪ, какЪ скоро однажды она вправлена будетъ. Но во второмЪ случат совстмъ противное сему происходитъ.

Признаки сущеежвенные. Существенные признаки грыжи суть опухоль болье или менье продолговатая, мягковатая, подающияся, когда станешь давить перстами: кожа, подъ которою она сокрыта, не бываеть ни красна ни воспалена, ниже скорбна. Она пропадаеть иногда, когда

больной ляжеть прошличениев. Но какъ скоро станеть кашлять, то ощутительно бываеть легкое потрясение подъ перстомъ положеннымъ на опухоль, и проч. Грыжа обыкновенные всего сопровождается рес*мами*, или по крайней мъръ тошнотою.)

Грыжа бываеть иногла смертоносною, прежде межели примъшищь, что она существуеть. По чему, всякой разъ какъ тошнота, реота, мпорной запорб, и проч., подающь поводь кы подозрыванию завала вы кишкаха, надобно не теряя времени осмотрыть трательно всё различныя части, на которых в грыжи обыкновенно обнаруживающся.

(Всв части подбрющия могуть быть жилищемь кана ча-Аля кило или грыжо. Но кольны мышеко по абрющія де сти тълг жащія вь пахахо, безпрекословно подающь чаще всего быть жи-ПОВОЛЬ КЪ выходу нъкоторой части кишока, и сін лишемъ выжи называются подбрюшиыми (inquinales). Послъ кнав нап грыжв вв пакахв или подбрюшныхв, пупошныя, или грыжь. выходящія чрезь пупв, и шь, кон находящся вдоль бълой терты, чаще других в приключающея. Бывають такожь грыжи вы желудкв, вы пузырв, вы маткв; но таковыя бользни случаются очень ръдко, и требутоть самой совершенной опытности къ распознантю ихъ и врачеванію пристойному; почему мы и говорить объ михъ не намърены.

Урыжа подбрющная или въ пахах вываетъ двоякая: или остается она въ маху, или опускается даже въ мошну, которая часто бываетъ величины ужаеной. Первал представляеть опухоль шаровидную, которую не должно никакъпринимать за бубоив, такъ какъ мы выше сего на страница 43 и слъд. сего Тома поворили. Одно изъ главных в свойствь килы, какъ скоро она Свойства не сжата, есть, когда больной находится въ поло-отвичаюженти, какое ниже сего описано будеть, что она по- шія нилу JOMB IV. TR дае ш-

еть бубо- дается совершенно или частію оть давленія перстовь; а сего не бываеть съ бубономв, которой оть таковаго подавленія больше еще больть начинаеть.

> Можно еще принять ее за ляро, которое, прильнувши иногда къ паку, представляетъ опуколь довольно похожую на килу или на бубонб; но естьли осмотринь мошчу, то примътишь въ ней пустоту. которая и обнаружить свойство сего рода опухоли.

OmF sacoренія съre emboas.

Кила, опускающаяся даже въ мошну, представляеть опухоль продолговатую, которую многіе смъменоносна- шивали иногда съ опухолью, или засорениемъ свменнаго ствола. Недавно одинь Лекарь Бандажисто впаль въ ошибку сего рода, въ разсуждении малолешнаго сына у одного изЪ моихЪ пріятелей. ОнЪ положительно заключиль, что у него была кила, а нотому и перевязаль бандажемь; но грубая его ошибка состовъ томъ, что онъ наложиль бандажь, хотя и не могъ вправить сей мнимой килы. Какъ засореніе шаковое было волды реватов, и составляло такъ называемую водяную во шуляпахо опухоль, которая, извъстно, не причиняет в боли, то пересязь только что тяготила младенца; и как в присовътовано было, чтобы онъ къ ней привыкаль, то и не смотръли на его слезы. По прошестви полутора года, или двухь леть, приметили, что опухоль увеличилась: погда показали оную мнъ; килы не видълъ я никакой; но какъ я долженъ былъ не полагащися на собетвенное сужденте о семь дель, то я и присовътоваль дать осмотрыть онаго младенца Г. Борденасу, звамени тому Хирургу Королевской Академін НаукЪ, который и решиль, что то была простая опухоль вол дыреватая вы стволь семенномв. Тогда отняли перевязы, и стали употреблять одни токмо лекарства наружныя крепительныя, кои оную совершенно выльчили.

Изъ сего явствуеть, съ какою предосторожно съ изиот стію поступать должно при осматриваній кило; и предосторожностію естьли человькь упражнявтійся довольно въ Лькар- надле ской наукь, отпося въ семъ случав, то сколько над-жить полежить быть осторожнымъ всякому другому! Сколько ступать надобно имъть недовърїя къ онымъ самохваламъ, до- при осматрольно дерзновеннымъ, чтобы дълать операцію, которая ній ниль. единственно и бываетъ нужна тогда, когда нахо-

Была здёсь одна женщина, говоришь Г. Гиссоть, убійственсмотри стран. 169 и 170, Тома II, увъщанія ко народу, ныйопыть копторая безстылным в образом в принималась за стю ныхв тв операцію и умершвляла больных в, послъ мученій са карей, мых в жесточайших в и по отръзания лара, как в то завсегда дълающь лъкари площадные и совершенные невъжды: но чето знающій Хирургь въ такомъ случав никотла не слълаетъ. Часто даже повсюду бъгаютъ оные злодви, двлающіе сію операцію, то есть колощеніе, безь всякой нужды, и безчеловъчным в образом в изувъчивают в множество младенцевь, которыхь бы натура одна или вспомоществуема будучи бандажемь, выльчила совершенно, хоша напрошивь того они умершвляють изь нихь великое число, и лишающь способности къ дъторожденью тьхв, кои от разбойнических в ихв рукв въ живых остаются.)

члень ІІІ.

Пользование жиль или грыжь.

Какъ скоро открость или примътить грыму, надобно нето и надобно стараться о вправлени кишки, поелику и весьма малая частица сей внутренности вышелтая изъ брюха, достаточна бываеть не рёдко къни кишки, причинению всъхъ припадково, о коихъ мы теперь говорили; а оттуда, естьли оной не вправишь немел-

ленио, слно изпорядочное положение кишки ножешь причинить смершь.

Когда страждущій килою будеть младенець, то Monomenie. вы изномы надлежить класть его на спину, а голову держать жень боль. очень низко; и ежели въ семъ ноложении кишки сами кой, когда собою не вправяшся, то оному удобно пособствоенъ мазде- вашь можно посредствомъ легкаго подавлентя, то немъ при сей опера есть, пожимая полегоньку опухоль въ брюхо персшомЪ.

Когда кишка войдеть внутры, то надлежить Что надобпо денать, положнив на то место, где была грыжа, липкой плананъ сноро сты ръ, а потомъ перевязать бандажемъ, которой всжеть впра- льшь носить довольно времени. Способь, как в льдашь бандажи, или перевязи, и класть оныя на грыжу млаэлена. денновъ, весьма извъстенъ. Надобно при томъ стараться поступить такъ, чтобы младенецъ не кричаль и не савлаль великаго авиженія, пока грыжа не

будеть совершенно вылжчена.

(Вотъ припарка, которую не можно довольно выхвалить, и которую употребляль я съ величайшим в успъхомъ, савдуя щастанвымъ опытамъ Г. Луи и других внаменитых в Авкарей: а именно корые или тол-Корье или тенал дубовая кора, лвкарство мало стоющее, и которое въ изобили находится вездъ, гдъ только есть кожевники; и нъшъ такихъ городовъ и большихъ селъ. гав бы оных в не было. Вот в способь, как в оную приклалывапты.

Способъ жакъ ее пригощов-Zamb,

мюлченая

дубовая

жора.

Возьми толгеной дубовой корки - - - одну унцію:

Положи вЪ мъшечикЪ изЪ мягкой колстины или пъсколько подержанной, на подобте правной подушечки, зашей отверстве, въ которое станешь класть оную кору. Подушечка сія должна бышь набища не шуго, но такъ, чтобы она была плоска и магка. CIL

СЪ другой стороны припаси теплаго вина въ чатв; положи въ нее подутечку, и дай ей напитаться въ продолжени нъсколькихъ минуть; приможи такамъ образомъ шенлую подушечку на отвер-канъ приетте, въ которое выходила грыжа; утверди пере-кладывать вязками, но единственно такъ, чтобы оная не отпала: подушечка стя можетъ служить цёлую недёлю;
но надлежитъ всякой день намачивать се вновъ по
три раза.

По прошествій недели надобно сделать другой мещечикъ такого же виду, которой прикладывать такимъ же образомъ, и продолжать сіе до техъ поръ, пока не удостореришься, что оная часть довольно будеть стянута и укрепится такъ, что боле кишка выходить не можеть. Одинъ шестимесячной младенецъ выльчень быль совершенно менье нежели въ пять недель, а взрослые люди одни по окончаніи трехъ месяцовь, а другіе по прошествій шести.)

У взрослых в людей, когда кишка выйдетв изв способъ брюха от в какого нибудь усильнаго напряжентя, или внять вправот да случится, от в какой нибудь иной причины, лу у взрочно она придетв вв воспаленте, часто весьма труд-слых вто бываеть ее вправить; а иногда також в и согсыть не возможно, без в операціи, кое пописанте не принадлежить кв нашей цели: однакож быв в столько щастлив, что имбл я успъх во всяких случалх в в которых в меня призывали на помощь, и вправливаль кишку, не имбл нужды прибъгать кв другить средствать, кром тых в, кои всяк в употреблять можеть личитаю себь за долг в предложить здъсь в коротких в словах в способь, как в и ноступаю.

Астуаншій способъ какь вправлять грыжи:

Пусптивши к рось больному, я кладу его на спи-кровопуму, голоною очень мизко, а задинцею весьма высоко сканіс. Т пт 3 жень кол. кв изголовью. Вв такомв положения я прикладываю м жень боль часто перемьняю, вв продолжени изрочитаго временой. При. ни, на части, тав бываеть грыжа, фланель намоченную вв декоктв изв листьевь проскурняку большаго (bifmalva), изв цввтовь ромашки, или за неимвніемь оныхв, вв теплой водь. При чемв приказываю промывательныя. тромывательныя, составленныя изв декокту сихв раствній, изрядной ложки коросьяго масла

и небольшей щепошки соли.

Тежели кишка не входить, то я прибъгаю къ подавленію, какъ то сказано выше на страниць 428 сего Тома. Когда кила бываеть очень півердая, то съ великою силою давить надобно: однакожь одной силы недовольно, а потребно еще и нъкоторое искусство. Въ самое то время, какъ операторъ ладонью жметь кишку, долженъ онъ придерживать се искусно перстами, дабы вправить въ то отверстве, чрезъ которое она вышла. Способъ сей легче понимать, нежели описывать.

Тромыва Ежели по несчаснію вст сіи средства найдущемельным ся безплодными, то надлежить испытать промывамэть дыму муритель тельных изб дыму курительнаго табаку: ибо удавамаго таба лись они, когда вст другія средства вправленія остаму. вались тщетными; и по всему заключать должно, что настоя на таковыя средства и на другія подобныя какія обстоятельства подать могуть, не трудно впрасить большую часть килб, не имъя прибъжища къ жестокой операціи, завсегда весьма нъжной и очень трудной.

Надобно

М такъ я бы совътоваль Лъкарямъ не унотременытать
вет сіи

блять инструментовь, прежде нежели не испышающь
средства, всъх способовь еправленія. Мнъ случалось многокрашно
прежде не- имъть успъх вь еправливании кишки, поступая всегда
желя прасобственному моему способу, не смотря на то-

что Лъкари, впрочемъ и весьма опытные, утверждали, иъ операбудтобы еправленія не льзя иначе сдълать, кромь опе-ціироціи.

(КакЪ скоро истощены будутъ средства, пода- когда предваемыя предложеннымъ теперь способомъ, и когда не ложеныя удастся вправить кишки, то непременно следуеть бывають приступить къ операціи; но на сіе решиться доджно безуствинемедленно, поелику болезнь увеличиваясь всегда, ны, то можеть умертвить въ два дни; а потому и надобно принять въ помощь Лекаря самаго опытнаго.

Не льзя довольно внушить простому народу, ціи, но не что онь не должень никогда давать себя різать и времени. Рубить онымь палачамь повсюду проходящимь, кои не опасности, имьють инаго достоинства, кромі смілости и без ноимь подстыдства, и что, ни вы какомы случав килы или гры многіе, по-

Взрослые люди, послё еправленія кишки, дол. нові дережны носить перевязь стальную. Безполезно бы было мать описаніе сихі перевязей или бандажей, потому что оныя у художникові всегда ві готовности находятся. Таковые бандажи безпокояті обыкновенно ві первыя времена; но оті употребленія привыкнуть кі нимі можно. Почему всякой человікі доститнувшій до зрілаго возрасту, и который страдалі килою, можені носить бандажо чрезі всю жизнь свою.

(Мы совътуемъ испытать припарку, недавно нами на страниць 428 сего Тома описанную; и ежели, употребляя опую въ продолжени большаго или меньшаго времени, соразмърно съ тъмъ, какъ давно грыжа существуеть, примътить кто, что она выльчена, то и самый бандажъ тогда болье не нуженъ бываеть.)

Когда предаложенных ередсива бываюнь бываюнь безуентыны, то надле-жишь при-спупить и операции, но не упуская времени. Опасности, ноим подавергаются многіе, по-лагаясь на лачальщи-ков деревенских веремених венских венских веремених венских венски

ЧЛЕНЬ IV.

Дігта, какую должны наблюдать страждущіє килою или грыжею.

Люди имъющіе килу, должны остерегаться отъ всякаго телосложенія излишняго, отъ ношенія вещей тяжелыхь, отъ приганія, бъганія и проч. надобно воздержаться имъ отъ яствь естротеорных , отъ напитков крепких и всячески убъгать отъ простуды, но причинь усилій кашля, кои одни достаточны бывають къ награжденію килою.

T A A B A 55.

О припадкахъ смертельныхъ, зависящихъ отъ причинъ внѣшихъ, или причиняемыхъ тѣлами остановившимися въ горлѣ пищепріемномъ и горлѣ дыхательномъ; отъ по-груженія или потопленія въ водѣ, и проу.; отъ парозъ удушающихъ и стужи чрезмѣрной.

Извъстно, чио можно не ръдко возвращать жизнь посредствомъ вспомоществованій приличныхъ, тъмъ, кои по видимому оной лишились. Всякіе припадки, сопровождаемые смертію внезапною, по большей части становятся бъдственными единственно потому, что не употреблены были способы, къ отраженію дъйствія оныхъ.

Не должно никогда почитать мертвымъ никого, Не должно иниогда ое- от в какого бы то приключентя ни было, до тахъ поръ, пока въ такомъ несчастномъ случав сердие, man amb MPHOTO, кто каже- люзгв, или всякой другой для жизни нужный оргаль, не будушъ шяжело ранены. (Ибо во всякихъ другихъ mica Mepпрежде не случаях в надлежить испытывать даже до невозмож dunem, наго; и никогла пресвчение двистой душевных не жели не улостовь. долженствуеть поставлять препоны вспомоществое BaHI" о крашист ого смерши.

ваніямь, которыя человы в почитаемый мертвымь. можеть получить оть духа благотворнаго и просвъщеннаго, неудобоотвращающагося даже и тогда, когда онъ и не надвешся, чтобы понеченія его могли принесть плодъ желаемый.)

Льйствіе органова его можеть уменьшено быть до того, что не ощутительно бываеть оно въ продолжении изкотораго времени, хотя при всемъ томъ жизнь еще не кончилась. Однакожъ, ежели въ подобных в случаях в дать крови и мокротам в остынуть. то невозможно будеть возвратить движентя, котя бы такожь твердыя части и восприями опять свое Авйствіс.

И такЪ, какЪ скоро движение легких в остановишся отв паровь мефитическихв; когда двиствие сераца пресъчено будеть ударомь полученнымь въ грудь; когда оборошы мозга повреждены раного въголову; то, естьли дать охладеть больному, весьма веролтно, что онь останется вы томыже самомы состояніи, а именно, мершвымь. Но ежели будень держать его вЪ тенлъ, то, какЪ скоро поражениая часть возвращить епособность действовать, и жидкія воспрінмуть опять свои движенія, и жизненныя двиствія возещановящся.

(Иногда пошребно довольно долгое время кЪ мотребно тому, чтобы влажности совершенно охладели; поели. вногда ку, такъ какъ мы ниже сего покажемъ, оживляемы гое время, бывали утопленные, кои находились болбе шести ча-прежде совъ подъ водою; а при томъ многіе примъры доказы- нежели вають, что нъкоторые люди оживали послъ многихъ дней чаемой смерши, даже и послъ шого, какъ въческате были зарышы в в землю. А сте происходить от того, окладьчио дъйсивія теплоты еспественной могушь по видимо- макой стему остановиться в в человькь, хотя бы он в жизни и не пень, что JONES IV.

ди, ижъ разо-

лиш и. Следовашельно не должно пющаев робеть: TOWERS HE не надобно оставлянь несчастного, бывающого жер-MOREO. твою полобнаго приключения, прежле нежели не упопребишь средствь, ком предложены будуть вь слылующих в параграфахв, и не употребавь ихв св постоянствомь и такь, какь требуеть сего свойство принадка, вЪ которомЪ помогать нужно.

Онасно поатпино**дож** екоро ша-FOIR GXNH . дей кои нажущея жишенныровъ , паденій и Poqu.

Ужасное есшь дёло похоронять немедленно тъхв, кои по несчастно кажушся вишенными жизни посль ударовь, паденти и проч. Таковые несчастные, вивсто того, чтобы имъ быть отнесеннымъ въ мвета теплыя, быть положенным в полож огня или на ми жизни, теплую постелю, обыкновенно оппосятся вЪ церпосле ула-ковь, въ анбаръ, или во всякое другое мвето хололное и сырое, гав, посль учиненнаго имъ безполезно кросопусканія таким в челов вкомв, который может в быть и самъ ничего не смыслить, принимають ихъ за мершвыхь, и оставляють такимь образомь, не заботясь объ нихъ ни мало въ последовании.

> Таковое поведение кажется внушаемо бываеть невъжествомъ и подкръпляемо древнимъ суевъргемъ, требующимЪ, дабы тело человъка, подозръваемаго умершвленным в отв какого нибуль несчастнаго случая, было оставлено, въ Англіи, въ домъ, гдъ никого не живеть; (а во Франціи, въ комнать, или въ масть отавленномь оть жилых покоевь, и полагаемо нагое на соломъ.) КЪ чемужъ ведетъ подобное суевърге? Сего объяснять мы не намърены: но всеконечно поведение, къ каковому подаетъ оно поводъ, прошивно встмъ правиламъ разума, человъколюбія и здраваго смысла.

Первое вин-

КакЪ скоро человъкЪ кажется лишившимся жизни маніе, на внезапно, то первое попеченіе, какое имѣть должно, мадебно из состоить въ томь, чтобы увъдать о причинь, коти-

рая могла служинь къ сему поводомъ. Надлежитъ человену з піщашельно осмошрвінь, нешь ли какихь нибудь тель который посторонних в, лежащих в в воря в дыхательном в, или наженся мищеприемнома, какъ то мы говорить станемъ въ вымъ следующем в. Въ таком в случав надлежить всякия упо- энитреблять средства, дабы оныя вынуть. Но какъ скоро воздух в обремененный мефишическими парами будеть сему причиною, то надобно немедленно перенести больнаго на другой воздухв, такъ какъ ниже сего въ 6 3 сей главы мы предпишемъ.

Когда обращение крови остановится внезапно. то какая бы оному ни была причина, выключая слабосии, надобно пустить кроез. Ежели кроез итти не можеть, то для побужденія оной надлежить больнаго погрузить въ теплую ванну, или тереть его теплыми салфетками и проч. Наконецъ, когда не можно отвратить тотчась причины, ввергнувшей челолъка въ сте состоянте, то единое средство остаетея то, чтобы содержать теплоту жизненную, потирая его шеплыми салфешками, посыная на него песокъ или золу шеплыя, и проч. (Сти общтя правила ме могуть быть пригодны во всяких обстоятельствахъ. Въ 95 следующихъ мы станемъ разсматривать ть, кои свойственны каждому припадку во особливости, и тогда всякъ увидитъ, что кровопускание есть средство, употребляемое редко, и что можно обойшишься безъ песку и золы шеплыхъ во всъхъ почти случаяхь.)

Мив бы надлежало теперь говорить подробно о примадкахв, которые, какв скоро вв оныхв поспъшно не Употребинь помощи, обыкновенные всего бывають смертельны: должень бы я такожь показать и средства самыя удобивания къ облегчению несчастныхъ, кото-Рым'в таковые припадки приключаются: но как'в по V V 2 Счаечастію предупредиль меня вы сей части мосго труда знаменитый *Гиссотв*, то я и удовольствуюсь поивстить единственно тв изы наблюденій его, кои показались мнв самыми важнейшими, и присовокупить некоторыя изы техь, кои снискаль я опытомы.

§ 1.

О припадках смертельных, происходящиль отв тёль остановившихся вы горль, вы глотк или вы дыхательной трубь.

Сін приз Хотя припадки сего рода случаются очень часто, падчи бы- и вообще бывають весьма опасны, однакожь происховають дять они обыкновенно от небреженія непростительно дять наго. Надобно учить дьтей жевать больше яства, и ствіемь не брать ничего вы роты такого, что бы проглотить нерадьнія. Для нихы было опасно: но не одни малольтныя дьти подобныя неосторожности дьлають.

Везразсудность
мьжь, нои держать во рту булавки, иголки, гвозди, и другім острыя вещи, и которые иногда даже и спять цълую ночь въ такомъ состояніи. Поступокъ сей есть самый гвозди, бу- безразсудньйшій, ноколику кашель и множество других в лавки, припадковъ, могуть вогнать подобныя вещи внутрь, прежде нежели человъкъ примѣтить то можетъ.

(Но не токмо одних в буласока, иголока, вел-Примтры емершель- ких вещей острых в, швердых в и проч., кои ни маныхъ при- лейше не определены на то, чтобы ихъ глотать, надковъ. лоджно; саныя даже яства причиняющь опасапися -нэниквенныкь от смерить люшвишую, какв скоро кто принимаеть день прэ- их в кусками слитком великими. Один в шестилиевной PAONEHных быв младенець, сказываеть Г. Лиссотв, проглошиль обсашими нус- каренную миндалинку, которая остановилась вы горав, нами и съ и тотчась унеръ. Одинъ взрослый человъкъ почув-O. C.M. B.R. B.G. жалее- сывоваль, что кусокь баранины остановился: но что-CILLIAN . 6H

бы не испутанть никого, вышель онь изь за столе; спустя иниуту стали искать его и нашли мертвымь. Аругой погибь оть куска пирога; третій оть куска кожи ветсинной; четвертый оть лица, которое протлотить на похвальбу хотьль.

Каштанъ, проглоченный младенцемъ, умертвилъ его. Другой младенецъ погибъ скоро задохнувшись, мбо всегда отъ занятия духа такъ скоро погибъютъ, отъ груши, которую онъ бросилъ на воздухъ и пойналъ въ ротъ: равнымъ образомъ отъ груши умерла также одна женщина. Кусокъ жилы оставался восемь дней въ горлъ такъ, что больной не могъ ничего глотать; послъ того прошелъ онъ въ желудокъ отставши по гнилости; но больной вскоръ по томъ умеръ отъ ссепаления, антоноса огня и проч.

Сколько бы мы ни стали приводить подобных в примъровь сдълавшихся по нещастію слишком в общими; однакож в ни мальйтей отв того не произойдеть пользы; поелику скорая и внезапная смерть, бывающая послъдствить таковых в приключеній, почти всегда зависить, или отв трожорливоети, пороков в ностыдных в совершенно произволемых в.)

члень І.

Признаки припадковь, приключающихся от тваь остановившихся въ горав пищепримномь или дыхательномь.

(Когда какое тёло остановится въ горяв питеприемномо или дыхательномо, тогда больной ощущаеть то весьма сильную боль въ томъ мветь, гав останавливается оное тёло, то чувствование болье безпокоящее, нежели причиняющее скорбы а иногда позывы на рвоту тнетные, тоску чрезвычайную; и ежели сте тёло таково, что отеерстие выше глотки бу-

Уу з

Acm l

денть заграждено, или дыхательное горло ситеснено, то больной чувствуеть запятие духа жестокое, идышать совствы не можеть: легкое наполняется, и какь кроез не можеть болте возвращаться изъ головы, то лицо становится красное и синее, шея раздувается, ственене увеличивается и больной погибаеть очень скоропостижно.

Но когда дыхание не будеть ни остановлено, миже обезпокоиваемо; когда проходь не загорожень совершенно, и больной можеть еще глотать, то онь вы состоянии прожить несколько дней, и бользиь будеть тогда особенною бользить горда пищеприемнаго. Но естьми проходь совершенно бываеть заграждень, и когда отпереть его не можно, то изъ сего последуеть жестокая смерть.)

членъ н.

Пользование, какого требують ть, у коимь находятся микія нибудь тъла остановившіяся въ горль пищепріемномь или дыхательномь.

(ИзЪ внутренности рта летва проходять въ каналь твенвиший, называемый пищеп рвемнымо горломо (соррадия), и которой проходя около хребта, оканчивается въ желу дкв., какъ то мы показали сте въ примъчанти 3, глав. 2, Том. I.)

тожно вы проходь, то два только способа находится, как в оное пишить от проходь, то два только способа находится, как в оное от пуда выгнать: или вытаскивають его вы роть, или роть, или пробивають вы желудока.

самое надежный шее и вырный шее средство есть самое навсегда то, чтобы дылать извлечение; но не всегда шее средоно бываеть самое удобный шее. (Впрочемь, усилия дыство есть ласмыя высей операции, унюмляють часто больнаго ми. Часто також вывает в опасность нетерпящия ни веть; но мальйшаго отлагательства,) и тогда надобно лучте оне возметробить его в в желудок в, а особливо когда остано-жно. В причинить вреда сей внутеренности.

Вещи, кои можно пробивать безопасно въ желу-канія те доко, суть вежіл летва, какъ то хлебо, мясо, пиро- на можно пребавать ги, плоды, (части кишокъ и самая даже кожа. А сі везь опа- не потому, чтобы весьма большіе куски извъстных веніл въ летво не были почти неудобоваримы; но ръдко слу-желудокъ. чтовы они были смертоносны.)

Вещества нессаримых желидкомо, какъ то проб-какія же ка, дерево, большій косточки въ плодахь, стекло, должно кости, камни, металлы и проч. должны, сколько воз-вышаски-вышаски, бышь вынимаемы вонь, а особливо ежели сіпроть. вещи суть остроконечны и проч., какъ то буласки, иголки, рыбый кости, отломки стеклликой посуды, (ножницы, ножички, перстни, пряжки и проч.

Сколь ни странным в покажется вычисление всвх в таковых вещей, однакож выть ни одной из в них в, которая бы не была проглочена, как в то самым в опытом в доказано; и припадки обыкновенные всего от в иных в происходяще, суть, жестокая боль в желу дкв и котиках в соспаления, нарывы, тиры, гновыя раны, внутренняя лихорадка, антонов огон в, колотые и жестокой рыз в в живот в наружные вереды, чрез в которые сін тыла вон выходят в; и нерыдко даже, послы жесточайших в страданій, смерть лютвишая.)

Первое и второе средство, какъ вынимать тъла остано-

боко, то надлежить попышаться выпушь его перста-

ии, который способъ часто бываетъ успъщенъ. Но когда оно прошло очень далеко, то должно принять шинини: въ помощь щинтики, какія употребляють Авари; но сей способъ не ръдко остается безъ всякой пользы. а особливо когда твло будеть свойства гибкаго, или когла опустится глубоко въ гордо.

> Третій способъ какъ вынимать тыла останозившіяся вы ropat.

Какъ скоро не успъещь ни перстами, ниже щипчиками, или когда не возможно было упопребипь ни тъхъ ни другихъ, то надобно взять прибъжище къ крючкамЪ.

Kpickin. СпособЪ нанъ ихъ пригоднов-TOPEO 32нускашь.

Таковые крючки топичась можно еделать, загнувши на концъ прушикъ желъзной проволоки; запускають его плашия; и для удостовъренія своего о надать и въ правлени онаго, или дабы запустить его съ большею безопасностію, надлежить загнуть также и другой конець, за которой станень держать, имъющій служить вмісто руколтки, и ві которой вкладывается перств, дабы держать его тверже, предосторожность, которой не должно никогда оставлять для предупреждентя случаевь могущих иногда приключиться, когда подобные инструменты выпадуть из в рукъ Оператора.

> Посль того, какъ крючокъ пройдетъ за тъле сстановившееся въ горав, то надобно переворотить его, дабы зацвинть за твло, которое легко вынется вивсив сь онымь крючкомь.

вин слу- Крючки весьма пригодны еще бывають, кога жать наи півло несколько гибкое, какв про булавки, шпильки, maye Kb выпаски- рыбъя кость, и проч.: ежели они лежать поперегь ванію бу- въ горав, то крючокь, закватывая за средину, 110лавокъ,

покривляеть ихъ и вонъвышаскиваеть, или сеньли они рыбыкъ хрупкаго свойства, то къпереломлению ихъ служить, ностей и проч.

Четвертый способь, какъ вынимать тъла остановизшіяся въ горлъ.

Когда шъла остановившіяся въ горат будуть очень кольца. малы, или когда занимають нъкоторую токмо часть прохода, то, поелику могли бы они тогда легко ускользнуть от в крючка, или распрямить его сопротивлентемь своимь, употребляють кольца, сдъланныя изъ металла, или изъ шерсти, или шелку.

Что касается до кольца дълаемаго из веталла, способъ то для сего падлежить взять кусокь жельзной прово дать ноль. доки, то накой и довольно длинный; посреди согнуть из тверего вы кольцо, около дюйма вы поперечникь; оба контань, и ца несогнутыя должно держать параллельно, и принань оных двинуть близко одины кы другому: сти два копца служать кы торло вкладывается сторона сдъланная на подобте кольца; направляется кы остановившемуся ты кольствыться вытаскиваеть.

Но кольца гибкїя дёлаются изъ шерсти, нитокъ, шелку или тонкихъ снурочковъ, кои надобно навощить, дабы чрезъ то самое придать имъ болёе крёпости и твердости. Которое нибудь изъ сихъ колецъ способъ, привязывается къ рукояткъ жельзной, изъ китовыхъ канъ дверовь, пли изъ гибкаго дерева, посредствомъ котоща гибкигърой и опускается для зацепленія тель остановивших ми. ся и извлеченія оныхъ. Можно вкладывать и многія изъ такихъ колецъ другь въ друга, дабы надежнёе зацепить остановившесся тело, которое попадется въ одно, ежели минуеть другое.

Сего роду кольцо имъетъ еще одно преимуще- преимуство; а именно, когда однажды какое нибудь півло за- щества Голів IV. Фф цънжикою, сжать оное столь крытко вы кольцо такимы образомы завитое, что властены будещь всячески оное: двигать; а сте самое во жногихы случаяхы принести можеты великую пользу.

Пятый способъ какъ вынимать тела остановившіяся въ горль.

Морская губна. Другое средство употребительное въ подобных в случаях в есть морская субка: свойство, какое она имъетъ надуваться нарочитымъ образомъ при намочении ся, дълаетъ се весьма пригодною въ такихъ обстоят тельствахъ.

Споссбъ, макъ вкла-Дывать се.

Когда какое нибудь тело остановится въ горяв, но такъ, что не займеть всего прохода, то можно вложить кусокъ губки чрезъ пустоту, которую оставляеть оное тело въ проходе, и опустить ее далье самаго тела. Губка тотасъ станеть надуваться, и пртобрытаеть довольную величину въ семъ влажиомъ месть: можно даже способствовать къ скорвитему вспучентю оной, давая проглотить больному нёсколько капель воды, въ ту самую минуту, какъ губка будеть находиться въ горяв; тогда вытаскивается она за рукомику, къ которой привязана, и какъ она сделается слишкомъ общирною для небольшаго места, въ которое была пропущена, то захватываетъ съ собою и тело, служащее ей препятетвтемъ.

Другей способъ. Удобность губки къ сжиманію, когда бывает она суха, есть другая причина ся полезности. Въ такомъ случат кусокъ губки довольно общирный можетъ сжать быть въ весьма маломъ пространствъ, съ ниткою или лентою, которою обвиваютъ его кръпко, и которую весьма легко можно распустить и вытащить, послъ того, какъ губка пропущена будетъ.



Можно такожь сжимать габку вы прутикт изытрети китовых усовь, ращепленномы начетверо; но симъ способъ образомы трудно пропускать ее безы причинентя боль- ному раны.

Шестый способъ какъ вынимать тела остановившіяся вы горль.

Мит часто случалось видеть, что булавки или кусокт пругія вещи остроконечныя, остановившіяся въ горат, мяса тверь вытаскиваемы бывали помощію куска мяса твердаго, даго которой дашь проглотить больному, и тотчась вынешь съ довольнымъ усиліемъ. Средство сіе надежнте грецкой губки, и можетъ равнымъ образомъ имть усптьхъ желаемый.

Седьмый способъ жакъ вынимать тъла остановившіяся въ горлъ.

Наконецъ, когда всё нами теперь предложенные Рвота. Обстособы будуть безполезны, то остается еще одно столень средство, а именно произвести рвоту больному. Но ноторыхь она полезною быть можеть единственно для вещей она полезостановившихся просто; ибо въ такихъ случаяхъ, на быть когда бы они зацёпились, или пристали крёпко въ какой нибудь стороне горла, рвета могла бы причинить желикой вредъ.

Ежели больной можеть глотать, то для произ-ипекануведенія рвоты надлежніть дать ему піритцать пли анаг. сорокь грань ипекакуанны вы порошкь.

ВЪ прошивномъ же случав можно возбудищь рво- промывату, потрогивая въ горлъ перомъ. Естьли же средство тельное
сте будетъ безуспъшно, то должно употребить про-ту пабашмывательное; изъ декокту сдъланнаго изъ табаку, ко наго споторое составляется слъдующимъ образомъ:

собъ какъ
оное при-

Возьми табаку листоваго, - - одну унцію; готовлять

фф 2

Вски-

Вскипяти въ довольномъ количествъ воды; сте промывательное часто производило ресту, когда на-BCAKIA ADVIIA PEOMHELA оставались отош баншосп пицепными.

Back Hoemin люденіе.

Намасле-

RRIMOBPI

(Промывательное изъ табаку, почитающееся за онаго. Наб- послъднее средство, дъйствительно заслуживает вниманіе. Воть произшествіе описанное Г. Гиссотомв. Одинъ человъкъ проглошилъ большой кусокъ легкаго телятьяер, которой остановился посреди горла, и. проходь онаго совершенно заперъ. Лекарь испышываль безполезно очень многія средства: другой же видя оных в безполезность, и как в при том в больной ималь лицо черное и опухлое, глаза на выкапів, и страдаль облороками частыми, съ движеніями судорожными, предписаль ему вивсто промывательного, декокто изъ унціи табаку листоваго: лВкарство сте произвело сильную рвоту, такъ что отъ оной извержено было тъло остановившееся, которое бы больному смерть приключило.)

> Средства, какъ пробивать въ желудокъ тъла, кои внутренности повредить не могуть.

> > Какъ скоро остановившаяся вещь будеть такая;

что можно оную пробить вы желудоко, то есть, жабов, мясо, плоды и проч., какв то на страница 439 сего Тома говорено было, то можно испытать оное посредством восковой севтки деревянным в маслом в натерптой, и не много погрътой для того, чтобы была она гибче; или пыреемб, которой вездъ доная свъчка, усы и прот. с папь можно, но копторый удобно ломается, или ки повыми усами, жельзным в прушиком в, палочкою из в гибкаго деревя, на концъ которых в привязывается грецкая губка, и проч. Но всъ сти пъла должны бышь гладки и равны, дабы не могли они причинить ни мальйшаго раздраженія.

(Случалось иногда кЪ великому щастію, что твла, кои пропихнушь хошьли въ желу доко, прилинали K.To къ свъчкъ или губкъ, которыя употребляемы были для вогнанія их в внушрь, и св оными вонв выходили. Но сіе случается единственно еб тълами остроконечными. >

Ежели не взирая на всъ способы, на стран. 440 обстоя. и след. сего Тома предложенные, не возможно выта тельства, щить лаже и такія тьла, кон опасно бы было пропих- рыхв нахнушь въ желудоко; шогда изъ двухъ золъ надобно лежитъ избъгать хуждшаго: ибо гораздо лучше отваживаться пропяжина пропихивание оных в в желудоко, нежели остав желудонъ лять безь помощи больнаго, которой бы могь тот даженть часъ погибнушь. Тъмъ менье надобно имъшь сомнънія на вредвъ принятии сего намърения, что великое число примеровь доказываеть, что хотя и приключались часто великія бъдствія по проглоченій таковых в тъль, и самая даже смершь люшая, однакожь иногда они ми мальишаго зла не причиняли.

(Случается, сказываеть Г. Лиссото, когда сін тъла проглочены будуть, изъ четырехъ вещей одна которая нибудь; или, і) выходять они низомв; или 2) никакъ не выходять и умершвляють больнаго; или 3) выходять могою; или 4) чрезь кожу пробираются на ружу.

Когда выходять они имзомо, пто бываенть сте таковыя или по прошестви короткаго времени, не причинивъ тъла выпочити никакого припадка; или по прошеств и долгаго иногда ние времени, и тогда таковое извержение предваряемо зомъ. бываеть жестокою болью. Случилось даже, что чрезъ нвеколько дней выходили, без в причинентя муки, кость куриной лапки, косточка персиковая, булавки, иголки, всякія монешы, дудочка длиною дюйма въ чешыре, которая производила жестокую боль прое сутокъ и вышла благополучно; ножички, бришвы, башмашная пряжка.

Я видъль, продолжаеть Г. Гиссото, за нъсколько предь симь дней, иладенца двухь льть съ половиною,
который проглотиль гвоздь длиною больше дюйма, и
котораго шлянка болье трехь линей широты имъла:
гвоздь сей остановился было нъсколько минуть въ
горль; но посль прошель внутрь между тьмь временемь, пока по меня посылади, и вышель ночью съ
испражнениемо на низо, не причинивъ никакого принадка. Еще очень не давно цълая кость изъ крылушка цыплячьяго производила небольшую боль въ желу дкв въ
продолжении трехъ или четырехъ сутокъ.

Иногда тела сти остаются гораздо долбе, и выходять разве по прошестви многих месяцевь, не причинивь однакожь никакого вреда. Бываеть иногда и то, что ихь никогда не увидишь и совебыв не почувствуеть.

Но не всегда столь щастливо удается. Чаще тсего, котя тела выходять и нашурально, однакожь не иначе, какь причинивши жесточайшую боль вы желужко и кишкахо. Одна девочка проглотила несколько булавокь, оты которыхы терпела она несноснейшее колотье вы продолжении шести леть; наконецы по прошестви сего времени вышли оне наружу и она вылечилась. Три иголки причиняли целой годы облороки, судороги; по прошестви же сего времени вышли оне воны и больной сталь здоровь.

Случается иногда, что таковыя тьла, прошедь всь кишки, останавливаются вы заднемы проходь и причиняють мучительные припадки, но которымы искусный Лькарь почти всегда пособствовать можеть.

жанения не Во вторых в от проглочения вредных в тель выходять происходить то, что они причинають жесточайте при-

жество людей вы подобных случаях в находится: 60льнаго:

Одна дъвочка проглотила нъсколько булавокъ, кои во рту держала: часть оныхъ вышла низомъ; но другая часть исколола кишки и даже брюхо съ неслыжанною болью. По прошестви прехъ недъль погибла стя больная.

Одинъ мущина проглошилъ иголку, которая проколола желудокъ, прошла въ петенз, и погубила больнаго тахоткою Шупъ, упущенный изъ рукъ при осматривании горла и проглоченный, умертвилъ больнаго по прошестви двухлътняго времени:

Правда, мы видимъ ежедневно, что многіе глотають монеты изь разных в металлово, не чувствуя
оть того ни мальйшаго принадка; быль такой даже
случай, что одинь человькь проглотиль до ста луидоровь, кои всв вышли низомо; но столь удачные
случай не должны внушать излишней безонасности.
Одна монета проглоченная заградила сообщеніе между желу дкомо и кишками, и смерть причинила. Весьма часто глотають безвредно косточки плодовь; но
есть примъры людей, у которых дълались оть нихъ
завалы, кои были причиною смерти, послъ великихъ
мукь, какъ то приводятся о семъ наблюденія въ Медицинскомъ Журналь, смотри Ноябрь 1779 года.

Одна женщина, которая умерла от в снут ренней михорадки, извергнула при последних в днях в жизни несколько косточек в сливных в, и наконец в два тела неправильных в всличиною св небольшой грецкой орех в, кои у меня сохраняются. Равный в образом в и они суть не иное что, как в сливныя косточки, кои по времени покрывались веществом в темноцветным в, ноз-

сихъ двухъ тъль, всякъ видъть можетъ зерно ко-

Ман выходамъ онн мочою,

Третій образь, коимь сій шёла выходять вонь, есть посредствомь моги; но таковые случай бывають рёдки. Булавка средней величины вышла при мочененусканій чрезь три дни послё проглоченія оной. Чрезь сей же каналь у однихь выходила небольшая кость, косточки вишневыя, сливныя, и, какь сказывають, персикь; всякому разсудить не трудно, что сіє послёдовать не могло безь причиненія самой жесточайшей боли.

или чрезЪ вожу. Последній путь, чрезь который выходять иногда тела и неваримыя желу жома и вредныя, попадающія вы желу дока, есть кожа. А дабы сіе могло случиться, то потребно, чтобы они прошли насквозь желу дка или кишока, и причинили вереды, кои векрываются сами собою, или которые должно бываеть вскрывать. Часто остаются они очень долгое время прежде нежели совертать сей путь: иногда такожь боль бываеть непрерывная; а иногда больной страдаеть токмо по временамь. Вередо делается или на желу дка, или на других вастяхь брюха. Иногда такожь тела сіи, прошедь сквозь кишоко, простираются путями особенными, и выходять далече отв брюха. Одна проглоченная иголка вышла, по прошествім четырехь лёть, вы ногу, а другая вы плече.

Всв сін примвры, кои мы за нужное почли здвей привести, и множество жесточанших в смертей, причиняемых в твлами проглоченными неосторожно, до казывают в необходимость, чтоб выть в разсужденій сего осторожным и свидвтельствуют как в говорить тот же Г. Гиссот в противу безразсудност ужасной, и я смью сказать, злодвіственной, чтоби забавляться играми, могущими причинить подобныя зложность.

жлюченія, или такожь держать во рту тёла, кои; выпадая по неосторожности, или по какому нибудь случаю, бывають причиною смерти. Можно ли, безь содроганія, класть вь роть иголки, буласки, геозди, какь то всегда дёлають ремесленники; а особливо обойщики, портные, швеи, торговки модь, кои много болтають, разговаривають, вездъ расхаживають, на-полнивши роть гвоздьми, булавками, иголками, и проч., когда помыслишь о ужасныхь бёдствілхь и лютейшей смерти, которую причинить они могуть?

Пользованіе, какое употреблять надобно, когда не мод жно вынуть, ниже пропихнуть въ желудокъ тъла остановившіяся въ горль.

Какъ скоро увидишь, что встусилія, какія толь- надобно ко ділаєшь къ извлеченію тьла посторонняго, или оставнть попытин. Къ пропиханію онаго въ желудоко, будуть безплодны, для чего з то надлежить оныя оставить; поелику соспаленіе, которое бы оть того произошло, естьли бы болье настоять сталь, могло бы сділаться столько же опаснымь, какъ и самое тьло постороннее. Ибо часто умирали больные оть сего соспаленія, даже и послів извлеченія онаго тібла.

Чего ради, въ самое то время, какъ станеть употреблять тоть или другой предъ симъ нами совытованный способъ, надобно давать больному глотать, а при томъ и часто, какую нибудь жидкость мясти- давать тельную, какъ то сыворотку, молоко пополамъ съ во питье мягалою, ятную воду, или декокто изъ листу большаго чительное; проскурняку, но всегда теплыя.

Ежели он в глошать не можеть, то надлежить или ширка вливать сти же самыя жилкости посредством в кривой цовать трубы или чубука, наставляючи оныя вы горло. Торло. Торло или рищовантя не токмо умягчають раздратов. Тома IV.

женныя части; но еще, когда ихъ пускаешь съ нъкоторымъ усиліемъ, способетвують часто лучше къ
отперенію горда, нежели всякіе другіе инструменты.

Когда, по испышаніи шщешном в всяких в средств в, принужден в будешь оставить тёло в в горл в, то надобно пользовать больнаго так в, как в будто бы он в одержим в был в действительно бол в знію воспалительною. Надлежит в пустить ему кровь; содержать его на діэт в легкой, и около шей прикладывать катаплазты млегительныя. Нужно також в пользовать его сим в способом в, естьли подозреваеть воспаленіе в в горл в, хотя бы остановившееся тело и было из в онаго вышашено.

Кровонусканіс. Кащаплаза мы.

Иногда потрясение и движение, простертыя до известной степени, действительные самых инструментов в ко освобождению тель остановившихся вы горав. Часто одины толчокы вы спину освобождаль оныя; но сте средство верные и сильные бываеты тогда, когда тело остановится вы дыхательном горае. Вы семы послыченые случае надобно еще новытаться произвести сихание и реоту. Ибо остановившися вы горае булавки очень часто бывали освобождаемы оты скорой взады верьхомы или вы кареть.

Пользованіе, когда неудобоваримыя въ желудкъ и вредительныя тъла, остановившіяся въ горлъ, пробиты будуть въ желудокъ.

Aisma.

Acmaa.

КакЪ скоро вещества несваримыя желудкомо пробиты въ него будутъ, то надлежитъ предписать больному пищеупот ребленте болеутолительное: яства его должны состоять единственно изъ плодовъ и вещей клёбныхъ; изъ поклебокъ, суповъ и проч. Ему воздерживаться надобно отъ всего того, что можетъ разгорячить или раздражать, какъ то, отъ вина, пуншу, масла, перцу и проч. Пить долженъ онъ молоко пополамъ съ водою, ятную воду, сыворотку и проч

Пишье.

TLOAB.

Пользование, когда остановившееся тыло совершенно на полняеть гооло.

Когда горло такъ загорожено будетъ тъломъ, патемень въ немъ остановившимся, что больной не можетъпро ныя пропускать никакой пищи, то надлежить питать его мыватель. промывательными извопваровь, желе или студеней и проч.

Наконець, когла больной находишел въ опасности, чтобы не задушило его, естьли не остается никакой надежды къ освобожденію его, и когда смершь каженися близкою, ежели не будеть возвращено дыжание скоро, то надобно тотчась рышиться на брои-прорязыжотомію, що есть, на вскрытіе дыхательного горла ваніе ды-

Сія, операція не составляеть никакой трулности горла. ДЛЯ мекуснаго Лъкаря, и не причиняеть великой ція, не буболи страждущему. Не ръдко бываеть она единымь дучи сосредством в колохранению жизни, в в таковых в неша-пряжена стных обстоятельствах в. Почему мы и совътуем в болью, слуупотребленте оной, котя дълать ее долженъ един-житъ ственно Лъкарь весьма искусный.

(Посредствомъ сей операціи вынимали часто ствомъ къ кости, бобы, и другія вещи, а чрезь то спасали многихь жизни. больных в. Но как в предразсуждентя суть весьма упорны, поелику многіе страчатся всякой операціи, и какЪ не токмо, дабы хотыть согласинься въ томъ, что сія легка, воображають по глупости своей, сказываеть Г. Гиссотв, нвито варварскаго въ такой операціи, которою векрывають горло: то весьма нужно, чтобы люди просвъщенные соединились противъ таковаго предразсужденія. Можеть быть такожь желательно бы было, чтобы законы отнимали у родителей право сопрошивляться операціи, когда она признана за необходимо нужную. Она бы предостерегла ихЪ

X x 2

жательнаго Сія операелинственнымъ сред-

dmo

отъ ужасной скорби, какую претеривли тв, которые отректись на сте согласиться, приходили въ отчаянность, видя, по удобности, съ каковою вынимали оное твло по смерти, чрезъ легкое надръзанте, сколько легко было спасти человъка, коего упорное ихъ невъжество привело ко гробу.

Проркамваніе горжа пащепріємнаго.

Надобно на все покушаться, когда идеть дело о жизни человека. Вы случать же, естьли бы какую нибудь вещь не льзя было вынуть изы горла пищепрісемнаго, или естьли бы она не могла тамь оставаться не умертвивы скоро больнаго, многіе советують делать прорезываніе на самомы горле пищепріємномо, для извлеченія оной, и употреблять то же самое средство, когда тело, которое падеть даже вы желу доко, вы состояніи причинить припадки могущіе скоро умертивить больнаго.)

\$ 2.

о припадкакъ смертельныхъ, приключающихся от потопленія, паденія, ударовь и проч.

члень І.

О припадкахъ, и очевидной смерти, приключающейся отъ потопленія; или о утопленникахъ.

Какъ скоро человъкъ пробудеть четверть часа подъ водою, то не должно имъть великой надежды о возвращени ему жизни. Однакожъ, какъ многія обстоятельства могуть способствовать къ содержанію жизненной теплоты въ тъхъ, кои находятся въ семъ бъдственномъ положеніи, то и не должно оставлять таковыхъ нещастныхъ очень скоро плачевному ихъ жребію; а надобно напротивъ того испытывать веякіе способы возможные къ ихъ спасенію; поелику множество находится примъровъ, довольно доказанныхъ, о такихъ, которымъвозвращена была жизнь

жизнь по вышащени их из воды, при всъх признаках смерши, и когда оставались они нарочитое время не подавая никакото знака жизни.

Вспоможенія, какія падобно оказывать утопшимъ для воззращенія имъ жизни, когда кажется, что они ее лишились.

Прежде нежели мы приступимъ къ матерїи, описаніе предложимъ здесь описаніе вещамъ содержащимся въ відина ящикъ, который находиніся во всёхъ караульнахъ маго куторода Парижа и другихъ городовъ во Франціи, рав- атъ- ан- но какъ у большаго числа знатныхъ помещиковъ и трено, и приходскихъ Священниковъ тамошнихъ. Ящикъ сей, немъ с. называемый буртово- антерено, и коимъ мы обязаны благо- держащихъ творности одного великодушнаго гражданина, Г. Пта, см. бывшаго прежде мъщанскимъ головою въ сей столицъ, содержитъ:

- г. Шерствной колнакЪ, которой надъвается утопленнику на голову.
- 2. Два шерспіяных в полошенця, коими делають ся тренія, так в как в ны ниже говорить станем в.
- 3. Шерстяное покрывало, на полобіе боложона, коимъ покрываю пъ утопшаго, какъ скоро его разлънутъ.
- 4. Четыре роля табаку курительнаго, каждый: въ половину унціи.
- 5. Маленькую коробочку, содержащую въ себъ многіе пакещцы рвотнаго, каждый въ три грана.
- 6. Двъ бутылки мърою въ два фунта, наполненныя канфарнымо спиртомо, смъщанным в съ нашаты рны мо спиртомо летучимо (spiritus salis ammoniaci volatilis).
- 7. Хрустальную сткляночку, содержащую въ себъ пашатырный спирто летутій жидкій, который есть тоже самое, что и соль щелоко-нашатырная жидкая.

- 2. Жельзную ложку вылуженную.
- о. Трубочку для вдыханія воздуха въ грудь.

10. Курительную машину, въ которой зажигающь табака, посредствомь раздуващельного меха, служащаго равнымъ образомъ къ пропущению дыма въ головки машины, на носу котпорой приделан в гибкой чубукЪ, оканчивающійся трубочкою, которая вкладывается въ задній проходъ. Трубочка сія бываешь двойная, дабы одна могла заменить другую, въ случав естьли бы та засорилась.

Накобне прежде mcero Zo-EMINE.

ВсякЪ чувствовать можетЪ, сколько нужно бытъ запасену таковым в нинком в, как в скоро хочешь поспать сей могать утопленнику. Следовательно прежде всего и надобно узнать; находится ли ящикъ сей въ томъ мвешь, гдь вынушь изв воды утопшій; а ежели онаго нъшъ, то послать немедленно кого нибудь изъ вспоноществующих в в самое ближайшее мъсто для выпрошенія его у того, кто оной имбеть. Всякь, кто бы то ни быль, въ семь случав не откажеть; и поелику они весьма умножились, такъ какъ мы недавно сказывали, то естьли хотя мало посившить принявшій на себя сей прудь, благовременно достапь ее будеть можно.

и сыскашь двукЪ

Еще нужно весьма имъть трехъ или четырехъ человък в разумных в, потому что большая часть вспонами шрехь моженій, нами теперь упоминаемых в, должна быть знающихъ употребляема въ одно время, и каждое различнымъ человъкомЪ.)

> Первое, что надлежить делать, когда будеть вышащено изъ воды тело утопленника, есть перенести его, какъ возможно скорве, въ такое место, гав способно будеть подать ему вспоможенія, для его состоянія нужныя. Но надобно весьма остерегаться, пере-

нося его, дабы не нести его такъ, чтобы слълался ему от в того какой нибудь воель, кли толканіемъ его обо что нибуль, или несентемь его въ дурномъ положении, какъ то держа голову его внизъ, или въ какомъ иномъ положении ненатуральномъ.

Следовашельно кладешся он в на посшелю, или на солому, такъ чиобы голова его была немного повыше, а прежде положить его должно на роспуски или на плеча кому нибудь; однакож в нужно, чтобы он в находился всетда въ положении сколько можно самомъ прямомъ. Естьли утопленником в будеть младенець, то тело его нести должно на рукахЪ.

(Витето того, чтобы нести утопленника на пле. Какимъ чахЪ, чего не льзя сдълать не давая тълу положентя образомъ прошивъ напуры, всегда вреднаго, попребно, дабы утоплен-Ава человъка, или и большее число, иссли онаго съ осто ника. рожностию, или положивъ его на руки, переплетя себъ оныя, или такожъ посадя на руки между собою соединенныя. Перенесеніе таковое должно происходить со всякою поспъшноснію, дабы меньше умеданны употребленіемъ вспоможеній потребныхъ.)

Какъ скоро хочешь возвратить жизнь человъку, показанія. который кажется мертвым в по наружности, то первый кон должпредметь, какимь заниматься должно, состоить въ но выполь возбужденти теплоты естественной, от коей зави-употребсять двиствія жизненныя, и въ приведеніи въ движе-леніи вспоніе сих в действій чрезв употребленіе лекарство раз-меженій. Аражающихъ, не токмо прикладываемыхъ на кожу, но еще и пропускаемых в в легкія, кишки, и проч.

Хошя бы холодъ и не былъ никакъ причиною первое посмерти утопленниково, однакожъ становится онъ весь назаніе: ма сильнымъ преплиствиемъ къ возвращению имъ жизни. Чего ради снявши съ утопшаго мокрое его платье,

наллежить тереть его крынко и вы продолжени довольнаго времени, снизу вверьхъ, а особливо впадиии желу догную, шерстяными полошенцами, кои должно держать столько теплыми, сколько будеть возможно; и тотчась, какь скоро довольно теплая посшель пригошовищся, положишь его на оную, головою повыше, продолжая тереть безпрестанно. Сверьх в того надлежить надъть ему на голову шерстяной колпакъ, и покрыть ето одъяломъ, которое следано на подобіе рубашки или болохона. Надобно такожъ прикладывать ему салфетки довольно теплыя на желу доко и на брюхо и киринчи нагръпые, или бупылки съ теплою водою къ подошвъ ногъ или къ ладонямЪ.

Mongues ? OTSP REK жадобно на-Ymonach-

(СЕ величайшим в тщаніем в надлежить наблюдать порядокЪ, коему должно слъдовать въ пользовании чать ото- утокленниково для возвращения имъ жизни. Причина, драниемь для которой надобно начинать съ отогравания ихв, есть весьма явная, естьки хотя мако станешь разсуждать со вниманиемЪ: ибо не льзя взяться за то. чтобы возвратить жизнь вы тель, пока кровь не можеть обращаться въ ономъ; и всякъчувствуеть, что таковое двиствие не можеть имъть мъста, пока оная жровь не будеть приведена въ состояние жидкости способной имъть течение. А какъ она не можетъ приобрѣсти сего состоянія, пока тѣло не будеть отогръщо такъ, чтобы имъло растворенте способное дать ей оную жидкость: то следовательно не можно предпринимать никакого вспоможентя итоплениикамв, пока напередъ не отогръешь ихъ довольно, дабы к рось их в савлалась жидкою.

> Г. Лиссото повъствуеть, какъ то ниже сего видъть можно, исторію объ одной дъвиць, подтверждающую совершенно необходимость, чтобы следо-BaIIIL

вать предписываемому от в насъ теперь способу. Лы вица сія, вытаменная изъ воды, остававшись въ оной долгое время, была скоро отогръта наружно: когда пришла она въ чувства, то первыя ея слова были, студено, студено; доказательство, что не взирая на все сабланное къ отогрънию ея, чувствовала еще она хололь весьма великой.

ВЪ следстве чего желательно бы было, дабы потребно къ орудіямъ запаснаго ящика, о которомъ говорили мы бы присоне давно на стран. 453 и следующ. прибавили и не- вокупить больной терлометра самой простой, въ которомъбы ному ящи. означена было единспрвенно придцать вторая или ну и терпридцать претья степень термометра Реомюрова Для чего? съ следующими словами: Геплота крови, или какую Должно дать или доставить утопленикамв.

Естественный и легкій жарЪ одного или двухЪ человъкъ здоровыхъ, лежащихъ нагими съ каждаго боку подлъ утопшаго, бываль спасителень во мнотихъ случаяхъ. Больнаго кладутъ на бокъ, а тъ, которые ложатся съ нимъ, оборачивающся передомъ своего тела къ обоимъ сторонамъ невла утоплени-K08a.

Кожа содранная топтась съ барана, можетъ также употреблящься съ пользою, для покрытія и оппограванія больнаго.

Надобно держать чрезъ все сте время окна или несоходидвери комнаты отворенными для вольнаго воздуху, мость воз-Не должно пускать туда кромъ людей, кои необхо жаго и димо нужны; поелику возвращение утопленику снясвиять жизни зависить не мало оть чистоты и движенія ві комчать воздуха; его окружающаго. Надлежить притомь по утоплеступать по Плану общества, составленнаго в Поплонъ ев пользу утопшихв, внесенному въ трешью часть 1774 года, Обстоятельного описанія успіхово усрежденія. JoME IV. Kakoe

какое городо Парижо сделало во пользу утопачинко. cor. I. Il a (Détail des succès de l'établissement que to ville de Paris a fait en faveur des personnes novées par Mr. Pia.)

Aemy vis фиципа ... лет учій.

Надлежить давать ему часто подъ нось крепески. На- кие спирты летуси, (какъ на примъръ спирто нашаты рный летугій; его впускать можно такожь м въ ноздри, посредствомъ маленькихъ трубочекъ бумажных в, на подобіе свътильни, кои в в ноє в вкладывать должно несколько разь, но шолько не мешкая.

Тренія . епиршами»

Во время сей операціи другой вспомоществующій лолжень тереть ему спину и впадику желидотилю полотенцами намоченными въ водкъ или въ спиртъ тепмыхв, прибавивв туда спирту нашаты рнаго летикаго: еще надлежить потирать виски спиртами летучими. и душь ему въ ноздри порошки раздражающе, какъ то тертой табака или маерана.

Таыканае yema ymoпленику.

Для возещановленія же дыханія потребно, чтовозаука въ быт сильный теловъкъ дулъ, изъ всей силы своей, въ уста больному, пощинывая между твув у него ноздри перстами. Какъ скоро онъ примътитъ, по возвышенію груди и брюха, что воздухо прошель вы легкія, и оныя наполняєть, то должень перестать душв; погда пожимая грудь и брюхо, для изведенія онаго впущеннаго воздуха, будеть повторять сію операцію нісколько разв сряду, проводя таким в образомь воздух вопять вы легкия, и изгоняя ето оттуда чрезъ прижимание груди и брюха; словомъ, подражая, сколько возможно будеть, чрезъ таковое вамкание искусственное, действиямь дыкания естественнаго...

. Какъ скоро не можно успъть въ томъ, чтобы въ коздри. впустить воздухб въ лескія, дуючи въ уста, то на-40.0

добно попышаться ввести его въ одну ноздрю, зажавши крепко другую, равно как и самый рошь.

Локторъ Монро предлагаеть для сего дъйствія деревянный чубукь, расположенный однимь концомъ для заняшія ноздри, а другимъ такъ, чтобы можно было душь вы него риомы, или для вкладывания онаго въ трубку раздувальнаго мъха, которой въ томъ же самом'в намерении унотреблень будень.

(Вдыхальная трубоска, находящаяся в в запасном в способъ ящикв, весьма способна для сей операціи. Одинъ ко- напъ упонецъ сей прубочки должно положить утопленику проблем трубочку въ рошъ; а другой конецъ берешъ въ рошъ свой и вдых дълуеть вспомоществующій. Какъ скоро онъ хочеть ную нов онящь изчащь душь, що зажимаеть двумя персшами ящика кожаную трубу оныя, дабы воздухо не вышель изверуди утопленика; равнымъ образомъ пощипываетъ онъ стю кожаную трубу и для изовжантя выдохновенти.

наетъ приходить въ себя, могли бы наполнить стю трубу и попасть прямо въ ронгъ тому, кто дуетъ. А какЪ сїн выдохновенія суть чрезвычайно непріятны и отвратительны, то и должно всячески стараться, дабы убъгать оныхЪ.

кои, выходя изъ желу дка у топленика, когда онъ начи-

Но чтобы таковое вдыханте двиствовало как в на-40бно, то нужно иногда раздвинуть зубы у утопленика, когда оные бывають очень сжаты, дабы можно было вложить туда конець трубочки. Тогда надлежишь прилъгать къ ручкь жельзной ложки, которал вь семь случав отправляеть должность рычажка; и весьма нужно, когда захочень делать таковое разнятіе, употребить самую величайшую осторожность, жабы не свихнушь челюсти у того, кому помогащь намъреваешься.

Когда симъ образомъ достигнешь до того, что Разнимешь зубы, то надлежить содержать их в от-II II 2 Bep-

веретыми, положа между ними небольшой кусокъ дерева толщиною въ пенекъ вдыхальной трубочки, дабы вкладываніе оной было не трудное. Надлежить такожь во время вдыханія не забыть зажать ноздри у утопленика; а иначе воздухв, которой впущень будеть въ роть, можеть выйти чрезъ ноев, отв чего операція сія была бы безплодною. Но между тъмъ, какъ совътуемъ мы зажимать ноздри у утопленика, надлежить такожь наблюдать, что не надобно ихъ держать столь крытко сомкнутыми, дабы воздуха не могъ временемъ изъ оныхъ выходить; ибо тотлабы не льзя было установить дыханія искусетвеннаго, о которомъ мы недавно говорили. Следовашельно и надобно по времени ошнимашь персшы, коими прижать нось, и подавливать грудь и брюхо, такъ какъ мы на страницъ 458 сего Тома совътовали.

Mpop 83hr ваніе дыжательнаго горла.

Но когда не можно ввести воздуха в в легкія ни чрезЪ рошЪ ниже чрезЪ ноздри, то должно вскрыть дыхательное горло; и сія операція, называемая, какв то мы уже говорили, бронхотоліго, не можеть дълана бышь никъмЪ, кромъ весьма искуснаго Лькаря; а потому и не для чего намъ заниматься описантемъ

Hamambip-НЫЙ спирить летучій Пріемъ.

(Во время употребленія варугь, сколько возможно, вспоможений, о которых в мы не давно предлагали, надобно еще попытаться дать проглошить энутренно утопленику какихъ нибудь кръпкихъ жидкостей, какъ на примъръ кашаты рнаго спирту летутаго. Надлежить взять ее двенадцать или пятнадцать капель въ столовую ложку воды; влить составъ сей въротъ утопленику, и держать ему голову наклоненную назадь, дабы способствовать проглогенто онаго. Надобно повторять сей пртемъ больше или меньше до тъхъ поръ, пока онъ не придеть въ память и пулься не возвращинися. Exc.

Ежели спустя нъсколько времени послъ того обстоякак В утопленик в приняль стю жилкость, примытищь, тельства что она производить тошноту вь желудкв, которая ющія вотщебы только его томить могла, потому что она рвотное. не производить рвоты дъйствительной: то въ таком в случав надобно распустить три грана реотнаго въ трехъ или четырехъ ложкахъ воды, которыя и давать ему глотать одну за другою. Естьли станешь его рвашь, то должно поить его шеплою водою для вспомоществованія реоть. Естьли же лікарство сте звиствуеть равномърно и низомб, тогда, какЪ для уменьшенія рвоты, такЪ и для укръпленія утопленика, надлежинъ давань ему по маленькой кое фейной ложечкъ канфарной водки, какая находится въ водия нанзапасномо ящикв. Она составлена такъ, что разби-фарная. васнів реопіное и деласть оное недействительнымь; и тогла она равняется крапительному, потогонительному и мотегонительному, то есть действуеть и потомв и могею. Смотри шестую часть обстоятельного описанія успахова и проч. Г. Піа, 1777 и 1778 год. етран. 29 и 30.

Но- нашаты риый спирто летугій не токмо сеть лекарство прибавочное вы пользованіи, какое должно употреблять нады утопленикали. Г. Сажо не обинуяся сказываеть, что оно есть главное и вое, каковое только вы семы случат употреблять дожно, и вы доказательство тому предлагаеть следующее наблюденіе, по которому многократно по томы поступалы даже и вы Англіи Лондонской Лекарь Г. Милфорто.

"ВЪ 1777 году, Іюля 20, говоритъ Г. Сажд, пьяный "человъкъ, усмотря нъсколько человъкъ въ скафан-"дръ, то есть, въ платьъ подшитомъ пробками, на "ръкъ Сейнъ, подумалъ, что и онъ можетъ по приэ, мъру их войти и ходить во водь; потому ли это , онъ воображаль, что вода не глубока была въ ономъ , мъстъ, или потому что почиталь себя довольно , искусным въ плавании, дабы выйши изъ оной. Но , как в бы то ни было, снять св себя платье и бро-, сишься въ воду было дъйствие одной минушы. Сколь-, ко ни кричали ему, чтобы берегся, но онъ ни мало , не уважаль шывь, и восхищался усныхами своими. , пока еще держался на ногахЪ; но какЪ вскоръ стрем-, лентемъ воды понесло его, то онъ скрылся изъ . глазъ. Чрезъ нъсколько уже минутъ увильли его но-, ги на поверьхности воды, и онъ опять пропаль. . Спустя болье двадцати минуть, какъ онъ уто-, нуль, одинь перевощикь вышащиль его изв воды. . Сезв движентя и безв пулься, а глаза у него оыли , открыты и неподвижны.

"Одинъ изъ плавающихъ при помощи скафандры, приближился къ лодкъ, впустиль нашаты рассо спирту метусто въ ноздри утопшему, и влилъ еще ему метыре или пять капель онаго въ ротъ. Вдругъ сей меловъкъ дыхнуль сильно, сталь извергать волу съ пъною, и оправившись, сказаль: я здороед. Переможно, видя его стоящаго, проговорилъ: мит бы должно было отнести его ед караульно, пока онд "былд утопленикомд, то бы я нажилд луидорд. Друмой же ухватя свое платье, думаль по тъмъ сло, вамъ, что хотять посадить его въ тюрьму; и такъ "скочивши вдругъ съ лодки на землю, убъжаль отъ "перевощика.,

Ежели различныя вспоможенія недавно показанбашный, ныя, найдушся безуспынными, що надлежить впувпускаемый вы скать табашной дымь, на подобіе промывательнаго, эздній про- чрезь задній проходо, для раздраженія кишоко. Многія жодь изобрытены машины, такь какь и та, которая находитен въ запасномо ящикв, выше сего на стран. 453 ж следующь сего Тома описанной, для употребленія таковых в промывательных в, и немелленно надобно приналься за оныя, как в скоро их в достанешь.

Но за неимвијемъ оныхъ, можно унотреблять способъ, обыкновенную курительную трубку. Вы нее наклады нанъ его вается курительный табака, который надобно смочишь, прежде нежели раскуривань станеть, чубукъ вкладывается въ задній проходь; зажженная трубка Обершывается лоскутомъ бумаги, на которой наколоты многія скважинки; на бумагу надобно дуть такъ, чтобы дымь направить вь чубукь, воткнутый вь задній проходь; или шакожь можно принаровишь къ Раскуренной шрубкъ другую шрубку и душь въ чубукъ сей послъдней.

Еще можно впускать табашный дымв и следую. щимъ образомъ: надлежитъ взять трубочку обыкновеннаго ручнаго насосца или шприца, къ которому привязать небольшой пузырь, или мешечикь, и трубочку вставить въ задній проходь. Потомь отверстіе мышечка или пузыря закрывается чубукомъ, около котораго завязывають крыпко мышечикь; наконець раскуривають трубку и направляють дымь, такь какв выше сказано.

ВЪ случав же естьли бы не возможно было впускать промыть Автму табашнаго въ кишки, надобно прибъгнуть къ тельных пропыстыельны ий изъ шенлой воды, въ кошорую при- и вина. бавлять несколько сели и сина или крепких спир- нап изъ тово, и оныя повинованно заправний выпо и боом вань ихъ инструментомъ обыкновению для проливательных в употребительным в, а именно, шприцом в, мли мвшечкомъ, или пузыремъ съ трубочкою: но какъ должны они проходить очень далеко внутрь, то го-

раздо лучие употреблять шприцъ извъстной вели-

Теплан Ванка. Между тъмъ какъ одни занимаются сими вспоможентями, кто нибудь долженъ приготовить теплую санну, въ которую поставить утопленика, ежели средства уже испытанныя будутъ безуспътны. Естьли же не способно будетъ употребить санны, то надобно зарыть тъло больнаго въ соль, песокъ, какой нибудь хлъбъ, золу и проч. нагръвши прежде оныя.

Ніблюде-

Г. Лиссот упоминаеть объ одной дъвицъ, которой возвращена была жизнь, когда уже по выписщени ее изъ воды все тъло у нее разлулось и опухло, такъ что она имъла всв признаки смерти. Ее положили нагую на теплую золу, покрыли также другою золою равным в образом в теплою; на толову нальли колпакь и шею ен обернули чулкомь, кои наполнены были золою, и сверьх всего окушали ес ольялами. Какъ пробыла она полчаса въ такомъ положеніи, то пульсо у ней возвратился; а притомъ опамятовавшись, закричала: студено, студено. Послъ чего дали ей немного вишневки и оставили на восемь часовъ зарышую въ золв. По окончании сего времени она вышла оттуда, безъ всякой другой боли, кромв усталости или слабости, которая чрезъ нъсколько лней совсвыв миновалась. Еще сказываеть онв, что посредствомЪ теплоты отЪ кучи навозной оживленЪ быль одинь мужчина, которой шесть часовь находился подъ водою (1).

IIpo.

⁽¹⁾ Смотри отвъты Г. ніа на письма Г. Аббата жанена, въ разсужленіч пенлой золы на стран. 83 обстонтельнаго описанія учрежденій, учиненнаго городомь парижемь въ польгу утопленивовь, изданів второв, и стран. 16 дополненія въ сему, описанію, и проч. Сверько жого смотри стран. 17, 18 и 19 шестой части того же сочиненіл.

Прежде нежели больной подасть какіе либо зна- не издобие ки жизненные, и пока не будеть вы состояніи гло- ничего давать вы тать, безполезно бы было и даже опасно вливать ему роть какую нибудь жидкость вы роть. (Но должно изы сего утопле- всеобщаго закона изключить истаты рили спирто нику, нометутій, который, какы то мы вы наблюденіи на стран. Ка оны не будеть вы 463 видыли, былы первымы и единственнымы вспомо- состояніи женіемы; да и никогда излыченіе не было ни столь глотать. Вынлючал наша.

Ежели должно давать съ величайшею предосто- тырный рожностію жидкости утопленику, прежде нежели онъ надле- придеть въ состояніе глотать,) то однакожь можно жить ему ему промачивать почасту губы и языкъ перомъ обмок- премачинутымъ въ теплой водкв, или другихъ спиртахъ назыкъ крвпкихъ; и какъ скоро онъ возвратить способность спиртами, глотать, то можно давать ему временемъ по ложкъ теплаго винограднаго вина, или какого нибудь напит-ка крвпительнаго.

Многіе совътують давать утопленику реотног, Средства; какь скоро онь не много придеть вы чувства; но наих провесегда гораздо лучше производить ез немо реоту, не избодить употребляя никакого реотнаго. Можно для сего дъйреоту, не ствія будеть попытацься щекотать вы горль пухомы давая ему пера обмокнутаго вы деревянномы масль, или какою реотнаго. нибудь другою вещію мягкою, которая бы не вы состояніи была повредить тьхь настей.

Т. Гиссото присуждаеть давать вы такомы слу-уксомедь чав уксомедь морскаго луку (Охутев sciliticum), на морскаго каждый пртемы по ложкы вы небольшемы количествы луку. воды, и повторять чрезы каждую четверть часа даже до шести разы; а ежели не льзя скоро достать сего лекарства, то совытуеть вывсто онаго употреблять крыкой настой изы малфею, изы цевтово роматко-сыхо, пли изы травы кудрясый солгецо (herba cardui Гомо 19.

benedisti), подслащенный медомя, или просто смъшанный съ теплою водою, прибавивъ къ ней не много обыкновенной соли. Но надлежить примътить, что совътуя всь шаковыя лекарства, Г. Гиссото не хочеть, чтобы дава. ли ихъ въ довольно великомъ количествъ для возбужденія реоты і но почитаеть оную ни мало не у мъста въ полобныхъ случаяхъ.

Не надобно прерывать BCHOM OKEленикъ и Казалск прикодя. чувешва.

Proma He нужна.

Какъ скоро больной начнетъ подавать нъкоторые знаки жизни, то надобно крайнъ бъюстись, даній, кошя бы перестать ділать ему вспоможенія; ибо иногда бы утоп- умирает в онв посль сихв первых в признаков выздораеливанія. А напрошивЪ того должно продолжать всегда припарки теплыя и раздражающія, и давать ему чашимь вы сто вы небольшомь количества напишки крапительные.

Oscmonтельства. MOK43 V10= пусканіе.

Наконен в хотя бы он в и явно быль оживлен в однакожь остается иногда у него щемота, кашель, движенія лихорадотныя, признаки составляюще подлинную бощіл кродо льзнь. Въ такомъ случав и надобно пустить кровз больному изъ руки, давашь пишь ему въ великомъ количествь воду ятменную, изв цевтова самбуковыха, или всякой другой грудной отвард болеутоли-MEABHBLU.

СЪ какею осторождобно пускашь кровь ушопленикамЪ.

(Надлежить примътить, что не прежде кровопускание совышуется, как в по явном в оживлени больностію на наго, и когда бываеть щемота, кашель, жарб и проч. Ла и подлинно кровопускание не должно быть употребляемо безЪ разбору во всякихЪ случаяхЪ видимой смерши, а шъмъ паче надъ шълами охладълыми и какъ бы ледяными. Не благоразумно, сказываеть Докторь Ялександра Жонсона, отваживаться на оное, пока тело не возвращить нъсколько прежней теплоты: въ подобномъ случав не должно почитать его за необходимо нужное. Ибо часто случалось, что кровопускаміс умедливало самым возвращенісм в жизни, а иногда и смерсмертоносныть бывало для того человька, котораго оживотворить старались.

Какого бы хорошаго дъйствія ни ожидали от в крокопукровопусканія, однакож весьма нужно предув в домить, снавів не чио оно не должно бышь однимъ изъ первыхъ вспо- можене моженій, употребляемых в ко возвращенію жизни: пбо сущеистечение крови явнымъ образомъ препятствуетъ пре-ственное. 40 лженію операцій нужнайших b и даятельнайших b: перевязка, останавливая кровь, останавливаеть или чанть мо-Разспроиваеть часть движенія жидких и твердых , жеть оно которое возстановить стараются, вспоможентями, на савышьея кон должно большую полагать надежду.

Надобно однакож в сдълать изключение из в сего изключен правила, изключенте, замъченное въ шестой части обстол. ніс. тельнаго описанія и проч., приведеннаго выше сего вЪ примъчании и сей главы: а именно как в скоропримътишь. что сосуды у утопленика надушы, когда лицо у него будеть багровое или фіолетовое, и когда глаза его кажушся сверкающими. Тогда надлежишь пустить кровь больному из в шейной жилы. А слъдовашельно кровопуи надобно призвать тотчась Лъкаря. Однакожъ нужно скапіе изъ примъчать, чито сте кровопусканте не должно вдругъ шейной бышь слишком вобильное; лучше опящь кв оному возвратипься, ежели будеть нужно.

Вспоможентя, подаваемыя утопленикамо и другимъ постоянлюдямь, кои по нещастію лишатся всьхьпризнаков в жизни, ство, ка-40 лжны быть продолжаемы довольно времени, и по ма- нее надоб. лой мъръ шесть часовъ, безъ всякаго при томъ въ водава-Успъхъ отнаянія; а наконець даже до тъхв порв, нін вепопока нещаетный не возвратить жизни, или пока не можени. будеть заподлино извъстно, что оныя возвратить вогда оныя ему не можно: о чемъ достовърно узнаешь, ежели, поквнумь разнявши въка, примътишь, что глаза потускли и можно.

сделались томны, и когда впрочемъ тело холоднея более и более, совсемъ окостенаетъ.

Вспоможенія должны подаваемы бышь всё вмёстё, сколько то возможно, однакожі такі, чтобы одно не препятствовало другому. Слёдовательно и нужно віб подобныхі обстоятельствахі взять віз помощь двухіб или трехів человікі довольно разсудительныхі. Иначе произошло бы затрудненіе и другі другу только бы мішали, да и самыл вспоможенія лишились бы своей дійствительности, потому что не смотря на всякое доброжелательство, были бы они подаваемы сіб нівкоторымі замішательствомі, могущимі причинить вредів утопленику, коему бы помочь хотіли.

Мы почли бы за нарушение признашельности, которою всякой доброй гражданинъ обязань благотворности гражданскихъ Начальниковъ сей столицы, естьли бы мы умолчали о вспоможенияхъ безвозмездныхъ, и даже награждаемыхъ, каковыя по ихъ приказанию подаются, да и подавать должно утопленикамъ. Но вообще человъколюбию и ревности Г. Пла, прежняго городскаго головы, одолжены мы благоучрежденить, которсе городъ Парижъ сдълалъ въ
пользу утоплениковъ, по примъру Амстердамскаго, и
которому послъдовала большая часть городовъ во
Франции, Англии, Германии, Италии и проч.

СЪ Іюня мъсяца 1772 голу, какъ существуеть еїє установленіе, по исхоль 1778 гола, спасено двъсти семдесять человъкь въ одномь гороль Парижъ, и гораздо болье въ другихъ горолахъ королевства сего, кои усердно пожелали шествовать по слъдамъ столицы: слъдовательно болье шести сотъ человъкъ возвращено обществу, которые прежде сей эпохи погибли бы, хотя бы еще были и живы; да и надобно пред-

предполагать, что по всёмы попеченіямы, прилагаємымы ежедневно от Полиціи сего города, по многоразличнымы вспоможеніямы, кои она оказываеть, и по самымы наставленіямы везды разсылаємымы, вы короткое время можно будеть спасти гораздо большее число нещаєтныхь.

Кажется намъ, что мы не можемъ поступить лучше въ разсуждени столь важнаго предмета, какъ къ предложенному нами теперь присовокупить перечень Предписанія, обнародованнаго въ 1772 году, господами Головою купетескимъ и правителями мѣ-щанскими, касательно до утоплениковъ, кои кажутся мертвы пи, но въ самомъ дѣлѣ не будуги таковы ми, могутъ воспользоваться вспоможениями къ возвращению имъ жизни. Сте краткое наставление приклеивають обыкновенно напереди запаснаго ящика для утоплениковъ, дабы всякому удобно было можно оное читать, а чрезъ то бы самое гораздо лучше вперилось оно въ память сержантамъ и солдатамъ караульнымъ, и дабы сти, зная его наизусть, были въ состоянти содъйствовать всё совоку пно при подаванти различных вепоможенти.

Толова купетескій и правители міщанскіе, же- предписы лая истребить білственное злоупотребленіе под. ніе города парижа в верхі за поси, равно какі и катанія ві бездон парижа в мятія вверхі, вопервых в запрещають сій два ередства, кахі. яко безразсудныя и опасныя. Имін же впрочемь свільной омногих в успівхахі, происходивших в от различных в впоможеній оказанных в утопленикамі, поспішають оныя показать своимь согражданняю, и просять их в оперенебреженій оных всякой развикає случай предетавится кі ихів употребленію.

Сти спасительных средства состоять вы следу-

вспоможеній, жакія ANN VIIIO» жасниноаТ.

- г. Раздъть утопленика, вытереть его фланелью, поэторене окупать въ покрывало, качать различными образами; осшавлящьего мало на спина и держащь в в тепла, естьпопребны Ли можно, но не перехванывая однакожь ему воздуха.
 - 2. Дать ему проглотить от осьми до пятналцати канель летусаго спирту нашаты рнаго, какъ то выше сего на страницъ 460- сего Тома предписано; BHYCKAMIS EMY 603 ZYX BB ACCRIA, AVA BB DOMB HOCDEA-• швомъ трубочки, и пощипывая у него объ нозари.
 - 3. Пропускать ему въ кишки дыпъ табашный.
 - 4. Шекотать у него въ носу и въгорав пухомъ перушка; влувать ему въ носъ табаку или гихательнаго порошку; подносить ему под внось летугій спиртв нашаты рный, такъ какъ и дымо курительного таблки.
 - 5. Тереть у нето всю поверхность тела фланелью намоченною въ канфарной водкъ; и естьли разсудишь, что он в в в состояни глотать, то давать ему послъ приняшь одну или двь ложки канфарной волки.
 - 6. НаконецЪ, долгое время продолжать всъ сін вспоможенія, такъ чтобы одно не могло помешательствомь быть другому. Неутомимое настояние вы семь елучав твыв паче необходимо, что часто не иначе какв посль двухь, четырехь и даже шести часовь непрерывнаго труда, первые знаки жизни оказываться начинають.

приказа Hie, данатив зажасной первомЪ пребова-Ham.

Сержантъ каждой караульни обязанъ давать запасной ящикв, заключающий в в себъ вышепомянуныя вспоможенія, при первомЪ онаго требованіи: за нимЪ лимив при следовань моженть самь, или пошленть солдана проворнаго и разсудишельнаго.

> ВЪ продолжении двадцании ченырехъ часовъ долженъ онъ рапортовань Полиціи о томъ, какой успъхъ имьли вышеобъявленныя вспоможенія.

Весь принасъ свой долженъ онъ содержащь все-Рда въ корошемъ состоянии: въ следствие чего обязанъ дополнять оной, и стараться о вычищении машинЪ всякой разъ, какъ скоро онв употреблены будушЪ. Ежемъсячно осмотръ онымъ быть долженъ, дабы Полиція мотла имъть надлежащее свъденіе о прилагаемомЪ попечении.

Городская Полинія выдасть сумму сорока осьми награждемероеб для разделенія между теми, кои спасуть нія темь, утопленика, возвращением в опому жизни, следуя рас- суть положению означенному въ преждереченномъ Пред-утопиаго. писании, и на условіях в в оном в извясненных в.

Ежели употребленных средства не будутъ имъть желаемаго успъха, то сержантъ или солдатъ Аодженъ сходить въ Парижекую Полицію и представишь ей мершвое шело совсемь имуществомь онаго. дабы Шателетские Офицеры, или другой, до кого сте дело касается, сведущи обо всемь были.

Сверькъ того каждому дается знать, что во всяком в случав чрезвычайныя издержки заплачены бу-АушЪ, шолько бы оныя найдены были за нужныя.)

Ч Л Е H Ъ II.

О мнимой смерти, приключающейся от паденія, удаг ровъ, и проч.

Съ людьми, кои по несчастію от паденія, уда-тъже ег-Ровъ и проче, кажушся лишенными жизни должно по мыя всноещупать такимь же почти способомь, какь и съ ть накія и ии, кои оставались нъсколько времени подъ водою.

видъль одного человъка такъ лишеннаго наблюдечувствъ отъ падентя съ лошади, что онъ пробыльние о мничелые шесть часов в совершенно без всякаго знака мой смер. жизни. Однакожъ человъкъ сей, когда сму пустили ключивпро- шейся от подали вспоможенія, способствующія къ про- шейся от ДОЛ. паденія

AAR ymo-

долженію шеплошы жизненной, опамяшовался, и въ корошкое время совершенно оправился.

отт уда- Докторъ Александерв, въ Опытахв Медицины и Литтературы Эдимбургской, упоминаеть объ одномъ наблюдении почти подобномъ. Человъкъ, который, получивши ударъ въ грудь, имълъ всъ признаки смерти, былъ выльченъ ванного изъ теплой воды, въ коей пробыль онъ нъсколько времени.

Примъры сіи и множество других в имв подоб-Большей ныхв, кои бы я могв привести, руководетвують Macmin m txb , non умирають насъ жъ извлечению следующаго важнаго заключения; что нъкоторой части людей, умирающих внезанно внезатию от в паденій, ударов в проч. можно бы возвращать нослъ паленій . жизнь, естьлибы употребляемы были къ тому поударовЪ, требныя средства, и оныя бы чрез в надлежащее врси проч. мя продолжаемы. можно бы 6 bi AU BO3-

(Надлежить примътить, что вспоможенія, уповратины жизив. в пребляемыя къ возвращению жизни утоплениками, нія оказы-выключая сограванія, которое единственно приличествовать можеть утопленикамв и тьмь, кои замерваемыя утоплени знуть, какъ то мы сте послъ увидимъ, полезны прошиву всего шакъ называемаго внезанною смерштю, катодны во кая бы оной ин была причина; а именно противу сидовеяной рогд, приступово холеры, паралика, удавленія, убитія почти висзапной. громомо и проч. Поелику часто во всъхъ таковыхъ случаях в одно шолько дыхание прерывается, а слядовашельно и довольно возстановить оное.

тоже самое разумъть должно о людяхъ утом тей части таковыхъ удавленныхъ, что и о живот таковыхъ ныхъ, у конхъ вытащать зоздухъ въ духовой матив: нужво сти животныя кажутся мертвыми; но ихъ воскресить токмо вез токмо вез токмо возвратится имъ воздухъ. По чему вратить и должно различать смерть отъ остановлентя жизни. Жизнь

Поелику жизнь состоить вы движени; а сперть шееся дывы разрушени или раздёлени частей. И такы когда вы чемы разрушения еще не было, що возвращи движение, и щы состоить возвращишь жизнь.)

\$ 3.

О Асфиксіи, то есть величайшей степени обморока, или о припадкать смертельныхь, приключающихся оть парозь вредныхь и захватызающихь духь, какь то о чадь или угарь или о парахь исходящихь оть горящаго уголья; оть напиткозь закисающихь; оть колодезей и рзовь, закрытыхь сь давняго времени; оть лампадь и сзычь зажененныхь вы малыхы мыстахь; оть нужникозь, и проч., такожь и о припадкахы происходящихь оть удару громочаго и проч.

Воздух бышь можеть вредень и даже смерто- как возмосень многоразличными образами: 1) Когда онь ди- дух возметь бываеть началь своих в животворительных в. 2) латься Когда онь упитается парами мефитическими или смер- вредным тоносными, и проч. Таким в- то образом в воздух в, про- носным тоносными, и проч. Таким в- то образом в воздух в, про- носным тоносными, и проч. Таким всякой другой пламень огненный, не можеть болье продолжить ни двиствія сего самаго огня, ниже жизни животных в. От- туда и происходить опасность спать вы покоях в запертых в, и вы которых в курится раскаленный уголь.

Правда, иные утверждають, что опасность про-надобно исходить от свриаго масла, выходящаго парами из убытать уголья, и которое распространяется вы комнать; что угару. Аругіе же думають, что оная зависить единственно от количества воздуха вы комнать, который оты огня повреждается. Но каковы бы ни были оба сти мнынія, однакожь не менье по тому заподлинно извыстно, что надобно убытать, сы величайшимы попеченіемы, чаду или паровы оты уголья.

Jone IV.

впасноентв. Вообще опасно отдыхать или спать въ небольепашь въ ших в покоях в, в в коих в куришся огонь, чем в бы шопнебольшихъ по- лена печь ни была. Въ недавнее время найлено чешыкожко, въ ре человъка задохинихся от в того, что лежали въ такоихъ то. кой комнать, въ которой оставили догарать не боль-IROMERA. шое количество землянаго уголья: однакож в угаръ и оть уголья дровянаго зловредень вь равномърной спепени.

Входишь въ такія мвета, въ которыхъ напишки. кои броnen Emez заниеаюпъ.

Пары выходящие от вина, сидора и от всякаго другаго питья закисающаго, или конторое бродинть, содержать вь себв нвито смертоноснаго, умершвлянажодымся ющаго также, какъ и самый чадъ отъ уголья (2): отнежда опасность входить въ погребъ или выходъ, вЪ которыхЪ находится великое количество напитковъ закисающихв, а особливо естьли оные держаны были долгое время въ заперши. Тысяча ссшь шакихъ примъровъ, что многіе умершвляемы бывали внезапно отъ того; что входили въ сіи мъста, а другіе, которые съ немалымъ трудомъ могли избъжать опасности.

Опасности Когда откроешь подземныя мѣста, затворенныя оть кожсъ давняго времени, или когда станущъ чистищь коденія въ мъста под- додези глубокіе, изъ которыхъ нъсколько льть не вемныя, въ чер-

⁽²⁾ Теперь довольно доназано, что вст пары, поднимающиеся от веществъ такимъ образомъ закисающимъ, или вродящимъ, суть такого же свойства, накъ и тъ, кои происходать оть уголья, и что они составляють изкоторой родь гаса или пару упругаго, коему дано названіе, нісколько чрезвычайное, воздужа стоячаго (аёт fixus) ибо не известно, что разуметь должно чрезв водумь стонуй Однакожъ всего извъсшиве сшало що, что сей гасъ, или сей паръ упругой есть подлинная жислота, и который, какъ скоро имъ напитаются щелочных соля, соединяется съ оными и составляеть тело твердое подобисе крусталю. Какъ многіе сперва отрицали, чтобы сей парь быль жислота, то и поступили изсколько храбро противь Г. Сажа, а потомъпротивъ г. графа де Милли, Членовъ Королевской Анадеміи наукъ, кои первые подали сте митите: однаножь въ последовании принуждены были согласиться, что они справедливо мыслили.

терпали воды, то выходяще изб оных в пары произ-нолодези, водять действия подобныя шемь, о которых мы терь, и перь говорили. По чему и не должно лазишь в коло-тероч, за-тероч, рудники, рвы и проч. и другия мёста влажныя съ давнаго и глубоки, кои долгое время затворены были, преж-времени, де нежели не очистять их от в мефититескаго возлуха зажжениемь в оных в пороху и проч.; как в то мы сделали о семь примечание в глав 2, Тома I.

Легко узнать можно, когда воздух въ таковых средства мъстах бывает нездоровый и смертоносный. Надоб- узнавать, но прочемить туда свъчку, польно, соломы и прочему важженныя. Ежели сти тъла продолжают в горьть, то таковых можно взойти туда без опасентя; но естьли вдруг мъстах они погаснуть, то весьма надлежить остерегаться злоот хождентя въ оныя, пока воздух не будет очи вредный. щен огнемъ, или водою, какъ то мы ниже сего на страницъ 484 и слъд, сего Тома говорить станемъ.

дымь от лампаль и сальных свыть, а особли- припалки, во когда их погасять, дыствуеть такь какь и приняюче- аругіе пары, хотя слабые и медленные. Однакожь на- ющіеся от ходятся примыры людей умершвленных однинь ды- лампадь, момь от лампадь, погаціенных вы небольших комна сальных тах запертых; да и люди, имы вы грудь слабую и ныжную, чувствують обыкновенно сильную щемоту, какь скоро находятся вы таких поколхв, гды много горить свычь.

членъ І.

Пользованіе, какому подвергнуть себя должны ть, кои задохнутся оть того или оть другаго изь сихь паровь. Вспоможенія, какія должно оказывать тьть, кои поражены бывають слегка, или которые въ обморокь впадають несовершенный.

Тв, кои примътять опасность, каковой подвергающь ихв пары, ими обонаемые, и которые слъд-Ш и 2 співенственно выйдуть изы того мьста, какы скоро ночува ствують тягость, обыкновенно получають облегчений воз- когда на открытомы воздухв находять на потчась, когда на открытомы воздухв находять воз- ся. Естьли же остается вы нихы нькоторая неловичь; лекость, то могуть они совершенно оправиться чрезы спирты нюханіе лепутаго спирта нашаты ркаго, и когда выпьють нашатыр- немного воды сы уксусомы, или лимонаду теплаго.

мых в и проч., вы которых воздух столь скоро повреждается от паровы мефитических происходящих от трои множества свычь, и от ды шанга великаго числа людей вы них находящихся, естьли бы случилось, сказываеты Г. Саж , чтобы кто нибудь впалы вы обморок , то надлежало бы противуположить метичти спирт нашаты рной дыйствию остроты мефитической; и гораздо бы скорые можно было привести его вы чувства, давши ему понюхать сего спирту, нежели посредствомы уксуса: поелику обморок есть ток мо начало Асфикси, состояния, вы которомы всякая кыслость болые бываеты вредна, нежели полезна)

Но когда дъйствие сихъ паровъ будетъ такое, что человъкъ лишается отъ нихъ всей памяти и чуветва, то надобно прибъгнуть къ слъдующимъ средствамъ, естьли хотя мало надъяться можно возвратить ему жизнь; (да и не должно никогда небрещи о испытании сихъ средствъ, развъ когда человъкъ пробудетъ въ такомъ состояни очень долгое время, охладъетъ и совсъмъ окостенъетъ.)

Вспоможенія, какія надобно подавать тёмь, кои лишато ся памяти и чувствь, то есть дошедшимь до величай шей степени обморока.

В элукъ Надлежить начащь перенесентемь больнаго на колодный в создух весьма чистый, колодный и открытый. Давашь откры-

ему нюхать летугія соли, нашаты риый спирт лету-нашатыр. гій, и проч. Сверхв того надобно пустить ему клова ный изъ руки; и естьли онаго кровопусканая будеть не тучій. довольно, то отворить ему кровь и изв шейной жилы (3). Посль чего должно поставить его ноги въ ваним для теплую воду, и оныя тереть крыпко. Наконець, какъ ногъ и скоро онъ въ состояни булеть глотать, то давать ему пишь лимонадв, или воду съ уксусомв, къ коимъ прибавлять не много селитры, или лучше отв тести 40 лвеналцати капель летутаго спирту нашаты рнаго вь одной ложкъ волы.

Не лоджно такожъ позабывать и промыватель-промыважыхб острыхь: ихв приготовляють прибавляючи тельныя къ промывательным в обыкновенным в по двъ унціи сиропу изв придорожной иголки (fyrupus rhamni cathartici) и по стольку настойки александрискаго листу, или, за неимвніем в оных в, по половин в унціи терпентину Венеціанскаго, распущеннаго въ литномо желткв: но ежели не льзя скоро промыслить сих в лекарство, то просто можно положить в промывательное двв или при изрядныя ложки обыкновенной соли. Для возстановленія теплоты жизненной, обращенія крови, и проч. надлежить употреблять средства, выше сего на страниць 455 и сльд сего Тома нами совыпованныя.

Вспоможенія, какія надобно подавать тёмь, кои задок: нутся от угару или от парозъ происходящихъ отъ разженнаго утолья.

Г. Госсато, Лекарь в В Аллоа, приводить наблюженте объодномъ человъкъ, задохшемся отъ пару зем--R.A. III m 3

⁽в) Кровопускание почитается последним вепоможением в, накое долж- Кровопуно употреблять въ Асфинсіны или сей степени о вмороновь; въ нихъ сканіе есть бываеть оно вногда смертоносно в почти всегда безнолезно, кремъ послъднее

лянаго уголья разженнаго: и он в сказываеть. что возвращиль оному жизнь, дул ему въ рошь, пусшя изЪ руки кровь, качая его и потирая кръпко по всему шелу.

Докторъ Фреуэнд, изъ Суссекса, объявляеть, что одинъ молодой человъкъ задохся было отъ чаду происходящаго от землянаго уголья; но что он был в оживлень темь, что погружали его вы колодную воду, а послъ положили въ теплую постелю.

Обычай погружать в в холодную воду людей угарающих в или задыхающихся от в чаду, по видимому происходить от вежедневнаго опыта, делаемаго наль собаками, задыхающимися от в паров в собачей пещеры в в Ишаліи: ихъ мечушь въозеро Аньяно, смежное съсею пещерою, и онъ тотчаев приходять въ чувства.

въ чемъ еостоять и ковыя вспоможе-

(Способы, какЪ приводишь вЪ чувства человъка задохшагося от угару, происходящаго от уголья горящаго, сушь весьма просты; да и пользование равным во образом в ни мальйшей разнообразности в себъ не заключаеть. Сткляночка нашаты рнаго спирту летутаго, трубочка, которую вкладывать в вротв, на подобіе трубочки запаснаго ящика для утопленниково, выше сего на страницъ 453 и слъд. сего Тома описаннаго, и вода весьма холодная, супь единственныя орудія кЪ возвращенію жизни.

Простая вода есть собственнодъй-

Вода признается за настоящее собственно двиствующее лекарство прошив в заложновений, происходящих в отъ мефититеских в паровъ уголья. Способъ употребетвующее лять оную есть простой, легкой и по возможности

вспоможеніе, какое употреб жишь дож-MHw.

только, когда больной будеть накодиться вы случав выше сего на страницъ 447 сего Тома описанномъ. Сметри такожъ, Записки ученыя, жритическія, и проч. соч. Г. Гуленя (Mémoires littéraires, critiques etc. par Mr. Goulin) 1776 года, на страницъ 19 и савдующ.

всякаго рода людей, не изключая ни самых в мало раз- Асфинсіи, судищельных в или бъдных в.

Надлежить начать перенесентемь задохшагося степени человька на мысто вы домы самое открытое, даже на обморова происходать на стуль, или на поль, прислонивы угару. Авть; посадить на стуль, или на поль, прислонивы угару. Спиною кы стынь; голову надобно держать ему прамо, и уставить оную такь, чтобы не могла качаться во время нодавантя вспоможентй; тогда многте люди, перемыняючи другь друга, когда оты сего дыйствтя утомятся, безпрестанно должны вспрыскивать ему вспрыскими о самою холодною водою сы великою силою и вы ване лица извыстномы разстоянти, употребляя для сего какой самою холодною водою сы можно черпать дом. ведрами нарочно припасенными, и которыя должны ведрами нарочно припасенными, и которыя должны дополнять друге вспомоществующе, по мырь какы она тратиться будеть.

Операція сія, дълаемая многими людьми поперемьно, долженствуеть быть исполняема съ довольною силою, и продолжаема нъсколько часовъ безостановочно, или до тъхъ поръ, пока не примъчены булуть нъкоторые знаки жизни, оказывающіеся небольшою ихотою. Тогда можно отворить роть задохше-первые муся, и надлежить стараться держать его отвер знаки ожистымъ чрезъ вкладываніе ему между зубами неболь. шихъ осколочковъ деревянныхъ, дабы могь онъ пропустить ложку воды, въ которую положено семь чли восемь капель нашаты рнаго летусаго спирти. Въ ноз-летут нашатырими, коимъ напоены будуть бумажки, на подобіе свъный. пильни свернутыя, и которыя надобно перемънять часто.

Потомъ опять надобно приняться, да и весьма воспъшно, за вспрыскивание холодною водою; ибо перерывъ

рыв в в таком в случав долженствуеть быть очень корошкое время, и продолжать оное переставая временемь, дабы дать ему проглошить нъсколько дожек В холодной воды св каплями нашаты рнаго спирту летутаго, такъ какъ и прежде, до тъхъ поръ пока больной не подасть явных знаковь чувствь, и не начнеть даже выговаривать словь.

Tpenis.

За икотого последуенть реста и всеобщее дрожание: и естьми пребываеть онь вы намяти и чувствахъ, то надлежить перенести его на постель слегка погръщую; по томъ тереть его теплыми салфетками, и двое должны заняться потирантемъ ему одинъ туловища, а другой конетностей; давать ему нюхань нашаты рной спирто летугій, и принять нь вколько ложекъ воды съ каплями сего же спирту.

Свижій воздукъвъ ROMBAME.

При всемЪ томЪ надобно содержать вЪ комнать свъжій воздухб, а иначе выздоровленіе его могло бы быть токмо минутное; естьли же впадеть онь опять въ прежнее свое состояние безчувствия, то надлежить паки начать вспрыскивание холодною водою, и продолжать оное такъ какъ выше было сказано.

Промыватиельныя острыя.

Нужно еще бываеть тогда ставить больному промывательныя систительныя изъ тамару съ мыль. ного водою, или каковыя не давно предложены были; да и непременно нужно, чтобы онь после часто был в очищаем в, как в то выше сего на страниць 477 сего Тома совъщовано было.

Обстол-Mic 4P . MIBS пусканія.

КЪ кровопусканию прибъгать надобно не прежде, какъ уже больной придешь въ прежнее чувство и воз жія крово-вратишся у него теплота, такъ какъ въ примъчания 3 на стран. 477 сего Тома предписано; когда онъ ка жется телосложенія многокровного, когда пулься у не го будеть полный и непорядотный, и когда жалуется OHE

онъ тягостію въ головъ. Тогда нужно предписать ему ванна для ванну для ного, а при томъ и пустить кровь изъ ру-ногъ ки: но таковыя дальнъйшія попеченія должны быть преподаны отъ искуснаго Лъкаря, безъ коего совъта приступать къ онымъ не должно.

ВсякЪ видитЪ, что вода и нататы рный спирто летугій суть единственныя вспоможенія, какія токмо нужны кЪ отраженію смертоносныхЪ дъйствій угара. Г. Сажо довольствовался даже и однимЪ нататы рнымо спиртомо летугимо. Я довольно былЪ счастливЪ, сказываетъ онъ, что привелЪ въ чувства человъка задохшагося отъ угару, вкладывая ему въ ноздри свътильну изъ бумаги, намоченную въ нататы рномо спирто летугемо и покапывая въ ротъ нъсколько капель того же самаго спирту. Хотя я и не имълъ приотжища къ вспрыскивантямъ, однакожъ думаю, продолжаетъ онъ, что пе надобно небрещи о употребленти оныхъ, ежели сей нататы рный спирто не приведетъ скоро въ чувства человъка отъ угару задохшагося.)

Вспоможенія, какія надобно оказызать тёмь, кои задохнутся оть паровь исходящихь оть напитковь закисающихь или бродящихь; оть смертоносныхь изліяній, происходящихь оть колодезей, подкоповь, нужниковь, подземныхь рвовь, и проч. затзоренныхь съ давняго времени; оть ударозь громовыхь и проч.

(Тѣ, кои лишатся жизненных в чувство от со-тъ же садъйствія таковых в парово, оных в изліяній, грому и мыя вепопроч., сходствующо состояніство своим в св тьми, которые въ безпам'ятство приходять от угару: слъдовательно и вспоможенія для них в нужны ть же самыя.

Вообще всяк в согласен в, говорит в Г. Д. . . . Впалающіе в письм в к в сочинителю Записок в, приведенных в в в велиприм в чати з сей главы, что утопленники умирают в степень сбратов IV.

морона умирают в равно нацъ m ymonжениини. BCHIN.

во время вдохновенія (inspiratio). То же самое разумьть должно и обо всвув задыхающихся, или внадающих в въ величанную степень обморока. Сила мускулова или сжащія легкихд, хошя и вспомоществуема бываеть тіяво ваокно- жестію волы, или воздушнаго столпа обыкновеннаго, не можеть преодольть упорности воздуха по свойству его стоячаго и весьма упригаго, который содержить легкія въ величайшемь разширеніи. Тъ, кои имъють нъкоторое монятие о устроении человъческого тела, согласятся въ томъ, что всякое движение должно быть остановлено до твх в порв, пока сопротивление воздуха внутренняго не преодолжется.

> Всякой воздух в неподвижный, гасы, мефитические пары, угаръ, суть весьма упруги и стоячи. Примъчено еще, что волнение или движение болье обыкновеннаго къ смъшенію ихъ способствуеть; что паръ водяной раздъляеть таковой воздух в стоятий, очищаеть оть горютаго существа преизобилующаго, приводить къ востоянію воздуха обыкновеннато, и что гцелогная соль (alkali) его поглощаеть.

Канъ мричина смерти утонденниковъ можимся omb 340= mapos b есть та же самая, MIO M BUNGони тре-6ymmb, изковы.

КакЪ причина смерши ушопленниковЪ и задыхакшихся от угару, от в паров в при чищении нужников в, от в тернаго талу выходящаго изв рудниковь и проч., и задыжа- есль одинакая, що и вспоможентя должно упошрео дянь штже самыя. Дьло состоин вединственно вво отвредныхъ няшти свойства стоячаго и чрезмврно великой упругости от воздуха разширяющаго легкия; въ сдълании его удобоемъсимымъ и въ способствовании сообщению его съ воздухом в обыкновенным в. Но каким в образом в моженія, до сего достигнуть? спрашиваеть Г. Д. . . . Не лучнаковыхъ шее ли бы среденно было внускать почасту помощію способнаго кЪ тому надувального мѣха, вЪ отвереше еуть оди находящееся выше глотки, или, ежели непремъпно нужно, чрез вренхотомию, в дыхательное горло волу пара

a , w, ...

парами? Великую бы вЪ такомЪ случав могла принесть нользу в дыхальница.

Во время шаковой операціи весьма бы не жудо было согравать конетности и самое тало задожнагося ошЪ паровъ. При самомъ мальйшемъ движении легкаго употреблять бы можно нашаты рный спиртв летусій. тренія теплою фланелью, качаніе, курительную машину из в дыму табашнаго, рвотныя, вскрыше жилы, единственно для облегченія кровообращенія, и даже вспрыскивание холодною водою: поелику всё таковые способы сушь весьма афисшвишельны и служащь величайшимъ всиоможениемъ. Окачивание холодною волою въ таком в несчастном в положени нахолящихся людей. производишь дейсшвія чудесныя: но не должно въ оных в обманыващься: ибо все ете происходить не отв сольйешьія холоду на шела бездыханныя и сполько же колодныя, как и самая вода, но единственно от в стремленія водяных впаровь, вспрыскиваніемь производимаго.)

ЧЛЕНЪ И.

Средства, какъ предупреждать Асфиксію, то есть величайшій степень обморока, и припадки приключающіеся оть паровь мефитическикь и дукъ закватывающикъ.

(Какъ огонь отъ горящаго уголья во всегдашмемъ бываетъ употреблении между бъдными людьми, а особливо между великимъ числомъ ремесленниковъ и художниковъ, коимъ не льзя никакъ безъ онаго обойтися; то мы поставляемъ себъ за долгъ напомянуть здъсь, что находятся средства, какъ предупреждать бъдственные припадки, приключающеся отъ подобной топки, и что оныя средства суть столько же просты, а при томъ и легче сще, какъ и тъ, кои шеперь преддожены къ отвращению послъдствий оныя.) Средства, какъ истреблять мефитической воздукъ, происког дящій от горящаго уголья.

пода.

(Вода раздъляемая парами есть, какъ то мы сте недавно показали, великое лекарство на задохновение оть чаду происходящее: равным в образом в она самая служить еще на сіе и средетвомь предохранительнымб. Довольно держать в в печи, надъ горномъ, надъ жаровнею и проч. во время шопки небольшой горшокЪ, или какой нибудь сосудь съ широкимъ отверствемъ, наполнивъ водою; а сія вода согрѣваясь отъ горящаго уголья, превращается въ наръ, который распространяясь въ комнатъ и смъшиваясь съ воздухомъ атмосферы, упругость онаго поправляеть, и препятствуеть ему бышь столько бъдственнымЪ, какЪ онЪ вЪ полобных в случаях в обыкновенно бываеть, ежели не вознешь сей предосторожности. Воду добавлять должно по мъръ того, какъ она выкипать станеть, и до тъхъ поръ, пока въ печи огонь отъ уголья не утухнеть.

Свойства воды для приведенія стояніе.

Вода по видимому имъетъ свойства отмънныя къ приведению воздуха въ естественное его воздужа въ стоянте. Въ съверных в частях в Европы и Азти ставятъ естествен- ведро съ водою подлъ печей, для предупреждения занос его со- разительности воздуха, происходящей отв чаду. Сте обыкновение есть весьма общее въ Китаћ, гдв неимущіе люди упопіребляють единственно земляное уголье для топки печей. Чадъ поднимающийся от в него столько же бываеть опасень, какь и чаль эть нашего уголья дровянаго: он в бы могв умеривлять стоящих в близв печей, естьлибы не держали безпрестанно подля оных в чаши св водою, влажностію своею раздыляющей оныя частицы упругія, столько опасныя и столь скоро могущія пресъкать начало жизни.

Наблюде. mic.

Г. Парментиерв, Профессорь въ Королевской Колле тін Фармацін (Антекарской науки) описываеть въпрево-CXOA:

сходной Диссертаціи физитеской, химитеской и экономитеской о свойстви и здоровомо катестви водо рики Сейна, что одинь бидный человикь имиль обыкновеніе ставить зимою вы ногахы у кровати своей горшокы сы горящимы угольемы, и что на оное уголье, не заташая его, накладывалы сосуды наполненный водою; что какы оны забылы вы одины вечеры наставить сосуды, то нашли его на другой день безы памяти и всякаго чувства; но кысчастію случилось, что ему возвратили жизнь.

Докторъ Шагто, во время гумы, выставляль по ночамь на открытой воздухо сосудь наполненный водою, которая всегдя повреждалась. Въ ней дълалась пъна и нъкоторой родъ сметаны по верьху плавающей, а во всякое другое время вода сохраняла всю свою чистоту.

г. Полето, Парижскаго Факултета Врачь, совътуеть очищать клевы кипячею водою, преимущественно всякому другому средству въ подобномъ случав употребляемому, удостовъренъ будучи, что вода есть единое дъйствующее въ природъ, могущее Раздроблять вещество заразы.

Но безполезно будеть приводить множество примъровь о Медикахь. Свойства воды къ поправленію создуха, повреждаемаго парами мефитическими, запечатльны во многихь сочиненіяхь, какь то вь запискахь Королевской Якадеміи Наукь, 1710 года; еб Библіотекь Медицины, Том. Х, при словь Suffication; въ запискахъ Г. Гулена, приведенныхъ въ примъч. З сей главы; въ подробномъ описаніи успъхово и проч. Г. Піа.

И такъ какъ скоро узнаень, что кто нибудь падеть въ Ясфикстю, или величайщую степень обморока въ комнать, въ погребъ, выходъ, рудокопной Щ щ 3 ямъ

ямъ и проч., то и надобно начать съ поливания тамъ немалаго количества воды: ибо естьли войти туда безь сей предосторожности, то несомнительно можно будеть и самому впасть въ полобной обмороко. какъ то случилось въ погребв у одного жлебника Шартрскаго, куда онъ собираль горящее уголье, вытребая оное изъ печи, и гдъ пятеро человъкъ умерло другь послъ друга отв того, что они холили туда вы намерении помочь старшему сыну хлебника сего. который умерь первый. По чему послъ не иначе нотли войши въ сей погребъ, какъ напрыскавъ прежде великое количество воды; но какъ прошло множество дней прежде нежели увъдали о семъ средешвъ, то и выпащили отпуда токмо трупы, изв которых в ни олинъ не могъ бышь оживленъ.

Нашашырный спарть леmvain. шашырный тучій нымЪ обфазомЪ средсива прошивъ мефишичеposb omb рудинковъ.

Но нашатырный спирто летугій имбеть тв же сапыя свойства. Довольно, поливать оным в в зараженном в мвств до твх в порв, пока можно там в дер-Вола и на- жащь зажженную свычку. Тогда всякъ можеть входить туда безъ опасения. Весьма желательно бы было. 42 епирть ле- бы каждому трудящемуся въ подземельных в рабопах в выдаваемо было по сткляночкъ сего спирту. Какъ скоро еуть рав- кто нибудь из них в найдется зараженным в смертоносчыми парами, исходящими безпрестанно от мепредокра- таллов и минералово, то сотоварищь его должень нвительных поднести кв нему свою сткляночку, или дать ему проглошить нёсколько канель онаго въ ложке воды, или наконець попрыскань имь вы шомь полземельномь снихъ па- мъстъ, естьми пары быми въ довольно великомъ количествв и столько распространились, что варугь поразили многих в землеконащелей.

Противъ нромежодя-

Химики въ работахъ своихъ подвержены бывають тому, что часто поражаются нарами мефитите щих от скими от кислостей минеральных. Когда припадок CAY"

случится легкой, що довольно шогда, дабы трудя- неспосыей шійся вышель на ошкрышой воздухо, и попюхаль наша-минеральты рнаго спирту летутаго; но когда припадокь будеть ныхь. тяжкой и сопровождается сильнымь обморокомо, то надлежить дать ему нъсколько капель сего самаго спирту вь одной или двухь ложкахь воды.

Однакожъ при всемъ томъ не должно небрещи о важноеть содержанти въ комнать, погребъ, рудоконной ямъ и проч., сколько возможно, открытато воздуха внъшняго, кас соразмърнаго съ количествомъ паровъ, которые наво- лать онасенте, для способствовантя исхождентю воздуха упругаго, какъ бы оный стущенъ ни былъ, съ парами водяными, или щелоконашаты рными (vapores alcalici.)

Большая часть нами тенерь предложенных То средствъ взята изъ перечней изящной записки о бъдственных в зайствіях ворящаго уголья, изданной Г. Уармантомв, Членомь Академін въ Нанси, и Совъщникомъ. — Врачемъ ординарнымъ покойнаго Короля Польскаго, Герцога Лотарингскаго и Барскаго, въ которой онъ подробно изъясняеть, весьма удовлетворительнымь образомь, многія врачеванія, учиненныя оть него, послъдуя нами предлагаемому способу. Смотри вверьхъ того листы подъ заглавіемъ: b Avis du Bureau d' Administration de l' Hôpital Général, изданцые и обнаро-Аованные съ шъмъ, дабы предлагаемыя ошъ него средства, следавшись известными всякому без вразличия человеку, могли быть употребляемы, не токмо когда бы за дохновение от в чаду угольнаго случилось, но такожь и во всяких в задохновениях в от в грому, напитков в закисающих в, нужников в проч.; пятую часть Подробиаго описанія и проч. на стран. 124 и слъдующихЪ. Средства, какъ уничто жать мефитическій воздухь, происхо-

дящій оть нужниковь. (Но смертоносные нары, происходящіе оть нужсомивнія, что они сходетвують съ парами излешающими оть горящаго уголья, оть напитковь во время закисанія, оть колодезей долгое время закрытых во трудоконных в ямь и проч, и что по сей причинь вода и нашаты рный спиртв летутій могли бы быть на оныя предохранительными средствами, такь какь служать на нихь и врасеваніемв. Однакожь затруднительность въ употребленіи сихь веществь, а особливо летутаво спирту нашаты рнаго, по причинь весьма великаго количества, какое бы онаго потребно было, побудило Химиковь заниматься симь предметомь, и по много-кратных в испытаніяхь достигли они до того, что нашли предохранительныя средства оть сихь паровь въ огнь и извести немореной.

Огонь и мемореная мавесть.

> Симъ открытіемъ обязаны мы господамъ Паборію, Кадету, младшему, и Парментіеру, Членамъ Коллегіи Фармаціи, и проч. открытіемъ, говорюя, тъмъ болье важньйшимъ, что бъдствія, коимъ подвергаются несчастные, опредъляющіе себя на чищеніе нужниковъ, суть весьма общія, хотя и чаще всего оставляемы въ невъденіи, потому что люди сіи мало имъютъ сообщенія съ другими, по причинъ самыхъ работь ихъ; потому что никто не ходить въ ихъ рабочія мъста, и потому что золотари ремесло свое исправляють ночью.

> Г. Кадетв, Членъ Королевской Академіи Наукь, сообщиль сему знаменитому обществу, въ засъдяніи Маїя 15 дня 1779 года, подробныя описанія до сего предмета касающіяся, кои всякаго вниманія заслуживають. Да и надобно часто предъ очами публики выставлять бъдственныя приключенія, встръчающіяся повсюду, какъ скоро можно ей приводить на память средство для нее маловажное, о коемъ она иногда позабываеть, и которое употребляєть очень поздно.

Г. Фотре, Парбонской купець, велья выконати насяюдежиу подав старой, которая была паполнена; и ко-ніеторыя заразительной и смрадной запахъ побудиль его на то, чтобы оную оставить не выпоражниваючи. Уже дошли было до осьмналиами футовъ глубины, какЪ 16 Апреля 177.9 года, около девяти часовъ вечера, вся кладь прорвалась изъ старой ямы въ новую; которая девящью футами была ниже другой. Одинъ каменьщикъ и двенадцапилъпняя дъвка, кои у него рабошали, внезапно упали и не подавали болъе никакого знака жизни. ИзБавухЪ другихЪ каменьщиковЪ находившихся на подмостках водин в упаль в в яму, в в которой смрадное вещество поднялось уже на три фута, а другой на самыя доски своей подмостки. Сынъ сего послъдняго прибъжаль на помощь, и упаль топтась въ вму. Еще одинъ человъкъ торгующій шерстью опуетился туда, пришель въ обморокъ и паль; но тотчась опамятовавшись, сталь хвататься за льстницу и упалЪ снова.

Толико злоключеній устрашило предстоящих в викто не отваживался пуститься в в такое м в сто, из в котораго ни один в челов в к в своему усердію, польз в в смертоносную яму и лишился дыханія. Еще один в сапожник в собою пожертвовал в равном в рно смерти. Подобная участь постигала всту в техв, кои покушались туда лазить: еще один в бочар в погиб в там в же.

Напосавдокъ мужество начало уступать благоразумію. Всякь покущался, но ніщетно: многіе частные
люди стали оть сего отрекаться: едва только поставять ноги на льстницу, то побледньють и начнуть качаться: ихь схватывають за платье, за волосы, и вытаскивають безь памяти, и каждый жалуется давленіемь вы груди. Спустя ньсколько времени поТомо IV.

лагали, что смрадь не столько будеть смертоносень; почему Г. де ла 9 ргб, молодой человыкь дежій, и рышла помочь Г. Фаунь, своему дядь: его перевязали подь мышками, дабы можно было вытащить вы ту минуту, какь станеть кричать; но ста предосторожность стала безполезною, поколику голось не имыеть способности распространаться вы подобной атмосферь. Оны опустился и нашелы предметь своего изысканія вы кучь мертвыхы и умирающихы; желаеть, но не можеть болые подать новыхы вспоможеній. Наконець явился одины Гренадеры: оны по службы своей будучи предопредылены на то, чтобы жизнію жертвовать для сограждань, опустился вы яму и вытащиль всь оныя несчастныя жертвы.

Изб осьми человъкв, не считая дъвки, Г. фауре и одинъ каменьщикъ подавали нъкоторые знаки жизни. Имъ начали вспомоществовать нашаты рны мо спиртомо, треніями и чистымъ воздухомо. Каменьщикъ скоро приведенъ быль въ чувства. Но Г. Фауре приходиль помалу въ чувства, какъ вздумали сперва пустить ему прова изъ руки, наставлять промывательных табашчых, по томъ вскрыть жилу шейную, прикладывать по два нарыеныхо, горгитную мазь, припускать пілвицо къ вискамо, давать рвотное, и проч. Всякъ чувствуєть, что ему надлежало погибнуть отъ таковаго нелъпсто пользованія.

Подобное произшествие случилось въ Парижъ на улицъ Пашевенъ Апръля 30. Изъ трехъ работниковъ, кои чистили нужникъ, двое едва было не погибли, а третий дъйствительно пораженъ былъ смертию.

ВЪ 1784 году одиннадцать челов в къ погибло въ одну ночь при чищенти ямы въ улицъ Сентъ-Луи о Маре. Одна изъ тъхъ, кои служили недавнимъ ним'в опытомъ Химикамъ нами предъ симъ упомяну. тымь, стопвшая за нъсколько до того мъсяцовъ жизни многимъ человъкамъ, вычищена была безъ всякой опасности, от употребления тых же самых в средствв.

Средства сін состоять, какъ то мы уже сказа-способъ, ли, въ подкладыванти огня и употребленти немореной какъ упоизвести. Огонь раскладывается на самон возвышенном воз въ домъ мъсть, съ такою предосторожностю, чтобы запікнупы были всь места нижникъ жильевъ, такъ что воздух вызываемый во внутренность рва, чрезъ отверстве, въ которое работаютъ золотари, принуждень бываеть, дабы выйти вонь, проходить сквозь печь верьхнюю; он вахватываеть съ собою въ трубы и воздух в мефитической, которой раздробляеть почти совершенно: мы сказываемъ почти совершенно, потому что Химики наши принуждены были для очищентя онаго устроить и другую печь во внутренности рва, чрезвычайно опасную и учинившуюся недавно могилою многимь работникамь.

Чтожь касается до употребленія извести, то известь. оное заключается единственно въ набрасывании ея въ жидкость находящуюся во рву. А сте вещество перемыняеть столь внезапно оныя свойство, что въ одну минуту смертоносный паръ истребляется, заразительный запах в перестаеть и работа становится безврелною. Смотри Наблюденія о нужниках в и средства како предупреждать неудобства при хищении оныхв, напенатанныя по Королевскому указу и на иждивенти правишельства и проч. въ Парижъ, въ Типографіи Ф. А. Птерръ, въ улицъ Святаго Такова.

Оть употреблентя таковых в способовь происхо-Антъ, что чищенте нужниковъ, стоившее жизни многим'ь тысячамь человькь, вступить вы число работь To To 2 обыобыкновенных в; что парт мерититеской и зараженный выходящій въ атмосферу, парт столь опасный для страждущих в лихорадкою, рожениць, жалующихся грудою и проч. будеть не токмо истреблень, но даже и способствовать станеть къ очищеню воздуха трезъ перемену его въ летутую кислость сериую; что наконець чищене нужника, столь бедственное для всякаго соседства, не будеть болье производить ни малейшей опасности.

Вев столь важныя последствія были живо почуветвованы правительством в, неусыпно пекущимся облагоустройстве столицы; и по донесенію онаго Его Величество обнародоваль указь, записанный вы протоколь Парламентском в, коим в жалуется обществу, извыстному поды именем в Вентилатора, изключительная привилегія на чищеніе нужных в мёсты: и симы же самым указом в отрешаются золотари прежиїе.)

\$ 4.

О припаджахъ смертельныхъ, приключающихся отъ чрез» мърной стужи.

Когда стужа случится чрезмърная, и естьли чековъкъ пробудеть; на оной очень долгое время, то
можеть она причинить ему смерть, потому что какъ
она сгущаеть кровг въ конетностяхо, и побуждаеть
оную стремиться въ весьма великомъ количествъ
къ мозгу, то больной и находится подверженнымъ
нъкоторому роду паралита, предваряемаго дремотою
непреоборимою.

жетовно Дорожные люди, находящісся въ такомъ случав, преоделя- должны, какъ скоро почувствують дремоту, усувать ареможу, при- гублянь усилія, дабы избавиться оть неминуемой чиняемую опасности, коей они бывають подвержены. Сонь, кочрезмерно торой они наклонны почитать за некоторой родь веляною етужею.

подкръпленія от в претерпъваемой ими стужи, стамовится смертоносным в, естьли они по нещастію ему предадутся. Но щастіє наше то, что подобныя дъйствія стужи в в наших в климатах в встръчаются очень ръдко.

члень і.

Вспоможенія, какія надобно оказывать тёмь, кон от моролять одну или многія части тёла, или когда оныя оть стужи окрыпнуть или оцепеньють.

Однакожь весьма часто случается, что руки и надобно моги у дорожных в людей такв цвпенвють или замер пособствевають, что должно опасаться антонова огна, есть ваніемь вы ли не будуть приняты кв упрежденію онаго нужных таковых предосторожности.

Но весьма нужно предварить, что самая вели- опесности чайтая онасность происходить вы подобных обсто- от внеательствах от внезанной теплоты. Чаще всего мы запнаге отогръвавидам , что техь, у коих ноги или руки оцепе- иг.

ньють от стужи, къ огню близко сажають; но здравый разсудок и наблюдение доказывають, что ньть поступка безразсудные, как то уже учинено было о семь замычание вы чл. 1, § 1, глав. 2, Тома I.

Всякому крестьянину извёстно, что естьли по- деляно ложишь въ отонь, или въ теплую воду, лства, пло- пользовать ды, коренья и проч. замерзлые, то оныя загнивають пенваме и впадають въ некоторой родь антопова огля, есть- от стули такъ сказать можно, и что въ подобномъ случат, жи такъ и слинственнымъ средствомъ къ содъланто ихъ удобо- пленъ и пледы за ядомыми, остается держать ихъ неколько времени въ мерэлые, холодной водъ; а когда живопиныя находятся въ такихъ же обстоящельствахъ, то и пользованы быть должны тенъ же самымъ образомъ.

ЪБ 3

Kakb

КакЪ скоро ноги и руки оцененьющь оть стувжь отти-жи, то следовательно и надлежить, или класть ихъ рашь снвгомь, наи въ воду весьма холодную, или отпирать сивгомв. класть въ до техь порь, пока не возвратять они натуральной весьма ко- своей шеплошы и самой чувсшвишельносши. Послъ шо-**ДОДНУЮ** го надобно перенести больнаго, въ такое мъсто, ководу. торое бы нъсколько было тенловато: дать ему нъсколько чашекъ таго, или настого изъ цвътовъ саме буковых д, подсластивши медом д. Ибо ньть человька, которой бы не примътиль, что какъ скоро озябнутъ руки, самое лучнее къ отогрънию оныхъ средство есть, вымыть их в холодною волою, и потом в продолжать тереть их вкрытко нысколько времени.

ЧЛЕНЪ П.

Вспоможенія, какія надобно оказывать тёмь, кои столько объяты бывають стужею, что не подають болъе никакого знака жизни.

Сивгъ. лодная во-NKH . SK жолодная Banna.

КакЪ скоро кто нибудь находился на стужь въ весьма ко- продолжении довольно не малаго времени, такъ что не подаеть болье никакого знака жизни, то и наллежить тереть сму все тьло снегомь, или волон весьма студеною, или, что еще лучше пользуеть, погружать его въ самую жолодную воду, естьли только авлать сте возможно. Надобно твыв охотные рышиться на сте средство, что, как в то мы удостовърить можемь, насколько человакь зарышых вы снагу, или находившихся на самомъ студеномъ воздухъ въ продолжени пяти или шести днеи сряду, такъ что нъсколько часов в пробыми они не подавая никакого знака жизни, симъ способомъ прежнее здоровье возвращили,

(Ежели принята будеть холодная ванна, то въ какъ упо- оной оставить должно больнаго на четверть часа, шребляшь 60-

болбе или менбе; по томъ вынувши его изъ воды, холодную надобно поширань но всему шълу обнаженному фла-ванну. нелью или полошенцами намоченными въ холодной во- стеля умбав. Таковыя трентя продолжащься имьющь чешвершь ренно шенчаса. После того надлежить положить его вы постелю мам. Умвренно подогрвтую посредствомъ награвальника, но такъ, чтобы тюфяки были теплы, и могли бы сохранянь теплоту, которая имъ сообщена будеть.

Тогда надобно имъть прибъжище къ новымъ тренія волтреніямв, кои делаю пся шеплыми полошенцами, или, ною. Канъ дучше еще, шеплою фланелью намоченною погръщою происховодкого. Два человька зачимающея шаковыми треніями: дить треодинъ претъ подошву ногъ, самыя ноги и лядвеи, нія по брюмежду тъмъ какъ другой потираетъ руки и тъло, жу и грустараясь всегда направлять съ низу въ верыхъ тъ тренія, кон дълающся по брюху и но груди. Должно такожь наблюдать и то, чтобы между тъмъ, какъ происходять сін тренія, солержать вь движеній кочти безпрерывномъ, однакожъ и умъренномъ, человъка замерзлаго, и держант ему голову выше нежели mbao.

При чемъ должно тогда попытаться приводить нашатырего въ чувства, поднося ему полъ носъ нашаты рнаго ный спирту летугаго, давая оной нюхать и впуская въ спиртъленоздри, посредствомъ фитиля, имъ напоеннаго: что самое надобно новторять иногократно. По томъ надлежишъ приближать его мало по малу къ печи, которад будеш в топиться, дабы могв онв не варугв оторъваться; естьми же способно будеть, то постевишь его въ теплую ванну. Еще надобно дать ему тепла внутрь нъсколько капель нашаты риаго спирту лету-ванна. даео вр чожка почольшало впич пун вочки почечатенной сахаромв. Наконець, какъ скоро онъ будеть казапься почти оправившимся, то надлежить дать сму

отвіры и напишься легкаго отвару, и держать его на діэтв перемвиной из вина в в малых в прісмах в и отваров в, прежде нежели станеть ов в употреблять вищу твердую.

Естьли же пользование будеть начато не съ жолодной санны, а съ трений, то оныя производить должно такь, какь и недавно нами предписанныя; но вмъсто четверти часа надобно продолжать ихъ полчаса. Впрочемь, надлежить поступать во всемъ такъ какъ мы предъ симъ сказывали.

макъ по дъянію великодушному, его ознаменовавшему, и котораго не льзя довольно восквалить. Произшествей сте взято изъ въдомостей, аппес 1776, N. 31, fol. 247, variétés.

Жаблюдеміс. Недавно одинъ кошельникъ, изъ числа тъкъ, кои вздять по увздамь для починки поврежденной по суды, встръщиль въ нъкоторомъ разстоянти от Галберстадта Жида, лежащаго на больной дорогъ, гля стужа его захватила, и гдъ казался онъ какъ бы мер тънмъ. Подлъ него лежала небольшая кинка платков и лентъ, коими онъ торгъ производилъ. Котельникъ слышавъ, что замерзлый человъкъ можетъ оживлен быть, ръшился сдълать сему опытъ: и такъ взвалиль къ себъ на плечи Жида и принесъ его въ блят июю деревню. Тамъ началъ мыть его водкою, то реть по всему тълу и проч., и достигъ до того того онъ сталь оттавать постепенно.

Но нъскольких в часах в труда и нопечений человъколюбивый котельник видить съ радостию, что Жидь его подасть нъкоторые знаки жизни. Онъ усугубляеть ревность; и при упорном в постоянствъ свой подвить свершаеть. Доволень будучи успъхом в своим в, оставлеть он в больнаго, не имъющаго болье в в нем в нужды, летить на то мъсто, гдъ зарыл его товары, приносить оные и Жиду върно вручает в кипку.

Но сей увидя свои товары, которые почиталь пропащими, встаеть съ чувствительностию, и хочеть принудить своего избавителя принять оные, въ награждение за услугу оть него полученную: однакожь котельникь оть оныхь отрекается, сказавь ему п съ нежностию пожимая у него руку: Влаго делние, за которое усинится возмездие, не есть более благо делние; первая же должность, вслкимо исповеданиемо веры предписываемая, состоито во любей ко ближнему. Послы чего немедленно ушель оть него, будучи весьма доволень тымь, что хорошее дело савлаль,

Однакожъ сте дъло само по себв надълало шуму; оно предускорило кошельника, кошорой, вступая въ первый городь, быль разспрашивань, признань и отвелень къ Градоначальнику. Предъ него явился онъ безболзненно, но съ нъкоторымъ замъщащельствомъ, потому что не сказывали ему, для чего заставляли его савлать сте посъщенте. Сулья сказаль ему: Другв мой! ты заслужиль награждение, жалцелое от Короля каж дому граж данину, который спасет в жизнь другому гражданину. Я тако ты должено мив обблеить Свое имя и мъсто твоего рожденія, для вписанія оных в ев мои протоколы. Котельникъ повиновался и получиль мзду положенную, проливая шт сладчайштя слезы, которыя исторгаеть чувствительность, и кои сами по себъ сушь наипріяшньйщая изб всьх в награда.) Уомв IV. ы

ваніе горячаго на мую бываетъ самричиною ногтобав, жыпокЪ и #POW.

Я всегла быль того мненія; что ногтовам . приклады- трешины на кожв, цыпки и другія воспаленія на конетностяхо, столь общіл между поселянами здішними, часть весь въ колодное время года, происходящь наиболье опъ ма колод- перехождентя внезапнаго из в тепла на стужу, по есть от в прикладыванія скоропостижнаго и неосторожнаго мою общею чего нибудь теплаго на часть весьма холодную. Ибо, какЪ скоро у какого человъка трезвычайно озябнутъ ноги и руки, еїи простолюдимы носять ихь тотчась отогравать кв огню, или, естьли найдуть случай, то погружають въ теплую воду: безразсудность, которая, естьли и не производить антонова огня, то почти всегда причиняеть воспаление вь оных в частяхь. Но можно легко предохранить себя от полобных в припадковЪ, употребляя предосторожности вышечномянушыя; а особливо вЪ члень IV, § 9, глав. 51 и 3, глав. 52 сего Тома.

ТЛАВА 56.

О Обморожь; о пьянствь; о занятін духа; о удушенін ж удавленін, о судорогахъ сопровождаемыхъ видимою смертію и о смертяхъ скоропостижныхъ.

О обморожь и различныхъ онаго степеняхъ.

€войстве обморока жервой степени, подъ именемЪ слабости мзавещна. Fe.

(Обморок в имветь многія степени: самая легчайшая, въ которой больной помнить и сохраняеть чувство, не въ состояни однакожъ будучи говорить, есть такЪ называемой обморок в первой степени или слабость; припадокъ весьма частый у людей, страждущих в нереными бользиями, или по просту ипохоно дріго, у которых в не примічается, не взирая на сіс состояние, великой перемены въ пуласт.

Когда больной лишится чувствъ и памяти, съ обменарочитымъ ослабъниемъ пульса, то сие состояние на-рока втовывается синкопе или вторая степень обморока.

Ежели обмороко случится столько сильный, что Асфиксіи пульсо совершенно остановится, дыханіе будеть не- или обморона чувствительное, тьло охладьеть и лицо покроется высочай синеватою бльдностію; то сія посльдняя степень, шей степриключающаяся ръдко, но которая есть истинное пени. изображеніе смерти, и къ оной ипогда руководствующая, называется Ясфиксією или высочайшею степенію обморока, о которой мы уже предлагали въ § 3 главы предъидущей.

Обмороки зависять оть множества причинь раз-главных личныхь. Вы семы параграфы говорено будеть токмо причины о главный шихь, каковы суть: 1) излишество крови; обморока.

2) недостаточество крови, или великое малокровіе;

3) кровопусканіе и чистительныя; 4) заваль или тягость вы желу дкі; 5) запахи у людей страждущихь не рены ми припадками; 6) нікоторыя особенныя болізни;

7) роды, и проч.)

членъ І.

О обморокъ приключающемся оть излишества крови.

Люди сложенія крыпкаго и довольно здоровые, кто оному булучи многокровны, впадають часто вь обмороко подверьне запный, послы того, когда находились вы сильномы тылодвиженій, или пили вы излишествы напитки весь ма разгорятающіє; когда переносили слишкомы великой жарь, предавались ученію слишкомы прилыжному и проч.

Пользование обморока приключающагося от излише-

Въ таковыхъ случаяхъ дають нюхать уксусв; унеусъ, труть виски, лобъ и запястья уксусомв смъщаннымъ съ равнымъ количествомъ теплой воды; а ежели больь ы ы в

ной можеть глотать, то вливають ему вь роть двъ пли три ложки уксусу, смъщавь ихъ съ количествомъ воды въ четверо или пятеро противь онаго. (Кръпкіл же воды вредны бывають въ семъ видь обморока.)

Ежели обмороко продолжается вы своей силь, или естьли перерождается вы синкопе или обмороко второй степени, то есть, вы совершенное потеряние чувства и памяти, какы то сказано на страницы предыидущей, то надлежить пустить кровь больному; а послы кровопусканія дать ему промывательное.

Крозопусканіе. Промывавыданное.

> Тогда надобно оставить больнаго въ ноков, только давать ему, чрезъ каждые полчаса, по чайной чашкв настою изъ липоваго цвъту, ромашки и проч., или отвару леменнаго, прибавляя къ оному немного сахару и уксусу.

> Средства какъ предупреждать обморокъ, приключаю щійся отъ излишества крови.

> Какъ скоро кто подверженъ бываетъ обморокамо зависящимъ отъ сей причины, то для предупрежденія оныхь, надобно ему пищеупотребленіе наблюдать легкое; яства его должны состоять единственно изъ плодовъ и овощей, а питье изъ воды или полпива. На конецъ нужно ему имъть довольное тело движеніе, не ходя однакожъ до усталости, да и сонъ его не должень быть продолжительный.

Детва. Патісь Телодана

членъ п.

О обморокъ, приключающемся отъ Анемін, то есть, от недостаточества крови, или великаго малокровія, или отъ слабости.

Обыкновенные всего обмороко приключается от в медостатка или весьма малаго количества кроби: как в то и бывает в он в часто послы сильных в кробо мето

техеній, нослі великих в нощеблівній, потерянія охоты кі відів, и проч. По чему ві семі виді обморока и надобно слідовать пользованію, прямо противному тому, какое мы совітовали ві члені предвидущемі.

Пользозание обморока, приключающагося от великаго малокрозія.

Надобно положить больнаго на постелю, одъть тренія. его и тереть ему ноги, лядвей, руки и все тьло теплою ный фланслыю: давать при том в нюхать унгарскую водку, епирть лемашаты рный спирто летугій, летугія соли, травы тучій летурний и душистыя, как в то руту, шалфей, мяту, тучія соли розмарино и проч.

Надлежить такожь пустить ему вы роть ивеколько капель водли или рому; а естьми можеть оны
глотать, то дать выпить не много теплаго вина сы ване, егелкаромы и корищею; смёсь, составляющая превосходкары и неное крёпительное питье. На впадину желудосную наранда,
добно приложить фланель намоченную вы тепломы
винё или водкё; сверхы всего не худо класть поды
подошвы грётые кирпичи, или бутылки наполненныя
теплою водою.

Какъ скоро больной нъсколько опанятуется, то должно дать ему хорошей похлебки или бульбону, или сухарей намоченных въ тепломъ синъ, съ сахаром и корицею.

вредетва, какъ предупреждать обморокъ, приключающійся отъ великаго малокровія.

Для предупреждентя возврату или отрыжки таковых в принадков в, должен в он в употреблять часто, но в в налом в количеств в, ясто легктя и питательныя, как в то панадо, сделанный на отвар в или буль юн в, ясты. в м в сто чтобы делать его на вод в, я на самыя в в з свесвъжія, вареныя вЪ смятку, шоколато, поджаренысломпики кльба, студени, и проч.

члень Ш.

• обморожь, приключающемся от кровопусканія и чистительныхь.

Обмороки послёдующіе за кровопусканіем ими сильным в действіем в тистительных в, принадлежат в також в кв сему отдёленію.

Пользование обморока, приключающагося отъ кровопуска-

обмороко от кровопускай происходящій ръдко бываеть опасень, и перестаеть обыкновенно, какъ
скоро положать больнаго на постелю. Въ слъдстве чего
людямь подверженнымь сего рода обмороку, должно,
для предупрежденія онаго, всегда пускать кровь лежачимь. Однакожь, естьли сей обмороко продолжится
долье обыкновеннаго, то надлежить дать понюхать
больному не много уксусу, и даже выпить его съ водою.

Пользование обморожа, приключающагося оть чиститель-

КакЪ скоро обморок вывает в дъйствием в систи-MOXOKO . деревянтельнаго или рвотнаго слишком в крвпкаго и вакаго. Hoe Macao то надлежить пользовать больного, во всехь оппошевода ячніяхь, равно естьлибы онь быль отравлень. Следоменная и проч. про- вашельно и надобно давашь ему въ довольномъ колимивательчествъ молоко, деревянное масло, ятменную воду, теп-HMH MATчительныя лую воду, и проч., ставить промывательныя мягти-Крипительныя, и посль, как в онв очувствуется онв своего MICABHLE. обморока, давать ему крвпительных и болеутолительныя лекарства. Должно посоветоваться съ в г. главы 48, Toma III.

УксусЪ.

ЧЛЕНЪ IV.

О обморокъ, приключающемся отъ тягости въ желудкъ

Часто обмороко приключается отв неварения жему жа, происходящаго иногда от в излишно великаго количества ястев, а иногда от в лурнаго оных в каче-CHIRA

Пользование обморока, приключающагося от излишно великаго количества яствъ.

Как в скоро обморок в зависить отв первой при-реста чины, то и надобно приовгнуть къ реств, которая есть самое лучшее средство къ избавлению себя отъ онаго. Въ слъдствие чего и надобно пособствовать ей питье въ давая пишь больному нъсколько стакановъ легкой на-довольливки из в цвв пов в ромашки, кудрявае волгца (сат-ичествв. duus benedictus), и проч.; и естьли больнаго не станешъ рвать натурально, то можно безъ опасентя предписать ему 12 или 15 гранъ порошку ипекакуанны , ипекану. такъ какъ сте предписано въ примъч. 4, на страницъ анна. 90. Тома II. Одинъ мой знакомецъ недавно испышалъ сте съ корошимъ успъхомъ на самомъ опытъ, и лъкарство сте присовътовано ему было отъ собственнаго Авиженія пъхЪ, кои его окружали.

Пользование обморока, приключающагося отъ дурныхъяствъ-

Когда облюрок в происходить от в качества ястев, що налобно полкрыплять больнаго, равно естьли бы сей обмороко происходиль от в слабости, окоторой гово-Рено было выше вЪ членъ II сего §: надлежитъ такожъдавать ему нюхать кръпкіе духи, и проч. Но вся важность за- напашырключается в в том в чтобы вельть ему употреблять по- ные спирь больше шенлаго пишья, дабы накоторымо образомо пише тепзащонить вещества вредныя, и пришунить остроту мой воды сных в на паче дабы прогнать их в в подсеревок в ном номивым доставить имб выходь чрезь ресту.

чествъ.

4. VEHT

члень V.

О обморокв, происходящемь оть запаховь.

Бывают в обмороки, которые приключаются иногда, а особливо у людей спраждущих в нервными припадками, от в запахово непріятных в (даже и пріятных в, какЪ то отъ духовъ розовыхв, туберозовыхв, фіалкевыхв, и проч.)

Пользование сего вида обморожа.

Catin in воздухЪ. венгества раздражаm winger WPOY.

ВЪ такомЪ случав надобно вынести больнаго на открышый воздухв, давать ему нюхать вещества раздражающія, опідалинь от в него все могущее прогапів его непріятнымъ образомъ; но какъ мы говорили уже о обмороках в приключающихся от в припалково нереныхо, то запсь болье объ нихъ говорить не станемъ. Надлежинъ токмо справиться съ в 9, главы 45 Toma III.

YAEHB VI.

О обморокъ, приключающемся въ бользняхъ:

Ymo 0384въ мачалъ лижора» декъ гни-ZMXD:

Лих:ра» ZOK'B

злыхЪ.

Не редко применаются обмороки въ продолжения чаеть опъ бользней. Въначаль лихорадоко гнилыхо означають они обыкновенно заваль вы желудка, или собрание испорт ченных в мокроть; и проходять, когда следается какое нибуль выпоражнивание верьхомъ или низомъ.

ВЪ началъ же лико радоко злыко обмороки бывають признаком дурнымъ.

Пользование обморожа, приключающагося въ началъ лихорадокъ гнилымъ и злымъ.

ВЪ обоихЪ случаяхЪ надлежитъ унотреблять ук Унсусъ. суев внутренно и наружно, такъ какъ самое лучшее . 11карство, пока оный продолжается; а когда минуется, то можно будеть давать въ довольномъ количеств

лимонадь, лимонный соко, мешая съ водою.

Toak

Пользование обморожа приключающагося въ течени больза ней сопровож даемых в сильными выпоражниваніями.

Обмороки случающиеся въ бользняхъ сопровождаемых в сильными выпоражниваніями, должны быть польи происходяще от слабозованы пакь какь спи, о которых в мы говорили на стран. 500 сего Тома, и надлежить стараться о умърени тако- умърять выпоражвых выпоражниваний. ниванія.

Пользование обморожа послёдующаго за приступомъ перемежающейся ликорадки, или за усиліемъ ликорадки безпоеоывной.

Какъ скоро сти обмороки приходять подъконень подкрытсильнаго приступа перемежающейся лихорадки, или при жать силы. каждом'в усилий безпрерывной лихорадки, то надлежить подкрыплять силы больнаго, давая ему по большому стакану хорошаго вина съ водою.

члень VII.

О обморожь посльдующемь за родами.

Женщины нъжныя и матогными припадками страждущія бывають подвержены обморокамо посль родовь; но сте самое можно бы было предупреждать часто крапительными, и впускантем в свъжаго воздуха в в покой Родильницы.

Пользование обморожа послёдующаго за родами.

Когда обмороко сей происходить от весьма силь когда онъ ных в кровей, то надлежить всячески стараться о происхо. Умърении оныхъ. Въ разсуждени чего надлежитъ при сильныхъ мычать, что обмороко у рожениць бываеть вообще кровей. Авиствјемъ слабости и истощентя силъ. Докторъ Энглеманг приводить о семь предметь любонытства достойное наблюдение.

Joz. 3 17. Бъ

Наблюденіе. Онъ повъствуеть, что нъкоторая женщина опроставшись благополучно, впала внезапно въ обмороко, и пробыла болье четверти часа не подавая никакого знака жизни. Почему и послали за Врачемъ; но ея служанка мучась тъмь, что онъ долго не приходиль, вздумала сама подать помощь своей госпожъ; и такъ легла на нее, и приложа губы къ губамъ, начала ей въ грудъ дуть изъ всей силы.

ВЬ весьма корошкое время лежавшая въ обморокв женщина пробуждается какъ бы отъ глубокаго сна; и когда подали ей нужныя въ такомъ случав всноможенія, то она скоро оправилась. Служанка будучи спрашивана, откуда она научилась такому действію, отвъчала, что видела оное въ Альтембургв, гдв повиваная бабки опыть сей употребляють съ самымъ лучетимъ успехомъ надъ младенцами.

О семъ произшестви упоминаемъ мы единственно для возбуждения и прочихъ посивальных бабок къ тому, дабы онъ столь похвальному примъру последовали. Ибо множество младенцевъ раждается такихъ, кои не подаютъ никакого знака жизни, а гораздо большее число другихъ, кои оканчиваютъ жизнь, хотя безъ сомнъния можно бы имъ помочь, употребляя приличныя средства: но оныя предложены на стран. 186 и слъдующь сего Тома.

члень уш.

О обморокъ, какая бы ни была оному причина.

Пользование.

Воздужћ чистый и свъжій есть первъйшее вспоможеніе про-

От вакой бы причины ни происходили обмороки, оденакожь чистый и свъжій создухо почитается всегда самымь важный шимь пособість для больнаго. Естьли же кто вы подобныхы обстоятельствахы пренебрежеть о доставленіи онаго, то тоть подвергнеть опасню-

ености жизнь своего друга, стараясь спасти его. Слу-тивь обчается не рёдко, что многіе будучи встревожены по. морока. ложеніем в больнаго; призывают в толпу людей, или дабы помочь ему, или может выть чтобы стать свидвтелями его смерти; ибо дытаніе столь многих в людей непременно долженствует в, так в сказать, изчерпать

По крайней мъръ за подлинно извъстно, что таковое дъйствіе, весьма общее въ низкоиъ состояній народа, бываеть часто бъдственнымь, а особливо для людей нъжныхь, и тъхъ, кои приходять въ обмороко оть единственнаго истощения силь, или оть усили бользни. А какъ въ подобныхъ обстояне толжне тельствахъ чистый воздухо столько важнымъ почи пускить въ тается, то и не должно совсъмъ пускать въ комна номнато ту обмершаго человъка никого кромъ тъхъ, кои сунромъ щественно нужны къ его вспомоществовамию; а принанъ лютомъ надобно всегда держать и окна открытыми, датенно нуть бы по крайней мъръ перемежался тамъ воздухо свъжий. жныхъ.

Особы подверженныя частым воблорокам во или надобно которыя часто впадають вы слабость, не должны ни стараться чего пренебрегать, старалсь вовсе отвратить прищени причину оных воблику всегда оставляють они последчины обствія, наносяція вредь телосложенію, морона.

Всякой обмороко оставляеть больнаго въ изну- обынюрении и разслаблении: от деления во крови останаввенныя последсивия
мокроты расположены бывають къ застоянию: откуда сгущения, завалы; а естыли обращение крови
совершенно пресечется, или довольно уменьшится,
то оть сего делаются иногда полипы въ сердув или
въ большихь сосудахо.

Единственные обмороки, кои ни мало не опа- каніе сесны, супь тъ, кои иногда означають переломы въ морони въ 2 всего опа- лихо радках3; однакож в должно стараться також в, даоны. бы и оные как возможно скор ве проходили.

\$ 2.

Опіянствъ

Дъйствія піянства не ръдко бывають бъдственны, поелику ньть никакого яду, которой бы умерщвляль достовърнье, какь горятіе спирты, каковы суть водка, винный спирто, румо, рако, вишневка, различнаго рода ратафіи и проч., употребленныя вы излишнемь количествь, какь то мы сдълали уже замьчаніе вь главь 8 Тома І.

Иногда останавливая двйствіе сухих в жиль, умерщвляють они внезапно; но вообще двйствія их вывають медленные, и во многом в походять на двйствія опія, изъясненныя вы члень І, § 4, главы 48, Тома III.

Однакожъ многіе другіе роды напитково хлівль имко, какъ-то виноградное вино, пиво, сидоро, пуншо, и проч. могуть учиниться столько же бъдственными, какъ и горятіе спирты, когда оные съ излишествомъ употребляются: но обыкновенно извергають ихъ реотою, которую должно всегда возбуждать, когда желу доко съ избыткомъ обремененъ будеть какими нибудь напитками.

Однакожъ большая часть нещастныхъ, отъ пів янства умирающихъ, погибаеть паче отъ того, что не въ состояніи бываеть управлять собою, нежели какъ отъ смертоубійственнаго качества сихъ напит ковъ. Ибо дъйствительно будучи неспособны держаться на ногахъ, падають и находятся не ръдко въ положеніи принужденномъ, останавливающемь круго обращеніе крови или дыханіе, да и весьма часто остаються

ются они въ такомъ положении до техъ поръ, пока жизнь кончишся.

Вспоможенія, кои оказывать должно челов вку піяному.

Піянаго человівка не должно никогда оставлять разетегна его собственное попечение, пока не разстегнуто нуть будеть на немь платье, и пока не приведется онь платье, вы положение самое поконное, дабы жизненныя дви-напурально стеїя не были пресъчены, и дабы желудоко могъ ное. удобно извергнуть то, чъмъ онъ обременяется. Самое же благопріятное, какое піяный человькъ долженъ имъть для рвоты, есть класть его на брюхо. Когда онъ спить, то можно поворотить его на бокЪ, приподнимая ему немного голову. Особенно же надлежить имъть попечение о томъ, дабы шея у него не была покривлена или свернуша, ниже стянута воротникомЪ, галешукомЪ и проч.

Чрезмърная жажда, которую производить пите ковпких випитково, принуждаеть часто утолять оную питьемь совство противнымь. Мнт случилось видъть бъдственные примъры людей умершихЪ единственно от того, что пили молоко въ великомъ количествъ, послъ излишняго употреблентя вина или пуншу кислаго. Поелику от в сихв кислых в напишковъ, вспомоществуемыхъ жаромъ желу ака, свертывалось молоко такЪ, что варенію онаго совершенно препятствовало.

Самое пристойнъйшее послъ бражничества питье Воляное есть вода, въ которую положена будетъ корка засу-питье. шенаго хлъба; гай, настои мятные, шалфейные, во-Ав ясменная и проч. Ежели пьяный человъкъ чувствуеть вь себв позывы на рвоту, то можно дать ему легкаго настою изъ цевтово ромашки, или теплой воды съ деревяннымо масломо. Но въ такомъ случав

вообще не трудно возбудить рвоту, щекотя единственно въ горат перстомъ или перомъ.

Вмъсто того, чтобы входить въ подробное изъ яснение всъх Бразличных в признаково пілнетва, предвъщаю. щих в опасность, и предлагать всеобщее начертание пользованія для штхв, кои въ семь скучномь состояніи находятся, я намерень вкратив описать исторію о піянстві, которое мнь случилось недавно видьть, сопровождавшемся большею частію признаково самых в опаснъйшихЪ, и прошивЪ котораго средства мною употребленныя успъхъ имъли.

Наблюдение приклю-

Одинъ молодой человькъ пятнадцатильтній или о піянешвь около шого быль побуждень накошорою наградою выпишь десять рюмок в крынкой водки послы чего вналь оть водии онъ тотчась въ глубокой сонъ, въ которомъ и пробыль около двенадцани часовь даже до того, что какъ наконецъ трудное его дыханіе, охладненіе конегностей и другие признаки опасные, привели въ тревогу его пріятелей, то чрезь сіе самое и нашлись они принужденными послать по меня.

> Я засталь его еще спящимь; видь его быль устрашительный, и вся кожа была покрыта холодным в потомб Единственные знаки жизни, кои въ немъ оставались, были дыхание глубокое и трудное, и движенія судорожныя или волненіе въ кишкаха.

> Тщетно покушался было я разбудить его, пощипывая его, растрясывая и поднося ему подъ носъ вещества летутія и раздражающія. Изъ руки пустиля ему нъсколько унцій крови з влили въ рошь воды съ уксусомв; но какъ онъ не могъ глотать, то весьма малое количество оных в прошло в в его желудоко.

> Ничто не успъвало и опасность казалась болье умножающеюся; тогда вельдь я ему поставить ноги

въ шеплую воду, и спустя нъсколько времени послъ, промывапромывательное раздражающее: а от в сего промыва техьное тельнае имъль онь однажды на низв, и первое сте раздража. с редство подало ему нъкоторое облегаение. Его повторили съ одинакимъ успъхомъ, а потому и должно почитать оное за первую причину его выздоровленія. Тогда началь онъ подавать нъкоторые знаки жизни; шилъ все, что ему ни подносили, и мало помалу пришель въ чувства.

ОднакожЪ вЪ продолжении многихЪ дней все еще оставалось вы немы несколько слабости и пулься быля лихора догный. Особливо жаловался онъ на то, что в в кишках в чувствовал в жестокую боль; но сте чувствование боли мало по малу миновалось посредствомъ пищечнот ребленія легкаго, и питья прохладительного и клейкаго.

Върояшно, что не позвали бы никого въ семъ смерть случав на помощь, и сей бы молодой человько умерь приклюкогда бы его оставили, естьли бы за нъсколько пред отводки. тьм в дней не были поражены нещасттем в одного изв его сосыдей, коему присовъщовали выпинь цълую бунылку водки, для избавления себя от в перемежающейся лихорадки, и которой погибъ посреди припадковъ, точно сходственных в съ тами, о коих в мы теперь говорили; объ нихъ упоминали мы и въ членъ 1, § 4, Thas. 3. Toma II.

3.

О занятін духа или задохновенін, удушенін и удавленін. ЧЛЕНЪ І.

О занятін духа или задохновенін.

Припадки сти происходять иногда или отв за- причины. соренія легкихв, приключающагося отъ мокроты клейкой или отъ судорожнаго состоянія неред, сего внут. ренняго члена.

кто оно. Люди питающіеся яствами грубыми, и изобилуюму быщіе кровію бывають весьма подвержены задохновенію, вержень. зависящему оть первой причины, т. е. оть засоренія

Пользованія задохновенія приключающагося оть засо-

Кровопуснаніе,
промывавишь промывательное мягительное и даващь пишь весьтельное, ма часто по стакану питія мокротожи дительнаго, въ
селитряное которомъ распущено будеть немного селитры. Сверхъ
титіе.

уксусъ. уксусу, и голову держать надъ симъже паромъ, или
употреблять вдыхальницу, дабы паръ могъ пройти
въ самыя легкія.

Пользование задожновения приключающагося от судорожныхъ припадковъ въ легкихъ.

Люди страждущие нервными бользнями и удушь емв подвержены бывають судорожнымв припадкамв Ванны для легких 3. В в таком в случав надобно погружать ноги ногЪ больнаго въ теплую воду, и держать его надъпаромъ укоусъ. уксусны мо, как в то мы выше сего совътовали. Сверх в того надлежить давать ему пите мокротожи литель. ное, кЪ которому можно прибавлять, смотря по слу чаю. Эликсиру парегоритеского, полагая на чашку Дв 9линсирЪ кокту по одной кофейной ложечкъ. Должно також парегорическій. давать имъ нюхать дымъ отъ бумаги, перзева, кожи жженых в, и выносить их в на вольной воздух в. Вольной воздужъ.

ЧЛЕНЪ II.

О удушенін или задушенін.

нерадыне Младенцы подвержены бывають задушению отв нормилиць нерадыня и небрежения кормилиць. Когда младенець подверга- находится въ постели, то надобно всегда, чтобы опр

енъ лежалъ такъ, дабы не могъ подполять подъ одъ-мизаейяло, и никогда не должно лицо быть у него закры- цезъ. тое. Самое мальйшее вниманте къ симъ двумъ наставлентямъ, сколь они ни просты, спасетъ жизнь великому числу младенцевъ и воспренятствуетъ тому, чтобы и прочте не оставались слабыми и больными во всю жизнь свою отъ повреждентя ихъ легкихъ, естьли надлежащаго о семъ старантя приложено не будетъ.

Вспоможенія, какія оказывать должно младенцамъ задуд

Вмъсто того, чтобы намъ заняться преподаніемъ начертанія пользованія къ возвращенію жизни млаленцамъ задохшим я и задушеннымъ, какъ сказывають кормилицы, мы предложимъ наблюденіе Г. Жанена, члена Парижской Академіи Хирургической; поелику средства имъ употребляемыя увънчаны были успъжомъ, а притомъ и самое наблюденіе сіе содержитъ почти всъ случаи, и слъдственно всякія лъкарства, какія токмо быть могуть нужны въ подобныхъ обвтоятельствахъ.

Как в одна кормихица имъла нещастіе задушить наблюд младенца, то и призвали Г. Жанена: онв нашель се аеніе. го младенца безь всякаго знака жизни; не было у него ни бісніл вь жилах в, ниже мальйшаго дыханіл; сверьх в того лицо имъль синее, глаза открытые, опухлые и мутные; нось полонь соплей, роть отверстый; словоть, младенець быль почти холодень. Прежде всего приказаль онь нагръвать полотенца и пенель, а межму тыть как в исполняли его приказаніе, вельль распеленать младенца, и положиль онаго вы теплую постено на правой бокь: тогда началь его тереть по всему тълу весьма тонкими полотенцами, чтобы не ободрать на немь нъжной кожи.

Jong IV.

香香

Какъ

КакЪ скоро пепехЪ пришехЪ вЪ надлежащій стетень теплоты, то Г. Жаненд изЪ онаго сдълаль ему
постелю, и имъ покрыль всего кромь одного лица: положилъ же его на львой бокЪ, и потомъ одъль одъяльцемъ: при чемъ отъ времени до времени подносиль ему
подъ носъ сткляночку съ содою Люского, или нашатырнымд спиртомб янтарнымд (аqua luciæ f. spiritus
salis аттопіссі succinatus) (нашаты риый спиртб летьтій быль бы еще дъйствительнье,) которую при себъ
имълъ; также дуль ему табакомд въ ноздри, а напослъдокъ началь вдыхать создухд въ ротъ, зажимая ему
кръпко носъ.

Такимъ образомъ возвращали постепенно теплоту жизненную: блентя висотной жилы вскоръ стали быть ощутительны; дыханте учинилось свободнъе и чаще, да и глаза открывались и смыкались поперемънно.

Наконець младенець произнесь некоторой вопль, подобно какъбы просиль груди; тогда дали ему трудь, которую онъ схвата съ жадностію, сталъ сосать такъ какъ будто бы ему ничего не приключалось. Хотя блентя жиль казались совершенно возетановленными и время было довольно теплое. ОднакожЪ Г. Жаненб разсудилъ оставить его еще на три четверти часа въ пепав: по томъ вынувъ изъ онаго, очистили его и одъли по обыкновенному; наконець заснуль онв крыпко, и продолжаль бышь совершенно здоровымъ. Но мы предложили уже прежде на спран. 186 и следующ. сего Тома о тома, какима образомо надлежить поступать со младенцемь, который при выкож дении изв утробы матерней не подаетв никакого знака жизни, или которой перестает ды шать спустя несколько минуто после рождения: рав. нымъ образомъ преподали мы въ (3 главы предъидущей и средства, какъ оживлять тъхъ, кои задох нутся от в каких в нибудь паров в мефититеских в. **Ч**ЛЕНЪ

ЛИ СНЭ Л. Р

О удавленіи:

Г. Жанен в приводить еще наблюденте о молодом в наблюде-челов в кв, который съ отчанния повысился, и надъко-чіко имь онь употребиль стиже самыя вспоможентя съ то-ликим в же успыхом в какъ и надъ младенцем в, о кото-ром в теперь говорено было.

Г. Гловерд, Лъкарь Лондонскаго Оффиціальства, упоминаеть объ одномь человъкъ оживленномь, чрезъ дватцать девять минуть послъ того какъ онъ повъсился, и которой по томъ наслаждался, въ продолжении многихъ лъть, здоровьемъ самымъ лучшимъ.

Вспоможенія, какія надобно оказывать тымь, кои сь отд чаянія или иначе позысятся, и которые, показываясь лишенными всякаго чувства, будуть почитаемы за мертзыкь.

Средства къ возвращению сему теловъку жизни кровонуунотребленныя состояли въкровопускании изъжилы висосной и шейной внъшней, въ дълании трений по спинъ,
премывавъ наставлении промывательных изъдыму табашнаго, тельных
посредствомъ трубокъ, какъ то предъ симъ на страизъ дыму
ницъ 462 сего Тома предписано, и въ потирании ему
кръпко ногъ и рукъ.

Всъ еїн вспоможенія продолжались четыре часа; преръзгніе по томъ сдълали ему на дрізаніе въ дыхательномо гор- дыхательна, или операцію бронхотоміго называемую, и вдыха- вдыжаніе ли сильно воздухо въ легкіл посредствомъ трубочки. поздужа.

Чрезъ двадцать минутъ послъ таковой операціи, кроез начала течь изъ жилы по лицу его; и пильев, который до півкъ поръ быль несщутителень, началь показываться въ запястьв. Какъ тренія всегда продолжали, то пульев становился парочито в в

тастымв; и послъ какъ произвели ему раздражение въ носу и во рту посредствомъ нашаты рнаго спи рту летугаго, (fpiritus salis аттопасі), то онь открыль тлаза. Тогда стали давать ему кръпительныя. Наконець по прошествіи двухъ дней онъ столько оправился, что въ состояніи быль перейти восемь миль пътій.

Но мы удовольствуемся симъ примъромъ къ ноказанію того, что можно дълать къ возвращенію жизни нещастнымъ, кои давятся и въщаются сами, въ намъреніи извести себя.

\$ 4.

О судорогахъ сопровождаемыхъ мнимою смертію и о смертяхъ скоропостижныхъ.

членъ І.

О судорогахъ сопровождающихся мнимою смертію.

Жонвульсіи или судороги бывають часто предвломь бользией острых или долговременных ; а вы такомь случав весьма мало надежды остается къ спасенію больнаго, который умираеть обыкновенно вы самомь подступь.

Но какЪ скоро человѣкЪ, который по видимом ту наслаждается совершеннымЪ здоровьемЪ, внезапно будетъ объятъ судорогами, такъ что на немъ окатутся всъ признаки смерти, то не вся еще надежда потеряна; а должно всегда пыпаться о возвращении ему жизни.

Младенцы весьма подвержены бывають судорогамо: часто погибають они скоропостижно во время прорезывания зубово, оть одного или многихь подступово судорожныхо. Мы инвемь множество самыхь достовърныхь примъровь иладенцамь, коимь возвращена быбыла жизиь, хошя по всвыб признакам вазались было они умершили въ судорогахв; но здесь приведемь единственно савачющий, помещенный Локтором В Зопсоном в вы небольшомы его согинении о возможности возвращать жизнь людям в отевидно мертвымв, или имвющим всв ппизнаки смерти.

Вспоможенія, какія надобно оказывать тыть, кон кажуть ся умершими въ судорогахъ.

ВЪ приходъ Свящаго Клементія, вЪ городъ Кол-наблюде. честерь, къ шестимъсячному младенцу отсосавшему не грудь, и находящемуся еще на кольняхь у своей матери внезапно пришла сильная судорога, продолжавшаяся столь долгое время, и остановившая такъ обращение крови и движение всъх в частей тъла, легких в и пульса, что его почли за совершенно мертваго: въ слъдствие чего раздъвши его, положили на столь и заказали делащь гробокъ.

Но одна въ сосъдешвъ живущая Госпожа, любива шая страстно сего младенца, приведена будучи вЪ изумленіе, когда услышала, что он умерь, прибъжала въ домъ. Осмотръвши его со всякимъ вниманіемъ. нашла, что онв еще не остыль, что составы его были гибки; и она примътиля, что стекло, которое подносила ко рту и къ носу сего младенца, нотускло от вего дыханія.

Тошчасъ взяла она его къ себъ на колъна, съла передъ отнемъ, стала тереть его и качать полегоньку. Вь четверть часа почувствовала, что сердце его начало биться, но весьма неудобоощутительным в образом Б: тогда влила ему немножко материяго молока вЪ Рошь; и продолжая потпрать у него ладони и подошвы, примыпила, что онъ начинаеть шевелипься, и что молоко глошаеть. Наконець по прошестви другой чет-5 3 3

вер-

верти часа она имѣла удовольствіе возгратить сѣтующей матери ся рабенка совершенно здороваго, жаждущаго хватать грудь и также въ состояніи сосать какъ и прежде. Младенецъ сей рось хорошо, не имѣлъ болѣе судорого, вырось великъ, и теперь живъ находитея.

Сти вспоможентя, кои каждый человык в дыйствительно можеть оказывать безъ всякой трудности, достаточны къ возвращентю жизни младенцу мертвому, по крайней мыры по всымы наружнымы признакамы, и который вы самомы дылы таковымы учинится, по всей выроятности, ежели не употреблены будуть оных средства, кои суть столь просты.

Тренія,
вамханія
воздука,
промывапельныя
пэб дыму
пабавинаго.

Однакожь, вы случать естьли бы они были безуспышны, можно такожь употреблить и другія, каквто, тереть по всему тылу крыпкими спиртами; покрывать оное теплою золою или солью; вдыхать воздухо вы легкія, наставлять промывательныя изы дыму табашнаго и проч.

Для младенца рожденнаго мертвымЪ, или который скончается вскорв послв рожденія, употребляются тв же самыя средства кЪ оживленію его, какія и тогда, когда онЪ умираетъ въ судорогахЗ, какъ-то мы прежде говорили; смотри стран. 186 и слъдующія сего Тома.

Сти вспоможентя могуть такожь равно полезны быть и для взрослыхь, естьли имъть всегда вниманте къ возрасту и другимъ обстоятельствамь, въ каковыхъ больной находится.

Примъры предъидущие и наблюдения, коими они сопровождаются, доказывають неоспоримо, какие усивжи даже и неимъющие ни малъйшаго свидения въ Наулъ Врачебной могуть получить, стараясь о возвращения

жизни твмв, кои умирають скоропостижно, и даже оть какой нибуль бользни. Могли бы мы привести множество таковых в приключений, естьми бы сте было нужно; но надъемся, что и сообщенныя нами достаточны будуть къ обращению внимания публики; къ оказанію человъколюбія и благотворности въ споепъществовании всъми силами къ сохранению себъ подобныхЪ.

ВЪ 1767 году учрежденное вЪ Амстердамъ Обшество для оживленія утоплениково, имьло удополутора ста человъкъ. вольствіе спасти болве въ продолжени четырехъ леть, посредствомъ всноможений онымъ предписанныхъ, и которыя по большей части, что самое заслуживает впримъчанія, были ока-Зываемы кресшьянами, или чернью совершенно несвъдущею въ Наукъ Врачеоной. (Правительство города Парижа было равномерно щастливо, како то мы на етраницѣ 446 сего Тома показали.)

Но сін средства съ толикимъ успъхомъ употребляемыя кЪ возвращенію жизни утопленикамо, рав. Сін венономфрно хорошій уснъх вимьть будуть во множествь пригодны случаевь, вы которых жизненныя силы кажутся ве всяних въ самомъ деле токмо остановленными, а следствен случавкъ, но способными къ возобновлению всъхъ ихъ действий, ногда естественкогда приведены будуть въ движенте. Всякъ содро- ныя дейгаться должень, когда помыслить, что по недостать ствія току въ таковых и попечентяхъ, погребено множество лю новятся, 4ей, у которых в можно бы оживотворить источники и ногда жизни.

ЧЛЕНЪ II.

О смертяхъ скоропостижныхъ.

Скоропостижныя смерти, вы коихы болые всего ніс. ожидать можно усивка от употреблентя вспоможентй, Какія нами предлагаемых в, суть шт, которыя приключают ропостижен вы приступь паралита, припадка истеритеского, ныя смер-

нужно бываеть привелии ихЪ въ движеми, въ конкъ можно ежидать наиболье уснъха. сильнаго обморока, или какой нибудь иной сего рода бользии, въ коей причины смерти не примътны, и въ которой страждуще падають и мгновенно лишаются жизни: а различные случаи, въ коихъ можно испытывать сти же самыя вспоможентя съ пользою, суть задхновентя, происходящтя отъ сфриыхо паровъ угольныхъ ямъ, и всякихъ рудниковъ вообще; отъ зараженнаго воздуха колодезей, подземельныхъ погребовъ и пещеръ, затворенныхъ съ давняго времени; отъ выдохновентй, выдетающихъ отъ напитково закисающихо, какъ-то отъ чана съ виномо, пивомо, и отъ паровъ горящаго уголья, кислото минеральныхо, сфриыхо, мышьяку и проч. Но о всъхъ сихъ предметахъ мы уже предлагали въ \$ 3, главы предъидущей, на стран. 473 и слъдующ. сего Тома.

Утопленники, удавленики, тв, кои умирають скоропостижно, по получении ударовь, послъ падения, претерпъвши голодь, бывь подвержены чрезмърной стужъ и проч., могуть такожь оживлены быть итыми же самыми средствами, кои предложены въ \$\$ 2 и 4 той же главы предъидущей.

Можеть быть и ть, кои кажутся убитыми громомь, или волненемь произшедшимь оть движентя душевнаго, какь-то оть страха, радости, изумлентя и проч., могли бы равнымь образомь воскрешены быть чрезь средства пристойныя, какь-то чрезь сильное вдыханте имь воздуха вь легкал, и проч.

Вспоможенія, какія оказывать должно людямь умираю-

Оныя суть Вспоможенія, потребныя кЪ оживленію умираю почти щихЪ скоропостижно, суть почти одинаковы во всять же са кихъ случаяхъ; ихъ могутъ подавать всё тё, кой мые во находятся при ономъ нещастномъ обстоятельстве,

и не пребують они ни великих виздержекь, ниже случаяхь, великаго познанія.

Главное дело состоить въ возстановлении тен емы быть лоты жизненной и самаго движения; а до сего достивельных проти можно вообще посредствомь огня, третий, крого-выномь чело-выном, противатель как долинков, папитково крвпительных проч. Таковыя всно-жны пременя должны быть переменяемы по обстоятель таковыя стеманивать ствать, как то всяк изрядно разсудить можеть: вспоможеть мо состояние больнаго и простой здравый смыслына. Аостаточны будуть къ преподанию способа, коему следовать надобно.

Болье всего мы совътуемъ твердое постоян- постоянство: ибо, хотя бы обстоятельства казались и безнадежными, отчаяваться еще не надобно. Никогда не должно должно покидать больнаго, пока остается хотя ма-ихъпрэльнший лучь падежды. Всякой же разъ, когда увърень должать. бываещь, что дълаеть единственно добро, а не зло, не надлежить никакъ щадить трудовъ своихъ.

(Мы обязаны Г. Сажу, знаменитому Химику и важность Члену Королевской Академіи НаукЪ, употребленісмЪ, нашатырвъ большей части вышереченных в случаевь, нашаты р- рту летунаго спирту летутаго. Жидкость сія, признанная от в чаго въ всвх в некусных в Врачей за возбудительное во велких в большей сильных в обмороках в, для достижентя истиннаго сво части выего мъста, имъла нужду въ трудахъ сего ученаго му- женныхъ жа, который ознаменоваль ее самымь существен-случаевь. нымъ лекарствомв прошивъ оныхъ принадковъ, подвергающих в ежедневно твхв, кои жертвами их в бывають, прехожденію от в смерти мнимой къ смерти дъйствительной. Что самое учиниль онь въ небольшомъ сочинени подъ заглавіемь: Опыты способствующие кв показанію того, тто нашатырный спирто летутій есть явкарство самов сильнышее в Ясфиксіях или силь-JOME IV. 436x2

иых обмороках в; с приметаніями о полезных дійствіях в, происходящих в от внего в укушеній змей, в обожженій, бешенстве, паралите, и проч. первое, второе и третіе изданія.

ВЪ семЪ сочинении, напечатанномЪ по повелению Правительства и разсвянномъ въ столицъ и провинніяхь стараніемь Г. ле Увоара, Генераль-Полиціймейстера, для коего благо общее есть первое упражненіе, а вскоръ и во всей Европъ, а особливо въ Ишаліи, гав было оно переведено и напечатано иждивеніемь Правишельсшва; вь семь сочиненіи, говорю я, Авторъ начинаетъ доказываниемъ, что большая часть Ясфиксій началомь имветь тонгайщее вещество кислое, какъ- то сте нами показано было въ примъчанти 2, на спраницъ 473 сего Тома; и послъдствие опытовъ, учиненных в со всяким в искусством в и расторонностію, отличающими сего превосходнаго артиста, о дъйствіяхь смертоносныхь паровь жидкостей во время закисанія, о действіх в чаду, изліяній мефититеских происходящих от в нужников в, и проч., не должны болье ни мальйшаго въ разсуждени сего оставляшь сомнѣнія.

Но естьли он в изв сего заключаетв, как в то и должно было савлать, что нашаты рный спиртв летутій, не токмо чтобы его почитать простою принадлежностію, или просто возбуждающим в пользованіи в в полобном в случав употребительном в, долженствует напротив того употребляем быть предпочтительно всякому другому лекарству; то не опускает в предварить, что, не токмо дабы представлять нашаты рный спирт летутій за лекарство всеобщее, а говорит в повторяет в припадках в пригоден в единственно быть может в в припадках в и бользнях в кислостію, причиняемых в притом компреблять его должно весьма скоро, естьли компьть,

тьть, дабы производиль онь дыйствія желаемых.
"Я скажу болье, присовокупляеть онь сей са"мый спиртв нашаты рный, цылебный во многихь
"случаяхь, можеть учиниться вреднымь, естьли
"употреблять его не кстати, когда на примърь на"ходятся гнилыя частицы въ тъхъ мъстахъ, гдъ
"обитаещь, или когда эконолія животных
клонит"ся къ щелогно-солію (alkalescentia), къ скорбуту,
"п проч. "

Но мы не станем завсь следовать Г. Сажу въ многочисленных в опытах в от него учиненных в къ утверждентю - спасительных в действей нащаты рнаго спирту летугаго, и кои новторяемы были въ целой Европе съ успехомъ равномернымъ. Ибо сего не могли бы мы сделать, не повторяя токмо себя самихъ, поелику мы не опустили предписывать сего сильнаго лекарства во всяких в случаях в в которых в опытомъ доказано, что оно успех в имело.

И такъ мы удовольствуемся единственно отосланіемъ къ главъ 40, предлагающей о паралить; главы 48, \$3, къ члену I предлагающему о въщенствъ, къ члену II, предлагающему о ужалении за бевъ, и члену III предлагающему о ужалении насъкомыхъ; къ \$5, главы 52, предлагающему о обкога гъ главы 55 къ \$2, предлагающему о утопленикахъ; къ \$3, предлагающему о парагъ вредныхъ и запимающить духъ, и наконецъ ко всъмъ параграфамъ и членамъ настоящей главы 56.)

Весьма бы желашельно было, дабы и въ Англіи Учреждено было заведеніе подобное Амсшердамскому, и давалось бы награжденіе всякому, кто возвратить жизнь человеку мертвому по видимому (а). Безъ

⁽а) я имбю щастіє примъчать, что со времени изданія въ свъть сего сочиненія составлены многія общества въ Англія, оживляємыя тъми

сомнънія много дълають люди для славы; но еще болье того дълають они для денегь.

Однакожъ, хотя бы и не было соединено никакого награждентя съ таковыми дъйствтями благотворными, то сладчайшее чувствованте, каковое ощущать долженъ честный человъкъ, когда разсуждаетъ, что онъ довольно былъ щастливъ, когда воспрепятствовалъ тому, дабы не повергнули въ могилу, прежде роковато предъла, одного изъ подобныхъ ему, составляетъ само по себъ награжденте довольно сильное.

ГЛАВА 57.

О Горячкъ обыденной.

> итъми же самыми чувствіями благошеориссти, накими и общество Амстердамское, и что старанія ихъ не меньшими успъхами увънчаваемы были.

(т) Первое изб сихв общество завелось 1774 года. Удивительно, что Г. Бухань не упоменаеть объ немъ въ вредвидущихъ изданіяхъ своего сочиненія. Планъ онаго видёть можно въ третьей части Озстой. тельного описанія успожовь и проч. Г. Піа Начальники сего обще ства въ предисловія онаго плана избленяются такимъ образомі: ... Мож ,, но лумать, что сіе общество возрастеть вскорт всеми теми, коняв ,, чувствительное сердце сострадательствуеть нещастнымт, и усугу-, башь сболренія и всисмеженія, нь возглащемію жизни сограждань, нов , весьма были близки къ пошеряні о окой, или ошь бользии, канъ шо въ ,, сумасшествін, горячнахь ст помещательствомь ума; или отъ при-,, наюченій непредвидимых в, ноим в наждый человтив, а оссбанво бълный », подверженъ бываенъ; или отъ самоубувсивъ, кановыя многіе по э, чрезвычайной чувствительности предпринимантъ, даже и люди че-,, стаые, дорогіе или нужные для семейства. И такъ, споспъществуя ,, стояь полезному учрежденію, мы делаемь сіе малое иждивеніе напв э, для себя, такъ для семейства своего и друзей; и чанонецъ для , всехъ нещестныхъ. Смонри впрочемъ L' Avis des prevos, des Mars chands & Echevins de la ville de Paris. Cmpau. 455 n 454 cero Toma.

жизнь, покорено законамъ, которыхъ всякое маруше- оно повреніе бываеть причиною бользни. Самаго лучшаго тьло. жлается
сложенія человькъ тщетно излишествь не дьлаеть, рода поме
не тщетно предается трудамь, изнуреніямь, удо- шестьомь.
вольствіямь, и проч., сверьхъ силь оть природы полученныхъ: онь неукоснительно наказывается за свои
безпорядки, и казнь его бываеть всегда сразмѣзна самой его неосторожности. Воть причина, для чего
раскаяніе, неловкость и боль сопутствують всегда
разсьянію, увеселеніямь, и проч. даже и у щъхь, для
которыхь забава и гуляніе бывають весьма нужны.

Ремесленники представляють намы ежедневно при-примъры мъры симы истинамы. Занимаясь работою во всю неваятые отвятые отвятые обыкновенно по воскреснымы и праздинчнымы ровыхы днямы, для забыта своихы трудовы и изнуренай, жюдей. коимы бывають подвержены, позабывають самихы себя; бытають и гуляють неумыренно; пьють и ядять сы излишествомы, относительно кы ихы пищеупот реблению обыкновенному; а на другой день бывають или больны, или удручены, изнурены а притомы и гораздо больше нежели вы прежнае дни, когда занимались свочими упражненами; или наконець на другой день становятся кы работы совсымы неспособными.

Хозяева, тв, от коих они зависять, не упуекають их обременять укоризнами, завсегда неосновательными, поколику внушаемы оныя бывають единственно неудовольствиемь, какое производить вы сихы хозяевах медленное течение их рукодый: ибо не чувствують они, что их работники должны тымы менье быть вы состояни, дабы трудиться на другой день праздника, чымы сы большею ревностию работали они вы дни предшествовавшие.

Но не то бы было, естьли бы, какъ то совъ-Сколько товано имъ въ главъ 2 и 5, Тома I, захотъли они вежно то, чтобы мъз

тыть тру- принять за върное, что всего важите кЪ сохранения лы съ ижъ здоровья, дабы работы мышаемы были съ гуляотдохновеніемъ или отдохновеніемъ, и что равномырно будеть туляніемъ противно порядку природы и законамъ, всякое одушевленное существо управляющимъ, естьли предаваться неумъренно удовольствию такъ какъ и трудамъ.
Ибо отъ таковаго безразсуднаго поведения раждается, оное множество бользней предложенныхъ и изъясненныхъ въ настоящемъ сочинени, и изъкоторыхъ самая легчайшая есть обы денная горятка, (febris cohimera, gallice соигьаните), которою мы теперь заниматься намърены.

чие разумъстся чрезъ обыденную горячну,

Вообще чрезъ обы денную горятку разумвется болве начало бользни, нежели какъ бользнь со ственно такъ называемая. Ибо весьма извыстно, что она предшествуеть большей части бользней острых, такъ что первые признаки бользней тажкихъ чаще всего имъють свойства такъ называемой горятки обы денной.

Свойство обыденной горячки. Однакож в обыденная сорятка существенная, то есть, оное разстройство произведенное во всей мажинъ каким в нибудь излишеством в, не зависящее ни от какой порчи в в мокротах в, ниже какого либо повреждентя в в частях в; стя обы денная горятка, говорю я, имъет в шествте постоянное и порядочное, и с в небольшим в внимантем в в оной легко признать можно три пертода, примъчаемые в в бользнях в острых в, именно, время раздражентя, состоянте и конець, который обыкновенио бывает в переломом в весьма от у тительным в.

ВЪ разсуждени сего не льзя не удивлящься молчанию всвхъ Авторовъ о обы денной горяскъ. Ни одинь объ оной не говориль, выключая знаменитаго Г. Литода, который ничего не опустиль, и коему еще обязаны мы познаниемъ многихъ другихъ бользией, кои до него были или несвъдомы, или смъшиваемы съ другими. Конечно молчанте нашихъ писателей происходить от того, что обы денная горятка бываеть вообще столь легкою бользнію, что часто требуеть от больнаго единственно того, дабы онъ возбраниль себъ причины оную породившія.

Но как в сте средетво, котя и существенное, не есть достаточно во всяких в случаях в; как в больтую часть времени оставляется оно в в небреженти; как в весьма часто таковая неловкость пользована бываеть лекарствами противными, могущими иногда переродить ее в в бользнь тяжкую и смертельную; наконець как в обы деннай горятка случается очень часто, то всь сти причины побудили нас в разсудить, что она заслуживает в быть помыщенною в в число бользыней, о которых в в Доматинем в Петебник предлагается.

Г: Ліето до говорить о горятк обы денной подь именемь разгорятенія, конечно по той причинь, что простолюдимы принисывають оную всегда крови разгоряченной и воспаленной: но искусные Врачи, товорить сей наблюдатель, не безьизвъстны о томь, что нерезы здъсь играють ролю главный шую.

Она весьма часто приключается молодымы лю-кто ей дямы, а наиначе півмы, кои бывають ръзвы, пылки и подверо прудолюбивы; людямы запимающимся работами тяжельмими, дълающимы телодейжентя усильныя, кои бывають сложентя сухаго и многожелтного, которые вспыльчивы, сердины и проч.; ведущимы жизнь распутную, и проч.

5 . 1.

Причины обыденной горячки.

расположены быть на четыре различныя отделенія:

1) Нощебавнія, неумвренное твлодеиженте, безмврный трудь, безпрестанное упражненте вы наукахы; 2) злоупотребленте яство разгорячающихь, вина, крыпкихо напитково, перемвна пищеупотреблентя, а наиначе естьли кто переходить оть рода жизни порядочнаго кы какому нибудь излишеству; 2) страсти, скорби душевныя, и проч.; 4) наконець любовныя забавы, распутство, рукоблудіе, и проч.)

5 2

Признаки обыденной горячки.

(Больные, кои часто и не почитають себя таковыми, жалующем слабостію, болью головного. сномъ непріятнымъ и беспокойнымъ, а иногда безсонишего: чувствують глухую боль во всёхь членахь, въ спинь, въ поясниць, въбрюхь; часто такожь бываеть у нихъ жаръ въ головъ и во внупренности; жаръ ръдко оказывающійся на составь телесномь; языкь у нихь бываеть иногда сухь; но не всегда мучатся они жаждою: пильсь, хотя и не находится въ состояни естественномЪ, не всегда бываетЪ лихо радотный. Нъкоторые имъ ющь жарь и потв по ночамь; другіе страдають поносомб, и могу испускають горячую: большая часть не имветь охоты кь вав; варенія желу зка бывають трулныя, и особливо ночное спокойствие возмущають. Иныс же больные имвли сильныя кросотетенія, мочились кровью, харкали мокротою кровавою и проч.

какимъ Сія бользнь оканчивается обыкновенно сильнымъ образомъ потомб, иногда угрями, или другими сыпями, коими она оканчиваетъ, покрыта.

Обы денная горятка, как в то мы уже сказывали, есть горячна бользнь весьма легкая; но не должно запускать се: есть боль ибо, естьли утвердится она чрез дурное повелеми истема,

то можеть переродиться во всякте роды лихорадоко, не должно вы воспаленте, вы тохотку и проч. И какы великое чи небрещи сло бользней тяжкихы предваряемо бываеть обы денного соряткого, то всякы чувствуеть, что она становится опасною, какы скоро мокроты пртобрытуть извыстный степень повреждентя, оказывающийся жаромы острымо, какого прежде никогда не было; дурнымы запахомы во рту, оты поту и моли; чрезмырною вонью испражнемия низомо и проч.

§ 3.

Пользование обыденной горячки.

(Не надобно терять из виду сказаннато нами снольно выше на страниць 526 сего Тома, да и всь опытные нами, практики признають, что большая часть бользней острых предварлема бываеть обы денного горяткого. Почему и вниманіе должно оказывать самое разсудительное вниманіе, как вниманіе къ причинам оную произведшим в так в и къ призначать причинам в оную произведшим в так в и къ призначать кам в призначать со представляемым в. Познаніе сик в двух в преднам обы метов в толякую заключаеть важность в пользованіи, леной голям боль онаго многіе впадають в потрышности, рачки, темь болье предосудительныя, что самое мальйшее бъдствіе, мотущее приключиться больному, есть перечесеніе двйствительной бользнь тяжкую, которая можеть во гробь его низвергнуть.

Обы денная горякка, вы семы виды принятая, есть вниманіе и можеть быть изы всыхы бользней та, которая тре-раченіе, на-буеть наиболье раченія: и я смыю почти сказать требуеть честности и человыколюбія, естьли бы позволено бы-обыденная ло какому либо человыку когда нибудь безы оныхы ды-горячка ствовать. Все искусство вы большей члети случаевы того, кто обы денной горякки заключается вы томы, чтобы разбить того, кто пользовать самую бользнь; или ясные сказать, дабы предварить ее кочеть. Томо и.

оную; да и какое удовольстве прілтнёе для души чувствительной, для друга человъчества, какъ естьли сказать въ себъ можеть: я спаса моего ближияго от ужасных последствій болезни. Но къ нешастію для твхв, кои нарицаются предопредвленными на вспомоществование больнымЪ, не всегла сие чувствование представляется исполненным в предестей. Мы сделали слабое начершание въ нъкоторыхъ нашихъ примъчаніяхь, а между прочими вь примъчан. 7, главы 4 м примъч. 3, глав. 8, Тома II, и въ примъч. 1, глав. 37 Тома III, тнуснаго разбойничества, какое ежедневно содълывають оные невъжды, которые, попирая ногами всякое почтенте человъческое, видять въбольномъ, на них во всем в подагающемся, такую жертву, которой могуть по произволению корысти своей пожертвовать: Можно бы даже про них сказать, что они одну токмо цель и именть, а именто отпатощение припадковь, дабы сделашься нужнее.

Весьма нее поведенје непользова-

КакЪ скоро кто изЪ нихЪ призванЪ будетЪ таобынновен-кимъ человъкомъ, который страждеть обыденного горяткого, то онъ нимало не разсуждаеть о твлословъждъ въ жени онаго, о причинахъ и свойствахъ сей бользни легкой, о средствах в унотребляемых в натурою кв ной горяч- восторжествованію надъ врагомъ содержащимъ ее въ изнеможении; не это его занимаеть. Ему надобенъ больной; и орудія здравія, которых в он в нарицается блюстителемЪ, становатся вЪ рукахЪ его орудіями смершоносными.

> БезЪ веякаго разсмотренія пускаетъ нъсколько разЪ крось, даетъ и повторяетъ слабительныя; приписываеть лекарства на лекарства и проч.; и естьля твлосложение сего нещастнаго бываеть столько крытко, что можеть противустоять таковому нельпому и злольйственному нользованію, то услышишь его же cama

свои заслуги и усугубить принадлежащее ему награжденте, дълающаго ужасную картину опасностямъ, каковымъ подвергался сей больной, которая въ самомъ дълъ не долженствовала быть таковою.

Естьли же напротивь того сей нещастный падеть подь жестокими ударами своего палача, то оправданіе онаго ни мало его не безпокоить; предразсудки народные притекають къ нему на помощь; а совъсть его, затворениая къ самому полезнъйшему чувствованію, а именно къ чувствованію человъколюбія, не чувствительна бываеть къ угрызеніямь, такъ какь чело всякаго стыда чуждается.

Да простять намы сти размышлентя; они кажутем намы тымы лучше здысь помыщенными, что обыденная горятка есть бользны подающая наиболые поводы кы подобнымы дыйствтямы, поелику, какы собственно говоря не бываеть болены, то и располагаещься слыдовать совытамы первыхы, кто на глаза попадается; а естьли и призываеть на помощь, то рыдко принимаеться за Врача искуснаго.

Важивищая въ обы денной горяткъ: отъ него зависить пищеуповесь успъхъ, и естьми оно располагается съ осторожносттю, то избавляеть отъ надобности всякаго ль- ной горякарства. Надлежить начать отведентемь больнаго отъ чкъ. причинъ, отъ которыхъ зависить стя бользнь. Слъдовательно величайтая важность заключается въ томъ, чтобы имъть свъденте о таковыхъ причинахъ; вопервыхъ по тому, что самое сильныте средство къ лостижентю до излъчентя состоить въ отдаленти отъ оныхъ больнаго; а по томъ, поелику сти причины доставляють больнаго; а по томъ, поелику сти причины до-

10 10 2

HOW-

принадлежащее къ тому классу, къ коему они относящся, и пребующее пользованія съ онымъ сообразна-Вошь для чего мы и распределили сіи причины на четыре класса различных в, выше сего на страниць 528 сего Тома предложенные, изъ коихъ мы составим в столько же членовь для улобныйшаго пользованія самой бользни.

YAEHB I.

Пользование обыденной горячки приключающейся отв ноще бавній, неумвреннаго твлодвиженія, човзмвонаго тоуда, неусыпнаго упражнения вънаукахъ и проч.

На добно прерыванія прудовъ своижь.

(ЧеловъкЪ, который чувствуя припадки обыначать съ денной горятки отб того, что излишно занимался прудами, или пълесными, или душевными, не захочеть покинуть своихь упражнений, быль бы совершенный дуракЪ, самопроизвольно подвергающійся смерти. Сія неловкость, имь чувствуемая, есть повельне природы, гласящей ему, дабы остановился, потому что таковый человькъ требуетъ больше, нежели сколько права имбеть ожидать оть своего WAS TOCAOKEHIS

> ВЪ самомъ дълъ, естьми онъ захочетъ переступить чрезъ предълы, то натура, въщающая уже о себъ яко о неимущей силь достащочных в скоро будеть угившена, и больной впадеть въ изнеможенте, противъ котораго никакое искусство Врачебной Науки дъйствовать не въ состояни; естьли же напротивъ того покаряясь таковому велентю, возметь онь несколько дней отдохновенія вЪ постели, то узрить тишину, последующую за бурею, и свое здоровье оправляющимся, а часто и не нава нужды ни въ какихъ авкарстеля Е.

Mpenmy-MSecin Ba токоя въ MOCTASAM.

Однакож в случается иногда, что жар в сом в в толов и полсниц в, уступають токмо несовершения сему первому средству: тогда надобно предписать больному пиштя прохладительныя, как в по лимонад в, во-лимонад в ду с в уксусом в, сыворотку с в померанцом в, или настой уксусом в ма с в уксусом в да с в уксусом в каждой стакан в котораго сыворотна должно класть по четыре или по инти гран в селит с в померан ры. Он в может в которую пибудь из в сих в жидкостей насто насто употреблять вывсто обыкновеннаго своего пиштя, и свеноль принимать от одного до двух в полуштофов в на день нику с в селит вою.

Поутру и ввечеру должень держать ноги вывыны для теплой водь; и прежде каждой таковой ванны надоб-ногы и промывае но ставить ему промывательное изы простой воды, тельныя, кы которой можно прибавлять не много масла дере-вяннаго или свёжаго коровьяго.

Еспьли у больного будеть лихорадосивий жарб, канів дод то должень онь дни два воздержаться оть всякой жны быть пищи. Еспьли же лихорадки не будеть, то надлежить затья. давать ему летва соразмърно степени разслабленія, въ каковомь онь находится.

Аства сін должны быть взяты из в класса прозябаємых в; как в - то шпинатв, сорогинское пшено, кашица, молоко, илоды тогдашняго времени и проч.

Надлежить возпретить ему вино и всякте мапит- питеки крепкие, ибо не чрезь крепительныя надеяться должно возвратить силы вы сти первыя минуты. Можно, сказаль Г. Плетодо в сравнить вы птаковых об крытстоятельствах в, дыстве крепительных св дыстве вели бы смы раздувальнаго мыха, который придавая силу отню вредны. скорые его истребляеть.

Али чего?

Ръдко бываеть, чтобы въ случав простаго уто- кровопумленія, о коемь мы шеперь говоримь, нужно было сканія и оканчивать пользованіе слабительнымо, а и того раже техняль ю ю з

суть про- случается, чтобы оное надлежало начинать съ к исвямивны въ пусканія. Сін два вида врагеваній, столь важные въ семъ родъ немаломъ числъ бользней, бывають, а особливо крообыденной вопускание, обыкновенными источниками припадковъ герачки. очень часто последующих в за обы денного горяткою: припадковь, которые тыть ненье всякь принуждается почитать посторонними для сей бользии, что ть, оть коихь они произошли, чрезь дурное ихь поведеніе, не преминують предупреждать, или уверять, что оные приключиться долженствовали.

Контя бы и было нъсколько жару. однаножЪ сіе еще не есшь приинна для кровопусканія. Понятіе. каное напредставишь о

Ежели иногла у больнаго будеть изкоторый жарб, то сего не должно никакъ почитать причиною къ тему, дабы спъшить кровопусканиемв. Ибо сей малый жард есть не инос что, как в орудие, употребляемое напурою кЪ восторжествованию поспешному и благополучному надъ неловкоситю, въ которой она нахолишся. Падлежить взящь шерпвите день или два; ежели сей припадок в не укрощается от в покоя, прохладительных и других в средство недавно нами предлодобно себь женных в; ежели напрошив в того напряженность онего увеличивается, то изъ сего заключить должно, семь жарь. чио обы денная горятка не есшь бользнь существенная, что она будеть единственно началомь другой бользни, которыя можно уже распознать свойство, н по сущности сего самаго жару, и по другимъ признакама произшедшимъ, и кои въ продолжение сего времени довольно окажушся.

Кровопускание тъмъ maye npo-MINEHO . можение бываеть . большее.

Савловашельно надлежить совершенно воздерживаться оть кровопусканія, которое тьмь вредные вы горятки обы денной, произшедшей от урезмърнаго утомленія, чъкъ большее бывасть еїе утомленіе, и чьмь чтыв изне- болье изнуренным в кажется больной. А дозволить себв оное можно единственно вв случав сильнаго кросотехенія симптолатическаго; да и то съ предосторежыосшь

жностьми показанными вЪ Томѣ III, на свіран. Зо и в іннемвемслѣдующихЪ.

Что принадлежить до проноснаго, то хотя и которомь не всегда оно нужно, однакожь рыдко случиться мо- оно быть жеть, чтобы послыдетный онаго были столько же она можеть дозволено. Сны, какь и оть кровопускантя. Ибо вообще проносныя сбетоя. Сбетоя. бывають безполезны и излишны, какь скоро больной тельства, имыль уже какое нибудь выпораживанте, такь на прирыжь прометь потоб, или истетей моги сы прочение до большимь или меньшимь отсыдомь, или сыпь угрева- наретво тую, или сильное кровотетете, и прочения до весть безпольно обыкновенныя обы денной горятки, и кои за истужно. Тиминые переломы почитать можно.

Однакож в ежели, послё того как в неловкость когла оне минуется, больной станеть чувствовать во рту нё-потребно. которую вязкость; ежели потеряеть он охоту к в вав, состояние довольно обыкновенное для техв, кои не имьли никакого из сих выпоражииваний, тогда надле-чисти-жит предписать пропосное легкое и прохладительное, техво то упцию талары (рира tamarimdorum), векиня прохлажа ченной в стакан воды или сыворотки, в которот в носле велёть разпустить от двух до трех унцисамой лучшей манны; или настой из талару и Ялексамой лучшей манны; или настой на талару и Ялексамой лучшей манны; или настой на талару и Ялексамой лучшей манны; или настой на талару и Ялексамой лучшей манны; или пакож воду минеральную художественную, составленную из вести дражы соли Сед-

Посль таковаго пропоснаго, которое можно и повторить, естьли нужда потребуеть, надобно давать больному летва питательныйшія, какъ-то мяса молодых в животных в, не много хорошаго вина, и сверхы того должень оны имыть нысколько телодоиженія.

мицовой или Эпсомовой, распущенной въ полуштофъ воды, которой должно пить по стакану черезъ часъ.

Еже-

Какъ вести себя жолженъ выздоре» вленін.

Ежели, по выздоровлении больной принужденъ будеть воспріять прежиїя свои упражненія, то побольной по требно, дабы он возвращался къ нимъ постепсино и въ пользу свою употребилъ наставление не давно имь полученное; чрезь котпорое научаясь кознавать возможность силь своихь, научается также и тому, что излищества суть токмо относительны, и чносовершенное будеть безразсудство размерять себя съ людьми, которые насъ сильные и крыпте, или пускаться на оныя столько же, как и они,

ЧЛЕНБ П.

Пользование обыденной горячки, приключающейся от вло употребленія яствь разгорячающихь, вина, крепжихь напитковь; оть перемьны діэты, и проч.

(Пользование обы денной горятки, от в сихв причинь зависящей, нъсколько различествуеть от того, которое нами теперь предложено. Равнымъ образомь надлежинь присовыновань больному удалянься оть причинь, оную произведимхв, то есть, отрышить яства разгорятающія, вино, крепкіе напитки, дурную діэту и проч. Но сихъ средствъ еще не довольно вообще, поелику желудоко и кишки чаще всего набишы бываюшь веществами неудобоваримыми, ошь коихъ оной освободинь должно.

Жанъ сей сей родЪ обыденной TODAMKE mm sem To mis mpe-

По чему шаковая неловкость, имъя великое схом ство съ неварентемо желудка, о которомъ мы предло жили вЪ главъ 43, Тома III, требуетъ и пользованія почни сходнаго. Однакожъ ръдко случается, чтобы велиное , больной имвав позывы на рвоту; но какв онв чувсъ неваре. ствуетъ немалый жаръ въ желудкъ, брюхъ и поткахв; ність же как во рту бываеть у него сухо, горячо, а не рвя мулка, то ко и съ жаждою, какъ кожа у него горишъ и пульсо и пользова-имъетъ онъ сильный, хотя при томъ и неполный,

то теплая вода, даваемая въ великомъ количествъ, буетъ равномърно служить для него лекарствомо главнымъ подобнаго.

И такъ больной долженъ пить побольше теплой пите весоды, или воды ятной, или воды съ уксусомо и проч. дяное и въ по выбору. Въ первые два или три дни надобно постаном номь номь вишь ему три или четыре промывательныхо, и сверхъ личествъ. того долженъ опъ воздерживаться отъ всякой пищи промывавь продолжени сего времени. Не нужно, чтобы онъ тельныя. дежаль, такъ какъ мы въ предъидущемъ случав совъщовали: а надобно, напротивъ того, чтобы онъ по-больной не хаживалъ и слегка быль одъть.

Естьли бы однакож в больной стал им вть позывы на рвоту, то надлежало бы тогда помогать натурв, которая в сем случав употребляет почти завсегда усил тщетныя, и дать ему пятнадцать или двадцать гран и илекакуанны в в порошкв, в стакан в теп и пекакулой воды; самому же двйств оныя пособствовать можанна. но твы или другим в вышеозначеннаго питья, как в то мы предписали и в в примъчан и 4, главы 3, Тома II.

Пропосное чаще бываеть нужно въ семъ случав, проносное. нежели въ предъидущемъ, а наипаче ежели больной, имъвъ тошноту, не принималъ ипекакуанны, и не имълъ никакой сыпи. Но прежде приняття пропоснаго, потребно, чтобы жаръ былъ совершенно утоленъ и боль разбита; что самое требуетъ болве или менве времени, относительно къ напряженности его припад-косв. Онъ можетъ принять, которое нибудь изъ лежа ретеб выше сего на страницъ 535 сего Тома предписанныхъ, и оное повторять смотря по надобности случаевъ.

Когда обы денная горятка происходить отв перемены діэты, то всего довольно чаще возвратиться къ той, какой следовали прежде, только бы содержа Гомо IV. долгое время діэту противную, не подали уже случая къ подлиннымъ бользнямъ, кои оныя посльдетвіями бывають, и которымъ вычисленіе видьть можно въ главь о летвахо, на страниць 209 и сльдующихъ Тома І.

Въ сей самой главъ показано и то, съ какими предосторожностьми надобно имъть разборъ въ ястемх относительно къ темпераменту и тьлосложентю. Еще видъть можно въ главъ 3, того же Тома I, на страницъ 229 и знаки, по которымъ примъчается, тто вино вредно или полезно.

Сей члень окончаемь мы совышомь краткимь, но весьма разумнымь и полезнымь, какой подаваль славный Пуссо одной знашной особы, у которой излишества стола бывали частыми причинами обы денной горятки и неваренія желудка. Оставьте роскошные столы и пыйте воду.)

ЧЛЕНЪ III.

Пользование обыденной гормчки, приключающейся от страстей, скорбей душевных и проч.

Сей видъ
обыденной
горячки
случается
втано.

(Ръдко бываеть, чтобы дъйствие страстей ограничивалось простою горяткого обы денною. Впечатавние
сильное, скоропостижное и жестокое большей части
изъ нихъ причиняеть очень часто горятки воспалительныя, другия бользни острыя, а иногда и смерть
скоропостижную. Медленное же содъйствие, напротивъ
того, нъкоторыхъ другихъ, скрытно подрываетъ цълый составъ тълесный, и ввергаетъ въ бользни разслабляющия, противъ которыхъ все искусство очень
часто бываетъ безсильно, какъ то мы сдълали о семъ
примъчание въ главъ 11, Тома 1.

Однакожъ таковыя дейсшвія бывають токмо отмосительными къ удобораздражаемости болящаго. Чело: Человък в нъжный и чувствительный может в умерщилен в быть однимъ движентемъ гивеа, когда напротивъ того сїє же самое движеніе произведеть внечать вніве легкое надъ человъкомъ кръпкимъ и сложения здороваго. Равнымъ образомъ печаль, скорби душевныя и проч., скользять, такь сказать, на телосложении крепкомЪ и мужественномЪ, когда напротивЪ того вовлекають они въ припадки неизцалимые тахь, кои имаюшь волокно слабое и бываюшь сложенія меланхоли-Ceckaen:

Савдовашельно страсти не долженствують при-кто онож чинять обы денной горятки, кромв как у твхв, кон подверимъющь телосложение средственное, то есть, которые не будучи чрезвычайно чувствительны, бывають однакожь столько чувствительны, что оныя оставляють еще нъкоторые слады присутствия своего; или у малаго числа шьхв, коихв страсти кажутся подчиненными столько, сколько сте быть можеть, силь разсулка здраваго.

Какъбы то ни было, но первъйшее изължарство надобно въ семъ видъ обы денной горятки, такъ какъ и въпро-начать съ чихъ, состоить въ отвлечени больнаго отъ причи- нія отъ ны, оную произведшей. Трудно, без в сомныйя, ис-себя при требить впечатление, какое следала въ душе страсть чины оную сильная и господственная; однакожь совъты разум. преизые. ные и хорошо преподанные от истиннаго друга; ви-Авніе предметовь противных в тьмв, кои нась поразили; бестам и разговоры о предметах в прямо противных в тымь, от в которых в приключилась бользны, суть великія средства, каковых в пренебрегать никак в не на-40бно; поедику сверьхъ того, что они часто удавались, безъ вспоможенія ихъ всякія лекарства бываютъ безсильны, какъ то мы показали сте въ примъчанти з главы S. Тома II.

Котда бы- Ежели больной имветь жара и боль ед головв, ваень ежели кожа у него горинь, то вмвето обыкномарь, то веннаго своего питія должень онь употреблять
жагдитель сыворотку померанцовую или лимонную, оршата, лимее. Ванны монада, воду са уксусома, ягную воду са селитрою, и
для ногьи проч.; сверьхь того нужно ему ставить ноги въ тепцвамя.

лую воду поутру и ввечеру, или сидвть въ цвлой
ванив, коея вода какъ можно менье должна быть теплою.

Въ первые дни два или три нътъ нужды ему употреблять много пищи: онъ можеть довольствожладитехьное пите успоновна. иу, то долженъ пить ввечеру миндальное или изъ другихъ съменъ молоко; къ которому можно будетъ прибавлять, смотря по обстоятельствамъ, отъ трехъ до шести драхмъ сиропу макорожетнаго.

жеть слабоеть, то стоять из сыворотки на винв, или из воды подемверотка стоять из сыворотки на винв, или из воды подна винв, крашенной виномв; или из жидкой наливки коры сасниливна сафрасовой или коришневой, подслащенной сахаромв. Кормиться можеть мясами молодаго скота; пить за иоряцы. столомь вино пополамь съводою; и употреблять питіс успокоевающее выше сего означенное, естьли нужда потребуеть.

Охинъ слу
Въ сихъ двухъ случаяхъ кровопускание необхомай покадимо нужнымъ почитается слинственно тогда, когда
вующий
ировопуснаніесяткомо отищении или во всякомъ другомъ кровотетенистиий периодитескомо, или обычайномъ: то же самое
тельныянадлежитъ разумъть о проносномо, которое давать
должно тогда, когда примъчены будутъ признаки требующие лъкарство тистительныхо.

Но вообще, как в скоро припадки обы денной горятки утолятся, единственными лекарствами для больнаго нужными почитаются разбите скуки, прогулка, путешествія и проч.)

ЧЛЕНЪ IV.

Пользование обыденной горячки происходящей оть неумъренности въ любовныхъ забавахъ, распутства или невоздержной жизни, рукоблудія и проч.

Колико бользней ведешь свое начало от при-сколько чинь сихь! Таковь есть жребій рода человьческаго, бользней чино любовныя утьхи становятся источникомь мно-от сихь жества золь, ежели кто не внимая ничему кромь стре-причинь. мленія желаній, безь разбору предается побужденію оныхь. Здысь-то наиначе пе quid nimis, нитего излишилго, есть основательный камень здоровья.

Первый припадокь, вы каковой вовлекають сего Самая легорода распутства, есть обы денная горятка; принадокь, чайшая на которой прелесть удовольствія весьма часто за денная гоставляеть смыкать глаза, и который чрезы таковое рячка. небреженіе скоро руководствуеть кы потерянію силь; а оттуда кы изможденію или истощенію почти всегда Канія суть неизцылимому, и часто кы бользиямы, столько же другія бостажимы какы и жестокимы: таковы суть: паралить, сонная бользив, падугая бользив, трясеніе тленово, ростаммець, судороги, всякаго рода подагры и проч.

Сколько есть молодых вольной, которые от неповиновения сему первому вельной природы находять изображение свое вы картины Я ретесвой; ужасной но истинной нижеслыдующее!

"Таковые молодые люди, товоришь онь, прини-послед"мающь и видь и немощи стариковь; они становать стариней
"ся бльдны, слабы, шяжелы, ленивы, глупы и жизни.

Я я 3

Даже

"таже слабоумны, тело ихъ изгиблется; ноги не мо-,, гуть больше ихъ носить, ко всему имвють они от-,, вращение, ко всему бывають неспособны; многие ,, впадають въ паралить и проч.,, De fignis & causdiuturn. morbor. Книга II, глава 5.

Улпократо описаль последствие таковых в распушствъ поль именемъ хребетной гахотки. "Бользны , сія, сказываеть онь, заражлается вь мозгу кребто-"вомб: она приключается молодым в супругам в и модям в , похотливыма: горятки у нихъ не бываеть; а хошя от ваять хорошо, но худьютьи чахнуть; имь , представляется, будто бы ходять по нихъ муровы, , кои опускающся изъ головы вдоль спины; всякой разь, , когда ходяшь на судно, или мочашся, шеряющь вы , довольном в количеств в стиянную влажность, вссьма , жидкую; неспособны бывають къ дъторожденію; ., часто занимаются венеритескимо двиствиемь вы сно-"видънїяхъ своихъ: прогулки же, а особливо въ доро-"гахъ трудныхъ, задушаютъ ихъ, разслабляють и , производять у никъ тягость въ головъ и шумъ въ ушахв: наконець острая горятка дни ихв оканчи-"ваетъ.

Знаменитый Тоффланий приводить въ своемв сочинени о бользилх приклюсающихся от злоупотребления любовных утьх сльдующее произшествие:

"Одинь осмнадцатильтий молодець, который часто
"имьль обращение съ служанкою, впаль вдругь въ сла"бость со всеобщимь дрожаниемь во всъх членахь:
"лицо было у него храсное, и пульсй весьма слабый:
"мять сего состояния вывели его чрезь чась вре"мени; но онь остался въ совершенномъ разслаб"лении. Тоть же самый припадокъ опять приходиль
"очень часто, и произвель ему въ осьмый день корчение
"и опухоль въ правой рукъ, съ болью въ локть, ко-

э торая завсетла увеличивалась съсамымъ припадкомо. "Бользнь усиливалась въ продолжени довольнаго вреэмени, не взирая на многія лькарства; да и не скоро эмогли его выльчить.,

Какую картину ужаснве представить можно оным в картина юношам воношам воношам

"Л. Д * * *, Часовщикъ, жилъ воздержно, и на"слаждался добрымъ здоровьемъ до семнадцатилътнято
"возраста. Въ сте время вдался онъ въ рукоблудте, кото"рое повторялъ каждый день, а часто даже и до трехъ
"разъ; изверженте было всегда предваряемо и со"провождаемо легкимъ потерянтемъ памяти и движе"ніемъ судорожнымъ въ протягательных мышках го"ловы, тянувшихъ оную сильно назадъ, между тъмъ
"какъ шея рагдувалась чрезвычайно.

"Не прошло еще года, какъ онъ началъ чувство» вать великую слабость послъ каждаго дъйствія: но
» напоминовеніе сіе не было достаточно къ извлече» нію его изъ опасности: душа его, совсьмъ уже пре» давшаяся таковымъ мерзостямъ, неспособна была зани» маться другими помыслами; и повторенія его безза» конія ежедневно становились обыкновенные даже до
» того; что онь нашелся въ состояніи, въ которомъ
" сталь опасаться смерти.

"Какъ онъ слишкомъ уже поздно взялся за раз-"Умъ, то самая болезнь столько усилилась, что из"лачить его не можно было; и дътородныя части сдъ"лачись столько раздражаемы и столько слабы, что,
"не было болье нужды въ новомъ дъйстви со сторо"ны сего нещастнаго, къ изліянію съмени. Самое
"легчайщее раздражение производило немедленно со"вершенное напряжение ствола, за которымъ слъдо"вало непосредственно выпоражнивание сей жидкости,
"ежедневно слабость его умножавшее.

, Оная судорога, которую чувствоваль онь пре-, жде токмо во время совершенія действія, и которая э, тогдажъ переставала, учинилась обычайною, и под-, ступала къ нему часто безъ всякой причины явной, ,, и столь жестокимъ образомъ, что во все время " онаго припадка, продолжавшагося иногда часовъ пят-,, надцать, а никогда меньше осьми, чувствоваль онв , во всей задней части шеи боль столь несносную, . что испускаль обыкновенно не вопль, но какь бы нъ , который ревь; и во все то время не возможно ему "было глотать ничего ни жидкаго ни твердаго: го-, лось его савлался хриповатымь; и онь всвхь силь лиу, шился совершенно. Принужденный оставить свое ре-" месло, яко неспособный ни къ чему и бъдностію , угнътаемый, началь онь изнемогать, почти безь всякой помощи, въ продолжении несколькихъ меся , цовъ, будучи шъмъ достойнъе жалости, что оста , токъ памяти, которая не умедлила по томъ исчез ,, нушь, послужиль единственно кънепрестанному при "веденію ему на мысль причинь его злощастія, и кв ", усугубленію всей ужасности угрызеній совъсти.

"Извѣстившись о его состояніи, рѣшился я сдѣлать "ему посѣщеніе; однакожъ нашель я его болье мершве" "цомъ нежели какъ существомъ живымъ, лежащаго на соло "мѣ; худощаваго, блѣднаго, загаженнаго, испускающато духъ "смрадный; почти неспособнаго ни къ какому движенію; час » часто изъ носу капажа у него кровь бавдная » и водяная; а изъ рта текла безпрестанно пъна. » Одержимъ будучи поносомо, марался онъ подъ себя, » даже и самъ того не чувствуя. Теченте съмени было » оезпрестанное: нагноснаме, мутные и опалые глаза » его не имъли болъе способности двигаться: пульсо » былъ чрезвычайно слабо, скоро и састо, дыханте имълъ » онъ весьма трудное; сухощавость чрезвычайную, вы- « ключая ногь, кои начинали быть солды ресаты.

"Помѣшательство ума было не меньшее: ибо ; находился онь безъ всякихъ понятій, и безъ памя- ти такъ, что не въ состояніи былъ связать двухъ реченій; безъ размышленія, безъ мальйшей заоо- ты о своей участи, безъ всякаго инаго чувство- ванія кромѣ боли, возвращающейся со веѣми при- падками, по крайней мърѣ чрезъ каждые трои сутокъ. Существо гораздо ниже скота несмысленнаго; позорище, котораго не возможно объять , ужасности: всякъ съ трудностію распознать могъ, щто оно прежде принадлежало къ роду человѣческому. ... Онъ умеръ по прошествіи нѣсколькихъ недѣль въ , Іюнѣ мѣсяцѣ 1757 года, имѣя волды ри по всему тѣ- лу. , Onanifme, стран. Зз и слѣдующ.

Таковыя описанія и примъры, коих в наполнены обыхенная Авторы, и которые могли бы мы привести в вели-гречка ком в множеств в, естьли бы было нужно, принесут в подава. Ли какую ни удь пользу новобрачным в, молодым в лю-емый на-дям в начинающим в вдаваться в в сообщеніе с в женіщи-турою н нами и рукоблудникам в Мы бы весьма были щастли нію всанавы, естьли бы надежда наша была нетщетная. По го рода крайней м в р в наш в долг в есть, представлять им в неум вреночасности, каковым в они подвергаются, как в скоро со-чостей, противляются вельнію природы, напоминающей им в остановиться; а таковое вельніе из вясняемо им в быв весть признаками горятки обы денной.

JOMB IV.

0 0

КакЪ

жно начижно начисих в припадково, то следовательно и надобно им вонаться поменен оружиться мужеством ; да отвергнуть они удовольтех но ствія, которыя их в телосложеніе не позволяеть им в
предаются употреблять кром как в съ ум вренностію, и кои безженцичисленныя злоключенія принудять их в оставить ненеум вренмедленно. Они должны брать покой соразм врно степени утомленія, в в каковое будут в повержены: надобно им в воздерживаться от в приближенія к в своим супругам в пли к в тем женщинам в, с в которыжи они своей страсти удовлетворяли.

РукоблуаниковЪ Потребно, чтобы рукоблудники не были никогла совершенно одни, дабы сыскивали они себъ пріятелей и собестриковь, могущихь занимать ихь воображенте и наполнить пустоту души ихь: надобно имь убъгать чтенти и разговоровь способныхь привести имь на умь тъ помышлентя, которыя весьма важно для нихь навсегда истребить изъ памяти.

Когда не пріобщить стой горятки обы денной, то есть, ежели не имвють стой горятки обы денной, то есть, ежели не имвють сухотная они сухотной лихорадки (febris lenta), приводящей вы имхорадка изможденіе, то надлежить давать имь питія прохлатить дительныя и селитряныя, вы предвидущихы членахы предписанныя; а ежели желудоко ихы вы состояніи варить пищу, то могуть они употреблять яства легкія и услаждающія.

ньть Всему должно предпочитать въ такомъ случав яства пре- молоко, поколику оно возвращаетъ силы весьма скоро- воскоднъе молока въ поспъшно; поелику питаетъ такъ какъ и соко мястаномъ ный, не будучи подвержено гнилости, и предупрежелучать. даетъ жажду; потому что занимаетъ мъсто пищи и питая; содержитъ всякія от двленія сосудово и располагаетъ ко сну спокойному; словомъ, потому что

оно способствуеть къ выполнению всякихъ показаний представляющихся.

Закутуев Лузитануев обязань быль употребленію молока излеченіемь одного молодаго человька, котораго неумъренныя забавы съ женщинами ввергнули было въ сухотную ликорадку, сопровождаемую палящимъ жаромъ и остротого моги, истощившими его ло такой степени, что онъ болье походиль на скелета. нежели на существо живое. Praxis Med. lib. 2, observ. 70.

Ежели молоко произвело столь удачное дей- Осторожствте надъ толико разслабленнымъ, то чтожъ дол-ность, каженствусть воспоследовать съ теми, кои чувству бно имъть ють токмо первые признаки изможленія? Но при упомы должны предваришь, что, дабы молоко дъйствие требления имьло желаемое надобно, или чтобы больной составиль извнего единственную себь пищу, или бы унопребляль его токмо на тощакь, а именно на завтракъ и ужинъ, когда желудоко совершенно бываетъ своболень оть варенія прочихь яства

К ровопускание совершенно не нужно; да и может в кровопудаже быть бъдственнымъ въ семъ видъ обы денной го- скание вреряски, поколику она всегда зависить болье или менье чего? оть изможденія или изнуренія, и когда всякое выпоражниванге бываеть вредно. Пропосныя не болье тогда бы-когда на вають нужны, развъ токмо бользнь произойдеть оть добно даизлишества лищи, от в чего желу доко ослабъеть, и носное, то варить не въ состояни будеть; а самымъ лучшимъ ревень товъ глаковомъ случав тистительнымо почитается ре-имо предвень, полагая онаго на каждый пріемъ по двадцати че-писывать должно. пыре грана, и сте повторяя до техь порь, пока не станеть льйствовать.

Ежели у изнуреннаго больнаго будеть лихорадка, то это без в сомный я лихорадка сухотная, обыкновен-

0 0 2

ная спутница измождентя; и въ такомъ случав надобно призвать на помощь Врача опытнаго.

Руноблудвикозъ изъ вобхъ больчых Ъ гораздо трудите.

Рукоблудники из всъх в такого рода больных в наименье послушны бывають, какь то мы следали о тиновых семь примъчание вы § 3, глав. 7, Тома II. Поелику беззаконте их в шествуент всегда под в пънтю тайны, пользовать що и не льзя никак в увъдать о их в состояни, пока признаки измождентя и разслаблентя не обнаружатся; и даже въ сте самое время весьма трудно еще бываеть сорвать покровь скрывающій истинну. Но мы оппсылаемь кь Онанизму Г. Лиссота, для узнанія пользованія, приличествующаго состоянію, въ каковомъ сін нещастные находятся. Услуга обществу оказанная от в сего знаменитаго Врача не могла бы имъть цъны, естьли бы люди унвли пользоваться наставленіями. оть него тамь преподаваемыми.

Тоже самое разумущь OH ORMAOK

Сказываемое нами затсь о рукоблудникахв. лолженствуеть равномфрно разумфться, да извинять нась рукоблуд- въ семъ выражени, и о рукоблудницахв: по весьма не ложно то, что изъ женскаго полу нъкоторыя предаются сему пагубному пороку. Больште города, монастыри, общества монахинь, панстоны, воспитательные домы, и проч., ежедневно подающь намь сему примъры; а припадки от в сего приключающиеся быватопъ темъ взживе и шемъ трудиве къ врачеванию, чвив телосложение женщинь слабве, нажные и немощамъ подвержениве.

> Сколько находишся бользней, кошорыя, сами по себь будучи маловажны, становятся неизлечимыми У женщинь, потому что ихь телосложение бываеть разслаблено и обезсилено от в сей толикож в постыдной как в и мертоубійственной причины! Сколько есть и другихъ, зависящихъ отъ сей единственной причи-HIBI a

ны, шемь пруднейшей къ открытію, что притворство и скрытность кажутся быть правиломъ воспитанія въ прекрасномъ поле.

Следоващельно самая величайшая важность заклю- весьма вачается въ томъ, дабы готовящеся къ веномоществованію ближнимъ, по должности своей или по склонноизвъстну
сти, были сведущи о таковыхъ действіяхъ, дабы обедственчрезъ то самое могли всегда остеречься противу
различныхъ переменъ, безпорядочныхъ и обманчивыхъ
пановыхъ
случайностей, каковыя столь часто представляютъ бо- привыченъ
лезни женскія. Можно для сего посоветоваться съ сочиненіемъ Г. де Біснвилля на страниць 235 сего Тома
приведенномъ.

Наставленіямь Онанизма равнымь образомь здъсь слъдовать можно, однакожь съ ограниченіями, изключеніями и различеніями, каковыя показують бользни женскія: по чему мы и совътуемь вы таковыхь случаяхь не полагаться никогда на собственное свое знаніе, а призывать всегда Врача благоразумнаго и опытнаго.

Чтожь до нась касается, то мы удовольству-наноминоемся напоминовеніемь, со всякимь убъжденіемь, матерямь, настоятельницамь монастырей, начальницайь терямь, воспитательныхь заведеній и проч., всячески бдёть о умь востомь, дабы дёти ихь, питомицы и всё ввёренныя ихь питательнадзиранію, не оставались никогда однё; дабы не свели оль короткаго обращенія ни съслужанками, ни съ волосочесальщицами, ни съ швеями и проч., женщинати по большей части распутными.

Do ces personnes - là craignez le caractere;
n On ne se perd jamais que par leur ministere.

Nivelle de la Chaussée.

То есшь:

"Ганико людей сы право узнавши опасайтеся; "Ото пагубныхко услуго ихо спышно уклоняйтеся.

He

Не должно никогда позволять имъ, подъ какимъ бы то предлогомъ ни было, спать съ гостьею, съ подругою, даже и съ пріятельницею, а особливо старье ихъ, поколику всв рукоблудиицы признаются, что таковое обращеніе бываеть эпохою ихъ распутства: наконець надобно доставлять имъ увеселенія; вводить ихъ въ такія общества, коихъ бы благопристойныя забавы наполняли ихъ сердце и не оставляли бы мъста къ пожеланію другихъ удовольствій или услажденій.)

ТЛАВА 58.

О Разгорячении отъ солнечных лучей.

торячение торячение от выпосное от вышения от выпосное от выпосное от выпосное от выпосное от выпосно

Сабдетвія разгоряченій отб солнечныхъ лучей-

Таковые припадки часто бывають очень опасны, поколику могуть они умертвить, а особливо людей пьяныхь, засыпающихь сь обнаженною головою на солнив. Вользнь, которая на нихь находить, мало различествуеть оть паралига, восхищающаго ихь иногда скоропостижно; а ть, кои оть нее избъгають, долгое время чувствують боль вы головь, очень мало дающую имь покоя. Другіе же лишаются тогда зрънія, или хотя и пользуются свътомь, токмо не болье какь сколько потребно, дабы различить ихь округом.

окружающее; иные же наконець остаются въ помъ-

Поселяне претерпъвающіе разгорятение от солметных лугей, чаще всъх подвержены бывають воспаленію грудобрюшной перегородки (рачарктепебіз) весьма опасному, которое простой народь горяткою называеть. Иные имъють безпрестанный бредо со помьшательствомо ума, но безь жару и безь боли головной. Другіе же бывали и такіе, кои лишались зрынія, или у которых в, по ныскольких в днях в несносной боли головной, бользны кидалась на выка, кои
логое время оставались красны и напряженны так в,
что и раскрыть оныя не можно было:

Дорожные люди, земледьльцы и другіе жители ктооным деревенскіе; кровельщики, каменьщики, мостильщики подвержень улиць и прочте работники трудящіеся на знов соличень болье всьхы подвержены бывають разгорятентиль от солнетных лутей: солдаты, вы походахы и при осадахы, могуть такожь страдать от оныхы: равнымы образомы не льзя избъжать сего и во время гулянія, вы разныхы забавныхы играхы на открытомы солнць и проч.

Т. Juccom в сказывает в, что он видель человых сими припадками страдавшаго от в того, что спаль съ обнаженною головою, подле великаго отня. Я не сомневаюсь, сказаль по поводу сего Г. Лиетодв, чтобы хлебники, пирожники и проч., не могли подавать тому множества примеровь, естьли бы попадались они на руки Врачей столько же способных в сумпь объ оных в.

§ 1.

Причины разгоряченія оть лучей солнечныхь.

будь части тъла, бываетъ, какъ то всякъ довольно

чувствуеть, единственною причиною сихь припадковь. Но шаковая причина, когда впрочем всв обстоятель. ства случатся одинаковы, несравненно будеть дъятель нье, ежели дыйствуеть на человыка упившагося виномь, на человъка предавшагося глубокому сну, на людей утомленных в трудами и проч., которых в может в она умертвить немедленно, такъ какъ мы уже сте сказывали.)

6 2.

Признаки припадкозъ приключающикся отъ таковаго разгор'яченія.

(Тъ, кои поражаемы бывають солнцемь, топчасъ жалующся тяготительного больго въ головь; болью сопровождаемою нередко жаромо и жаждою: они чувствують ломь, или біеніе сераца весьма безпокойное; имъ представляется, будто бы мозго качается въ керепъ; пламенные и сверкающие глаза не могушъ сносить свыта и бывають иногда сомкнуты оть опужоли ресниць. Иные имеють сухороги вы голове; а на другихъ нападаетъ сонливость или такожъ мучатся они великою безсонницею, которая бываеть обыкновенно предвозвъстницею ужаснаго бреда. ходятся и такіе, которые обыкновенно будучи вЪ жару, теряють память и делаются какь бы получ умными; другіе же имьють движенія судорожныя, или дрожанте въ конечностяхъ и проч.

признаки . em 3~ Вляюпъ віншана части годовы.

При всемъ томъ кожа на лицъ, на терепъ или жакіе пред- на всякой иной части, кажется сухою и какъ бы опаленною от в солнца, и дълается иногла опихоль. ока зывающаяся на шен и около ушей. Пото бывает в обыкновенно обильный и сопровождается величаншею слабостію: Мога кажения краснованною и съ жаромъ: наконецъ больные чувствують самую жесточайшую тоску, и не принипринимають пищи; нные такожь имъли отвращенте и от в питія. Одинв человьк в ходивши цьлой день на солнив, сказываеть Г. Гиссотв, впаль въ сонную боявзив и чрезв нъсколько часовъ умерв св признаками 6 h menemea.

Но не надъ одною токмо головою таковое дъй-другія ситвіе производині в жаръ солнечный, хотя она и есть части та такая часть, которая чаще всего онымъ поражаема женныя бываеть. Пускай кто нибудь подвергнется знойным в солнечный лучамъ сего свътила, съ покрытою головою такъ, ми луча. что она защищена будеть оть содъйствия оныхв, и простоить на оных в несколько времени, то конечно ощупить вы рукахы, ногахы, лядвеяхы, полсиина, или во всякой другой части тела, некоторое чувствование жара сухаго и вакаго, нарочитое одеревененте, боль жестокую и проч.

У малольшных дышей бользнь ега оказывается признаки величайшею сонливостію несколько дней продолжающе- у малоль. юся; безпрестаннымъ бредомъ или безпамятствомо, тыхъдъсмъщанным в съ бъщенством в и страхом в, так в как в будто бы кто ихъ жестоко испугалъ; движеніями судорожными, болью головною умножающеюся по часамь, от которой они кричать безь умолку; рестого безпрестанною, и проч. Случалось даже, что иные младенцы, по претерпъни таковаго разгорятенія, чрезв долгое время небольшим в кашлемо мучились.

Но шаковыя разгорятенія от солнетных лучей признани. не всегда сопровождаемы бывають припадками столько когда приважными, ниже столь разнообразными, как в тв, о ко- вають ихЪ мы теперь предложили. Ибо когда впечатление бы- легнія. вает в легкое, по тому ли что голова хорошо была укрыта, или что солние не так в жгло, или наконец в по тому что не долго кто находился на ономъ, то весь при-Jomes IV. V v па-

падокъ оканчивается иногда однимъ только нас мо пкомв, залеганиемв вв посу, болью вв горав или вв соловь, опухолью въ железахо шейныхъ, или сухостію въ глазахъ, которая болве или менве времени чувствуема бываеть, и проч.)

3.

Пользование припадковь приключающихся оть таковаго оазгоояченія.

Оно должжо бышь поспъшное. MARKHie.

(Припадки приключающіеся оть разгорятенія лутами солнетными, требують пользованія темь пожанъ скоро спъшнъйшаго и скоръйшаго, чъмъ они бывають сильные: припадни ибо когда признаки будуть тяжкіе, то, хотя мало упустинь времени, бользнь савлается неизльчимою. Но вся важность состоить въ утолени горячности жрови и погащении огня въ оную закравшагося. А таковое намерение выполняють совершенно кровопускания. ванны для ногв и полуванны, цёлыя ванны, промывательныя и прохладительныя как внутреннія, так в и вившийя.

KROBOHYеканія.

Надобно немедленно отворить жилу; и ежели кровопускание учинено во время, и въ соразмърности съ трлосложениема и напряженностию признакова, то оно разбиваеть иногда тотчась вст припадки: но въ случаях в очень важных в часто бываеть нужно повторить сте, и даже многократно. Г. Гиссото объявляеть, что Яндовику XIV принуждены были пускать кровь девять разв, дабы спасти его отв разгорятенія лугами солнетными, которое получиль онь будучи на охопт.

Ванны для Morb.

После кровопускантя надлежить ставить ноги въ теплую воду; а сте средство есть одно изъ самых в сильныйших в: послику многіе больные облегиеніе от в него тотчась получали. Надобно стоять вы санив сколько можно долве, и оную возобновлять часто. ВЪ

ВЪ случаяхъ опасныхъ надлежитъ погружеть боль полувания, наго въ полувания и даже въ ванну цёлую; но должно цёлая ваннаблюдать, чтобы вода была токмо тепловатая, такъ на тепловатая, какъ и въ ваннахъ для ногъ; ибо горячая вода могла промывать бы причинить немалый вредъ. Млетительныя промы тельныя вательныя, часто повторенныя, бывають еще вели тельныя. кимъ вспоможентемъ.

Во время употребленія сих в первых в средств воде св больной должен в пить в в довольном в количеств в во- уксусом в, оржат в, доворот в десь особеним во пригодно, також в оржат в, лимонад в, сыворотку сыворотка с уксусом и прочество уксусом и прочество в уксусом в оржат в на прочество в уксусом в прочество в уксусом в прочество в оржат в на прочество в уксусом в оржат в на прочество в на пред на прочество в на пред на пре

Надлежить примачивать голову, лобь, виски, а примочки особливо ту больную часть, на которой находятся на головъ пятна или опухоли, о коихъ мы выше на страницъ водою съ уксусомъ. 552 сего Тома говорили, полотенцами намоченными въ водь сб уксусомъ, въ сокахъ портулака, салату (la- списа), желъзняку (verbena), и проч.

Мы совышуемы испытать прикладывание компре- нашасовы намоченных вы нашаты рномо спирты летутемо, тырнымы болье или менье ослабленномы, относительно кы на пряженности припадковы. Судя по удачи сего спирту чимы противы обжоги, думаю я, сказываеты Г. Сажо, вы книгы на страницы 521 сего Тома приведенной, что можно бы его употреблять удачно и вы разгорятей ляго от солистных лутей; но какы я самы онаго не извыдаль, то опыту предоставляется оправдать стю догадку.

Какъ скоро состояние первых путей требуеть, славительный по принисываются славительный з и въ таковомъ случыя. Чав дается преимущественно декокто изъ тамару Упайскаго (tamarindi). Больной можеть принимать каждый день натощакъ по половинъ бутылки сего де-

кокту, приготовленнаго изътрехъ унцій тамару Явно дійскаго.

NOROZHBIR. блюденія.

Холодныя ванны пользовали иногла даже и въ ванны. На- таких в случаях в, кои казались безнадежными. Одинъ двадцашильшний человько, говоришь Г. Лиссота, находившись долгое время на знов солнечномъ, бредилъ жестоко, но безъ горятки, и быль прямо бысноватый. По многих в кровопускані ях в посадили его в в холо дную еанну, которую повторяли часто, и сверьх в того взливали ему колодную воду на голову. Сти вспоможентя мало помалу его выльчили.

> Одинъ Офицеръ, который въ великіе жары вкалъ по почть ньсколько дней сряду, слезая съ дошали паль вы обморокь, прошивы коего не двиствительны были всь лекарства обыкновенныя: равным в образом в и его спасли погружентемь въ воду самую студеную.

Предостожолодная жанна. По напряприпад мърять

Но всякъ чувствуеть, что таковыя холодныя рожность, ванны могли бы опасны бышь, естьли бы наперед не маковои убавили изъ сосудова, то есть, не пустили крови, а притомъ и сразмърно съ напряженностію припадковъ.

ВпрочемЪ не найдется человъка, который бы не женности чувствоваль, что всь таковыя лекарства не должны быть даваны безб разбору во всяких в случаях в разновь на горятенія от солнетных лутей: правда, прохладитель ныя и ванны для пого приличествують во всъхь; но явнаретва. к ровопусканія, ванны цёлыя, а особливо ванны холо Аныя, долженствують быть соблюдены для обстоя. тельств В важных в и опасных в, как в то мы постарались сте показать обстоятельно. Ибо не меньше бы опасно как в и смъшно было, естьли бы кто сталь пускать кровь и сажать въ ванну въ насморкв, въ залегани носа, въ простой боли головной и проч., дъйствіяхъ самыхъ обыкновенных в разгорятения от в солнетных в лучей, как в THO

то мы выше на страниць 554 сего Тома говорили. ВЪ разсуждении таковых в маловажных в бользней налобно поступать такъ какъ предписано въ в глав. 20. Toma II и въ главъ 26, Тома III.)

Средства какъ предохранять себя отъ припадкозъ приклю: чающихся от разгоряченія солнечными лучами.

(Для избъжанія таковаго отб солнегных в лугей разго рятенія не надобно никогда выходить изЪ покоевь, а особливо въ деревни, не имъя головы покрытой; не отдыхать никогда на солнцъ, наипаче же повыши, а и того болве напившись сверых в обыкновеннаго. Весьма бы похвальное было дело класть или велеть полагать въ тенистомъ месте оныхъ нещастныхъ, безчувственно виномъ упившижся, коихъ столь часто вспрычають на дорогахь близь кабаковь, лежащихь на солнив и погруженных въ глубокой сонъ, отъ коего иногда они и совсемь не пробуждаются.

Времена годовыя, въ которыя наиболье опасать льтомъ в ся должно разгорятенія отб солнетных лутей, суть весною весна и льпо, особенножь льпо. Весною одни токмо солнце опажители городские находятся обезпоконваны от в солн-ваеть для ца: а причиною сему полагать можно то, что естьли жителей таковые люди не выходивши большую часть зимы съ городдвора, а чрезъ сте самое бездъйствте подавши поводъ къ накопленію мокроть, появятся вдругь на солнце, которое имбеть уже нъкоторый степень силы, то сосуды головные, онымъ зноемъ разширенные, обременятся большимъ количествомъ жидкихо и мокротъ; количествомъ, которое тъмъ сильнъе будетъ, что прочія части, какъ то ступни, ноги и проч., будутъ холодиве: что самое очень часто случается весною, во время года обыкновенно дождливое, и когда земля почти всегла бываеть влажная.

Таковая холодновашая, а не редко и студеная сырость увлажняеть ноги, коихь сосуды сжинаяся, обращають жидкія кь частямь верьхнимь: и ежели въ стю минуту солнце станетъ ударять на голову, двиствуя такъ какъ нарывное, то мокроты привлечеть въ часть стю, сразмърно своему жару и разширенію сосудова: оштуда сильныя боли головныя; сопровождаемыя часто ломомЪ несноснымЪ и болью вЪ глазахЪ; припадками однакожЪ завсегла не столько тажкими, какъ тв, которые отъ летняго солниа приключающея.

Накодившимся на воздукъ зимою жды бояшься сол-Haro: но всякой человъкъ **Д**олженЪ тиняго: CITH OM. будеть тогда въ движенія.

Впрочемъ такте жители городские, кои не сидъли въ шеплъ зимою, а кольми паче поселяне деревенскіе, не бояшся солнца весенняго, потому что отв нъть ну- онаго не чувствують себъ никакого дурнаго дъйствіл. Но всв стращатся, да и должны страшиться солнца нца весен- лешняго. А сте происходить не оть того, чтобы не пріобыкли къ впечатльніямъ онаго, такъ какъ и къ впечатляніямь всяхь таль безпрестанно на нась дайствующихв, и чтобы не дошли до того, дабы могли опасаться переносить его зной, так в как в привыкаем в сносить еолну аль без всякаго вреда, жестокость самой величайшей развъ шон- стужи. Однакожъ деревенскіе жишели, пріобыкшіе къ солнцу по нуждь, все еще не избавляются опасности подвергаючи себя лучамъ онаго, естьли не будуть находишься въ дейсшвии, поколику примешили они, да и всякъ по поводу ихъ наблюдение савлаль, что ежели остаенься въ поков, то разгорятение от лутей солнетных получишь удобные, нежели находясь вЪ движеніи.

Следовашельно особы слабыя, нежныя и живущія Преиму-MILECINBA. обыкновенно въ заключени должны остерегаться отъ солнца ветого, дабы на солнув весеннем в оставаться на одном в для людей мвств, развв токмо корошенько будуть окупаны, да

и земля или песокъ будутъ очень сухи; ибо тогда сложентя сей животворный зной приноситъ великую пользу, а слабаго и особливо старикамъ.

Но всякой человъкъ вообще долженъ убъгать солнети, съ ща лътияго; и естьли принужденъ кто бываетъ на кановыми ономъ находиться, по какой бы то причинъ ни было, на ономъ то надлежитъ ему стараться, дабы быть всегда въ нажо-диться дъйстви, которое бы безъ утомления его, было од-должно-накожъ-достаточно къ притуплению, такъ сказать, знол лучей онаго.)

ГЛАВА 59.

О багровой сыпи.

(Подъ именемь багровой сыпи (gutta rofacea; ga- Свойства lice la Goutte rofe sive свирего разумьются обыкновеный сей больный красный пятна на лиць, сопровождаемый прыщиками, и иногда как в бы нькоторою когрою, съ великимъ жаромъ и болью мутительною; почему и говорится о тъх в, кои въ такомъ состояни находятся, что лицо у нихъ багровое и угреватое. Прыщи сй бывають иногда въ такомъ мпожествъ и такъ велики, что лицо отъ нихъ становится безобразнымъ и страшнымъ: изъ нихъ вытекаетъ матерія то гнойная, то сукровитная, кровавая, а иногда даже тистая кровъ. Болье всего садятся они на носу; отъ чего часто бываетъ онъ толщины престрашной.)

§ 1

Причины вагровой сыпи:

(Всякаго рода распутства, а особливо излишнее унотребление сина, крвпких в напитково и забавъ съ менскимъ поломъ, чаще всего къ сей сыпи подаютъ новодъ. Однакожъ есть люди поведения безпорочнаго

и наблюдающіе діэту, кои сю заражены бывають. Но въ семь послёднемь случат или она зависить отвостроты лишаевой, цынготной и проч., или проискодить от разгоряченія, причиняемаго трудами упорными, а особливо душевными; от оторченій и проч., или наконець от причинь внёшнихь: ибо нёть кажется сомнёнія и о томь, чтобы притиранія и помады, употребляемыя женщинами для наведенія себт краски, или для выровненія кожи, не способствовали къ порожденію багровой сыпи, поелику затворяя скестжинки, останавливають онё вы дохновеніе испарины.)

\$ 2.

Признаки багровой сыпи.

распалениемь, а особливо послъ кушанья, которов становится вскоръ безпрерывнымь, и за коимь послъдують красныя пятна легкия и поверыхъ только кожи, выступающия мъстами на лбу, на щекахъ, по носу. Мало помалу си красныя пятна дълаются темнье, разширяются и сливаются другъ съ другомъ такъ, что широкия кружки составляють.

По томъ непримътнымъ образомъ открываются небольштя остроконечныя шишечки, составляющтя столько же прыщиковъ, кои увеличиваются на поверьхности кожи, и источають, когда достигнуть до своего степени, различные виды влажностей, о которыхъ мы говорили. У иныхъ сти прыщи слившись вмъстъ составляють нъкоторой родъ маски или личины, отъ которой инчто не свобождается кромъ только окружности ръсницъ и губъ; у другихъ же сливаются они на носу и на верхнихъ частяхъ щекъ; а у нъкоторыхъ состоять изъ кружковъ неправильно лежащихъ. Одни тувствують жаръ несносный, даже и боль во всъхъ

тасшях в красных в; другіе же ничего шого не чувсшвующь, когда бы даже по качесшву и количесшву красных в пяшень казалось, что наиболье предполагать оное надлежало, и проч.

Не трудно остановить распространенте багро. Еене труж сой сыпи и оную выльчить, естьли приняться за сте дно выльчить вы началь. Но какы скоро она застарыеть, и больной будеть вы лытахы, то противы всякихы лыкарство она уже упорствуеть; а надобно тогда удовольствоваться врачевантемы котя на время облегченте подамощимы: да и самое лыченте таковое, предположивы, что она етаромощиты, послику опыты и наблюденте анатомить она етаромо опасностью, послику опыты и наблюденте анатомить и опасно теское доказали, что горятка, засоренте какой нибудь внут опасно бываеты ренней части, а иногда даже спазлы, и судороги, сопутьющимы ствують сему мнимому излычентю, а особливо естьли маться эм она дажежащимы пользовантемы предуготовлено не было.) жыченю.

Пользование багровой сыпи.

(Врачеваніе багровой сыли, сколько бы она ни не- оно должно давияя была, долженетвуеть завсегда продолжаться быть про- должно времени. Следовательно больному и надобно тельно. вооружаться терпеніемь.

меть, то бользиь непримьтнымь образомь пустить корни, кои не возможно и даже опасно будеть исторгашь вЪ последовании.

Следовательно и должно оставить совершенно всякіе напитки и умфрять двятельность труда своего; надобно воздерживаться от в всякаго яства остраго, соленого; приправленного сб периомв, пряного н проч.; кофи, шоколату и проч.

Лешва . Humie.

Кормишься можно похлебками, мясами молодых в живошных в, отородными овощами; а пишь за столом в воду одну, или просто виномо подкрашенную.

Aisma nonжна продолжашься BO BC10 жизнь

Прискорбно для нъкоторых в людей слышать. что таковое пищечнот ребление должно быть наблюда. емо не токмо долгое время, но и весьма долгое время: однакожь надлежишь имь удостовъриться въ томь, что безъ постоянства подобнаго не возмогуть они никогда ни изавчиться от вагровой сыпи, ниже предупредишь ея отрыжку, как в скоро она выльчена, такъ что предлагаемая нами діэта чрезъ всю ихъ жизнь быть долженствуеть.

дълыхЪ ногъ. Прооржашъ, Свекольная

Ваниа для Надлежить ставить ноги въ теплую воду восемь дней сряду. Естьли же больной почувствуеть въ себъ разгорячение, то долженъ употребить нъскольвыя, Сыво- ко промывательных в, а пишь или сыворотку, или ротка, оржать, или наливку свекольную, распуская въ каждомъ стаканъ оныя по четыре или пяти грановъ сеналивна съ литры. Въ следующие же осьмеро сутокъ сие пользоеелитрою, ванте перерывается, а по том в опять возобновляется и продолжаемо такимъ образомъ бываетъ до тъхъ поръ, пока оные первые признаки багровой сыпи не сокроются; и естьли вновь не станешь подвергать себя причинамъ, отъ коихъ она происходила, то навсегда от в нее избавишься.

> Но ежели красныя пяпна довольно уже времеии продолжаются, ежели прыщики уже окажутся, IIIO

то надобно, не смотря на оставление оных в причинъм наблюдение диэты, не смотря на ванны для ногв, промывательныя и пития, о которых в мы предвесим говорили; надобно, говорю я, больному принимать гистительное многократно и в продолжени чисти времени с в напряженности самой бользии соразмър тельныя, наго. Но с и гистительныя должны быть легкия и прохлаж дагощия, так в как в и в в члень 1, \$ 3, глав. деть ставов, на страниць 535 сего Тома предписанныя.

Одна средних в льтв Тоспожа выльчилась совер- наблюдешенным воздержаніем в отв вина, крыпких в напить ніе.
ково, кофи и проч., и употребленіем вод Пассійских в которых в она каждое утро пила по цьлой бутылкь, вы продолженіи осьми дней сряду, и кои по
томы на столько же времени оставляла; но вмысто
оных в пила равным в образомы по бутылкы рычной воды: и так воды Пассійскія слегка ее слабили, а вода рычная чистила желудокы.

Какъ скоро прыщи весьма умножатся, сдълаются велики и будуть выпускать влажность выше сего описанную, то пользование становится труднымь, поколику оно долженствуеть быть относительно къ свойству сей влажности: чего ради и совътуемъ мы въ
такомъ случав положиться на предписание и наставление Врача искуснаго.

Безъ сомнънія онъ будеть поступать весьма опасиости различно от площадных вачильщиковь, употребля- от праводих противь сей бользни одни токмо притираній, помадь, пластыри, помады, мази и проч. Онъ въдаеть, что мазей и таковыя внъшнія врачеванія суть тъмь опаснъе, чьмъ проч. Скорье сію бользнь прогоняють: ибо задхновеніе легихах и петени послъдствіями оной бывають весьма частыми.

Естьми же нужно иногда имъть прибъжище къ подобнымъ лъкарствамо наружнымо, то сте дълать мо- А а а 2 жно

жно не прежде, какЪ по долговременномЪ употребленіи лікарство внутранних в, посль употребленія мно-Нарывное, гих в саннв, шпанских в мухв, фонтанела, или піявицв, фонтанель, припускаемых в позади ушей и кв ноздрямв, которыя средства пригодны во всякое время, сказываеть Г. Плето 23, не изключая при том в и других вепоможеній.

> Но болье всего въ водобныхъ случаяхъ помогали и всегла хорошее двистве имвли фонтанелы открытыя на ногахъ. Особенножь обязанъ я нарывному прикладываемому на руку, и содержанному въ теченій двух в леть, посредством в коры деревца волги ягоды (coretx thymelaa) называемаго, излъчениемъ одной Госпожи, которая получила стю бользны какъ отъ печали по лишенти мужа, такъ и отъ досадъ нанесенных вей от вего родственников в. Однакож в самым в пригоднъйшимъ врачеваниемъ въ такой болъзни почитаются ванны изб воды морской.

Наблюдение

MODEKOM

воды.

Я пользоваль одну тридцатильтнюю женщину, которая захватила было стю бользнь от в труда усильнаго. Какъ прыщи у ней были втолетовые и синевашы, то я и предписаль ей сыворотку, въ каждомь полуштофъ которой велъль настанвать по пучку брунк ресу или жезухи (nafturtium aquaticum) и по горсти тистяку или дымянки (fumaria). Дважды принима ла она тистительное, и вскоръ по томъ приложили ей на руку нарывной пластырь, которой содержань быль ев корою деревца волгаи ягоды. Теперь наслаж дается она здравтемЪ совершеннымЪ.

Излишнимъ почишаю я предварить, что багре ван сыпз, которая есть признако скорбута, лишаево. Венеритеской бользни и проч., не иначе выльчена быть можеть, какь пользованиемь техь самых бользней, оть коихь она зависить. По чему и надлежить для сего случая совътоваться съ главами, предлагающими о каждой изъ оныхъ бользней, а именно, съ § 1, глав.

35, и съ § 1, глав. 38, Тома III; и съ §§ 7 и 3, глав. 49, Тома IV.)

\$ 4.

Средства какъ предупреждать отрыжку багровой сыпи.

(Весьма нужно, сказываеть Г. Ліето до, знать, что сія бользнь, будучи укрощена по наружности, часто возобновляется въ другое время года, и что слъдственно стараться надобно о предупрежденіи ел отрыжки, не токмо благоразумнымъ употребленіемъ лъкарство нами предложенныхъ, но еще и діэтого самою строжайтею и чрезъ вею жизнь продолжаемою.)

ГЛАВА 60.

О Мозоляхъ на ногахъ.

(Всякому извъсшно, что сте названте дается съожение имер ды из паростама, бывающимь особенно на пер. мозолей на стаха у ноги, и которые иногда несносную боль при-

§ 1.

Причины мозолей на ногакъ.

(Обыкновенною причиною мозолей бываеть сжа- Сжатіе тіе, какое слишкомь іпъсная обувь производить вы моги ств ногв, кошорой кожа твердьеть, и составляеть желые вакь вдающійся оть части вы тьло, почти такь какь и сучья вы деревьяхь.

Шеголи и модныя щеголихи, тв, кои думають, что дабы хорошо быть обуту, надобно имъть ногу меньше, уже и остроконечнъе, нежели какую произвела природа, не хотять върить, чтобы несносная боль, ими претерпъваемая, от сей причины происходила. Однакожь самымь опытомь доказано, что не сывает никогда мозолей и у монаховь, кои носять сандали, ниже у крестьянь, кои ходять босые или носять обувь широкую.

Aaa3

Впро-

Другія елъдemeia omb сжатія твеною обувьк.

Впрочемъ не одни только мозоли бывающъ слъдствість тьсной обуви. Пускай разсмотринь кто ноги наших в красавцовь; они не походящь ни въ чемъ на ноги жителей деревенскихЪ: ибо у сихЪ послъднихЪ ступни бывають широкіе и общирные, такь что плюсна и персты поллерживая, сколько возможно, во всъхъ их в частях в, способствують, вивств св пятою, кв приданію всему телу наиболье твердости.

Безоб разіе. какое мрі-06pbm2= ошь сжатія ихъ узкою обувью.

Но у щеголей поги совствы не шаковы; все у никъ обезображено: вся плюсна лежитъ на краю; сають ноги мые персты поддерживають однимь только нижнимь у щеголей концомв, который находится придвинуть къ полошвв, а чаще всего бывають они собраны вь узель, потому что одинь съ другимь какъбы сплетаются: почему щеголи и ходять всегда шатаючись, какв-то мы вЪ главъ 7, Тома I примъчание о семъ сдълали.

Наблюдение • странномЪ положе. го керста у ноги.

Vпражнявшіеся в В Анатоміи не ошибаются в В скелеть крестьянина и городскаго жителя при одномЪ воззрвни на ноги. Никогда изЪ памяти моей не нін больша-выйдеть, какь я бывь принуждень осматривать ногу у одного старика, пришель въ чрезвычайное удивленіе, видя большой палецо совершенно лежащимъ на пальнь смежномь, въ нагнътени столько глубокомь, что все было въ ровень. Да всякъ вообразить себъ, колико сей человъкъ долженъ былъ терпъть въ началъ таковаго сдвигиванія съ мьста, и до тьхъ порь, пока оное ненатуральное положение саблалось нечувствительнымЪ! Но такова сила моды, что она преуспъваеть делать себь невольниковь, даже и посредешвомъ страданій!

Однакожъ таковое дурное расположение и трудность, а даже и невозмножность ходить, не одни бывають злоключенія, проистекающія оть сего страннаго безумія, дабы хотвть ноги имвть малыя и остроконсчныя. Опсюда происходить еще почти совершен-HOC

ное остановление всякаго движения и всякаго двиствия въ мускулахо плюсны и самыхъ пальщово. Ибо персты на ногахъ, коихъ ярусы устроены такъ какъ и въ перстахъ ручныхъ, въ которыхъ у младенцевъ очевидно примъчается игра и движимость, не становятеля и нъкоторымъ образомъ бездъйственными у человъка взроелаго, который всегда носилъ обувь тъсную? Не должно ли по сему самому оное устроение членовъ мочитать за излишнее и обвинять натуру въ расточении? Станемъ паче удивляться ея премудрости.

И подлинно, кто не видаль людей лишенныхъ рукъ, кои делали ногами то, что бы стали делать и руками, естьли бы изувъчены не были? Я видалъ женшинЪ, мужчинЪ и даже малолешныхЪ дешей, кои пряди, вязали чудки, шили, кидали каменья и прочногами. ВЪ 1779 году весь ПарижЪ на ярманкъ Сентъ-Жерменъ сбъжался смотръть Ліежскаго учителя. Сей человькъ, произшедшій на свыть безь рукъ, чинить перо ев величаншимв проворствомв, пашетв очень хорошо. шьеть, тасуеть карты и играеть ногами. Ногами ръжить онь яства, посредствомь ножа и вилки. Ногою такожь носить вы роть ложку, вилку, полной стаканЪ и вышиваетъ. Копаетъ заступомъ землю, мятетъ въникомъ, выжимаетъ мокрое и проч. Наконецъ рачеміе, дщерь нужды, руководствовало сего человька кЪ тому, что онъ отъ ногъ своихъ заимствовалъ такія же вспоможенія, какія мы оть рукь получаемь. Ежели бы сей человъкъ родился богачемъ, то ноги его, сжашыя въ башмакахъ швеныхъ, служили бы много что Аля хожденія, и онъ вечно бы сталь проклинать жребій, лишающій его членов встоль важных в каковы руки; и приводящій его до состоянія болвана одушевленнаго или самодвижущейся машины, когда напрошивЪ того он в благословляет в природу, доставившую ему в в ногахъ дополнения къчастямъ, которыхъ его лишила.)

Необходимыя следствія мозолей на ногахъ.

HOAR Becs-(Боль причиняемая такими мозолями оываеть ма жестоиногда весьма чувствительна; часто препятствуеть Kis: mpyдность а она хожденію; а всегда производить то, что ходить ча:по и можешь мало, или съ великою трудностию. Въ разсуневозможжденій сего мозоли на ногахо заслуживають величайность жошаго вниманія: послику они или приводящь въ невозжишь. можность, чтобы предаваться телодвижению довольно-Нелостаmoкь mt-му для сохраненія здоровья, или опінимають привыч--SERETOR нія: совер- ку кв сему самому тіло движенію; втакв что естьми шенное не-кто напоследок и избавится от в мозолей сихв, то grancmaie, конечно не столько чувствуеть боли, однакожь все и преч. но остается погруженным в то же самое нельйетвіе, источник в безчисленных в бользней, как в то вь главь 5, Тома I было показано.

> Почему и нужно весьма пещися о томЪ, дабы младенцы носили обувь широкую, да и принуждать должно ихъ слъдовать сему употреблению по мъръ того, как' стануть приходить въ возрасть. Ибо ежели они достигнувь до пятнадцати или шестналцаши льшь привыкнушь имьшь ноги на своболь, що св трудностію подадутся на муку, какую отв весьмя твеной обуви чувствують иногіе, а кольми паче тв. которые кром в обуви просторной никогда не нашивали.)

> > Пользование моголей на ногахъ.

Hamb собетпвен-MOASH-CIRBY IORT 4еппва про-BRUBB MO-BUREAL

(Пекарства похваляемыя кь врачевантю мозолей на ногах бумножились соразыврно количеству прощале ных в лакарей, или твхв побродяхв, кои за пользоваго авир- ніе оных в принимаются, и из в которых в каждый нарицаеть себя блюстителемь таинствь. Но что бы они о томъ ни сказывали, однакожъ нътъ ничего истинные, что не находится никакого собственно дыйствующаго лекарства противь таковых в мозолей, и MILLO

что всякія мази, даже и саныя славивнийя, не болбе силы имфють какь и простой желтой воска, или всякое другое вещество мягкое, удобное къ воспріятію впечатленія мозоля, и къ предохраненію чрезъ то онаго от всякаго нагившения.

Ежели со времени перваго почувствованія боли, ка- Средства кую производянть мозоли, будень ставить ноги въ кант остеплую воду нъсколько дней, и носить обувь гораздо вать припросторные, то вырно приращение оных востановится, ращение

Но обыкновенно многіе довольствующся темь, начинаючто меньше ходять; однакожь какь нога завсегда находится в в одинаком в безпокойствь, по мозоль может в как скоувеличиться до такой степени, что болье не останет ро они нася инаго средства, кромъ какъ въ сръзанти онаго; а то единсте безпрекословно из всъх в в подобном в случав упо ственнымъ требительных способовь почитается саным в по-средспынный и такимы, который облегчение подаеть ствомы пона время продолжительнъйшее; и который також в мог выртывабы доставить излъчение совершенное, естьли бы сля ніе. операція была учинена съ предосторожностьми, каковыхЪ она требуетЪ.

Всъ Авторы совокупно совътують размачивать и налобно умягчать мозоль прежде выръзыванія онаго, или ста приготоэленіемь ногь вы теплую воду на время довольное, наге нь или прикладывантемъ къ нему катаплазмв, или какой сей операнибудь мягтительной мази: а еще и выразывать сова цін, что. шуюнть мозоль такь, чтобы ни мальйше не трогать 6м вирочастей здоровых В. По какомуж вырызы-вырывальщики мозолей дълають точно противное?

Я видъль одного опставнаго солдата, копторый, ки мозолей безъ сомнънія будучи неспособень ко всякому друго- на сказыму делу, принялся за лечение мозолей. Онъ столько вали. быль глупь, что отважился даже сказать, будтобы отв онаго размягчення сте выръзыванте становилось труднъе и больные; а сверько того утверждаль, что необходи-JOMB IV.

мо надлежало выръзашь мозоль до кория, такъ чтобы изЪ онаго мъс ша кровь пошла. Вот в одинъ случай, коего я быль свидътелемь, сопровождаемый наблюденіемь, которое мы за полезное почитаемъ привести завсь.

Маблюленіе о тномъ манимЪ •бразомЪ плонездмые ль. **ЧИХЬЩИКИ** 19 на Б:

Одна знакомая мнв Госпожа имела въ продолженіи многих в лашь мозоль, которой принуждена была даваны выразываны по няши или по шесни разъ на годь. Однажды прітхаль я кь ней, какь оптетавной солдашь, о коемь я говорю, занимался своею операсію опера ціею. А поелику тогда очень еще было рано, дабы вію дваз- подумать, чтобы сія Госпожа могла держать ноги въ водъ попребное время, по я и спросиль, чемь пригошовляли ее кЪ сему выръзыванию. Солдашъ ошвъчаль, что таковое приготовление совствы не нужно, присовокупя еще, какъ- то я выше сказываль, бултобы оть онаго размятченія сте выръзыванте бываеть и труднье и больные. Я видыль самь, что онь часто браль салфешку и вышираль крова, выходящую изъ малых в сосудоев, кои разрываль онв; еще захотвль я узнать, для чего онъ не щадить оть таковой боли; а онъ отвъчалъ, что естьли не выпустить кроеи, то надлежало бы ему вновь делать стю операцию чрезъ каждыя двъ недвли. Какъ таковыя глупости не стоили того, чтобы входить объ нихъ въ споръ, то я и даль ему кончить.

о томъ. жакъ наджежить ее ATARITA.

Посль того, как в онъ ушелв, я еталь просить стю Госпожу, дабы уввдомила меня, котда у нее мозоль разболится; а особливо, чтобы не давала знать своему солдату. По прошестви двухъ мъсяцовъ, или около того времени, мозоль быль въ такомъже состояніи, какъ и предъ операцією. Я присовътоваль ей ставить ногу въ теплую воду три утра сряду на два часа; и на претій день я выръзаль сей лозоль простымь ножичкомь, взявь всь нужныя предосторожмости, дабы не захватить частей здоровых в. По чему

ж выръзаль я его, не причинивь боли, а особливо безь изліянія крови: и сь годь уже времени, кота сія Госпожа гораздо болье ходила пъшкомь вы ныньшнее льто, нежели какь во всь прежніе годы, она мо-

Не то ли самое о мозогаха разуньть должно, о мозогахь тто и о струпахъ, предшествующихъ заживленію пры-тоже саща, поръза, небольшой раны и проч.? Ежели сти стру-мое разпы срываемы бывають, или спадають, отв какой бы должно. то причины ни было, прежде нежели сообщение меж-что и о ду ними и сосудами кожи совершенно прервано бу- предшелеть, то маленькія ранки, причиняемыя разрывомь ствуюоных в сосудова, подають поводь къ новымь струпи- щихв закамъ, да и самое заживление происходить медленнъе. живлению неболь-Хотя причины завсь находятся и различныя; одна- шихъ кожь действия кажутся быть одинаковы. Но да не от рань; ихъ ступлю от в произшествія, мною недавно описаннаго, не можно оный отставной солдать завсегда проръзываль даже безь остадо живаго мяса, и мозоль наросталь опять несомни- новленія тельно: чтожь до меня касается, то я берегь части самаго из здоровыя, и вошь уже цваый годь, какь онь не полаеть никакого знака существования. И такъ сил общая между всеми резашелями мозолей упопребищель обычноветь ная практика есть совершенное плутовство, тъмъ ная пракдостойньйтее осуждения, чымь болые причиняеть оно зывать мобользни страждущему, а при томъ и облегчение по- золи есть Азвая токно маловременное, содержить больных в в совершен-Разслабленій и недъйствій, кои по времени становит-ное плуся обильными источниками бользней, завсегда къ из-Авченію весьма прудныхъ.

Следовательно все искусство врачеванія мозолей на ногахо состоить вы размятченій оныхы средствами вышепредложенными, и вы совершенномы ихы искоретиеніи, не повреждал ни мало частей здоровыхы.

B 6 6 2

Лькар

Всякое лругое свелcm30 Kp0-CHO.

Явкарства находящіяся во множествь книгь, какъ- то въ Словаръ Экономитескомб и проч., суть мь мягчи несвойственны и опасны, какъ скоро они не изъ класса тельных лакарство мястительныхо. Бакія же вещества, состаесть опа- вляющія большую часть таковых в лікарство, могуть причинить припадки бъдственные, какв-то воспаленіл, рожи, ракв и проч.

HDEBMVмиества округленчешь сотнашь од-ROSVIII часть мо-3078.

Есть люди, кои довольствуются сръзаніем всей части мозоля, находящейся выше поверьхности кожи. ной пилы. Одинъ знаменитый въ обоихъ свътахъ Философъ упоногда ко- требляеть пилу округленную, которою мозоль подпиливающь безь боли, пошому что пила не можеть доставать иу толь. до частей мягких в, и так в как в со всякою удобностію опеко выдав- рацію сію можно кончить въ три или четыре минуты.

, Я видъль таких в людей, говорить Г. Ягетолб, ,, кои утверждали, будто бы от оных в избавлены бы-,, ли совершенно обыкновенным в щелоком в теплый в, ,, въ которомъ держали они ногу нъсколько часовъ, а ,, при томъ и во времена различныя. Другіе же припи-,, сують подобное свойство тесноку, пласты рго аммонія-, тному Вигонову и проч. Кора акайо почитнешся еще ,, за хорошее лакарство; но можеть также произволить , она и дъйствія зловредныя, возбуждая въ нихъ вос-, паление и насносние, какъ- то многократно мною при-, мъчено было. Естьли же можно наконецъ ожилать , какого нибудь пособія от всвя таковых прикла-, дываній, то не прежде какЪ по довольномЪ размя-, гченій напередь мозолей ванною, или иными срел-"ствами предложенными, и по срезании ихъ къ сему ,, употреблению способным в инструментом в.,,

Средства упреждашь ошрыжку мозолей.

Чтожъ касается до способовъ, какъ предупренакъпред ждать нарость и отрыжку мозолей, то не находится иныхЪ, кромъ того, чтобы перестать носить обувь тесную и жесткую, то есть отрешить причины порождань ихъ могущія.)

water remarkable to the state of the state o

O TEKAPCIBAXE IIPSZOXPAMMIEABHBIXE.

(Удивится можеть быть кто, не находя при концё сего Домашняго Явтебника члена о лекарствах предохранительных по примеру Г. Гиссота, и многихь другихь Врачей, симь предметомы занимавшихся. Но прежде нежели покажемы причину таковаго опущентя, надобно изылснить, что должно разумёть чрезы лекарство предохранительное; ибо неуповательно, чтобы всякой человыкы имель обы нихы подлинное поняте: а по томы мы и увидимы, опущены ли или выполнены Г. Буханомы сей предметь важный.

Предохранительныя лекарства суть тв, кои что должемногіе принимають предварительно, когда почитають умыть себя угрожаемыми бользнію вообще, или такою бо- подь имельзнію, которую обстоятельства, или признаки чанемь лысто оказывающіеся, заставляють насы почитать сы нареть предокранных от ранительных, какы бы приближающеюся, нитель А изы сего видить всякь, что слово лекарства предокраных охранительныя, вы настоящемы стыслы взятое, то же знаменуеть, что и лекарства вы предупрежденіе какый нибуль бользни принимаемыя.

Но Г. Буханд не довольствовался описантемь, съ самою величайшею подробностью въ нервой части своего творентя, то есть, въ первомъ Томъ сего неревода, средствъ какъ предупреждать бользни, но онъ еще не опустиль во второй части на концъ каждаго изъяснентя о какой нибудь бользни въ особливости, изъ чего мы старались составить особенный члень, преподать и совътовъ самыхъ благоразумнъйшихъ, и предлисывать лъкарство наполезнъйшихъ, къпредохранентю себя отъ той бользни, а равномърно и къ предостережентю отъ возвратовъ или отрыжекъ оныя.

И такъ котя онъ не писалъ особенной главы о авкарствах предохранительных, однакожь дъло свое Б б б 3

выполниль такь, какь только оное следать можно, дабы явишь себя исшинно полезнымь, то есть, что не прелписываль лекарство предохранительныхо, кромъ какъ по показаніямо извъсшныя бользни, или потому что мы оною уже страдали, или, такъ какъ она прилиптива, мы ее уже видели на других в людяхь, а сами боимся оной подвергнуться.

Монатіс. предокра-Mark M. To.

Но не вЪ семЪ однакожЪ смыслъ мнотіе простюнакое мно- людимы принимають слово лёкарства или средства эть о т. предохранительныя. Въ самонь дыль спроси у тыхв, нарствакь ком пускають себь кровь, принимають слабительныя, и проч., въ извъсшныя времена года: пто одни по причинв годовой поры: другіе по тому, что къ сему привыкли: нъкоторые изъ подражания; иные же безъ всякой видимой причины; но почти всё безъ всякой цьли авйствительной, по крайней же мыры когда начинають такь поступать: ибо ни мало не удивишельно, чтобы сій средства употребляемыя такимъ образомъ безъ показанія, скоро не разстроили здоровья, и не руководствовали тотчась къ необходимости въ лекарствахо, и къ бользнямъ темъ труднейшимъ къ уврачеванію, что оне основываются на поврежденін самаго тівлосложенія.

Всякія ятнарешва еушь наи полезны

Сказали уже мы, что ньть таких в лекарство. которыя бы никакого действія не производили; что, какъ скоро они не полезны, вредъ причинають; наи вред- а сія истинна подлинно относится до кровопусканій и слабительных в лекарство почти одних в употреблясных для предосторожности: но как в лекарства не могуть иначе быть полезными, кромъ когда показуемы быть долженствують по признакаль бользни или настоящей, или угрожающей: то ельдовашельно шв, кои отворяють себь кровь или принимають тистительных по единственному опасс-HIM

итю вліннія времень годовыхь на шело, или по привычкъ, или не зная, виновашы ди они или правы, подвергаются тому, что ежели не впадають скороностижно въ болезнь, то по малой мере получають большее расположение къ бользнямъ.

Весьма много находится примъровъ, сказываетъ опасности и самь Г. Гиссота, такимь людямь, которые, имья кареть по нещаеттю склонность къ лакарствамв, разстро-принимаеивали свое здоровье, сколько бы кренко оное ни было, мыхъ безъ трезв злоупопребление сихв даровь, то есть лекарство, показания отъ Промысла человъкамъ ниспосланныхъ на возстановленіе онаго: злоупотребленіе, котторое, когда даже здоровья и не повреждаеть, производить то, что и въ самой бользни шело, привыкнувшее сполько къ авкарствама, не ощущаеть оть никь почти никаких в лействій, а чрезв то находится лишаемым в всноможения, какое бы отв оныхв могло получить, есшьли бы употребляло ихъ токно въ нуждъ необхо-AUMOH.

Изъ всего нами шенерь сказаннаго явствуеть, что Г. Буханд не токмо не савлаль опущентя, не предлагая главы о лекарствах предох ранительных в " но входиль напрошивь того вы изследование сей машеріи съ шакою подробностію, каковой ни одинъ Авторь объоной не употребиль досель; поелику вся первая Часть его творенія посвящена на предупрежденіе болъзней вообще, посредствомъ благоустроенной дізты; и поелику во многих в главах в второй части мы не позабыли отличать особливымъ заглавіемъ лакарстев предохранительных для бользни от в карство исцаляющихо от сей же самой бользии. ТакимЪ-то образомЪ сближивая средство предохраняющее ев бользнію, которой избъжать стараешься, можно предохранить читателя от заблужденій зловосдных в,

нами довольно пространно описанных в. Естьли хотя мало захочеть он разсудить, то почувствуеть, что сте было единственным в способом в, как в показать ему подлинное дъйствте и силу лекарство предохранительных в, а чрез в то самое руководствовать его к в суждентю о прямых в показантях в оных в. Следовательно Г. Бухан и не должен в был в преподать особенной главы о лекарствах в предохранительных в.

Конецо второй Састи и Гома IV.





ВЫПИСКА ГЛАВЪ; ПАРАГРАФОВЪ И ЧЛЕНОВЪ

TOMA YETBEPTATO.

продолжение

ВТОРОЙ ЧАСТИ.

T A A B A 49.

О Венерической бользия?	3
Причины побудившия говоришь о венерической бользни въ семъ со-	
Неудобетва проискодящія от в необходимости, в в каковой часто бы-	
ваеть человъкь, чтобы скрывать сто больнь.	A
Невинные подвержены бывають сей бользии: новая причина, чтобы	
предлагать объ ней въ семъ сочинения.	8
Расположение сей главы.	ndi)
Для чего предлагается забы въ особливости о главныхъ признанахъ Венерической бользии.	
Бенерическом обявани.	3
тогда, когда ядъ венерической не прошель еще въ кровь.	F 80 7
S x .	
О венерической гонорреи, называемой просто ерыкомъ. в	3
Свойства сей бользии.	
Во сколько времени она оказывается ?	-
члень т.	
Признажи венерической гоноррен.	9
Признани предшествующие истечению.	-
Сопровождающие оное испечение.	-
Признани венериической голорреи дошедшей до самаго высочайшаго	
en cmemens.	_
Поря	-

Стран	0
Порадонь, въ накомъ вст сін припадни пропадають, когда болтань	
пользуется по правиламъ искусства врачебнаго.	No.
Бользии, от в которых в не можно распознать гоноррев.	wiji
Чъмъ отличается она отъ вередовъ въ почкакъ и пузыръ; отъ	
бълей.	100-
Небольште вереды на подобіе фистулы въ дътородныхъ частахъ у	
женщинъ.	X
членъ п.	
AVEUD II.	
Діэта, какую надлежить предписывать въ венерической	
гоноррен.	-
Пища, которой надлежить убъгань.	
Каную должно употреблать.	
Иншре приминос-	2
Mumbe whiterance	10-
ч л Е н ъ III.	
Авкарства, кои надобно предписывать въ венерической	
гонорреи.	
Сей бользии не можно абчить поспышно-	100-
Снольно времени продолжается она, хотя и бываеть пользована по-	
правиламъ исиусства	ijid-
Пользование венерической гоноррен самой легкой.	
Частная ванна. Шприцованія усладительныя.	-
СЪ наною предосторожностию надобно употреблять вязательныя	
шприцованія.	8
Одному польно Медину можно их в предписывать.	
Составь вязательный для шприцованій.	
Способь, какъ употреблять его, когда понадобится.	
Преимущества чистительных лінарство прокладительных в	
ЦБль, которую должно предложить при употреблении чиститель-	
ныхъ. Какіл прожаздишельных чистишельных предписывать должно. Гла-	
уберова соль и маниа. Пріемъ-	
Настой из Александрійскаго листу памаринта и Глауберовой	MP.
COAH+	
Способъ какъ приготовлять оной.	
Элентуарій чистительный прожлаждающій.	3.
Tipiemb.	-
Пользование венерической гоноррен тяжкой.	į
Первое состояние, или состояние воспалительное	16 -
Кровопускание.	4
Моженость мочегонишельных лежарсия b. — — — — — — — — — — — — — — — — — —	
A STANDARD NO. WAS TOTAL WAS AND	

Oranbaenie.

Стра	H-
Сехитра и Арабсиая камедъ.	1.7
Пріємв.	-
Binan marnesin.	-
Обстоятельства требующія клистировт. Польза окыкв.	-
Припарки изъ маниша жаббнаго съ молокомъ, и коровъимъ жан де-	
ревяннымъ масломъ.	and a
Изъ мяниша жавбнаго и вегеню - минеральной воды Гулардовой.	-
a deliberation from the contract of the contra	1.8
Преимущества подвязки.	
Второе состояние венерической гонорреи, или время	
употребленія меркурін.	-
Обыкновенныя меркуріальныя палюли.	9
Каломелась въ нашышнакъ.	-
Сулема.	married)
Не должно возбуждать слинотечения. Для чего?	20
Что надобно дълать, когда меркурій слабить или причиняеть ко-	
	21
Что происходить от сего явиарства когда оно не оживаено наи	
худо пріугошовлено бываєть.	-
Діяснордій или Японской составь.	2 2
Средства къ воспрепятствованію жому, чтобы меркурій не произ-	
водия в слиношечения.	
m. DEPENDED VEHICLE VILLED BY DEDECTOR VEHICLE TO DAME.	-
	2 %
Мернурій ві видів жидности.	-
Распущенный меркурій съ намедью, или просто съ намедью.	and the same of th
	24
Камедный меркурій въ видъ сухомъ.	and a
	25
Меркуріальная мазь.	haman (S)
Канимъ образомъ должно поступать при употреблении натираний.	-
	23
дівта, какую надобно предписывать во время употребленія мер-	
курія,	Market 19
Пиша и пишье.	m*;s400)
Третіе и последнее состояніе венерической гонорреи. 2	28
Признаки изображающие третие состояние венерической тоноррен-	ered)
По чему можно признать, что венерической ядь истреблень.	Capperin
Какъ должно поступать, когда признаки вновь окажутся,	2 #
Влзательные натышки чистительные, Пріемъ.	
В язательныя сильные дыйетвующія. Терпентинь, бальсамь Перуан-	,
ской, Гилеадовъ. Элинсиръ купоросной съ викомъ и жиною.	
A a r	E 30

Стран
Тто надобно дълать, когда истечение продолжается безъ привнаковъ
венерических в с с с с с с с с с с с с с с с с с с
Вязэтельный составъ для шприцоваци.
Діэта, неторую надобно предписывань во время третьяго состоя-
нія гоноррен.
5 2.
О гонорреи простой, или о истечении невенерическомв. 31
членъ т.
Причина сего рода гоноррен, когда она бываетъ слъд-
ствіемъ венерической гонорреи.
Ослабление или раны.
Почему можно признать, что она происходить от рань; от ослебления.
Причина гонорреи простой, отъ венерическаго яда независящей.
Излишество соковъ,
Повреждение съманной жидности. Оснвернения.
членъ п.
Пользование гоноррен простой, или истечения невенериче
скиго, происходящаго, отъ ославленія.
Авнарства то самыя, накім предписаны въ третьемъ состояній ве-
нерической гоноррея.
Визательныя сильныйшіль
Питье из жины съ чернильнымъ орбшкомъ.
Пріем'в.
Вкачтельныя инприцования.
Жолодная вание ; важноств онытя въ сей бользии. Возражения противъ употребления жолодной ваним.
Отвъты.
СпособЪ, нанЪ употреблять жолодную ванну.
Пользование гонорреи простой, или истечения невенериче
скаго происходящаго отв. вередовь или ранокъ.
Меркурій ; декокть изъ жины, сарсепарили, сассафраса, и проч
Натиранія мернуріальныя.
Пилюли изв наломеласа или сладной ртупи св терпентиномв; де-
ноктъ изъ гваниу, сарсепарили.
СпесобЪ, накъ пригомовлять сін пилюли. Пріемъ.
Нарывныя свёчки.
Способъ накъ ткъ употреблять.
Honby

Оглавлен' в е:
Сперин
Пользование гоноррен простой, или истечения невене- рическаго зависящаго оть другихь причинь, кромъ ослабления и вередовь.
Когда съмянная жидкость повредится:
J - 3.
О опухоли и воспаленіи ядрь, простонародно называемых ерыкомъ падшимъ (опустившимся) въ мошну, когда сіи припадки зависять отъ яда венерическаго, и когда отъ онаго не зависять.
членъ т.
Причины сихъ припадковъ, зависящихъ отъ яда вене?
Причины таковых в припадкозь, не от венерическаго яда происходящихь. Ч Л Е Н Ъ II.
Пользование опухоли и воспаления въ ядрахъ, происходя- щихъ отъ зенерическаго яда.
Кровопуснаніе. Пища. Теплыя примочки и припарии. Перевязка. Очень нужно больному лежать въ постели. Меркуріальныя натиранія.
Пользование опухоли въ ядрахъ по истреблении венериче- скиго яда, когда предполагается въ оныхъ порча отъ желвака или отъ рака.
Припарки изъ болиголова. Сокъ изъ болиголова
Пользование опухоли и воспаления въ ядрахъ, независя

Кревепусканіе, припорки, перевязка, покой въ постели, мягчи-

О венерической опухоми, просто называемой бубонами или пахозиками, и о мнимыхъ бубонахъ.

41 TAEHT.

Нарывныя или наэртвапісльных припарки. Канія сявденнія могушь бышь оть воспаленія въ ядражь-

післьныя промывашельныя.

Oras Bacwic.

Oranbaenie.	Cmi	ран-
членъ т.		
О венерическихъ бубонахъ:		41
Свойства бубоновъ.	P- 400	
Пользование венерических бубоновъ.	41	-
Жакъ производить разбивку оныкъ. Кровопускание, чистительныя явнарства прокладительныя. Тередства, какъ способствовать нагноснию. Дігта. Принарки мягчительныя.		
Время, когда вскрывать опужоль.	. *w	45
Скольно времени должно содержать нагносніс.	100 M	-
членъ п.		
О мнимыхъ бубонахъ.		-
Тричина сего вида бубоновъ. Чъмъ различается бубонъ отъ килы или грыжи въ разжимательн	ioŭ.	-
Япо должно делать, когда бубонь не можно привести из разе	N=	August 1990
шію, ниже ид нагноснію.	-	44
J I.		
О шанкеракъ венерическихъ и невенерическихъ.		· securiti
Свойства шанкеровъ.	m m	mental the same of
членъ і.		
О шанкерахъ венерическихъ существенныхъ. Признак	И.	45
Шаннеры чаще всего от других больней происходать. Мъсто оныхъ.	44	manual second
Пользование венерическихъ шанкеровъ существенных	Б.	46
Пищеупотребление прожладительное. Кровопускание.	-	gasered)
Частныя бани. Мягчительныя припарии.	-100	and quantities
члень п.		
О шанжерахъ венерическихъ отъ другихъ бользней и исходящихъ.	OQT	-å
Свойсина сего рода шанкеровъ.		4 7
Пользование таковыхъ шанкеровъ.		-
То самое, какое и Венерической бользии вноренившейся.	-10	
члень ІІІ.		
О шанкерахъ невенерическикъ.		-
Причина; неопрятность или нечистоща,		-
	ASH	tap=

Страк.
Авнарению: чистота; Баларунскія воды.
J 6.
О многихъ другихъ признакахъ венерическихъ, какъ то о бородавкахъ продолговатыхъ и круглыхъ, о шишкахъ въ заднемъ проходъ, о гребешкахъ, сморчкахъ и проч.; о странгуріи или мочеръзъ, о трудности моченія, о незалупъ и неотлупъ, или воспаленіи конечной плоти, о станихъ и о ядовитой течи, или напряженной гонорреи. 43
О бородавках в продолговатых и круглых, о шишках вы заднемы проходы, о гребешкахы, сморчкахы и проч. — Свойства сихы признановы; оныхы мыста. — — — Не всегда зависять они оты Венерической больни. — — —
Пользование, когда не зависять они от Венерической бользни.
Вода фагеденическая или смъщанная съ ъдностью; (то есть ртупноизвестная), масло сурмяное, адской на мень. Квасцы жженыя, порошонъ наъ назациаго можжевельнину, нрасная осадна.
Пользование, когда сін признаки зависять от Венериче-
То же самос, коморое и для Венерической бользии предвисано бу- дешь.
членъ п.
О странгурін или мочерьзь. Причины.
Сжатіе судорожное или воспаленіе. Признаки судорожнаго сжатія ствола мочеточнаго, причина мочеръза.
Признаки воспаленія ствола мочеточнаго, другая при-
Пользование мочеръза произшедшаго отъ судорожнаго сжатия ствола мочеточнаго.
Вода изъ льнянаго съмени, молоко миндальное и про т. Кровопускание, принарки.

	Cmp	2He
Пользование мочервза произшедшаго от воспаления	шей.	KH
пузыря.	A	5I
Кровопусканіе. Промывательных и припарки мягчительныя	•	-
Мочегонишетьное пишье.		-
Теплая ванна.		
Остановление момегонительнаго питьл. Для чего?	/ mi	52
Платчительныя свычин.	140	,
членъ пп.		
О запоръ мочи или о трудности моченспускана	A.	-
Свойство сей бользии.		-
Признаки запора мочи.		
Нёмь различествуеть мочерезь оть запора мочи.	C" edi	and the same
Причины запора мочи:	ban	53
Пользование запора мочи:		-
Тъ же самыя явнарства, нои и противъ мочеръза, ногда онъ не	d'mo	
Венерической бользии происходить. Промыванельныя, ванны к	£ .	54
сыворотка съ селинрою.	4	
Когда онъ происходинь от нароста динако мяса и проч. въ мо	-9FC	
точномъ стволь, свечки нарывныя. Свечки магчительныя.	##B	-
ч л Е н ъ IV.		
A STATE OF THE PROPERTY OF THE	MOLE	
О незалупъ и неотлупъ, или о воспаленіи конеч	ной	-
плоти.	ной	
Свойство незалупы.	HOM	
плоти. Свойство незалупы. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		
плоти. Свойство незалупы. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		к0°
плоти. Свойство незалупы. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ist .	3CO=
плоти. Свойство незалупы. Неотхупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспаления нечной плоти. Кровопусканія, прохадительныя чистительныя, припарки и проч	ist .	30°
плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален. нечной плоти. Кровопускания, прожагдительныя чистительныя, припарки и проч	is	3CO=
плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален. нечной плоти. Кровопусканія, прохладительныя чистительныя, принарки и проч Обстоянельства требующія рвотнаго. Что должно лёлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать.	is	30°
Плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопусканія, прожаздительныя чистительныя, припарки и проч обстоятельства требующія рвотнаго. Что должно дълать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать. Когда онь дъйствительно будеть.	is	30°
Плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспаление нечной плоти. Кровопускания, прожладительныя чистительныя, припарии и прочобстоятельства требующия рвотнаго. Что должно двлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать когда онь двиствительно будеть. Время, когда употреблять меркурій.	is	30-
плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспаления нечной плоти. Кровопусканія, прожладительныя чистительныя, припарки и прочовства требующія рвотнаго. Что должно лълать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать когда онь дъйствительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Л Е Н В V.	is	30-
Плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопусканія, прожаздительныя чистительныя, припарки и проч обстоятельства требующія рвотнаго. Что должно льлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать когда онь двиствительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Л Е Н В V. О с т а н и х в.	is	30-
Плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопусканія, прожладительныя чистительныя, припарки и проч обстоятельства требующія рвотнаго. Что должно льлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать когда онь двиствительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Л Е Н В V. О с т а н и х в.	in	30-
Плоти. Свойство незалупы. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопусканія, прожаздительныя чистительныя, припарии и прочовства требующія рвотнаго. Что должно лізать, когда антонові огонь начинаєть угрожать когда оні дійствительно будеть. Время, ногда употреблять меркурій. Ч Л Е Н Б V. О с та н и х в. Свойства сей болізин. Она не всегда бываєть признакомі Веперической болізни. Дру	in	30-
ТОЛЬЗОВЛИЙЕ НЕЗАЛУПЫ И НЕОТЛУПЫ, ИЛИ ВОСПАЛЕН. ИСЧНОЙ ПЛОТИ. Кровопусканія, прожладительныя чистительныя, припарии и проч Обстоянельства требующія рвотнаго. Что должно лёлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать. Когда онь действительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Л Е Н в V. О с т а н и х в. Свойства сей болезии. Она не всегда бываеть признакомь Венерической болезни. Друпричины.	in	30-
ТОЛЬЗОВЛИЙЕ НЕЗАЛУПЫ И НЕОТЛУПЫ, ИЛИ ВОСПАЛЕН. ИСЧНОЙ ПЛОТИ. Кровопусканія, прожладительныя чистительныя, припарии и проч Обстоянельства требующія рвотнаго. Что должно лёлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать. Когда онь действительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Л Е Н в V. О с т а н и х в. Свойства сей болезии. Она не всегда бываеть признакомь Венерической болезни. Дру причины.	iA	56
Плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопуснанія, прожагдительныя чистительныя, припарии и проч обстоятельства требующія рвотнаго. Что должно двлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать когда онь двиствительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Д Е Н Б V. О с т а н и х в. Свойства сей бользин. Она не всегда бываеть признакомь Венерической бользии. Дру причины. Кто оной подвержень. Пользование станихи независящей оть Венерической	iA	56
Плоти. Свойство незалупы. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопусканія, прожладительныя чистительныя, припарии и прочовот начинаєть угрожать. Когда онъ дъйствительно будеть. Время, ногда употреблять меркурій. Ч Л Е Н Б V. О с т а п и х в. Свойства сей бользии. Она не всегда бываеть признакомь Венерической бользии. Дру причины. Кто оной подвержень. Пользование станихи независящей оть Венерической лёзни.	iH	56
Плоти. Свойство незалупы. Неотлупа. Пользование незалупы и неотлупы, или воспален нечной плоти. Кровопуснанія, прожагдительныя чистительныя, припарии и проч обстоятельства требующія рвотнаго. Что должно двлать, когда антоновь огонь начинаеть угрожать когда онь двиствительно будеть. Время, когда употреблять меркурій. Ч Д Е Н Б V. О с т а н и х в. Свойства сей бользин. Она не всегда бываеть признакомь Венерической бользии. Дру причины. Кто оной подвержень. Пользование станихи независящей оть Венерической	is for	56

членъ уг.

OBMECTBO

О ядовитой течи или напряженной гоноррев.	BUYAN BY MOVE
Свойсива сей бользии.	The designation of the second
Пользование то же самое, накъ и въ Венерической гоноррев.	
Лаудань. меркурій.	
\$ 7.	
О Венерической бользни вкоренившейся.	
члень т.	
Признаки Венерической бользни скоренившейся. 5	9
	9
членъ п.	
Пользование Венерической бользни вкоренившейся. 6	I.
Соботвеннод биствующее для венерической бользии лькарство есть	
	2
Овъ пользуетъ надежите безъ произведения слиношечения Самое простъйшее приуготовление должно быть предпочисно	
Не должно умножать способовь.	
Изъяснение главнъйшикъ способовъ, какъ пользовать. Вене) m
рическую бользнь.	3
Способъ, жакъ употреблять неразпущенный меркурій	1
или меркуріальныя пилиоли один.	
Признани руководствующіе къ сему способу:	errord.
The second secon	4
Пріємы меркуріальных в пилюль	ecosile .
Обстоятельство пребующее слабительных в меркуріальных пилюли	5
Сім явкарешва понидающея чрезь пятнащать дней по совершенномъ	3
пыздерозлении.	monad
Сарсепариль презъ все время пользованія.	
Aiema.	paragraph .
нужно иногда къ сему способу льченія пріобщать и прошивущингот-	
иыя авигропия. Пріемь 6	6
Случаи, въ ношорыхъ сей способъ недостаточенъ.	-
Способъ какъ употреблять неразпущенный меркурій, сово)-
жупно ев сулемою.	-
Признани требующие таковаго совокупления.	
Пріуготовленіе.	nopaj
В Пріем	(B

Оглаваенте.

				Стиран.	
Прісив сулемы вв день чен	пвершь грана.	*	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 06	
Половина грана Три чешвеј		-	**	m 67	p
Пріемы мернурізльных в пи-	AIO AB*	-		d) some	
чистительныя, Пищеупотре	бленіе.	10	68	en garagest	Þ
Способъ канъ употреблять	меркурій не	разнунденны	ий, совому	ине еЪ	
промыващельными проти	вувенерически	ми.		as before	0
Обстоятельства требующія			ельныя про	пыву-	
венерическія предпочитат	в сулемв.				ß
Предуготовление		400	400	- 68	
Но два промывашельных в п	рошивувенерич	есникъ на	лень.	10 gapwood	ij
Прісив мернуріальных в пі		5	46		ø
чистительныя. Пищеупотре	ебленіе.				
Сей совсиупный способъ в		олняеть во	ткъ предп	нсаній	ı
Ann vero?		The second		_ 69)
Надобно иногда употребля	ть ибскольно	напираній	ихи окур	иваній.	g
Въ каномъ ноличествъ			60.7 60.7	m	
Способъ какъ употреб	Yagmi wook	140 114 770	000 7000000000		
The door states y hompeo	нати ран		редством	ь одних	9
)
Признани требующие сего с	пособа. Требу	omie mero,	THE IS DELL'E	n deg.	
кому другому быль пред	диочишаемъ.	\ -		di consu	10
Качества кожи нужныя къ	употребления	натираній	is w	-	, gel
Оныя не годяшся, йогда бы	ваеть истече	ніе гоноррен	ческое. Для	wero?	, es
Предуготовление. Кропопус	каніе, ванны	, unemmme	*RIGHAR	- 71	1
Количество меркуріальной	маэн для ма.	ждаго напа	вранія.	nt garden	, 10
Части долженствующія бы	ть натираеми	а. КакимЪ	поряднем	в виыя	
наширантя должны проис	ходишь.	•	100	40	d
Це должно употреблять г	паковыжЪ нап	ираній ин	по груди	HR De	
Spioky.	-		,	to score	-
Когда должно усугубить	количество ма	19н,		7	2
Канимъ образомъ должно а	влать натиз	анія, когд	а меркурій	Силь-	
но дъйствуеть во ршу.		60			
Деновть изв сарсепариля.	Какимъ образ	омъ больно	и лолженъ	COZED-	
жань себя во время поли		11.00	-	- Maria	
Aiama.	on.	e i		-	-
**					
Способъ какъ употре	евлять нап	nupanin s	перкуріа.	льныя со	ما
един	енныя съ	сулемою.	i i i	73	5
Принални, въ нешерыхъ д	TORKHO WHOME	еблять сба	cia cuerosa	witcmt	
Пріугошовленіе.	-,		Am one copa	awine min.	
Пріемъ сулемы. Количество	Manusconio isti	กที่ พลรพ	-		-
				-	
Способъ какъ употреб	баять мерк	ургальнь	ія натир	anin, co	esi
вокупно съ промыв	ательными	TI pomusi	уз ене риче	жими. 74	ŀ
Случай требунщій необко					
Канимъ образомъ дъйствую					
TO THE WILLIAM TO THE TANK THE	m. m.Lomman 2. r	ove bur Achu Tu	the Laurent market	прі	
				35 24	æ

				.Ca	прам-
Прізготовленіе, Количество	промыва шельн	ыхЪ прош	ив увенерич		
Мернуріальной мази.	, ps		100		25
Сарсепарияв.	40	**		' ' •	76
Способъ какъ употре	блять меря	сургальны	ия натия	anin	CO-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O CE OKYP	D		1	-
Признаки требующие соеди					-
Пріугошовленіе.		0		w	-
Количество мернурізльной	мази; сладкаг	о меркурія	въ онурин	anîn.	-
Пищеупотребленіе. Сарсепари		. •	**	***	2.2
Способъ какъ употребл	аять мерку ваній одни		едствомъ	оку	pu-
Признани требующие спосе	ба окуривані	ŭ.	- m		-
Напрошивъ шого окой запреш		· ·	400		-townsji
Онуриванія бывають или		гастныя. К	анимъ обра	дмог.	
должно дёлать всеобщія з				-	3.8
Пріугошовленіе. Количество		-		**	and and
Мекуссивомъ дълания или туральной. Для чего ?	составная нин	овирь предп	iounmae mca	H2-	79
муральном. Для чего в	ть ей скадной	мернурій.	46		40000000
Обстоятельства требующія	онуриваній ча	сихных в.	-	t, m.	-
Пище употребление. Сарсепари	<i>Х</i> ъ• −	*		w.	80
Способъ какъ употребл	ять мерку	рій посре	Дствоив	0,1411	XI
промывательна	ыхъ проти	зузене рич	ескихъ.		***************************************
Обстоятельства принужда п	is vnompedasn	в спасобъ	противувен	ери-	
ческихъ промыва шельныхъ.					Separation .
Припадки симъ способомъ из		-		7	Garantill,
Волье всего пользуеть онъ в			Test.	-	8 X
Сакое поняшіе должно имъщ	-	нерических	и промыват	te A Se	
ныжь.		see .	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ио потребно къ тому, да Сакимъ больнымъ употребля			Achevo nw	ъли.	8.2
luero лучше употреблянь пр			терическія.	TIDW-	
бавдяя къ нимъ нъсновън				· Frin	Manager .
Зеобходимость очищать преж					-
вити ін свойства меркуріальн	ой жидности,	составлян	Men sin	про-	
мывательныя. ПріемЪ.	-				8 5
Гріуготовленіє.	•	. 4 /	•	m	inspecial (
То два промывательных пр	7	синкр вр (сущки		-
пособъ какъ употребл.		7714 770000	2 000 0 2 1 5		
тивувенериз				npo-	D.A.
Кидность въ противувенсриче	СКИХЬ ВЗИНОМ	о однихъ	IONEO H. AATRIE	nac-	84
нущенная сулема	a manual W	y wompeon	STILL STILL	Fact.	(magest)
	2 a		19	30	Bb

	Спран
ВЪ какихъ обещоящельствахъ довольно къ излъчен	ію одного способа
противувенерических ванив	
Признаки показывающие необходимость сего способа	
Наблюдение.	
Количество сулемы на нажлую ванну.	m 88
ВЪ которой должно сидъть черезъ наждые два дн	Ho sel on constant
Сарсепариль.	
Не можно опредъянть ноличества мернурія, потре	бнаго въ каждомъ
cnocoft Afreila.	~ × 89
Способъ какъ употреблять суле.	му одну. 90
Реденть, чтобы давать се вь видь жидности.	
Въ пилюляхъ.	- 91
Должно ее давать въ самомъ маломъ количествъ;	въ денентъ изъ
сарсепариян, въ рыбъемъ наст или Арабской кам	седи.
Прізготовленіе, провопуснаніе, чистительное.	the processed
Четверть грана сулемы; половина грана; три чет	верши грана 92
Aisina.	" on Indexed
От кудаго употребленія сулемы зависять бъдо	швенныя схъдствія
оной приписываемыя.	and the second
Она не пригодна для всянаго больнаго миже во	сткъ обстоятель-
ствахъ для того не самаго больнаго.	a State Same
Способъ употребленія сулемы есть самый лучшій	
неровъ, гнойныкъ прыщей, опуколей конечной	
ножь, гонорреи, венерической гнилоскии, портя	
Сей способъ не удается равномёрно противъ бубог	
наростовъ, горбовъ на ности и проч. промивъ	
ющихъ воспаленіе; заваловъ затвердёлыхъ на п	одобіє желвана или
рана. Прошивъ глубонижъ ранъ; въ елучат внушрениси	**************************************
раздражаемости нервъ, судороги, падучей боль	
Въ случат рвошы, почечусть и присоединенія бол	
Надобно оставлять употребление сулемы, какъ с	
шель, нолошье, даже и легкія.	Topa on Manager Ada
Сулема служить лькарствомь вспомогательнымь	BO WHOTHEN ACCINO
ашельствахъ.	
Способъ какъ пользовать Венерическ	-
средотномь потовыхъ.	(parameter)
Авнорошва пошовыя, даваемый совокупно съ мерк	уріемЪ, ускоряютЪ
онаго дъйствія.	1 1 1 1 1 1 1
Обстоятельства, въ которыхъ они полезиы.	. 40 " 61
Особливо для твлосложений флегматическихв.	00 to 000
Деноний изв сарсепарили; способъ накъ дълашь	
Пріємъ, Свойства сего денонита и случан, въ коп	порыжь онь особен-
но пригоденъ.	
	II por

Cn	пран-
Противувенерическое свойство сарсепарили.	97
Наблюдение насательно до больнаго выльченнаго одною сарсепарилью.	-
Каршина болбони сего человвиа.	9 2
Діэта предписанная сему больному.	IOI
Пріемъ одной сарсепарили.	-
Сокрытів всякъ признановъ по прошесствін місяда.	102
Противувенерическая сила сарсепарили досель не извъстна была.	104
Способъ котовыжъ лъкарствъ яко недостаточный оставленъ.	unaversed.
Надобно умножать опышы надъ сарсепарилью одной.	105
Свей шва воливато корня или лаврика и лобеліи прошивъ Вемериче-	
сиой бользии	
нанъ упомянутыя шеперь расшенія.	107
Рыбій клей.	108
\$ 8.	
Всеобщія разсужденія о врачеванін Венерическимъ 60-	
аваней.	
Вниманіе, наное должно имбиь ив штлосложенію.	-
Меркурій быль бы опасень вы случав больней острыхв, бользней	
долговременных в, только бы оныя не происходили от в бользии	
Венерической.	106
Можно давать его, канъ скоро бользии не опасны.	Igentifycgall
Не должно давать его въ случат изможденія или разслабленія; во время місячнаго у женщинь, ниже въ послідніе місяцы беремен-	
ности но лучше въ первые мъсяцы.	
Самый лучшій способь пригодный женщинамь беременнымь, состо-	
ить въ промывательныхъ противувенерическихъ.	IIO
Кон могуть быть предписываны даже и во время мёсячнаго очищенія.	
Предосторожности, которых требуеть предписание мернурія для	
	. XIX
Аля подверженных в истерикв, ипохонаріи, для твхв, нои стра-	
ждуть кровавымь поносомь, падучею бользнію, жабою, цингоп-	
ною болбанію и проч.	Serversil
Времена года пристойныя употреблению меркурія.	112
Нужно приготовить больнаго легкими чистительными, провопуснані-	
емъ, ваннами, повторяемыми по обстоятельствамъ; дізтою	benned
Важность діяты во гремя употребленія меркурія, и чистоты или	
опришности.	173
можеть быть венерическая бользны начало свое ведеть оть нечи-	
cmombi.	terrored
Наблюденія могущія болье въ томъ увтрить.	114
Явсь больнь общия въ Америнь льчится такъ нань и венерическая	
вноренившаяся.	IIS
Чистота есть явнарство унимающее на время венерическую бользиь,	
а не есть предохранительное от в оной.	T.F. o.
Б 5	He-

Оглавлежбе.

	HPam.
Медосиминачество мнимых в предохранительных думножаемых в столь-	
жно надобно двлать, когда венерическая болбань осиманием была въ	IIS
Hebpemenin Ban nordsobana Xyao,	TIG
В вдетвія происходящія от в того, когда кто жочеть выхвиншься	
оть сей бользии очень сноро.	-
Должно понядать ленаренва не прежде, накъ спустя песнолько вре-	
мени по совершенномЪ излачения,	III
Влагонадежнъе продолжать лекарства гораздо болбе времени неже-	
Приняюченія бывающія последенніємь оть кудаго наблюденія дівты	Assessed 1
больными во время употребленія мернуріл.	-
Ложное умеранлючение о венерической бользин, содвлывающее оную	
бъдственною для велинаго писла больныхъ.	IIS
Венерическая больны представляеть разнообразности, и самому луч-	
шему штлосложению противоборетвующия Самое иртиное штлосложение не можеть преодольть венерическато	IID
яду, прошедшаго въ кровъ. Абкарства нужны бывають необходимо.	
Краткое повторение того, какимъ образомъ дожно поступань въ	annami
помьзованіи Венерической бохвани.	
difference construction of the second of the	
99 9 9 9 9	
TAABA 50.	
О бользияхъ женскихъ вообще, о тъхъ, кои зависять	
оть непорядочного мъсячного очищенія, остановив-	
шагося или слишкомъ сильнаго; о беременности; о	
родахъ преждевременныхъ, или о выхидываніи; о ро-	
дахь: о бользияхь родильниць; о безплодности или	
безавтности и о муженеистовствы или бышенствы	
Manku.	120
S X.	
О женскимъ бользнямъ вообще.	benedi
Упражненія, ив канимв определены бывають женщины, прошивны	
нхБ здоровью.	-
Доназательство взятое ств разности находащейся между женщина-	
ми живущими въ городскъ и женщинами деревенскими.	-
членъ г.	
Причины женскихъ бользней вообщей	[2]
Воябани бывающія следений ми обынновенной жизни женщинь.	
Деревенскія женщины быванть стольно же почин прыти сложені.	
емь, напъ и самые мужчины.	-
Расположение сей главы.	mquest
IN.E.	EHT

члень п.

Всеобщія попеченія; каковых в пребують женщины въ состояній здоровомь и въ бользни.

\$ 2.

• мѣсячномъ очищенти или о мѣсячныхъ кровяхъ, и о бользняхъ произойти отъ нихъ могущихъ, какъ то о непорядочномъ и трудномъ оныхъ изверженти, о заносъ или остановкъ ихъ, откуда происходить блъдный цвѣтъ или бѣлая лихорадка и испорченный вкусъ; о неумѣренныхъ кровяхъ, о сильномъ кровотеченти и о течи маточной; о полипѣ или каракатицѣ матки в о полипѣ ложеснъ или влагалища; о бѣляхъ и о томъ времени, когда женщины перестанутъ имѣть мѣсячное очищенте.

членъ 1.

- О мъсячномъ очищенти или о мъсячныхъ кровяхъ вообще.
- Каного возрасту женщины начинають имъть мъслиное очищение. - Сей возрасть различествуеть по илимату, роду жизни и проч. -
- Сколько времени проходить между каждымь мъслинымь очищениемь, 124 Продолжение мъслинаго.
- Трудно опредълять количество крови, истекающей во время очи-

- мя онв и больны от того не бывающь.
- Нужно, чтобы молодыл девицы были наставляемы тому, что должны оне переносить вы то время, когда поизжутся месячныя мрови.

члень п.

- О первомъ появлении мъсячнымъ.
- Снольно нужно молодымъ абвицамъ пользованься чистымъ воздукомъ и бымъ въ интлодвижени.
- Савдений безпечиости у двинцв.

Оглявленте.

Fremit
Вользни бывающія следствіями дурной пищи и ленарстве, не не- торымь девиды восбще страстны. — 127 Печали и задумчивости, не ноторой оче бывають силонны. — 128 Должно имъ поставить за правило веселость и разстаніе мыслей. — 128 Скольно шнурованья бедственны для сего возраста. — —
О первомъ извержении мъсячныхъ кровей, оказываю- щихся трудно.
Что надобно дълать вмёсто того, дабы давать ленарства. Обстоящельства долженствующія сопровожлать первое изверженіе месячных провей, когда еныя благопріятствующими почитаются. 130
Признаки предшествующие первому иззержению мъсяч-
Пользование, каковаго требують сін признаки. 131 Пары теплой воды; мокротожидительное питье, ванны для цегь п
О томъ, какимъ образомъ вести себя во время мъсяч- наго очищентя.
Дізта, накую въ сіе время должны наблюдать женщины. Должны онь убъгать всего того, что имъ обынювенно кажешся противнымъ. Снольно для нахъ нужно беречьея отъ стужи. О душевныхъ пристрастілхъ и о страстяхъ.
членъ III.
О остановкъ мъсячныхъ кровей.
Діэта, какую надобно предписывать въ остановкъ мъсячныхъ крозей, отъ чего бы оная ни происходила
Тълодвижение, вольный воздухъ, здоровая пища. Обстоятельства показывающия употребление напитновъ пръпитель-
Пользование остановки мъсячных в кровей, произшед-
Признаки остановки мёсячных в провей от ослабленія. Жельзных опилни; жина. Спосьбь накі пріуготовлять опилни.
Пользование остановки мѣсячнаго очищения, произшед- шей отъ полнокровия и отъ густоты крови. 134
Крэвопуснаніе. Ванны для ногъ. Чистительныя. Пища, Пите. Твло- движеніе. Тинктура чемеричная.

Стран	,
Пользозания остановки мъсячныхъ крозей, произшед.	
шей отъ пристрастій душевнымъ и проч. 135	5
Важность перемъны мъста и разсъянія мыслей въ та-	-4
Обстоятельства требующіх кровопусканія. Пілвицы. Рожки. Нары теплой воды, бани, теплыя припарки, промывательныя, сла- бительныя и проч-	10 mil
Пользование остановки мъсячныхъ кровей, приключив- шейся отъ какой нибудь бользни.	3
Вниманіе, какое надобно имѣть прежде пользованія остановки мѣсячныхъ кровей, отъ чего бы оная ни происходила.	-R
Надобно узнать достовърно, не отъ беременности и она происко- дият	46
сачных в провей.	Ľ
членъ іч.	
О бользни называемой хлоросись, то есть бльдный цзьть, или бълая лихорадка, и о испорченномъ вкусь	
или прихотяхъ беременныхъ женщинъ.	N.
Канія женщины бывають подвержены сей бользии.	h
Признаки бълой лихорадки или бользни называемой бълой цевть.	2
Слъдетвие бользии бълей лихорадии.	,
Признаки испорченнаго, вкуса, называемаго причудами или прикотями беременных в женщинь.	4
Пользование бользни клоросиса или бълой ликорадки, и вкуса испорченнаго, называемаго причудами и при- котями.	
Обстоятельства, въ коихъ потребны бывають монротожидительныя, рвотныя и чистительныя. Жельчыя опилки, жинг, горькія льнарства. Минеральныя воды Пассійскія; де форжскія, Вальскія; вода марціальная. Ванна для ногь, натиранія. Бракъ. Геременнымъ женщинамъ, имъющимъ испорченный вкусъ, не нужно	
нинаное ябнаренно. Чтожь дълань надобно:	

	Спгран•
членъ у.	Chipane
О сильныхъ кровяхъ мъсячныхъ.	141
ВЪ какихъ жетахъ женщины сему бывають подвержены.	on constraint
Причины сильных в крозей.	p parent
Пользование сильных в кровей.	142
Надобно начань страленіемь причины, произведшей сію бользив.	Name of the last
Покой, провопуснание Дівта. Пища.	tin spaceoutl
Деконтъ изъ крапивы, или изъ кровавника.	W. seemid
Визательный порошокъ. Хина съ мупереснымъ элиненромъ въ винъ.	· 143
YAEHB VI.	as summered
Разсужденія о мёсячных крозяхь или объ очищен	żu
мъсячномъ.	144
Разность, накая бываеть въ мъсячномъ очищении у неноторы женщинъ.	
части тъла, чрезъ неторыя иногда происходить очищение мъсячн	ióe.
Признани предшествующіе мъсячному очищенію въ такижъ сл	y.
чадхЪ.	145
Когда подобныя мъзминыя прови безпорядочныя уставятся довожьн	
то не надобно уже стараться о приведении оныжь нъ частя	мЪ
членъ уп.	C process)
О сильномъ кровотечении и о течи изъ матки.	-
что разумъть должно подъ словомъ кровотечение.	tel manufact
Причины сильнаго кровотеченія и течи изъ матки.	146
Признаки сильнаго кровотеченія и течи изъ матки	<i>t</i>
Болтэни, кои могутъ быть следствиемъ сильнаго кровотечения.	- 147
Пользование сильнаго кровотечения и течи изъ матки	
Необходимость поноя въ постели во время сильнаго провошечения.	Section 400
Какъ надобно иласть больную.	in transmitted
ИзЪ чего должна состоять ея постель. Надобно воздержаться ей отъ всянаго движенія, даже и не говорит	g - gasseed/
Кровопусианіе.	g.
лънарства вязательныя. Кровавнинъ; иупоросной элинсиръ; сирог	129
изъ цълительной травы лошанова ука.	148
Обстоятельства, требующія употребленія отваровъ. Давать онг	ie
должно жолодиме, равно нанъ и всяное пищье.	annual .
Унсусь. Жолодная ванна для ногь.	- taneautil
Примочна изъ жолодной воды ; влзательное шприцованіе. Абнаретва противу течи изъ матки. Паръ унсусней. Тряпочки в	annual de la constantion de la
моченыя вр Аксаср жолочномр.	0=
	Пипре-
	900

	Стран-
Пищеупотребление.	- 148
Сін бользни льчить должно съ великою осторожностію. Надо	бно
	of morning
Средства, какъ предупреждать сильныя кровотечен	in
и течь изъ матки.	150
Дізша. Минеральныя воды жельзноващыя.	10
ЧЛЕНЪ VIII.	
О полипъ маточномъ и о полипъ влагалищномъ.	Minned
Свойства сикъ болезией.	-
Признаки полипа маточнаго и влагалищнаго:	I51
М всто, на конторомъ зараждается полипъ маточный	-
Венерической ядь чаще всего бываеть причиною симь полипамь.	
Многіе смъшивали чжъ часто съ выпаданіемъ матки.	â I52
Признани различающіе выпаданіе машки на выворошь.	m , '
Пользование полипа маточнаго п влагалищнаго.	-
Перевязка, искоренение.	on the second
членъ іх.	
О 6 вляхъ.	153
Канія женщины имъ подвержены.	-
Признаки бълей.	
и ризники облеч.	154
Причины бълей.	-
Злоупотребление нитья водянаго.	NA DECEMBER
Сидячая жизнь. Привычка сидъть очень низко.	- 155
Слабость желудка.	
Роды трудиме и проч. Цингопиза и Венеринеская бользив.	
Признани отличающие бъли отъ гонорреи.	- I56
Обетоятельства, по коимъ трудно бываеть явчить бъли.	
Больчи, нои бышь могуть следствиями оныхв. Случи, вы ноихы не должно лечить былей.	157
eny 44M 9 BD ROLLE OF WALLE OF SHEET	A
Nonveganie 6knen.	Appendix
Тълодвижение. Пища. Вино Б грдо, вода минеральная или известнова	я. —
Кръпительныя пожлебки. Кръпніе отвары. Молоко, Хина. Холо,	д-
ная ванна.	- 158
Ипекануанга. Ревенв.	a managed
Кровопускание почти завсегда бываеть противно.	-
	77 70 70 70 70

членъ х.

О времени, когда женщины перестають имъть мъсяч	[=
ное очищение.	159
Время, когда женщины перестають носить мъсячное очищение, для нижь не столько бываеть опасно, какь - то нъкоторые думають.	tent description of the last o
Пользованіе, какого требуеть перерывь мъсячнаго оч щенія, когда оной случается внезапно.	160
Пищеупопребленіе. Телсдвиженіе. Ревень и гіера пикра. Случан, въ копорыхъ нужно предписывать отверстія дългемыя прижиганіемъ. Какія суть самыя обынновенныя причины богъзней, происходящихъ отъ того, когда женщины перестають имъть очищеніе мъсячное,	деранскій деранскій
чему подвергающся женщины, поступающія въ такомъ случав по способу обыкновенному.	161
не надобно ниногда давать лънаретвъ кромъ какъ по показанію нату- ры даже при относъ мъсячныхъ кровей.	162
Относь мъсячных в нровей самь по себъ не есть бользнь. Одни състо- янельства, въ ноижь онь пребуеть лькарствь.	1
Прижиганіемъ сд вланное отверстіе-	T 6 5
J 3.	
О беременности.	-
Беременность не есть бользяь, но она подсержена бываеть припад- камь, кои пребують иногда лькарствь. Беременныя женщины подвержены бывають не многимь бользиямь тажкимь.	
членъ І.	
Признажи веременности.	and the same
Энани беременности сомнительны бывають даже до четвертаго местия. Торина прови останавливаются восбите во время беременности, но	
He BCCTA2.	164
Знани неложные на чешвертомъ мъсяцъ.	165
членъ П.	
Пользование припадковь, какимъ подвержены женщины во время беременности.	. (
Канћ - то нардіальтія, сода, или горячее жельзо. Тошнота и рвота.	equatoris
Боль головияя и зубная; — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	166
Y.A.	EHP

членъ III.

0 томъ, какимъ образомъ вести себя должны беремен-	
ныя женщины даже и тогда, когда не чувству-	
ють никакого припадка 16	7
Время, когда должно пускать кровь въ беременности. Кровопускание не нужно всъмъ женщинамъ беременнымъ; случан, въ ноторыхъ должно безъ того обойтиться. Время, когда давать чистительныя въ беременности. Что надобно дълать, когда оказываются признаки, требующие упо требления слабительныхъ въ первые мъзацы. Пищеупотребление для беременныхъ женщичъ. Спъди легкия и употребляемыя часто: тълодвижение, разсъяние мыслей и спокойсти и духа. Должны онъ убъгать печали и всякихъ сильныхъ страстей.	18
S 4.	
y and the second se	
О выкидываніи или преждевременных родахь. Каждая беременная женщина болье или менье подвержена бываеть	
онасности от родовъ преждевременных в.	anni,
Время беременности, въ которое женизаны выкилыя готъ 16	9
Когда преждевременные роды называющь заносомь или мнимымь за-	n. Ni seret.
членъ і.	
Причины выкидыванія, или родовь преждевременныхь	- dans
членъ п.	
Знаки возвъщающе о родахъ преждевременныхъ. 17	0
членъ III.	
Средства, какія должно употреблять къ предупреж-	
денію родозь прежедезрененныхъ.	
Что должны двягть женщины слабыл и сложенія нажнаго. Женщины тучныя и дородныя.	Princes
женщикы шучных а деродныя 17 Надобно беременной женщий бышь веселой и удевленнорань при-	1
хошимъ-	unnih
ЧЛЕНЪ IV.	
0 томъ, что дълать надобно, когда знаки преждз-	
временных родозь преденцаюль о приближенти онымь.	ted
Положеніе, въ какомъ должих находиться женщина. Пищъ са и питью должно быть колодному. Кронопусканіе, накъ скоро ока можеть перенести.	
Вз	10
·	

	Спран.
что надобно дълать, когда бываеть мыть или рвота.	. 172
Обстоятельства, въ кеторыхъ надобно необходимо прибъгать	кЪ
Акушеру.	, 44
членъ у.	
О томъ, что должны дълать женщины подвержения	ak ST
родамъ преждевременнымъ.	• I73
Время, въ ноторое надлежить имъ отворять кровь.	dia proportional
Сколько полезно для беременных женщинь имъпь потлодвижение.	special results
\$ 5·	
О родахъ простыхъ или натуральныхъ, и о родахъ н	10-
натуральныхъ, тяжкихъ и трудныхъ.	And Communication
членъ і.	
О родахъ простыхъ или натуральныхъ.	174
Худыя предосторожности, употребляемыя въ родажь, бываю	пЪ
источникомъ множества бользней.	- constant
не должно однаножъ, чтобы си предосторожности простирались	40
изляшества. Излишнія предосторожности вредны во всякой больз	INo mount
ВЪ накомъ состояни находится испусство повивальное между бабная Большая часть повивальных в бабонь много дългеть, вреда во вре	
	MA
родовъ. Польза, какая бы могла произойти от того, естьян бы повивать	He
дозволено было кромъ какъ бабкамъ признаннымъ жъ сему ст	10=
собными.	THE RESIDENCE OF
Снолько младенцевъ умираетъ въ деревняхъ отъ неискусности пог	H-
вальных в бабонь и повивальщиковь сельскихь.	- 176
Сколько женщинъ погибаеть или остается немощными по сей сам	ой
причинъ.	an emergina
Для чего мужчины вмешались въ повиванія.	DES Processings
Скольно дорогъ для рода человъческаго искусный Акушеръ.	- 177
Нерадъніе и негодность повивальных в бабокв.	The second second
Повивальных в бабок винишь в в том в надобно в что мужчины в	0-4
вивають.	Prosperito
О томъ, что надобно дълать, когда женщина родам	r 11
мучится.	g (manufil)
Не надобно ей давать ничего разгорячающаго. Для чего?	Terrend
Болдзии, нанія причинаєть разгорачають за чіэта вр шакомр случат	. 178
Терминъ родамъ не всегда бываеть въ концъ девятаго мъсяца.	an manage
Что надобно дълать, когда перекваты долгое время продолжать	C.A
будущъ Когда нашура нажешся ослабъвающею.	

Стран.
О дъйствозанін натуры въ родахъ простыхъ или на-
туральныхъ 179
Простые роды бывають совершенно дъйствиемь натуры. — Время, въ которое начинаются первыя боли, называемыя у жен-
щинъ муками или фальшивыми муками. Какъ боли ста не иное что суть, какъ фальшивыя муки, то и не остается ничего дълать въ такомъ случаъ.
Что разумъется чрезъ то, ногда говорится, что женщина пят-
насть, или следы кладеть 180
Приближение водъ.
Выходь рабенка. Когда мьсто выходить вмьств сь рабенкомь, то говорять, что онь
родил: я въ сорочиъ. Но чаще всего выжолить оно послъ посредствомъ боли называемой
рьзомы вы живомы. Необходимость мукы по сбразу и устроению дытородныхы частей. 182 Роды безы мукы бываеть вообще сопровождаемы опесными при-
падками. Самый искусный Акушерь не можеть предокранить женщины оть бользии въ родажь, ниже сократить оныхъ муки.
Родами мучащейся женщинт нужно имъть одну или двукъ персонъ благоразумныхъ, кои бы могли ее ободрять и развеселять. — 185
о томы, сколько полезна быть можеть помощь вско- от по выходы младенца изы утробы матерней.
Для чего женщинъ недавно родившей, кужна помощь въ сіи минуты. Первое вниманіе какое должны имъть вспомоществующіе 134 Гдъ должно завламвать и отръзывать пуповину, когда мъсто вый- деть съ рабенкомъ
Когда мъсто останется въ матит , по выходъ изъ оной младенца. Время , въ ноторое надобно перевязывать и отръзывать пуповину. 185 Обстоятельства , въ ноихъ не надобно ни перевязывать , ниже отръ
зывать пуновины.
О томъ, какимъ образомъ надлежить поступать съ младенцемъ, который при выхождении изъ утро-
бы матерней не подаеть никакого знака жизни. 186
Тренія сукія по груди и по подбрюшію. В пыжаніе воздука въ роть младенца.
В прыскивание самою жолодною водою. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
пуповину.

	Спран.
О томь, какь надлежить поступать съ младен цемь, который перестаеть дышать спустя нъсколь- ко минуть посль рожденія.	188
Ть же самыя вспоможенія, какія и ві случат предыдущемъ. Наблюден Сколько нужно не давать ничего глотать рабенку, находящемус віз такомі случат, и не покрывать его.	
О томь, какь поступать надобно съ рабенкомъ здоро вымь посль перезязки и отръзанія пуповины.	
Гдъ надобно наасть рабенка и въ наномъ положени.	
О томъ, какимъ образомъ освобождать роженицу от мъста и какъ ес одъзать или укутызать.	
О выкождении мъста натуральномъ. О операция, посредствомъ ноторой вынимають мъсто у роженицы.	
Надобно разематривать, целое ли будеть место. Для чего? Необходимость покоя после родовь. Чемь должно покрывать роженицу. Перевязки не соответствують тому намереню, вы конторомы их	1 0 I
	b 192
Канія же перевязки нужны для брюка; — — Для груди рожениць. — — Сколько нужно осмотрёть рабенка потчась, какь мать освободить	195
ся отъ мъста и будетъ порядочно одъща	-
Ч Л Е Н Ъ II.	1 7 7
О родахъ ненатуральныхъ, тяжелыхъ и трудныхъ.	-
Что разумбется чрезь роды ненатуральные: Чрезь роды тяжелые и трудные. За такіе роды единетвенно должны приниматься искусные Анушерь Канъ скоро роженица станеть прикодить вы изнеможение, то надобно призвань Акушера.	195 I. —
ч х в н ъ III.	
Пристойное роженицамъ пользование.	
Діята. Спонойствіє дука. Спольно опасно пускеть много людей въ тоть покой, гдт рожени ца мучится. Пища и питье. Обстоятельства требующія вина.	162
	2

(6.

О бользиямь рожениць, жахь то обь очищении посль родовь весьма обильномь, о сильнымь крозотечені- якь, о трудныхь припадкахь, или тяжкой боли, о воспаленіи матки, о остановкь кровей, о воспаленіи грудей, и трещинь на соскажь, о лихорадкь съ сыпью нли высыпной, о горячкь съ пятнами, о молошниць и грудниць.

члень т.	
О очищении послъ родовъ весьма обильномъ и о крово	me
ченіяхь сильныхь.	period
Что надобно дълать, ногда очищение послъ родовъ будеть весьма	
обильное.	-
Примочки изъ воды съ уксусомъ или съ виномъ.	198
Смёсь унимающая кровь и вязашельная, Пріемъ.	ners, send
Ощъ чего происходять иногда крови весьма сильныя: нои не всегда	
требують лекарствь.	X 9 9
членъ п.	
О трудныхъ припадкахъ или тяжкой боли о безсонни	11,5,
о жарв и проч. въ разныхъ частяхъ тъла.	[terret0]
Что надобно двашь, ногда роженица чупствуеть тяжную боль.	Transpositi
Безсонницу сильную; жарь, расположение нь ликорадив.	ann-religi
Припадки маточные.	200
ч д Е Н ъ III.	

	U	воспа	ACHIN	M a m k n	•		-
	При	чины в	оспален	ія мат	жи:		-
	II	ризнаки	воспалені	я матки	•		201
Знаки,	ноказывающіе	нагноение 1	д антоновъ	огонь въ	машкѣ.	200	**********
	Пол	рзозаніе	воспален	ія матя	in.		present
Время	нровопусканія.	Папье с	елитряное.	Промыван	ельныя и	при-	
парк	N.			•	7	-	Mexiconia
		Name of the	NO TE OF	T30			

YAEHB IV.

			Ē			Поль-
Болъзии,	Призн какія мог	ажи остан суть произо	озки кро имя оть о	овей у ре	ожениЦБ. ихъ кровей.	
Причин	ы остан	повизшагос	т послъ з	оодозъ ка	าวรถพองอนรับ	a. 203
		родолжается твъ оно быв			енія рожениц	ъ
06ъ осп	пановля	кровотече	нія или о	чищенія і	послё родо	9Б. 202

	пран.
Пользование остановки: кровей у рожениць.	204
Итль, наную себъ предположить себъ надобно	-
Пользование остановии ировей, когда она произошла от поту.	- Constituted
Когда она зависить от колоду; от подбрющников , и проч. Дізта. Питье мокротожидищельное и легкое. Лекарства. Наблюденіе.	205
Кровопусканіе из в руки с для чего. Ванны, для ногь. Припарки мяг	Dipagnater
чительныя,	206
Велиная полезность противосудорожных въ остановит провей пос	a to
родовъ.	(managed)
Капли Гофмановы, вода изб цавту померанцоваго, настойка смир-	
ненная и бобровая и проч. Пріемъ.	207
Прімь.	208
Преимущества піявицъ. Куда надлежить ихъ припускать.	
Опасности рвотных .	Japan control
Кровопусканіє из шен планскія мухи лепешки из торчицы.	209
У ЛЕНЪ V.	
О воспалении грудей и о трещинъ на соскажъ.	210
Причины и признаки воспаленія грудей.	ř (manual)
Пользование воспаления грудей.	(mercus)
Когда нарывъ бываемъ опасенъ.	Seepport 1
Припарка изъ мяниша жатбиаго съ молономъ. Опасность авнарствъ	
нутрь вгоняющих . Промутрания	Constant of the Constant of th
Кровопусканія. Піявицы. Промывательныя. Пользованіе трещины на соскахъ.	211
Намазываніе деревяннымъ масломъ съ восномъ, Арабскою намедью,	propuner
унгарсною водою.	annual .
Чистительныя прохладительныя.	_
ч л Е н ъ VI.	
О высыпной лихорадкъ у роженицъ.	(manual)
Признани дурные и опасные.	212
Средства какъ предупреждать высыпную ликорадку у	00-
женицъ.	(marrowth)
Во время беременности.	SERVICE
Посль родовь.	213
ч л Е н ъ VII.	
О горячкъ багровой или съ пятнами у роженицъ.	parent.
Бользнь самая опаснейшая для рожениць.	approximately.
Признаки горячки съ иятнами у роженицъ.	-
Она принимаеть свойство гнилой по прошествии неснольких в дней.	Sharmana
arDelta	01b

	Стран
Пользование горячки съ пятнами у роженицъ	214
Обстоятельства требующія кровопусканія, нарывнаго пластыря что надобно дблать во время ознобу. Мигчительныя промывательныя во все время продолженія сей горя	Mary Company
Легкія слабительныя. Преимущества лъкарствъ солкихъ. Обстоятельства требующія лъкарствъ болеутолительныхъ.	= 215
Что надобно дълать, когда бываеть сильной мыть Корень колумбы	215
Пользование горячки съ пятнами у рожениць, ког, принимаеть свойство гнилости.	да она
Хина въ настоъ или въ денокть. Для чего? Промывательныя питательныя.	to toward
Средства, какъ предупреждать горячку съ пятн	ами у- 217
Нища, свъжий воздукъ. Наблюдение чистоты.	-
О ликорадкъ родильницъ.	
Признаки лихорадки родильниць!	218
Признаки особенные.	- 219
Время, когда надобно употреблять хъкарства.	228
Пользование сей аихорадки родильницъ,	
Инеканузина. Пріемъ.	- 22I
Масляное пишье съ кермесомъ	m 222
членъ их.	Sa.
О молошниць или лихорадкь вы грудняв.	223
Причины кропошечения у рожениць; молока въ грудякъ.	
Анкорадии вь грудяхь.	· remaind
молошизя ликорадиа бываеть обынновение у техь женщинь, ко	M
Признаки молошной лихорадки.	224
Время посят родовь, въ которое первые признаки оказываются	e terminal
Признаки опасные,	- remaind
Пользование молошной лихорадки.	0.04
Асвольно одного иншеупомребленія, когда больнь шествуєть п	225
рядном в сбынновенным в	
E a	Един-

Странь
Единственныя ябнарства, когда оныя нужны 225
Противно натура не давать младенцу сосать груди благовременно. —
Всяная женщина, у которой бываеть молоко, должна давать се-
Средства, какъ предупреждать молошную лихорадку
Давать себя сосать, накъ скоро окажущся мервые признаки молона въ грудикъ
Предупреждать запоры, Промывательныя.
членъ х.
О грудницъ, или загрубъніи моложа въ грудямъ.
Отнуда происходить название сей бользии.
Причины грудницы, или молока загрубълаго въ гру-
Признаки грудницы.
Болбани могущіл быть следствіємь грудницы 227
Пользованіе грудницы.
Діэта строгая. Теплыя полотенца на груди. Важность шенлоты. Мочегонительныя. Терпентинъ Хійской съ порошкомъ изъ монраць. Давать себя сосащь. Случай, когда надобно пускать кровь и давать чистительное. 222
\$ 7.
© вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё родовь.
О вниманіи, какое должны иміть женщины, когда опра-
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё подовь. Роженицамъ не Гдолжно вставать съ постели очень скоро. Отасности отъ содержанія себя въ велиномъ тепль во время родовъ.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё подобь. Роженицамь не заожно вставать съ постели очень сноро. Опасности оть содержанія себя ві велиноть тепль во время родовь. Оть заинственняго выблау вь церновь колодную.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда оправить послё подовь. Роженицамъ не Глолжно вставать съ постели очень скоро. Отасности от содержанія себя въ велиномъ теплі во время родовь. Ота единственнато выблау въ церновь колодную.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё подобь. Роженицамь не гложно вставать съ постели очень сноро. Опасности оть содержанія себя вт велиноть тепль во время родовь. Оть единственняго выблау вь церновь колодную. \$ 8 О безплодности или бездётности.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё подовь. Роженицамь не разжно вставать съ постели очень сноро. Опасности от содержанія себя ві велиноть тепль во время родовь. Оть единственнато выбрау вы церновь колодную. \$ 8 О безплодности или бездётности. Ч Л Е Н Ъ І.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё подовь. Роженицамь не должно вставать съ постели очень сноро. Опасности от содержанія себя вт велиномь тепль во время родовь. Отвединственнаго выбаду вы церновь колодную. \$ 8 О безплодности или бездётности. Ч Л Е Н Ь І. Причины бездётности: Бездётность обыкновенно чаще случается между богатыми, нежели между бідными. Для чего:
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда оправить послё послё подовь. Роженицамъ не Глолжно вставать съ постели очень скоро. Отасности от содержанія себя вт велиномъ теплі во время родовь. Отть единственнато выбэду въ церновь колодную. \$ 8 О безплодности или бездётности. Ч Л Е Н Ъ І. Причины бездётности: Бездётность обыкновенно чаще случается между богатыми, нежели между бідными. Для чего: Ч Л Е Н Ъ ІГ.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда оправить послё подовь. Роженицамь не заожно вставать съ постели очень скоро. Отасности от содержанія себя вт велиноть теплё во время родовь. Отвеннято выбэду въ церновь холодную. В в О безплодности или бездётности. Ч Л Е Н ъ І. Причины бездётности: Вездётность обыкновенно чаще случается между богатыми, нежели между бтаными. Для чего: Ч Л Е Н ъ ІГ. Пользованіе безплодности.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся нослё родовь. Роженицамь не Гдолжно вставать съ постели очень скоро. Отасности от содержанія себя вт велиноть теплё во время родовь. Отвеннято выбяду въ церновь колодную. В в. О безплодности или бездётности. Ч х Е н ъ І. Причины бездётности. Везлётность обыкновенно чаще случается между богатыми, нежели между бідными. Для чего: Ч х Е н ъ Іг. Пользованіе безплодности. 230 Тёлодвиженіе, ліэта взь растеній, молоко.
О вниманіи, какое должны имёть женщины, когда опра- вятся послё родовь. Роженицамъ не Гдолжно вставать съ постели очень скоро. Опасности от содержанія себя вт велиноть теплё во время родовь. Отвединственнато выёзду въ церковь колодную. \$ 8. О безплодности или бездётности. И Л Е Н Ъ І. Причины бездётности. Безлётность обыкновенно чаще случается между богатыми, нежели между бідными. Для чего: И Л Е Н Ъ ІГ. Пользованіе безплодности. 230 Тёлодвиженіе, лігта взъ растеній, молоко. Вязательныя. Железноватыя воды. Колодная ванна.
О вниманіи, какое должны иміть женщины, когда оправить послів родовь. Роженицамі не залжно вставать сі постели очень сноро. Опасности оті содержанія себя ві велиномі теплі во время родові. Оті вдинственнаго выйзду ві церновь колодную. В в. О безплодности или бездітности. И Х Е Н Б І. Причины бездітности. Между бідными. Для чего: И Х Е Н Б ІІ. Пользованіє безплодности. Тітлодвиженіе, лізта изб растеній, молоно. Вязательныг. Желізноватыя воды. Колодная ванна. Что надобно літать, когда безплодность происходить еть скор-
О вниманіи, какое должны иміть женщины, когда опра- вятся послі родовь. Роженицамь не должно вставать съ постели очень сноро. Опасности от содержанія стбя ві велиномь тепль во время родовь. От безплодности или бездітности. У Х Е Н Б І. Причины бездітности. Везлітность обыкновенно чаще случаєтся между богатыми, нежели между бідными. Для чего: Ч Х Е Н Б І. Пользованіє безплодности. Тром ваненными. Запра в раствий, молоно. Вязательны. Жельзноватыя воды. Холодная вания. Что надобно ділать, когда безплодность происходить еть скорбей лушевныхь;
О вниманіи, какое должны иміть женщины, когда оправить послів родовь. Роженицамі не залжно вставать сі постели очень сноро. Опасности оті содержанія себя ві велиномі теплі во время родові. Оті вдинственнаго выйзду ві церновь колодную. В в. О безплодности или бездітности. И Х Е Н Б І. Причины бездітности. Между бідными. Для чего: И Х Е Н Б ІІ. Пользованіє безплодности. Тітлодвиженіе, лізта изб растеній, молоно. Вязательныг. Желізноватыя воды. Колодная ванна. Что надобно літать, когда безплодность происходить еть скор-

Orabaenie.
Cm pani
∮ 9.
О муженеистовствъ или бъщенствъ матки.
Свойство сей бользии.
Канія женщины оной подвержены.
Ч Л Е Н Ъ I.
Причины муженеистовства, или вышенства матки.
члень п.
Признами муженеистовства, или бъщенства матки. 237.
Первые признаки.
Признани существенные.
Несправелянное предразсуждение о большей части женщинь, сею бо-
абзийо одержимыхъ.
членъ пп.
Пользование муженеистовства, или бъщенства матки. 234
Обладаніе любимымъ предметомъ.
Нравсивенным средсива.
Дізта прохладительная. Питіс. Промывательныя. Пища 255:
Обстоятельства требующія провопусканія; из ноги. Піявицы.
r A A B A 51.
О детскимы бользнямы, какы то о бользнямы приклю-
чающихся от задержанія въ кишкахъ младенческаго
посль додовь калу; о запоры и о выпадании задне-
проходной кишки; о молошниць; о ръзъ въ животъ
и коликахъ; о трещинахъ, о ссадкъ кожи и саднахъ
на тълъ; о сгущени возгрей въ носу и насморкъ; о
раоть; о мыть и понось; о сыпяхь; о летучемь
огнъ или огникъ; о ципкахъ, или опухоли на ногахъ
или на рукахъ отъ великаго холоду; о особлизомъ
родъ удушья или перепоночной жабъ; о трудномъ
проръзывании зубозъ; о Аглинской бользни; о судо-
рогахъ; о водяной бользни въ голозь; о пучени или
раздупін жлудка оты кислоты, и о бользни вене-
рической 236
9 I.
О дътскихъ бользняхъ вообще:
Скольно младе измъ нужна пом щь ихъ, опщовъ и матерей. Таловае неискусное попечение бываеть источникомъ дъпскихъ болъзней. 252
Landese Hench you're nonedenie oblesemb nemodunkomb Abnickus Coassien. 257
and the second s

L &

Юглавленте.

Cmpan.

членъ т. Причины дътскихъ бользней вообще. 237 Фласный поступонь новивальных бабокь вы накоторых узадахы. Первыя бользии млаленческія мьето имьють вы кишкахь. Дъйствія лъкарствъ, конми обременяють желудокь новорожденныхъ младенцевъ. /w :288 YAEH 5 TI Пользование дътскихъ бользней вообще. Средства, каковых в пребують припадки приключающиеся от таковых в лекарешвв. Ипенануанна, мли соль рвошная. Маи вино рвошное. Легкое чистительное. Манна, или бёлая магневія. Легнія поширанія рукою. ЧЛЕНЪ ПП. Всеобщій способъ врачеванія дётскихъ бользней. 229 Сей способъ служимъ основаниемъ всъмъ пользованиямъ приличествую. щимъ въ бользнякъ дътеникъ. Выпоражниванія составляють почти все врачебное искусство денское. 240 Надобно весьма мало лъкаремвъ для дъщей. 0 2. О автскихъ бользняхъ приключающихся отъ задержанія въ жишкахъ младенческаго посль родовъ калу: о запоръ и о выпадании заднепроходной жишки. члень Т. О бользняхь приключающихся оть задержанія вы жишкахь младенческого посль родовъ калу. Что такое меконіумъ или дътской послё родовъ каль: онь счищается обыкновенно ав первыя сушки. Что надобно дълать, когда онъ не очищается въ предписанное время. Самымъ лучшимъ въ шакомъ случат лекарешвомъ почищается машер нее молоко. Сколь глупо мивне шехв, кои думають, что не надобно мла денцу давать сосать груди, накъ по прошестви дватичен четырежь часовь после рожденія, или ногда прови перестануть. 242 Время, въ конторое надобно принести рабенка къ груди, что надобно давать младенцу, ногда ввёряють его нормилиць, .-Теплая вода подслащенная медомЪ. Меженание мъщаеть очищению перваго посят родовь кажа. Consessed No

Стр	Hom
По чему признать можно, что младенець имъль сіє первое очищеніе. 2 Вы накой соразмърности должны быть умножаемы очищенія низомы	4 57
у младенцевт.	-
ЧХЕНЪ II.	
О запоръ у младенцевъ.	44
Каніе младенцы подвержены запору. Что надобно далать, когда сіл бользны зависить оть того, что моллоно у нормалицы бываеть очень густо или слишномь давнее зависить она проискодить у рабенка, отнятато оть груди, оть его пищеупотребленія.	45
членъ III.	
О выпаданіи заднепроходной кишки.	-
Причины сего принадка: Принарна шеплымъ виномъ. Порошокъ изъ сажи и сесны скуриванія изъ масшини. Типо надобно дълать когда бельнь судеть упорная.	
О молошниць у младенцевь:	15.
Свойства сей бользии.	annual -
H. Y. E. H. P. II.	
, Причины молошницы у младенцевь.	passed) of
чженъ ц.	
Поизнаки: молошницы: у младенцевъ. 2	17
Опасныя слёдствій молошницы: Молошница: самая: опаснёйшая. Признани молошницы: вы устью горла, желуднё и нишнакы. Вы горле и груди:	48
Каніе младенцы подвержены молошниць. Опасная привычка кормилиць давать младенцамь засыпать, держа грудь во рту.	4.9
HAEHB III.	
Пользование молошницы у младенцевь.	enith.
Рвотныя и легкія слабительныя. Слабительный порошонь. И лемь. Младенцімь должно предписывать сладкую ртуть съ предосторожаностьюмя.	
Поло каніе для горла или умываніе. Чистительная смёсь.	
Рас гущенный нупорось былый.	-
Пре	A-

Отлавленте:

Страно
Предосторожности, каковых в требуеть сте явкарство. 251
Обстоятельства требующія болеутолительных в.
Сокъ изъ очитона большиго, медъ и нвасцы.
Сонъ рълный, медъ розовый. Сонъ морновный.
Ревенный сиропъ. Сокъ изъ арабской намеди.
членъ и.
Средства, какъ предупреждать молошницу у младенцевъ
Деноктъ изъ шалфен съ медомъ.
членъ у.
О молошниць у младенцевь симптоматической, или оть другихь бользней зависящей.
Свойство молошницы, отъ другикъ бользией зависящей.
J 4.
О жислостяхь и бользняхь оть нижь происходящихь, какъ
то о объе въ животъ и коликахъ.
Яства младенцевь удобно киснуть, и большая часть ихъ бользией подаеть изкоторые знаки кислостей.
мо таковыя кислости бывають чаще сабдствиемь, нежели причиною сижь бользией.
члень бользией. члень т. Признаки кислостей и бользией, оть нихь происходящихь,
члень бользыей. члень Тризнаки кислостей и бользыей, оты пихы происходящихы, какы то рыза вы животь и коликы.
члень бользыей. члень Т. Признаки кислостей и бользыей, оть нихь происходящихь, какь то обза вы животь и коликь. 255 Особенный признань рьза вы животь.
ЧЛЕНЬ І. Признаку кислостей и бользней, оть нихь происходящихь, какь то рыза вы животь и коликь. 255 Особенный признакь рыза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ.
члень бользыей. члень І. Признаку кислостей и бользыей, оть пихь происходящихь, какь то рыза вы животь и коликь. членый признакь рыза вы животь. члень ІІ. Пользование кислостей желудка и кишекь.
Сижь бользование кислостей и бользыей, оть нижь происходящихь, какь то обза вы животь и коликь. 255 Особенный признань рыза вы животь. — ЧАЕНЬ П. Пользование кислостей желудка и кишекь. — Не давать совсыю молона: отварь жидкой, калачь, движеніе. — Неудобетва оть лычарствь кислоту унимающихь. — 256
ЧЛЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть пихь происходящихь, какь то рыза вы животь и коликь. 255 Особенный признакь рыза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ. Пользование кислостей желудка и кишекь. Не давать совстив молона: отварь жидной, калачь, движеніе. — Неудобства оть льнарствы кислоту унямающихь. 256 Тяхь не иначе должно давать, какь съ чистительными выбсть. Былая магнезія.
ЧЛЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть нихь происходящихь, какь то рыза вы животь и коликь. 255 Особенный признань рыза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ. Пользованіе кислостей желудка и кишекь. Не давать совсыть молона: отварь жидкой, калачь, движеніе. — Неудобетва оть лычарствь кислоту унимающикь. 256 Тур не иначе должно давать, кань сь частительными вмысть. Вы-
ЧАЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть пихь происходящихь, какь то рыза вы животь и коликь. 255 Особенный признань рыза вы животь. ЧАЕНЬ ІІ. Пользованіе кислостей желудка и кишекь. Не давать совськы молона: отвары жидкой, калачь, движеніе. — Неудобства оть лінарствы кислоту унимающикь. 256 Тура не иначе должно давать, какь сы чистительными выбсть. Былая магнезія. ЧАЕНЬ ІІІ. Пользованіе рыза вы животь и коликь.
ЧЛЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть нихь происходящихь, какь то рьза вы животь и коликь. 255 Особенный признаны рьза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ. Пользование кислостей желудка и кишекь. Не давать совсьмы молона: отвары жидной, налачь, движеніе. — неудобства оть льнарствы нислоту унимающихь. 256 Туб не иначе должно давать, наны сы частительными выбсть. Бълая магнезія. ЧЛЕНЬ ІІІ. Пользованіе рьза вы животь и коликь. Опасности разгорачающихы льнарствы. Промывательныя магчительныя.
ЧЛЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть пихь происходящихь, какь то обза вы животь и коликь. 255 Особенный признань рёза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ. Пользованіе кислостей желудка и кишекь. Не давать совсьюю молона: отварь жидной, калачь, движеніе. — Неудобства оть явиарствь кислоту унямающихь. — 256 Ихь не иначе должно давать, какь сь чястительными вмёсть. Бёлая магнезія. ЧЛЕНЬ ІІІ. Пользованіе обза вы животь и коликь. Опасности разгорачающихь лекарствь. Промывательным мягчительным. Бёзая магнезія. Потиранія водкою по брюку.
ЧЛЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть нимь происходящимь, какь то обза вы животь и коликь. 255 Особенный признакь реза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ. Пользованіе кислостей желудка и кишекь. Не давать совськы молона: отварь жидной, налачь, движеніе. — Неулобетва оть лінареть нислоту унимающихь. — 256 Ихь не иначе должно давать, какь сь чястительными выбеть. Вылам магнезія. ЧЛЕНЬ ІІІ. Пользованіе обза вы животь и коликь. Опасности разгорачающихь лекарствь. Промывательным магчительным. Бълам магнезія. Потиранія водкою по брюку. Обстоятельства поназывающія ніснольно напитку ирёпкаго. Мят-
ЧЛЕНЬ І. Признаки кислостей и бользней, оть пихь происходящихь, какь то обза вы животь и коликь. 255 Особенный признань рёза вы животь. ЧЛЕНЬ ІІ. Пользованіе кислостей желудка и кишекь. Не давать совсьюю молона: отварь жидной, калачь, движеніе. — Неудобства оть явиарствь кислоту унямающихь. — 256 Ихь не иначе должно давать, какь сь чястительными вмёсть. Бёлая магнезія. ЧЛЕНЬ ІІІ. Пользованіе обза вы животь и коликь. Опасности разгорачающихь лекарствь. Промывательным мягчительным. Бёзая магнезія. Потиранія водкою по брюку.

Спрана UAEHB IV. Спелства , жакъ предупреждать кислости, ръзъ и колики у младенцевъ. 257 Пищеупониебление для кормилицы. Обстоятельства, въ ноторыхъ налобно переменить кормилицу. 5. © тоешинахь, салчахь и повлости кожи у младенцевь. 25° MECINO CUXTO HEAVFORD. TAEH BI. Пользование трещинъ, салнъ и прълости кожи воспаленіемъ несопровож даемыхъ. чистота или опрятность лёкарствамь на нихъ почитается. что надобно делать вогда одной чистопы не довольномеулобенва происходящия от в сбыкновенной пулвы. членъ п. Пользование трещинь, саднь и прълости кожи воспаленіемъ сопросождаемыхъ. Вола свинцовая Тулардова. Распущенный купорось былой, или былая глиния. О стущении возгрей въ носу и о насморкъ у младенцевъ. члень т. О стущении возгрей въ носу. Пользование. Вода майоранная. Бълый купоросъ. Злашерий или сокъ ослинато огурца. Авкарства, кои чаще всего удаются. чаень п. насморк в. Каніе младенцы сему полвержены. Пользование. Пары теплой воды , масло коровье , личное. Вода маюранная. Бёлой нупорось, элатерій. О ресть у младенцевъ. Для чего рвошт болте подвержены младенцы, нежели взрослые. Ис всегда ила олисия или перембилеть ее въ бользив. ЧЛЕНЪ

	Cmpan-
членъ і.	
Пользование рвоты у младенцевь.	262
членъ п.	
Пользование рвоты, произшедшей отъ излишетза ясть	Б. —
Ипекакуанна или теплая вода и проч.	265
Пользование рвоты, приключающейся оть яствь острых	•
и удобораздражающихъ.	
Перемъна пищеупотребленія.	(managed)
что издобно дълать, иегда острота будеть свойства кисловатаго;	
Гнилаго.	***************************************
косла рыста зависить оть иленникь мокроть; оть вогнатор	264
внутрь коросиы; отъ червей.	-
Пользование рвоты, произшедшей отъ раздражаемости	ŗ.
нервъ желудочныхъ и самой чувствительности	
страждущаго.	
На мой из в жины, ревеню и померанцовой нории. Чистительныя соли	•
Albank.	265
Пищеупотребление младенца, кормилицы. Весьма нужно въ такомъ случат младенца веселить, утъщать г	- Consuming of
npow.	
Пользование увоты, происходящей отъ заваловь въ под-	
боющін.	266
По чему можно подозръвани завалы.	and a second
Кровопусканіе, естьки буденть жарь. Промывательныя мягчитель.	,
ныя. Лънарешва унимающія боль. Настой изъ манны или Аленсандрійскаго листу съ лимоннымъ со	- mountd
номъ	
Полуванна Теплая, Магчительных припарки-	-
Пользование рвоты, происходящей отъ грыжи, прост	44 77 0
удушья и проч.	y A, big
Прежде унятія рвоты, отъ чегобы она ни происходила, надобно	
узнать достовърно, ивть ин грыжи.	267
Канъ признать можно ресту, происходищую опъ внезапной просту.	
ды. Средства оной пособствовать.	-
Средення накъ пособствовать расть произшедшей отъ угару Жидная соль щелоко - нашатырная	Annual Property
	Commission
Пользование рвоты упорной. Припарки ароматическія теплыя. Пластырь желудочный ев веріг.	distriction
жему и проч.	-
	6 9

OIN REAL CHIC.	
	Curban
\$ 8.	
О мыть и понось у младенцевь.	268
Знаки, не конорымъ примъчается, что у младенца мытъ или	A
Ръдко бываетъ мыть у новорожденныхъ мдадендевъ.	
Знани, по которымъ примъждением, чиго мыть или поносъ полезенъ.	
ЧЛЕНЪ І.	
Причины мыта и поноса.	
Ч Л Е Н В II.	
Всеобщее пользование мыта и поноса.	270
Тлавное двло, которое исполнить должно въ семъ пользования:	
Вино суръмяное. Способъ, нанъ его упопреблящь.	-
Пожирающія или унимающія кислопу и вязапельныя не могупі	271
быть даваемы, не употребивь прежде чистительныхь.	
Случай поназывающій болеутолительных лекарства.	272
Пользование главных в причинь мыта и поноса.	, prosent
Пользование, когда младенецъ очень много всть.	
Въ случав сыпи вступившей внутръ.	. Trends
Когда поносъ приключится отъ мистительныхъ слишкомъ кръчкихъ	,
то немедление надлежить остановить его. Для чего?	273
Визашельное пишье, Промыващельное изъ кражмалу.	to-months.
Обстоятельства требующія навдина. СЪ наними предосторожностя-	
Пользование, когда поносъ происходищь оть слабости кишокъ, от	, Francisco
ревносии, и проч.	
Авкарешва крвпишельныя. Минеральное вино съ коричною водою. Ді	A. Continuous
эта. Патье.	274
членъ III.	
Средства, какъ предупремедать мыть и поносъ.	275
Мредохранительными средствами на сін бользин нечинаются усер. дныя попеченія и здоровье кормилицы.	
Порошокъ унимающій кислошу и вместе крепишельный для кор-	-
милицы.	,comments
∮ 9.	
О различных видахъ сыпей, бызающихъ особенно у	1
грудных в младенцевь, о летучемь огнь или огникв,	
о шелудяхъ и о цыпкахъ.	-276
Жанал цель предполагается въ семъ параграфъ.	
4 2	LAEHT

членъ 1.

О разныхъ сыпяхъ, бы	вающихъ	особенно з	грудны	(XB
.4	иладенцевъ.		,	276
Същи сіи довольно часто слу Но они не очень опасны , и в осторожностей		тив засущае	- мы безБ пј	ред-
Причины сыпямь, бые	вающимъ о	совенно у	младенце	въ. _{посе}
Яства нездоровыя Нечистота или неопрятность	on g 66,	60.	**	
Пользованге сыпей бы	вающихъ о	собенно у	младенца	23B -
БЪ случай нездоровых в леты ствованію тому, дабы он предупреждать. Въ других в случаях в ликарской видъ ликарства	ии не сдълали ——————————————————————————————————	сь опасными	, и какъ в	xT
Сърная мазъ.		* •	•	" " 1 mm
Ţ	ЛЕНЪ	II.		
О летучемъ огн	ъ или огни	ихъ у млад	ценцевъ.	(person)
Свойство сей сыпи. Каного возрасту младенцы е	й подвержены		• 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 279
Причины ле	тучаго ог	ня или огн	ижа.	-
Зараза. Кормленіе грудью нъ удобнъйшему сообщенія		единственным	ть средство -	мЪ .= 289
Признаки л	етучаго ог	ня или ога	чижа.	gazzani
Эпблужденія о послъдствіях в	огника		• 1	- 281
Онъ не безъ опасности» Чило дъязетъ его опаснымъ.		±	m `	- 282
Онъ продолжительнъйщаго в его нашуръ, нежели какъ			вы остави	
Свойство мочи при окончаніи			•	
Пользованге	летучаго с	тня или о	гника.	283
Троичная трава есть собещ Способъ, какъ употреблян				180. 15
порошит	лъкаротво Мл	адени у.		m · 284
Дъйствія отъ сего явиарств	а въ первые	дни ; на вто		
Надобно продолжать упстре			не пушначи	ms
дней послъ соверщеннаго сп	адента струп	nenb.	the second	Внаки,

Common in
Энани, по коимъ можно признашь, что сія больчь вылічена со-
вершенно.
Средства, какъ предохранять младенцевь оть летучаго
огня или отника.
Не надобно давать кормить младенца грудью той кормилицъ, ко-
торая сама имъна сто бользнь. Для чего:
Примены по которымъ признать можно, что кормилица имъла
ивкогда сію бользив.
Примътивъ таковые призилки, надлежитъ взять младенца отъ-
кормилицы. Визим по коморымъ примъчаения, что младенецъ, сосавний кормили-
цу подозрительную, одержимъ сею бользию, жотя бы лету.
чій огонь и не оказывался наружу.
Троичная трава есть ленарство самое легное, не могущее вредить
и здоровымъ дъщамъ.
членъ III.
О шелудяхь на головь у младенцевь. 288
Важность чистопри и летво здоровых в ко врачеванию сей бользии.
Наблюдение.
что надобно дълать прежде употребленія лінарешві.
Вода мыльная иля изпестновая. Пластырь изъ черной смолы. Синій
нупоросъ. Жженыя квасцы.
Діэша. Способы, накъ предупреждать последствія отъ врачеванія. фонта.
neab.
членъ ту.
О цыпкахъ у младенцезь и у взрослыкъ.
Кто подверженъ онымъ.
Пользованіе цыпокъ.
Способы, какъ предупреждать и лівчить цыпки. 290
Остеретаться от внезапной теплоты посль ознобу.
Что надобно двлать, когда очень колодно булеть рукамь и негамь; когда сія части начинають быть красны и распукцуть.
Скабительное, горчица и водие.
Когда стануть нарывать, мазь галмейная, мазь изъ тудін, пла-
стырь бълильный. Бальсамъ Женевісьь.
Успоно сващельный бальсамъ Г. Шомеля.
§ 10.
О особливомъ родъ удушья, называемаго по Аглински
стоир, или паче о жабъ перепоночной.
Время, мъста, гав она приняючается, мянденцы, кои ей подвержены.
A 5 MIEHT

Смра	Wa
членъ 1.	
Причины жабы перепоночной.	2
ЧЛЕНЪ II. Признаки жабы перепоночной.	d
членъ пп.	
Пользование жабы перепоночной Ванны для ногь, кровопускание и промыващельное; пары отъ неплой воды съ унсусомъ, катаплазмы, припарки и проч	gardi.
дурной духъ.	3
членъ и.	
Средства, жакъ предупреждать отрыжку жабы пере-	-
Пищеунотребленіе. Заволока или фонтанель. Пластырь изв смолы Бургонской.	14
Дополнение къ члену croup, то есть о особливомъ родъ удушья или о жабъ перепоночной.	nempt
Наблюдение. — 25 Свойства болбани стоир, или жабы перепоночной. — 26	95
Признаки жабы перспоночной.	9
оботоятельства, могущія подать поводъ къ опасенію croup, или перепоночной жабы,	0
I Designation of the Control of the) 2
Признани, по которымъ сей родъ жабы различествуетъ отъ жабы элой или съ антоновымъ огнемъ.) 5
Пользование перепоночной жабы.	anne di
Пользованіе первой степени. Ванна для ногъ. Кровопуснанія, пілвицы. — Или рожечная кровь. Промывательныя, чистительное.	
Корна нассія, или слабительная нашна. Манна.	04
Средства возбуждать мочу: питіе селитряное. Нарывное. Пары отв воды св уксусомъ-	-
Вводимые въ грудь посредствомъ вдыжальницы.	3 6
Ипенануаниа или пишье рвошное.	06
меркуріальная мазь. Сладкая ртуть	~ 7
	0.7
* 1	IA

Стран.

S II.
О трудномъ проръзывании зубовъ у младенцевъ. 307
Десятая часть младенцевь умираеть во время проръзыванія зубовь. Причины таковаго несчастія. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Скольно важне, чтобы разсматривать со вниманісмъ припадни боль-
ных в магденцевъ. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Признаки труднаго проръзыванія зубовь. 509 ЧЛЕНЪ II.
Пользование труднаго проръзывания зубовь. 310 Промывательныя, легий чистительныя, яства и пите. Случай, когда надобно пускать кровь, или лучие припускать піявиць. Нарывныя. Спирть олекьяго рогу. Пріемъ. — 311 Лавданъ Сидентамовъ. Пластырь нэв смолы Бургонской. Медъ прикладываемый иъ деснъ. — 312 Корка жлёбная, кусонъ солодноваго корня и проч. кровопусканія изъ деснъ, или настяки на оныхъ. — 4то надобно дълать, когда опасаешься антонова огня.
членъ ин.
Средства, какъ облегчать проръзывание зубовъ. 313 Хорошее молоко. Тълодвижение, Холодная ванна. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
О Аглинской бользни.
Каних в втв магденцы подвержены бывають сей бользин.
членъ г.
Причины Аглинской бользии.
Худое эдоровье опцовъ и машерей.
Венерическая бользни. Худое пищеупотребление 515
Худое нормяение грудью. Недостатовъ тряодвижения. Истистота.
Дурной воздухъ.
Ч Л Е Н Ъ II.
Признаки Аглинской бользни 316
Внани, по которымь должно опасаться сій болбзан 318
TAEHT .

Cmpan?

TIENT

Ч Л Е Н Ъ III.	
Длэта, какую надобно предписывать мландецамъ, стра- ждущимъ Аглинскою бользнию 3	16
Дель, ношорую себь предположишь должно въ пользовании сей бользии. «	-
Яспива 5	20
Hamie - w	-
YAEHD IV.	
#жарства, коп надобно предписывать младенцамь, страждущимъ Аглинскою бользнію - 3:	21
Пріуго повленія меркурізльныя Дізта есть единственный споссов ив врачеванію Аглинской бользии. Надобно имъть постоянное терпьніе вв употребленіи оной.	22
\$ 13.	
О судорогахь у младенцевь.	-pagetti
членъ 1.	-
членъ 1.	ن
ЧЛЕНЬ І. О судорогахь симптоматическихь Причины. Пользованіе судорогь симптоматическихь, происходящих	NT 24
ЧЛЕНЬ І. О судорогамь симптоматическимь Причины. Пользованіе судорогь симптоматическимь, происходящие оть веществь раздражающимь желудокь и кишки.	
ЧЛЕНЬ І. О судорогамы симптоматическимы Причины. Пользованіе судорогь симптоматическимы, происходящим оть веществы раздражающимы желудокы и кишки. 33 Премывательное. Легкое рвотное.	25
ЧЛЕНЬ І. О судорогамы симптоматическимы Причины. Пользованіе судорогь симптоматическимы, происходящим оть веществы раздражающимы желудокы и кишки. Запромывательное. Легное рвотное. Выла магнезія. Ревень. Пользованіе судорогы симптоматическимы, происходящим	25
ЧЛЕНЪ І. О судорогамъ симптоматическимъ Причины. Пользование судорогъ симптоматическимъ, происходящи отъ веществъ раздражающимъ желудокъ и кишки. За премывательное. Легкое рвотное. Бълга магнезія. Ревень. Пользование судорогъ симптоматическимъ, происходящи отъ высыпания оспы или кори.	249 25 XB
ЧЛЕНЪ І. О судорогамъ симптоматическимъ Причины. Пользование судорогъ симптоматическимъ, происходящи отъ веществъ раздражающимъ желудокъ и кишки. За премывательное. Легкое рвотное. Бълая магнезія. Ревень. Пользование судорогъ симптоматическимъ, происходящи отъ высыпания оспы или кори. Ванна для могъ; промывательное мягчительное. Пользование судорогъ симптоматическихъ, происходящим продользование судорогъ симптоматическихъ, происходящим	249 25 XB
ЧАЕНЪ І. О судорогамъ симптоматическимъ Причины. Пользование судорогъ симптоматическимъ, происходящию отъ веществъ раздражающимъ желудокъ и кишки. 33 премывательное. Легкое рвотное. Бълая магнезія. Ревень. Пользование судорогъ симптоматическимъ, происходящию отъ высыпания оспы или кори. Ванна для когъ; промывательное мягчительное. Пользование судорогъ симптоматическихъ, происходящим отъ труднаго проръзывания зубовъ. Легкое чистительное, нарывное. Настойка изъ сажи, лурнаго запаку бобровой струи и проч. зъ сыво.	249 25 25 26

Ornanaê nie.

Cmpar	31
членъ п.	
О судорогахъ существенныхъ или первобытныхъ у мла-	
денцевъ.	6
Признани судорогь существенныхъ.	
Пользование судорогь существенныхъ. 32	7
Когда эзвисять очт от порчи въ мозгу	-
S I 4.	
О водяной бользни вы головы	mej
Свойство бользни водиной въ головь и водяной въ мозгу.	-
членът.	
Причины водяной бользни вы голозь. 32	3
членъ п.	
Признаки водяной больгий съ голось. Ч Л Е Н Ъ III.	desig
Пользование водяной бользни въ головь.	•
речень или ялаппа съ сладкою ршушью. Мочегонишельныя, Чакашель- ный порошекь.	-
О пученін и раздутін желудка отъ кислоты,	
членъ 1.	
Причины пученія и раздутія желудка от кислоты. — Ч Л Е Н Ъ II.	7
Признаки пученія и раздутія желудка оть кислоты. 331 Ч Л Е Н Ъ III.	E
Польгозание пучения и разлутия желудка от кислоты	-
Когда сно произощию отъ дурчыхъ яствъ. Хор шее молоко, припар- ки, промывательныя, сыворотка пополамъ съ настоемъ изъ ща, велю, брункреса и проч. Ревень. Пріемъ. Соль марціальная Рявісрова. Воды марціальныя. Пластыри діабота. нумъ, болиголовкый или Вигон въ.	- Carlo
Ŋ 16.	
О Венерической бользни у младенцевъ.	and and

членъ 1.

Признаки Венерической бользни у младенцевъ.	333
Раждающихся от матери, которая заражена Венерическою больчию: Раждающихся от матери, которая несовершенно выльчилась от в	
сей бользни во время беременности.	334
Знаки, по которымъ догадывашься должно о Венерической бользни	
у рабенка сей послъдней женщины.	consent
Знаки перемъняющие сію догадну въ самую достовърность.	335
Знани, по ноимъ примъпнить можно что младенецъ заражается сею	
бользию ошь кормилицы;	3 3 6
Мли от того, что клали его спать съ людьми ею зараженными-	quadprettititi.
члень п.	
	337
Налобно поспъшить ятченіемъ женщины беременной, тольно бы не	
было ей овыми мъсяцовъ.	(management)
Преимущества способа промывательных для беременных женщин .	maneral
Способъ нашираній, сулемы, меркурія нераспущеннаго, когда не можно употреблять промывательныхъ.	338
ВЪ накое время посяб родовъ предпринять можно пользовать мать, за-	550
раженную Венерическою бользнію.	national and the same of the s
Рабенов выявчивается въ самое то время, естьян и не станешь ему	
давать лъкарства.	-
не надобно заботиться объ отняти рабенка отъ кормилицы нездо-	
ровой, а должно пользовать кормилицу.	3 8 9
Когда младенецъ от груди отнять, то надобно его пользовать. Приличествующий способъ.	
пріємь сулемы для младенца двужь или трежльтияго; пятильт-	CONSTRUCTION OF THE PERSON OF
няго. Наблюдение.	
Пріемь явигрешвь для младенцевь должень быть четвертью слабве	
The second secon	- / -

ГЛАВА 52.

О Хирургій или Авкарской наукв вообще; о кровопусканій принятомь вы видь врачеванія и вы видь операцій; о Авкарскихы бользнямы самымы общимы, накы то о воспалительнымы, опухолямы внышнихы; о чирынхы; ногтовдамы и антоновомы огнь; о ранамы, в обжогамы; о убоямы и багровымы пятнамы на тыль оть ушибу; о нарывнымы ранамы или вередамы и о фистуламы.

341

Стран-
S I.
О Хирургін или Авкарской наукв вообще. 341
Планъ Автора относительно къ сей главъ и двумъ послъдующимъ. Чувствительность принуждаеть, такъ сказать, каждаго человъка быть Лъкаремъ при случаъ.
∫ 2.
О жровопусканіи, принятомь въ видъ врачеванія и въ видъ операціи. 344
Кровопуснаніе есть операція Хирургическая самая общая и та, ко- торую меньше всего благовременно употреблять знають.
членъ 1.
Показанія кровопусканія.
Вев бользии воспалишельныя и всякіе признани воспаленія.
членъ п.
Случан не требующіе кровопусканія. 346
Слабость, жидность крови, водяныя бользни и проч-
членъ ии.
О части тъла, изъ которой должно отворять кровь, и какимъ инструментомъ Дълать сіе надобно.
Опасно было бы наналывать жилу біющуюся или сукую. Вибшніе энаки, по ноторымъ сіє примъчается.
YAEHBIV.
О мёстё, на которомь перевязку дёлать должно. 347 Ч Л Е Н Ъ V.
О количествъ крови, какое выпускать надобно.
Оно должно быть относищельно ив телосложению, возрасту, обра- зу жизни и проч
членъ W.
О томъ, какимъ образомъ надлежить пускать кровь младенцамъ.
ЧЛЕНЪ VII.
Предразсудки простаго народа о крозопусканіи. 349
© той наи о аругой жилт. — Е 2

Cit	TPaHo.
О мнимых в преимуществах в первого кровопусканія; о кровопуска.	
нія изб ноги	550
нисти ручной; даже и изБ руки у ивноторых в мюдей.	- magnaterial of
тожно научиться отворять провь единственно от того, когда станет	
примъчать кровопуснанія.	55 I
Жотя кровопуснание есть операція важная, однакож в она легка, по-	
елику дълается она ежедневно [людьми самыми простыми и не-	
вёждами.	(management)
Не дляжно никогда пускать крови, ежела не оказываения надобно-	
сти въ томъ по признанямъ бользян.	5.52
· J 3.	
О воспалительных опухоляхь вившнихь, или о жигу-	
чихъ опухоляхъ; о чирьяхъ, нарывахъ, ногтовдахъ	
и антонозомъ огнъ.	pay gagli
Without Old B	35
Воспалительная опухоль витшияя онанчивается разбитемъ, нагное-	
ніемъ, аншоновымъ огнемъ или жельгномъ.	,
Внаки предващающее разбивку, нагносние, антоновъ огонь или	
желвакЪ.	-
Признаки воспалительных в опухолей вившних в.	-
Воспалительная опухоль принямаеть имя чирья, какъ скоро она	
вскроения или вскрыта будеть,	554
Пользование для приведения въ разбивку воспалитель-	
нымъ опухолей вившнихъ, какъ то чирьевъ, нарыв-	
	,
нымъ вередовъ и ногтобдъ.	(percent)
Легное пищеупотребление, кровопускания, чистытельныя. Припарки.	
капаніе масломь.	quantité
Ограничиванія на сіс пользованіе. Какъ должно льчищь чирьи.	panetected
члень І.	
О нарывахъ, или воспалительныхъ опухоляхъ внъшнихъ,	
которыя не можно было привести въ разбитіе.	355
Знаки поназывающіе, что опуколь превращается въ нарывъ.	
Потребия извъстная степень жару ив произведению гиоя; но не дол-	
женъ оный бышь очень сильный.	State (STATE)
Пользование для приведения къ нагноснию ихи нарыву	
воспалительных в опухолей наружных в, которых в не	
можно было разбить, или пользование нарывовъ.	356
	900
Припарки болеутолительныя, изощренныя сырым в лукемв.	married.
Наи сдбичныя ущолительными посредствомъ опія.	married.
	Ha-

Cmpan
Нагновніє и врачеваніе чирьевь сушь двисшвіе нашуры: надобно шок-
мо вспомощеетвовать ей-
энаки, по которымъ приметинъ можно, что чирей созрълъ.
что надобно дълать, когда нарывъ самъ собою прорзется. Чер-
ная мазь, бальсамъ Женевіевъ-
Когда он в самъ собою не прорывается.
Надобню умьть не пропускать щой минуты, когда созрветь гной.
AMA vero?
Чио надобно дълать, ногда нарывъ векрытъ будетъ инструментомъ;
черная мазь, бальсамъ Жененевъ 559 Пользование кровавых в нарывовъ съ болью и съ жаромъ, чирьевъ, ногмовав
N HDOA's
Надобно венрывать ногтобду накодящуюся подь ногтемь. Для чего?
Базильная мазь, бальсамъ Женевіевъ.
членъ п.
Оногтовдах в
Панарис в перваго вида не инос что есть, наив ногтовда. Мбето па-
карисовъ или ногтобдъ,
Признаки панариса или погтовды втораго вида.
Пользование панариса или ногтобды втораго вида.
Кровопусканія.
Припарки. Мазы черная съ припаркою.
ли шья правы мошоночника или настушьяго глазу, прикладываемыя
вмфото принарки.
Признаки панариса или ногтовды третьяго вида.
Мъсто ногиот ды сего вида.
Пользование панариса или ногтовды третьяго вида. 362
Надрванание.
Викрытіе приключающихся вередовЪ. БальсамЪ ЖеневіевЪ 563
Признаки панариса или ногтовды четвертаго вида
Мъсто ногтоваъ сего вида.
Пользование панариса или погтовды четвертго вида. 364
Вазры Більсамъ Женевіевь, жина, селитра.
Средства какъ предупреждать ногтовды.
Погружение переша въ воду горячую.
E. S. WIERE

Y	ленъ III.		Стран
	антоновомъ огнъ.		365
	наки антонова огня.	•	305
		1	-
	ованіе антонова огня.		366
ВеріянЪ наружно, или нат Проръзыванія, базильная м въ нашаплазмъ. Способъ Бальсамъ Женегіевъ. Наблю Лънарства внутреннія кръп Селитра въ велиномъ пріем	азъ, терпентинное масло накъ ее дълать. одение. — пительныя и жина.		a
	\$ 4.		
0	ранахъ.		371
Свойства ранъ.	p to to to to be		
Что двязеть раны больше	или меньше опасными.	a she	-
раны смертельныя;	1 m		-
Или почти всегда смертели	вныя; очень опасныя.	en ul	572
	Пользованіг рань.		demand
КЪ чему служатъ мази и лъкарства внутреннія въ с одна натура врачуеть ран	емъ самомъ случат.	Hbi.	575
	членъ і.		
Наружныя в	вспоможенія противу	ранъ.	
Первое внимание, наное дол Канъ поступать должно, бываеть очень сильное.			HO ,
Перевязка.		· / / /	a coperate
Распущенный купорось зи	ній. Вода стягивающая.		3:7 S
Губна дубовая. Способъ нанъ ее набирать	приготоваеть и приклади	n no make	
Морская губка.		100	376
Опасности отъ кръпкихъ с			. ~
Что надобно дълать для р	,		377
Сколько времени оставать с		Ka,	
что надлежить дълать,		ъ прожодитъ	578
Базильная мазь желтан. Ср	едства стонять дикое ма	aco.	-
Что надобно дълать, когд		воспаленія,	
Кашанлазмы изъ мяниша	жаббнаго и воды. заслуживанств предпочтен	o Track Tomas	- 579
нои дълающем изъ мян			a home
		. E T	ІЛЕНЪ

Огайваеніе.

членъ п.	Стран
·	
Внутреннія вспоможенія противу рань.	379
Строгая діэта въ ранажъ большикъ Случий, когда надобно пускать кровь	managed and the same of the sa
Важность сменойствія телеснаго и душевнаго.	580
Слабительныя.	***************************************
\$ 5.	
О обжогахъ.	- (mmad)
членъ г.	
Наружныя вспоможенія противу обжогь!	t t
Когда обжога бываеть поверьхь кожи.	
Когда отв оной сдъязется рана на кожъ.	-
Янчный бёлок выбишый св деревянным масломв.	581
Сомя твемоко - наташинан-	annual .
что надобно дълать, когда обжога глубона; очень велина.	582
члень II.	
Внутреннія вспоможенія противу обжогь.	-
когда обжога будеть опасная. Дізта строгая, провопуснаніе, сла-	
бительныя,	**************************************
Когда угрожаеть она антоновымь огнемь.	**************************************
Xuns.	-
Наблюдение.	383
Смёсь из воды известной съ деревяннымъ масломъ. Смёсь солкая	
Селитра. Сртэываніе. Хина.	-
ý 6.	
О убоякь или багровых пятнахь на тыль от ушибу.	384
членъ т.	
Пользование убоевь простыкь.	to a
Когда убой будеть легкой	Monthlygg
Коровій навозъ вмітешо нашандазмы.	
Внутреннія вспоможенія противу убесь простыжь.	385
Когда ударъ будетъ сильный, то провопуснания. Уксомедъ.	300
Катаплазма изъ мяниша жазбнаго съ цавтомъ самбуновымъ, ро-	
машною, уксусомъ и водою.	described to
Что надобно дълать, ногда больной потеряеть чувства от дъй-	
empia y6010.	
Chonolemnie.	-
Кровопусканія, прицарки, кашаплаэмы и проч-	586
YA	EHT

HZEED

YAEHB II.

Трудно определять, когда сію рану должно залечивать, и когда надобно ее содержать. Какія раны лечить надобно. Которыя должно лечить съ предосторожностію. Конкъ совсёмь лечить не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевыми рань. Внётнія вспоможенія противу гноевыми рань. Внётнія вспоможенія противу гноевыми рань. Зулема нареденая красная, базильная мазы, надрезыванія. Вода навестновая. Сулема Пріємь. Не можно лечить гноевой раны старой, не заменяев оной отверстіємь прожности. Волезни, нои были бы последствільни оных безь таковой предосторожности.	ANEND II.
Принарки. В случат пролема св виноновым отнем в. Награзмана плаубоків. 5 7. О нарывным или гносвым ранал. Ч А Е Н Б І. Причины таковых рана. Кито сным подвержены. Кант можно бы их предупраждать. Ч А Е Н В ІІ. Пользованіе гносвых раны. Ч А Е Н В ІІ. Пользованіе гносвых рань. Канд рана сід различествуєть от простой раны. Ч А Е Н В ІІ. Пользованіе гносвых рань. Канд раны лачнів надобно. Которыя должно залачнать, и ногав ностію. Канд раны лачнів надобно. Которыя должно лачнів св предосторожностію. Конх сововы лачнів на колжно. Виутреннія вспоможенія противу гносвых рань. Діата. Важность поноя для рань на ногах в. Вийтнія вспоможенія противу гносвых рань. Діата. Важность поноя для рань на ногах в. Вийтнія вспоможенія противу гносвых рань. Зут намяна на цва цвату самбуковаго, бальсят женевієвь. Ртуть осадочня красная, базильная мазв, надразыванія. Вода навестновая. Сулема. Прієм в. Не можно лачніш гносвой раны старой, пе заманяв оной отверотієм учет противу предосторожности. Вольни, кон быля бы посладетвівым оных безь таковой предосторожности. В 8. О вередах или гносвых ранах на полобіє фистулы и о различным видах фистулы.	
В т. О нарывнымы или гноевымы раналы. О нарывнымы или гноевымы раналы. Ч Л Е Н Б І. Иричины таковыкы раны. Кто снымы полвержены. Кто снымы полвержены. Каны можно бы ижы предупреждаты. Ч Л Е Н В ІІ. Иользованіе гноевыхы раны. Ч Л Е Н В ІІ. Иользованіе гноевыхы раны. Каніа раны яблять, когда сію рану должно заябливать, и когда на добно ее содержать. Каніа раны яблять надобно. Которыя должно зблить св предосторожнотію. Каніа раны яблять не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевыхы раны. Важность покоя кля раны на негахы. Вижтреннія вспоможенія противу гноевыхы раны. Важность покоя кля раны на негахы. Вижтреннія вспоможенія противу гноевыхы раны. Сулема. Пріемы. Не можно яблять красная, базнавная мазы, надрёзыванія. Вода навестковая. Сулема. Пріемы. Не можно яблять гноевой раны старой, не замянять оной отвершеннымы, кой были были были сомабдетімы оныхы безь таковой предосторожность. В 8. О дередахь или гноевыхы ранахь на подобле фистулы и о различныхы видахь фистулы.	
О нарывных или гноевых ранах . \$33 Свойство таковых рань. ЧАЕНЪ І. Причины таковых рань. Кто оным подвержены. Кан можно бы их предупреждать. ЧАЕНЪ ІІ. Пользованіе гноевых рань. ЧАЕНЪ ІІ. Пользованіе гноевых рань. ЧАЕНЪ ІІ. Пользованіе гноевых рань. Чароно ее солержать. Канія раны яванты надобно. Которыя должно залічныть, и ногда нестію. Конх советь авчать не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых рань. Важность покоя для рань на ногахь. Внішнія вспоможенія противу гноевых рань. Внять вспоможенія противу гноевых рань. Сулема. Пріемь. Не можно лічнть противу посвых рань. 391 Намяна из врату самбуковаго, бальсять женейевь. Сулема. Пріемь. Не можно лічнть посвой раны старой, не замінявь оной отверстієм уродно прижнганіе учиненныть. Воліни, кон были бы послідастійми оных безів таковой предстанорожности. В 8. О вередахь или гноевыхь ранахь на подобіе фистулы и о различных видах фистулы.	
О нарывных или гносвых ранахв. Свойство таковых ранв. Ч Л Е Н В І. Причины таковых ранв. Кан можно бы их предупреждать. Кан можно бы их предупреждать. Ч Л Е Н В ІІ. Пользованіе гносвых ранв. Ч Л Е Н В ІІ. Пользованіе гносвых ранв. Канія раны лічнты надобно. Которыя должно залічнівать, и когда надобно се совержать. Канія раны лічнты надобно. Которыя должно лічнть сь предосторожность. Канія раны лічнты надобно. Которыя должно лічнть сь предосторожность. Канія раны лічнты надобно. Которыя должно лічнть сь предосторожность. Внутреннія вспоможенія противу гносвых ранв. Дізня. Внішнія вспоможенія противу гносвых ранв. Внішнія вспоможенія противу гносвых ранв. Зуч наливна нэй цвіту самбуковаго, бальсам жазь, надрізыканія. Вода навестковая. Сулема. Пріємь. Не можно лічнть гносвой раны старой, не заміняв оной отверстнім учезь приниганіє учиненнямь. Волічнь чрезь приниганіе учиненнямь. Волічнь чрезь приниганіе учиненнямь. Волічнь чрезь приниганіе учиненнямь. Воління, ной были бы послідать па подобіє фистулы и о различнымі видамі фистулы.	глубокія.
ЧАЕНЪ І. Причины таковыкъ ранъ. Кто онымъ подвержны. Канъ можно бы икъ предупреталь. Чъмъ рана сія разанчествуєть отб простой раны. ЧАЕНЪ ІІ. Пользованіе гноевыхъ ранъ. Чадобно ее солержать. Надобно ее солержать. Канія раны авчить надобно. Которыя должно авлічнать, и когда сію рану должно авлічнать, и когда сто рану должно авлічнать св предосторожностю. Конхъ советь авчить надобно. Которыя должно авчить св предосторожностю. Внутреннія вспоможенія противу гноевыхъ ранъ. Вніши. Внішнія вспоможенія противу гноевыхъ ранъ. Внішнія вспоможенія противу гноевыхъ ранъ. Зуї Наливна изъ цвёту самбуноваго, бальсамъ женевієвь. Ртупь осадочная прасная, базнавная мазь, надрізыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємъ. Не можно авчить гноевой раны етарой, не замінивь оней отверстівть учиненнямъ. Волізни, кон были бы послідствільні оныхъ безів таковой предосторожности. З в. О вередахь или гноевымъ ранахъ на полобіе фистулы и о различныхъ видахъ фистулы.	\$ 7.
ЧАЕНЪ І. Причины таковыкь рань. Кань можно бы икъ предупреждать. ЧАЕНЪ II. Пользованіе гноевых рань. Чарано опредъянть, когда сію рану должно залічнвать, и ногда надобно ее содержать. Канів раны айчины надобно. Которыя должно залічнвать, и ногда надобно ее содержать. Канів раны айчины надобно. Которыя должно лічнть съ предосторожностно. Конкъ совствъ лічнть не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых рань. Важность поноя кла рань на ногахь. Вибшнія вспоможенія противу гноевых рань. Зугання изъ цетту самбуковаго, бальсамі женевість. Ртупь осадочая прасная, базильная мазь, надрізыванія. Вода навестновал. Сулема. Пріємь. Не можно лічнть гноевой раны старой, не заміння оной отверстіємь чрезь прижиганіе учиненнямь. Волізни, кон были бы послідствіми оныхь безь таковой вредовногомности. З 8. О вередать или гноевымь ранакь на полобіе фистулы и о различныхь видать фистулы.	О нарывных или гноевых ранах в. \$88
Причины таковыкь рань. Кмю онымь подвержены. Кант можно бы ихь предупреждать. Тымь рана сія различествуєть от простой раны. ЧАЕНЬ ІІ. Пользованіе гноевых рань. Трудно опредъльть, когда сію рану должно залічнвать, и ногда надобно ее солержать. Канія раны лічнты надобно. Которыя должно лічнть съ предосторожностно. Конкь совсть лічнты не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых рань. Вижность поноя кла рань на ногахь. Вийтія вспоможенія противу гноевых рань. Зугана изь цвіту самбуковаго, бальсамь женевієвь. Ртупь осадочня прасная, базильная мазь, надрізыванія. Вода навестновал. Сулема. Пріємь. Не можно лічнть гноевой раны старой, не заміння оной отверстіємь чрезь прижиганіе учиненнямь. Болізни, кон были бы послідстіми оныхь безь таковой вредовнорожности. З 8. О вередать или гноевымь ранахь на полобіе фистулы и о различныхь видать фистулы.	Свойство шаковыкъ ранъ.
Клю оным полвержены. Кан имжно бы их иредупреждать. Ч Л Е Н В II. Пользование гноевых ранв. Трудно опреданить, когда спо рану должно залвивать, и ногда надобно ее солержать. Кан раны лачить надобно. Которыя должно лачить св предосторожностно. Кан раны лачить надобно. Которыя должно лачить св предосторожностно. Виуторенийя вспоможения противу гноевых ранв. Вижность покоя для ран на ногах в. Вивший вспоможения противу гноевых ранв. Вивший вспоможения противу гноевых ранв. Зуг налича из в ввту самбуковаго, бальсам женезіев в. Ртуть осадочная красная, базильная мазы, надразыванія. Вода известновая. Сулема. Пріем в. Сулема. Пріем в. Сулема. Пріем в. Волазни, ной были был посладствільни оных везь таковой предостию ученостни. Волазни, ной были бы посладствільни оных безь таковой предосторожности. В в. О вередажь или гноевых ранах на подобле фистулы и о различных видажь фистулы.	членъ І.
Канъ можно бы их предупреждань. ЧАЕН В II. Пользование гноевых ранъ. Трудно опредъяни, когда сио рану должно залъчнать, и когда надобно ее солержань. Каніа раны лачинь надобно. Кошорыя должно лачинь съ предосторожность. Каніа раны лачинь не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых ранъ. Важность поноя для ранъ на негахъ. Витинія вспоможенія противу гноевых ранъ. Зуї Наливка изъ цвёту самбуковаго, бальсамъ женевевъ. Ртуть осадочиля противу гноевых ранъ. Зуї Наливка изъ цвёту самбуковаго, бальсамъ женевевъ. Сулема. Пріемъ. Сулема. Пріемъ. Сулема. Пріемъ. Бользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемь учиненнымъ. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемности. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемности. Вользин, нон были бы последствілми оныхъ безъ таковой предстемности.	Причины таковых рань.
Пользование гноевых раны. Трудно опредлание, когда сио рану должно зальчивание, и ногда надобно ее селержание. Какія раны льчины надобно. Кошорыя должно льчины сь предосторожностию. Конхъ совствъ льчить не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых рань. Внёшнія вспоможенія противу гноевых рань. Внішнія вспоможенія противу гноевых рань. Зута наливка изъ цвыту самбуковаго, бальсамы женевість. Ртуть осадочная красная, базильная мазь, надрызыванія. Вода известновая. Сулема. Пріемъ. Не можно льчить гноевой раны старой, не замынать оной отверстіемь чрезъ прижиганіе учиненнымь. Вользин, кон были бы последаствімын оныхъ безъ таковой предосторожностия. З в. О вередахъ или гноевыхъ ранахъ на подобле фистулы и о различныхъ видахъ фистульн.	Канъ можно бы ихъ предупреждань.
Трудно определень, когда сію рану должно залечнать, и ногда надобно ее солержать. Какія раны лечнім надобно. Которыя должно лечнів св предосторожностію. Конхв совсёмв лечнім не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых рань. Важность поноя для рань на ногахв. Вившнія вспоможенія противу гноевых рань. 391 Наливка изв цевту самбуноваго, бальсамв женевіевь. Ртупь осадочная нрасная, базильная мазь, надрезыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємв. Не можно лечніть гноевой раны старой, не заменять оной отверстіємь чрезв прижиганіе учиненнымь. Волезни, нои были бы последствінни оныхв безв тановой предосторожности.	членъ п.
Трудно определень, когда сію рану должно залечнать, и ногда надобно ее солержать. Каків раны лечнім надобно. Кошорыя должно лечніть св предосторожностію. Конхв совсёмь лечнім не должно. Внутреннія вспоможенія противу гноевых рань. Вившнія вспоможенія противу гноевых рань. Вившнія вспоможенія противу гноевых рань. Зуг наливка изв цевту самбуноваго, бальсамь женевіевь. Ртуть осадочал нрасная, базильная мазь, надрезыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємь. Колема. Пріємь. Волезни, нои были бы последствільні оныхв безв таковой предосторожности. Зуг на подобіє фистулы в в. О бередахв или гноевыхв ранахв на подобіє фистулы и о различныхв бидахв фистулы.	Пользование гноевых в рань.
Важность поноя для ранв на ногахв. Вившнія вспоможенія противу гноевыхв ранв. 391 Наливна изв цвёту самбуноваго, бальсам женевієвь. Ртуть осадочная красная, базильная мазь, надрізыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємв. Не можно лічнть гноевой раны старой, не замінив оной отверстієм чрезь прижиганіе учиненнымв. Волізни, нои были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни и подобіє фистулы по оразличных видахів фистулы.	надобно ее солержать. Канія раны лічнть надобно. Которыя должно лічнть сі предосторож- ностію. Конжі совсітть лічнть не должно.
Важность поноя для ранв на ногахв. Вившнія вспоможенія противу гноевыхв ранв. 391 Наливна изв цвёту самбуноваго, бальсам женевієвь. Ртуть осадочная красная, базильная мазь, надрізыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємв. Не можно лічнть гноевой раны старой, не замінив оной отверстієм чрезь прижиганіе учиненнымв. Волізни, нои были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни, ной были бы послідствільні оных безів тановой предосторожности. Волізни и подобіє фистулы по оразличных видахів фистулы.	Aiomo.
Намивка из в цв ту самбуковаго, бальсам В женевіса в. Ртуть осадочная красная, базильная мазы, надръзыванія. Вода известновая. Сукема. Пріємь. Не можно льчить гноевой раны старой, не замьнать оной отверствем чрез прижиганіе учиненнымь. Вользни, кои были бы последствільни оных в без в таковой предосторожности. Во вередах в или гноевых в ранах на подобіе фистулы и о различных видах фистулы. Зов	
Ртуть осадочная красная, базильная мазь, надрёзыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємь. Не можно льчить гноевой раны етарой, не замынавь оной отверствемь чрезь прижиганіе учиненнымь. Вользин, нои были бы последствілми оныхь безь тановой предосторожности.	Вићшнія вспоможенія противу гноевых рань. 391
Ртуть осадочная красная, базильная мазь, надрёзыванія. Вода известновая. Сулема. Пріємь. Не можно льчить гноевой раны етарой, не замынавь оной отверствемь чрезь прижиганіе учиненнымь. Вользин, нои были бы последствілми оныхь безь тановой предосторожности.	Наливка изВ цвбту самбуковаго бальсамЪ ЖеневіевЪ.
Сулема. Пріємь. Не можно льчить гноевой раны етгрой, не замынать оной отверствемь чрезь прижиганіе учиненнымь. Вользин, нон были бы последствільн оныхь безь тановой предосторожности. В 8. О вередахь или гноевыхь ранахь на подобіе фистулы и о различныхь видахь фистулы. 398	Ртуть осадочная красная, базильная мазь, надризывания. Вода из-
Не можно лечить гноевой раны етарой, не замениев оной отверствем в чрезв прижигание учиненнымв. Волезни, нои были бы последствими оныхв безв таковой предосторожности.	
осторожности. § 8. О вередахь или гноевыхь ранахь на подобіе фистулы и о различныхь видахь фистулы. 398	Не можно явчить гноевой раны етарой, не заменивь оной отвер-
у в. О вередахь или гноевых ранахь на подобіе фистулы и о различных видах фистулы. 398	Вользии, нои были бы последствими оныхв безв таковой пред-
и о различныхъ видахъ фистулы. 395	

	Спіран.
членъ х.	Cmpani
О вередахъ или гноезыхъ ранахъ фистульныхъ.	394
Операція. Діята	garante Spready
членъ п.	
О фистуль въ заднепроходной кишкъ.	greened
Причины	- Increased
Пользование фистулы въ заднепроходной кишкъ.	395
Постила Вардова. Діэта. Операція. Способъ нанъ оную яблать. Не всяную фистулу въ заднепроходной кишит выльчить возможно. Не должно употреблять ябкаретав въ случат фистулы и гноевых ранъ кромъ какъ по совъту искуснаго Врача или Ліпара.	596
членъ пп.	
О фистуль слезоточной или о протожь слезоточномь. Свойство фистулы слезоточной. Причины. Пользование слезоточной фистулы. Операція. Припадки, бывающіе посльдствіями жудо едъланной операціи.	397
глава 53.	
Продолжение о вользияхь Лькарскихь.	Mineral
О вывихиваніяхь разныхь частей тъла.	Property
Что должно разумъть чрезъ вывихиваніе человъкъ разумный и смълый можеть быть весьма полезень в случат вывихиванія.	Ъ - 399
Всеобщее поиятие о операции и пользовании, каковых требуеть вывихнутый члень.	<i>B</i>
Когда вывижнутіе недавнее	Tomorrow Tomorrow Tomorrow Tomorrow
S I.	
О вывихиваніи челюсти.	
	401
Ж	ЧЛЕНЪ

Отлавленте.

Oras Bachfe.	
членъ т.	Стран.
Причины вывихиванія челюсти.	40 E
членъ п.	702
Признаки вывихиванія челюсти.	
Опасной способъ у престьянь.	Mile Manufaction
чему признать можно, что челюсть вправлена	• 402.
© 2.	
О вывихиваній шей.	403
членъ 1.	
Причины вывихиванія шен.	portudit
жанъ скоро вывижнутие бываеть совершенное " то оное немед	хенно
Ч A Е Н Ъ II.	
Признажи: вывиживанія шей.	transit.
ч л Е н ъ ии.	
Способъ какъ вправлять вывихнутую шею.	(manual)
По чему примъчается, что вправление саблано. Оно не такъ трудно, какъ себъ воображають. Что надобно дълать по совершени онаго.	** 404 ** ******************************
√ ° 3 a.	
О вывихивании реберт.	· American .
Ч A Е Н Ъ I.	
Способъ какъ вправлять вывимнутыя ребра, ко	raa —
ч ж в н ъ п.	,
Способы какы вправлять вывихнутыя ребра, когда ловка костей находится внутри.	
Сіє вывиживаніє есть одно нов самых в трудных в вправленію.	405
Ø' 4°.	,.
•	
О вывиживаніи плеча	406
	energial.
Ч X Е Н Ъ Т.	
Признажи вывихнутаго плеча.	членъ
	L

Cmpaw.
членъ п.
Способъ жакъ вправлять вывихнутое плечо. 405
Жалобчо два помощчина нромб того, который лействуеть, для еделанія сего вправленія.
\$ 5.
О вывихивании ложтя, запястья и перстовы. 407
членъ т.
О вывихивании локтя.
Признаки вывихиванія локтя.
Способъ какъ вправлять вывихнутый локоть. Три человъи потребны къ вправлению сего вывихнутия.
члень п.
О вывихнутін запястья и перстовъ.
௺ ₺.
вывихнутіяхь андвен, кольна, лодыжки и перстовь у ноги.
членъ и.
О вывихнутін лядвен. Признаки вызихнутой лядзен.
Способъ жакъ вправлять вывихнутую лядвею. Когда она вывижнута напередь. Когда вывижнута назадъ.
Ч Л Е Н Ъ III.
О вывихнутіяхъ кольна, лодыжки и перстовь у ноги. Для вправленія вывихнутой кости проворетво нужнье, нежели сила.
т д А В А 54.
Продолжение о бользиямь Авкарскимь. 410
Ф переломленіяхь, зашибахь и килахь или грыжахь.
J I.
О перелом леніяхъ.
членъ І.
Раздъление переломлений и оныхъ свойства. 411 то разумъется чрезъ переломление простое, сложенное, многосложенное, полное, ненолное, поперечное, косвенное,
Продолгова тое,
Ж 2

членъ п.	Сшране
Признаки переломленій:	- pured
Первое понеченіе, какое имъть надобно въ переломленіяхъ. Отличительные знаки переломленія. Натура одна промышляеть о соединенія или сраженія раздроблечаєть.	енныхь
членъ пп.	
Пользование переломлений. Вспоможения наружны	IA. 414
Когда раздробленная ность бываеть велина. Промывательныя. По- ляющі і яства. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	CAR6- - 415
Потребно, чтобы больной быль содержань сухо и чисто. Въ каномъ положени должно держать раздробленный члень.	w 416
Наружныя вспоможенія въ пользованіи переломлен	ій. 417
Об тол тельства требующія отнятія члена СЪ наною предосторожностію двлать оное должно	and the second
Опасности от в перевязонь очень стянутыхь. Средства, начь содержать члень переломленный.	- 418
Переломленныя ребра. Вода съ унсусомъ.	- 419
5 2.	
О зашивахъ или ударахъ сильныхъ.	man media
Зашибы часто сопровождаемы бывающь принадками опаснъйши жежели переломленая. Для чего ?	IMH 9
членъ 1.	
Признаки зашивовъ	420
Что шакое зашибъ.	-
членъ п.	
Пользование защивовъ.	in the same of the
У лодная вода немедленно. — — — — — — — — — — — — — — — — — Предосторожности, съ кановыми надобно се употреблять.	- 42I
Перевязка. Частое кровопусканіе, покой и отдохновеніе. Черная грязь въ большижь городажь. Вода съ уксусомъ, нап	вода
соленая.	- 422
Необходимость держапь больную часть перевязанною очень д	SOTKO
Наружных авкарства.	
	6.4

	Canau
J 3.	Cmpan,
О жилахъ или грыжахъ.	423
что разумбется чрезв нику. Кто оной подвержены бывать.	disserve
членъ 1.	
Причины жиль или грыжь.	
Ч A E H Ъ II.	
	_
Признаки жиль или грыжь.	*24
ВЪ случав напряжения; ослабления.	(Managa)
Признаки существенные	
Свойства отличающія килу или грыжу оть бубона.	425
Отъ засоренія съменомоснаго ствола.	426
СЪ какою предосторожностію надлежить поступать при осматри	•
вани киль.	427
Убійственный опыть площадных в лекарей.	
членъ III.	
Пользование жиль или грыжь.	·
Надобно немедленно стараться о вправлени нишки.	Courtstand
Положение, въ изномъ быть долженъ больной, ногда онъ младе	-
нецъ, при сей операція.	428
Что надобно делать, накъ скоро нишка будеть вправлена.	-
Корье или толченая дубовая кора. Способъ, какъ ее приготовлять	,
канЪ прикладывать. СпособЪ какЪ вправлять килу у взрослыхЪ.	429
Легчайшій способъ какъ вправлять грыжи.	Servend
Кровопуснаніе. Положеніе, въ накомъ быть долженъ больной. При	•
пария промывательныя.	489
Подавленіе. Промывательныя из выму курительнаго табаку.	-
Надобно испышывать всь сін средства, прежде нежели приступити	
Когда предложенныя средства бывають безуспъщны, то надлежить	-
приступить къ операціи, но не упуская времени.	451
Опасноеть, ноимъ подвергающся многіе, полаталсь на лъчильщиновъ	
деревенских в, и проч.	
членъ IV.	
Діэта, какую должны наблюдать страждущіе килою	1
или грыжею.	432

T A A B A 55.

О припадкахъ смертельныхъ, зависящихъ отъ причинъ	
вившнихъ, или причинязмыхъ тълами остановивши-	
мися вы горай пищеприемномы и горай дыхательномы;	
оть погружения или потопления вы водь, и проч.;	
оть парозь удущающихь и стужи чрезмёрной.	432
же должие никогда оставлять никого, ито нажется мертвымъ,	
прежде нежели не удостовбришься о его смерти	-
Потребно иногда весьма долгое время, прежде нежели жидкости	
тья человыческого ожладыють до такой степени, что ижь разо-	
грёщь не можне	455
ными жизни, послъ ударовъ, падений и проч.	454
Первое внимание, накое имбить надобно и человъку, который из-	707
жется лишенным бжизни.	
T.	
О припадкахъ смертельныхъ, происходящихъ отъ тълъ	
остановившихся въ горав, въ глоткв или въ Дыха-	
тельной трубъ.	436
Сін припадин бывають обыкновенно действіемь нераденія.	- parentel
Беэразсудность техь, кои держать во рту леозди, булавки, птол-	
ки, и проч-	
Примеры смертельных припадновь, причинлемых от яствъ	
проглоченных в большими кусками и съ великою жадностію.	promounts
членъ т.	
Признаки припадковь, приключающихся оть тъль	
остановившихся въ горав пищеприемномъ или дыха-	
тельномъ.	學文學
членъ п.	
Пользование, какого требують ть, у коихъ находят?	
ся какія нибудь тёла остановившіяся въ горлё пище-	
	438
Можно только вышащить ихъ въ ротъ, или пребить въ желудокъ. Самое надеживищее средство есть вышаскивать; но не всегда оно	
возможно.	
Канія тъла можно пробиванть безъ опасенія въ желудонъ. Канія же	
	4189
	ep-

	Страно
Первое и второе средство, какъ вынимать тъла оста	
новившіяся въ горав.	439
Персты; шипчики.	-
Трешій способь, кань вынимать тела остановившіяся въ гораз.	440
Крючки. Спесобъ накъ вжъ приготовлять и въ горло запускать	-
Они служать наипаче къ вытасниванию булавокъ, рыбыкъ носте	á
и проч.	***************************************
Четвертый способь, какъ вынимать тъла остановизші-	-
HCH 6B. TOPAB.	441
Кольца. Способъ нанъ дълать кольца твердыя, и нанъ оныя вила- дывать.	Invested
Способъ, какъ дълать кольца гибними. Презмущества сикъ послъд-	•
нижъ колецъ.	- Province
Пятый способъ какъ вынимать тъла останозившіяся	
въ горав.	443
Морская губка. Способъ нанъ вкладывать ес. Аругой способъ.	
Tpemin cnoco6B.	448
Шестый способъ какъ вынимать тъла остановившіяся	
6Б ГОРАБ.	* (bernaud) *
Кусокъ мяса твердаго.	-
Седьмый способъ какъ вынимать тъла остановившіяся	
6ъ гор.1ъ.	
Рвоша. Обстоятельства , въ которыхъ она полезна быть можеть.	
Ипекакуанга.	delinearing*
Промывательное изъ дененту табаннаго. Способъ канъ оное при-	
Важность онаго, Наблюдение.	-
	444
Средства, какъ пробивать въ желудокъ тъла, ком	
внутренно повредить не могуть.	-
Намасленая свъчка, кипповы усы и проч.	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is
Обстоятельства , въ которыхъ наджежитъ пропихивать въ желу-	
докъ даже и штя вредныя	4'4'5
Или они не выходять и умеривляють больнаго.	transmitter.
Или выходять они мочею;	44'2.
Или чрезъ кожу.	Territoria (Carlos Carlos Carl
Пользование, какое употреблять надобно, когда не	
можно вынуть, ниже пропихнуть въ желудокъ тъ-	
ла остановившіяся въ горль.	(managatha
Мадобно оставить полышки. Для чего ?	Contragues .
Саващь питіє магчительное; или шприцовать снымъ кора	-
**	ROBO»

C	тран-
Кровопусканіе. Катапказмы — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	450
Пользование, когда остановившееся тело совершенно наполняеть горло.	45 I
Питательныя промывательныя	
5 2.	
О припадках в смертельных в, приключающихся от по- топленія, паденія, ударовь и проч.	ğundayı işti
ч л в н ъ т.	
оть потопленія; или о утопленикахь.	Recognize
Вспоможенія, какія надобно оказывать утопшимъ для возвращенія имъ жизни, когда кажутся, что они ее лишились.	453
Описаніе ящика называемаго Буанть антрепо, и вещей въ немъ	
содержащихся. Надобно прежде всего доставить ей ящинъ. И сыскать двухъ или трехъ человъкъ знающихъ.	454
Канимъ образомъ переносить утопленика	455
Первое показаніе: согръвать. Причина, для чего надобно начать отогръваніемъ утопленика. Потребно бы присовокупить къ запасному ящику и термометръ.	456
Для чего? Несбходиместь воздуха свъжаго и сивознаго въ номнать утопленина. Летучія соли. Нашатырный спирть летучій. Тренія спиртами.	457
Вдыжаніе воздука въ уста утопленину. Вдыжаніе въ ноздри. Способъ накъ употреблять трубочку вдыжальную изъ ящика	458
запаснаго. — проръзывание дыкашельнаго горла. Нашашырный спиршь лешучій	459
впутренно. Пріємъ.	461
Дымъ мабашный, впускаемый въ задній прокодъ Спесобъ, какъ его впускать	4 6 2

Отлавленте.

Cmp	on He
Не надобно ничего давать въ роть утопленику, пока онъ не бу.	
деть вы состояни глотать, выключая нашатырный спирть 4	6.5
Надлежить ему промачивать губы и лаынь спиртами. Средства,	
какъ производить въ немъ рвону не давая рвотнаго.	-
Уксомедь морскаго луку, и пр.ч.	-
Рвоша не нужна.	66
Не надобно прерывать вспоможеній, котя бы утопления и казал.	
ся приходящимъ въ чувства.	(manufal)
Обстояте топа , показующія кровопусканіе. СБ какою осторожно-	
стію надобно пускать кровь утопленикамъ.	-
Кровопускание есть вспоможение существенное. Во многихъ случаяхъ	
	467
Изключение. Кровопускание изъ шейной жилы.	instanting.
Пост янство, наное надобно имъть въ подавании вспоможении. Время,	
когда оныя покинуть можно.	salesmedig
	469
Кратное новторение вспоможений, какія потребны для утопле-	
	470
Приназаніе, давать запасной ящинь при пер-ожь требованіи.	-
	¥71
О мнимой смерти, приключающейся от паденія уда-	
ровъ и проч,	-
ть же самыя вспоможенія, накія и для упоплениковь.	annual .
Наблюдение о мнимой смерти приключающейся от падения.	
Отъ удара.	4.72
Вольшей части шехв, кои умирають внезанно после паденій.	
ударовъ и проче можно бы было возвращить жизнь.	-
Вспоможенія оказываемыя утопленинам'в пригодныя во всякой почти	
смерши внезацной.	(*
Въ большей насти таковыхъ случаевъ нужно токмо возвратить	-
остановившееся дыханіе.	-
Въ чемъ ессиониъ жизна, смерть.	475
€ 3.	
О асфиксіи, то есть величанией степени обморока,	
или о припаджажь смертельныхв, приключающихся	
оть паровь вредныхъ и захватывающихъ духъ, какъ-	
one of work with the of the of the order	
то о чадъ или угаръ, или о парахъ исходящихъ отъ	
горящаго уголья; отъ напиткозъ закис ющихъ, отъ	
колодезей и рвоев, закрытых съ дленяго времени,	
оть лампадь и свычь зажженных вы малыхы мь-	
стахъ; отъ нужниковъ и проч., такожъ и о при-	
падках происходящих от удару гоомозаго и проч.	-terrently
Канъ воздухь можеть сдвиаться вреднымъ и смертоноснымъ.	THE PARTY NAMED IN
Мадобно убъгать чаду или угару.	-
3	Она-

Оглавлен ї е.

Cm	гран.
Опасность спать въ небольшикъ покоякъ, въ коихъ топится; вко- дить въ такія мъста, въ ноторыкъ накодятся напитки, кои	474
Пользованйе, жакому подвергнуть себя должны ть, кои задохнутся оть того или оть другаго изь сихъ паровь.	processing
Вспоможенія, какія должно оказывать тёмь, кон поражены бывають слегка, или которые въ обморокь впадають несовершенный.	a,
О пирыный воздух Б ; летучій спирть нашатырный	476
Вспоможенія, какія надобно подавать тёмь, кои лишатся памяти и чувствь, то есть дошедшимь до величайшей степени обморока.	passant
Вездужъ колодный и открытой. Нашатырный спарть летучій. Ванны для могь и тренія. Промывательныя острыя.	477
Кровопускание есть последнее вспоможение, какое употреблять должно.	- bosseth
Вспоможенія, какія надобно подавать тъмъ, кон задохнутся отъ угару или отъ паровъ происходя- щихъ отъ разженнаго уголья.	Samuland
ВЪ чемъ соетоятъ таковыя вспоможенія. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	478
Вспрысниваніе лица самою жолодною водою. Первые знаки оживленія, Летучій спиртъ нашатырный.	479
Трені». Свіжій воздухі ві комнаті. Промывательныя острыя. Обстоящельства требующія провопуснанія.	480
Ваниа для новъ.	481

Отлавленте.

	mpake
Вспоможенія, какія надобно оказывать тыть, кон	
задохнутся от паровъ исходящих от напитковъ	
закисающихъ или бродящихъ; отъ смертоносныхъ	
изліяній, происходящих в от в колодезей, подкоповь,	
нужниковь, подземныхь рвовь, и проч. затворен-	
ныхъ съ давняго времени; отъ ударовъ громо.	
выхв и проч.	431
ТБ же самыя вспоможенія.	
Впадающіе въ величайшую степень обморока умирають равно макъ и ушопленики, во вдожновеніи.	
Канъ причина смерти утоплениновъ и задыжающимся отв эловред-	
ных в паров в есть та же самая, то и вспоможения нановых в	
они перебующь, суть одинановы.	482
члень п.	
Средства, какъ предупреждать асфиксію, то есть величайшій степень обморока, и приклюди приклюдиощієся от паровь мефитическихъ и духъ захватывающихъ.	487
Средства, жакт истреблять мефитической воздумъ, происходящій оть горячаго уголья.	484
Вода :	Married St.
Свойства воды для приведенія воздука въ естественное его состоя-	
ніе. Наблюденіе.	townscatili
Нашатырный спирть летучій.	486
Вода и нашатырный сперть летучій суть равнымъ образомъ пред-	
окранительных средства противъ мефитическихъ паровъ ощъ	
рудниковъ.	-
Противъ наровъ происходящихъ отъ нислостей минеральныхъ.	\$100,000 pt. 23
Важность открытаго воздуха.	487
Средства, какъ уничто жать мефитическій воздукъ, происходящій оть нужниковъ.	
Ones a watermana waseding.	
U.S Walter	488
Character was to a walling a suit and a stable of the stab	489
and the state of t	491
§ 4.	
О припаджахъ смертельныхъ, приключающихся отъ чр	e.3•
20 T O 21 O 24 O 22 O 22 O 22 O 22 O 22 O 22	92
Надобно преодоливать дремоту, причиняемую чрезмирно великою стужем	
\$ 2	LP'E
745	E-15 E-15

членъ і.

Вспоможенія, жакія надобно оказывать тёмь, кои отморозять одну или многія части тёла, или когда оныя оть стужи окрыпнуть или оцёпеньють. 493

Надобно поспешить пособствованіемь вы таковых случаяхь. — Опасности оть внезапнаго отогруванія. — Должно- пользоващь члены сцёпеньлые оть стужи такь, какь и плоды замералые. — Надобно ихь оттирать снёгомь, или нласть вы весьма холодную воду. — — 494

членъ п.

- Вспоможенія, какія надобно оказывать тёмь, кои столько объяты бывають стужею, что не подають болье никакого знака жизни.
- Споссбь, нань употреблять холодную ванну.

 Тренія: постеля умфренью теплая.

 Тренія водною. Кань должны происходить тренія по брюху и груди.

 Нашатырный спирть летучій.

 Теплая ванна.

 Фтвары и вино.

 Наблюденіе.

 Внезапное принладываніе горячаго на часть весьма холодную бываеть самою общею прачиною ногтовдь, цыпонь и проч. 498

ГЛАВА 56.

О обморокъ, о пьянствъ, о заняти духа, о удущени и удавлении, о судорогахъ сопровождаемыхъ видимою смертию и о смертяхъ скоропостижныхъ.

S I.

- О обморокъ и различныхъ онаго степеняхъ.
- Свойство обмерока первой степени, подъ именемъ слабости извъ-

Cm	ран.
Обморока второй степени; асфинсіи или обморока самой высочайшей степени.	499
Главныя причины обморока.	-
членъ 1.	
О обморокъ приключающемся отъ излишества крови.	,
Кто оному подверженъ.	description (
Пользование обморока приключающагося отъ излише-	Protessed.
Унсусъ	500
Средства какъ предупреждать обморокъ, приключаю-	brooml
Яства, пите, тълодвижение.	-
членъ и.	
обморокъ, приключающемся отъ анеміи; то есть отъ недостаточества крови, или великаго малокровія, или отъ слабости.	THE REAL PROPERTY.
Пользование обморожа, приключающагося отъ великаго	
	501
Средства, жакъ предупреждать обморокъ, приключа-	
Яства.	-
ч л Е н ъ ии.	
О обморожь, приключающемся оть кровопусканія и чистительныхь.	502
Пользование обморока, приключающагося отъ крово-	
Уксусъ.	-
Пользование обморожа, приключающагося отъ чисти-	
Молоко, деревянное масло, вода луменная и проч; промынательным	-
мягчительныя. Кръпительныя	(material)
3 3 ···	CHT

.Страно

Оглавленте:

Cinpan.

YAEHB VIII	
О обморокъ, какая бы ни была оному причина.	506
Пользованіе.	-
Воздужъ чистый и свъжий есть первыйшее вспоможение противъ обморона. Не должно пускать въ номнату больнаго нромъ какъ людей совершенно нужныкъ. Надобио стараться объ отвращения причны обморона. Обыкновенныя послъдствия обморока. Кание обмороки меньше всете опасня.	507
√ 2.	
Опьянствъ.	~ 0 0
	508
Вспоможенія, кои оказывать должно человъку пья-	509
Разешернушь плашье, положение нашуральное-	503
Водяное пишье.) marile
Наблюдение о пъянстви приключившемся от водки.	516
Премывашельное раздражающее.	511
J 3:	
O занятін дужа или задохнозгній, удущеній и удав- леній.	- graneti
членъ г.	
О занятін духа или задохновенін.	- Chicago
Причины.	
Кто оному бываеть подвержень.	512
Пользование задожновения приключающагося от за-	-
Кровопусканте, промывательное, селитряное питіе; унсусь.	-
Пользование задохновения приключающагося от су-	والمستنو
Ванны для ногь, уксусь.	Garantini Garantini
членъ п.	
О удушении или задушении. Нерадъние нормилицъ подвергаеть сему младенцевь.	CTLO-
	VIDU

Cn	пран.
Вспоможенія, какія оказывать должно младенцамъ	
	513
Наблюденіе,	-
членъ ии.	
Оудавленіи.	515
Вспоможенія, какія надобно оказывать тыкь, кой	
съ отчаянія или иначе повъсятся, и которые, по-	
казываясь лишенными всякаго чувства, будуть по-	
читаемы за мертвыхъ.	4
Кровопуснаніе, тренія, промывательныя из дыму табашнаго.	transmittely)
Проръзывание дыжательнаго горла.	-
Вдыканіе воздука.	/managaments
S 4.	
О судорогахъ сопровождаемыхъ мнимою смертію и о	
О судорогахъ сопровождаемыхъ мнимою смертно и о смертяхъ скоропостижныхъ.	516
	50 A (II
членъ 1.	
О судорогахъ сопровождающихся мнимою смертію.	30
Вспоможенія, какія надобно оказывать тёмь, кон	
кажутся умершими въ судорогахъ.	517
Наблюдение.	Annerson
Тренія, вдыжаніе воздука, промывательныя изб дыму табашнаго,	518
Сін вепоможенія пригодны во всяникъ случалив, ногда есте-твен-	
ныя дъйствія тонмо остановятся и когда нужно бываєть при-	
весши ихъ въ движение.	519
членъ п.	
О смертяхъ скоропостижныхъ.	
Какія суть споропостижныя смерти, въ коижь можно ожидать	
наиболье успъка.	
Вспоможенія, какія оказывать должно людямъ уми-	
рающимъ скоропостижно.	520
Оныя сущь почти ть же самыя во всяних вслучаяхв, и могуть	
оказываемы бышь всякимь человокомь.	Companie
Какъ должны происходишь шаковыя вспоможенія.	521
Поетоянство, съ каковымъ должно ихъ продолжать.	Важ
	20-1-1-1

				C	urban.
Важность нашатырнаго спирту	zemy waro	въ больш	ей часши	выше-	
предложенных случаевь.	104		EM Md	No.	521
" гл	ABA :	57.			
					,
О горяч	къ обыда	енной.			524
Что такое есть экономія животн	ъгхъ,	-	PT .	in .	< question
Она повреждается всянаго рода		вомъ. п	римбры т	энпикс	
оть мастеровых выдей.			м		5 2 5
Сколько важно по, челобы мёш	ать трудь	т съ отд	мэінэвонко	ихи Ст	
гуляньемт.	•	-	ne .	tio 1	Charles St. Co.
что разумъется чрезъ обыденнув			44		526
Свойство обыденной горячки.		2			- International
Кию ей подверженъ.	_	5		100	. \$ 27
	or.				
Причины об	กเสยนมกที่	гооячки	1.	a ware age.	the is and
11 phquad	and but a contract of				Street
	\$ 2.				
Признаки о	รายสาย	COO MU	- 70 T	,	
· ·		. A O JONE 1 II	. 15 .		528
КакимЪ образомЪ она оканчиваетс		0.00 4 . 110 . 11	44 WAYNANA		
Обыденная герячка есть бользнь з		av 2 no H	е должно	непре	
щи объ ней.	•	•		ulb	-
	J 3.				- 7
			1		
Пользованіе об	ыденнои	горячя	IN.		529
Сколько важно, чтобы оказывать	вниманіе	къ прача	намЪ и п	ризна-	
намъ обыденной горячки.	-		W.		(money)
Вниманіе и раченіе, каковыхъ тр			орячка со	cmo-	
роны шого, кто пользовань ее					Spirocopii.
Весьма обыкновенное поведение не	BEKAB BE			денной	_
гор чки. Важность пищеупотребленія въ о	Servario Y n		-		550
Bawkochia named nombeoresia an o	ODIACHHON I	opara.	7		931
У У	E H B	I.			
77			40 24 0		
Пользованіе обыденной год			-		
нощебавний, неумвренна					
наго труда, неусыпнаго	упраж:	нения 6	ъ наука	и бж	
npoq.					532
Надобно начать съ прерыванія тр	удовъ свои	жЪ. Пре	имуществ	no-	
коя въ постели.			- 0	1. 5	-
	EL,			A	HMO-

Оглавленте:

Cr	пран
Лимочаль, вода съ уксусомъ, сыворошка съ померандомъ, настой	
изъ свекольнику съ селитрою.	533
Вины для ного и промывательныя.	(Signature Side
Канія должны быть яства; питіе.	-
Кртишельныя были бы вредны. Для чего?	Speciments
Кровопуснанія и чистительныя суть противны въ семъ родъ обы-	
жота бы и было итсколько жару, однакожъ сте еще не есть при-	-
чина для провопуснанія. Почятіє, нанов надобно себь представить	
o cemb mapbe	534
Кропопусканіе пітмъ паче прошивно, чітмъ изнеможеніе бываеть боль-	004
шее. Единственный случай, въ которомъ оно быть можетъ доз.	
BOACH?, -	trescool.
Обсительства, въ которыхъ проносное ленарство есть безполез-	
по и не нужно. Когда оно потребно.	535
Чистительное прожизждающее.	(married and particular and particul
Какъ вести себя долженъ больной по выздоровление	536
членъ п.	
Польгование обыденной горячки, приключающейся отъ злоупотребления ястев разгорячающимъ, вина, кръп- жимъ напитковъ; отъ перемъны діяты, и проч. Канъ сей родъ обыденной горячки имъеть велиное сколство съ нева- реніемъ желудна, то и пользованія требуеть подобнаго. Татіе водяное, и въ добольномъ ноличествъ. Промывательныя. Больной не долженъ лежать, Инекакуанна. Проносное.	537
HAEHE III.	
Пользование обыденной горячки, приключающейся отъ	
44	538
Сей видъ обыденной гордчии случается ръдко-	(maprovit).
Кто оной подвержень.	539
Надобно начать съ отвращенія сть себя причины оную произведшей.	-
Когда бываеть жарь, то пите прожагдительное. Ванны для ногь	
и явля.	540
Яствя. Хладительное питіе успоконванціее.	descented
Когда будетъ слабость, то сыворотка на винъ, наливна изъ сасса-	
фраса или корийрт.	-
Одинъ случай поназующій провопуснаніе, чистительныя.	(manage)

членъ іу.

Пользование обыденной горячки происходящей отв не- умфренности вы любозных забавахь, распутства или невоздержной жизни, рухоблудія и проч. Сколько бользей раждается оты сихы причины. Самая легчайшая есть обыденная горачна. Какін суть другія бользни. Послыдствія распутной жизни.	
Картина слъдствій рукоблудія.	545
Обыденная горячка есть знакъ подаваемый натурою къ оставлению	0 1 3
всякаго рода неумъренностей	545
намъ съ неумъренностью; рукоблудниковъ.	546
Когда не пріобщится нъ тому сухотная ликорадна: питіе и яства.	-
Нъщъ ясина превоскоднъе въ шакомъ случаъ. Для чего?	
Осторожность, какую надобно имъть при употреблени молока Кровопускание вредно. Для чего:	547
Когда надобно даващь проносное, то ревень токмо предписыващь	** Terresisado
ZO // MCHO	
Рукоблудниновъ изъ всъхъ шановыхъ больныхъ пользоващь гораздо	
То же самое разумъть должно и о рукоблудницакъ.	548
Вельма важно, чтобы быть извъстну о бъдственных в дъйствіях в	_
Напоминовение машерямь, начальницамь воспитательных заведений	549
E IDOA" STEETCHIN	
	7
r A B A 58.	
О разгорячении отъ солнечных в лучей.	550
Что разумбется чрезъ разгорячение отъ солнечныхъ лучей. Слъд- ствія разгоряченій отъ солнечныхъ лучей. Кто онымъ подверженъ.	551
J. I.	
Причины разгоряченія оть лучей солнечныхь.	-
Признаки припадковъ приключающихся отъ таковаго разгоряченія.	5 E C
·	552
Признаки, накія предешзавляють висція части головы. Другія части твла пераженныя солиечными лучами.	innermal)
No. and and the state of the st	5 \$ 3
4 Z	Ipm-

	mpan.
Признани у малолътных в дътей.	653
Признани, когда припадки бывають жегкіе.	Significant
9 3.	
Пользование припадкозъ приключающимся отъ тако-	
ваго разгоряченія.	554
Оно должно быть поспышное, какъ скоро припадки тяжніе.	discount
Кровопусканія. Ванны для ногъ.	managet .
Полуванна, цёлая ванна тепловатая, промывательныя мягчительныя.	555
Вода съ уксусомъ, оржатъ, лимонадъ, сыворошна съ унсусемъ.	Manageria
Примочки на головъ водою съ уксусомъ, нашатырнымъ спиртомъ	
летучимЪ,	
Слабительныя. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	teamprisi
Предосторожность, кановой требуеть жолодная ванна.	. 556
По напраженности припадковъ надобно размарять ланарешва.	
	- 5
\mathcal{J} . \mathcal{L}_{\circ}	
Средства жакъ предохранять себя отъ припадковъ	5
приключающихся оть разгоряченія солнечными лу-	
чами.	parand
Летомъ и весною соянце бываеть опасно для жишелей городскихъ.	557
Находившимся на воздухъ зимою итть нужды болться солнца ве-	
сенняго; но всякой человъкъ долженъ опасапься солица лъшияго,	
разав токмо кто будеть тогда въ движения.	558
Преимущества солнца весенияго для людей сложенія слабаго и нёж.	
Haro.	Servereit
Предосторожности, съ нановыми на ономъ находишься должно.	559
Bit was a second of the property of the second of the seco	
г л а в а 59.	
	gar recording
О багровой сыпи.	Speciality
Свойство сей бользии.	-
§ 1.	
Причины багровой сыпи.	-
6	
	~
Признажи багровой сыпи.	560
Ее не трудно выльчить въ началь.	561
Но естьям она стародавняя, то часто и опасно бывлеть прини-	
маться за дбуение.	G Z
	3 00

Оглаваенте

Gripa _N s	, .
Пользование багровой сыпи:	į,
Оно должно быть продолжительно. Важность діяты, а наниаче когда бользнь происходить от неумъ- ренняго употребленія напишковь.	
Дівпа должна продолжаться во вею жизнь.	2
Вачна для целымъ ногъ. Промывашельныя. Сыворошка, оржать, евенольная наливна съ селитрою.	104
Чистительныя, ногда бользиь будеть стародавияя - 563 Н. блюдение.	
Опасность от примираній, помадь, мазей и проч.	a
жарывное, фонцинент, иниварие выше из мореной воды 500	
J 4.	
Средства какъ предупреждать отрыжку багровой сыпи.	To the same of the
TAABA 60.	
О мозоляхь на ногахь.	-
Свойство мозолей на когажъ.	8-
J r.	
Причины мозолей на ногажь.	n de
Сжатів ноги от узной обуви. Другія следствія от сжатія тесною обувью. Безобразіе, нановое пріобретають ноги у щеголей от сжатія ихь узною обувью.	ar E
Наблюдение о странномъ положени больтаго перста у ноги.	ii.
S 2.	
Необходимыя следствія мозолей на ногахь.	1
Воль весьма жестоная; трудность, а часто и невозможность жо- дить. Недостатонъ твасявижения, совершенное недвиствие, и проч.	-
J 3.	
Пользование мозолей на ногахъ.	7 4
Нъщъ собственно дъйствующаго явкаретва противъ мозолей. Средства нанъ останавливать приращение начинающихся мозолей. Какт	-

Cn	прана
Жакъ сноро они нароступъ, то единственнымъ средствомъ почи-	
тается вырвзываніе. Надобно приготовить больнаго нъ сей операціи, что бы впрочемъ вы-	**************************************
рёзальщини мозолей объ ней ни сназывали.	569
Наблюдение о томъ, какимъ образомъ площадиме лъчильщики сию	
операцію дълають.	570
О томъ, накъ надлежить ее дълать.	
о мозокихъ то же самое разумъть должно, что и о струпахъ, пред- в шествующихъ заживлению большихъ ранъ; ихъ не можно снимать	
без в остановленія самаго зальченія	
повство.	**************************************
Всякое другое средство иромъ мягчительных в есть опасно.	
Преимущества округленной пилы, ногда хочешь согнать одну толь-	in the same of the
Средства нанъ предупреждать отрыжну мозолейо	(Innerent)
О ЛЕКАРСТВАХЪ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХЪ.	573
,	
Что должно разумёть подвименем в ленарешв в предохранительных	0.
Понятіе, накое многіє имъють о лькарствахь предохранительныхь. Всякія лькарства суть или полезны или вредны.	574
Фиасности от в авкарств в принимаемых везв показанія.	676

Конецъ оглавленія Тома ІУ



POCONNECKARIAN
POCONICATION
OF GIOTO





rus. 3946





